







44.3.77



# SVMMA PLANTARVM

QVÆ HACTENVS INNOTVERVNT

METHODO LINNÆANA

PER GENERA ET SPECIES

DIGESTA ILLVSTRATA DESCRIPTA

A FVLGENTIO VITMAN

AB. VALLUMBROS.

IN R. MEDIOL. LYC. PVBL. BOTANICÆ PROF.

ET PLVR. ACAD. SOC.

TOMVS I.


---



MEDIOLANI. MDCCLXXXIX.

---

TYPIS IMPER. MONAST. S. AMBROSII MAJORIS.  
SVPERIORVM PERMISSV.





## PRAEFATIO

**Q**uodnam sit huiusce operis argumentum ; quæ-  
 ve utilitas ex ipsamet inscriptione satis lucu-  
 lenter eruitur : hinc consilii ratio prorsus supervaca-  
 nea . Fervet paucis ab hinc annis Botanices studium ;  
 itinera ; Societates ; Horti novas plantas in dies  
 proferunt : deficiunt pene novis stirpibus nomina .  
 Nec mirum ; cum strenui Viri nunc existent , qui  
 nec itinerum labore ; nec cœli conditione ; neve  
 impensarum onere deterriti , id unum curarunt , ut  
 Historiam , quam aiunt , naturalem novo censu au-  
 gerent ; cum præsertim principum Virorum favore .  
 Testes sint Banks , qui plurima a fortuna mutua-  
 tus præsidia ad laudem , optato sibi socio Solandro ,  
 magna suscepit , perfecit : Cook , qui in præruptis-  
 simis montium , ubi vel caprini gregis vestigium  
 frustra quæxivisses , diu est commoratus : Thumberg ,  
 qui Japoniam europæo pedi antea imperviam , semel ,  
 ac iterum , plantarum novarum avidus , paucis as-  
 sumpto viatico , fractis viribus perlustravit : Sonne-  
 rat ; Mutis ; Pallas ; Commerson ; Aublet ; Dombay ,  
 aliique plures magni nominis Viri , quorum inven-  
 tis Botanices studium multo felicius nunc adolevit .

Hinc admirabilis plantarum novarum fere quotidiana supellex, ex diffitis Orbis partibus advecta.

Opportunum itaque mihi visum est plantarum omnium censum revivare; cumque qua revocatis; quæ noviter inductis herbis amplificare; & quicquid in hac re fuit detectum, proferre. Sedenim, ut qua decet, sincera fide agam, plantas singulas huc relatas dicere non audebo. Eset quidem opus utilissimum: at quis tot esse se viribus gloriatur? Res quidem tanta suscipi non potest sine maximis præfidiis; potissimum vero sine nuperorum omnium inventis. Cum in patriam reduces erunt summi Viri, qui generosa quadam alacritate ducti, pridem iter susceperere ad extremas Orbis partes, Beauvoir nimirum in Africam: Billiardiere ad Orientales terras: Elond ad Anthyllas, & Cayanam: Richard in Americam: Le Masson ad Promontorium Bonæ Spei (Botanicorum Athenæum): Greber ad Martinicam: De Haye ad Hispaniolam insulam: Hendenfor ad Tartariam Præcopensem: Geoffroy ad Senegam: Badier ad Guadalupiam: La Peyrouse Orbem caussa lustrandi: Hi, inquam, cum redierint, quicquid novi attulerint, alternis annis in vulgus edam, si fata siverint. Sufficiat interim huc referre quæ potissimum in Vegetabilium ed. 14. desiderantur, quæque vulgata iam dudum sunt, plures videlicet stirpes, quæ in Historia Helvetica Halleriana; quæ in Scopoli Flora Carniolica; fere omnes Aublet in Flora Guianensi; Hacquet in nova

alpium Carniolicarum lustratione, post Cl. Sec. vñ  
 peracta, legere est. His cumulavi quæ post mo-  
 do dictam editionem in lucem prodire. Et qui-  
 dem primo quæ in Cl. Allioni numquam satis com-  
 mendata Flora Pedemontana, cui, utpote numeris  
 omnibus absoluta, nulla antefertur; paucæ pares  
 numerantur. Quæ in Heritier *Stirpibus novis*: Sco-  
 poli *Deliciis Insubricis*: Ludwig *Stirpibus cryptoga-  
 mis*, Sonnerat ad Indos itineribus. Quas omnes si,  
 fide tantum translaticia, ad proprias sedes non re-  
 vocem, dabunt mihi veniam, cum de nonnullis  
 anteps adhuc sim, an revera sint novæ species,  
 an varietates tantum; cumque nihil statuere solitus  
 sim, nisi post experimenta iterum, ac sæpius eadem  
 de re capta. Non inde tamen quis dicere audebit,  
 non satis acutam oculorum aciem tantos viros ha-  
 buisse ad minimas plantarum dissimilitudines noscen-  
 das. Nemo enim ignorat, pro soli natura modo  
 contrahi stirpes, modo produci: modo minora, &  
 aridiora: maiora modo, & crassiora esse folia, quan-  
 vis una, eademque sit plantæ species; ut propte-  
 rea nullum notandum esse discrimen videatur. Idem  
 sentiendum de aliis, quas in lucem nondum pro-  
 ditas puto: an novæ sint incertus hæreo. Tot enim  
 occurrunt ambages, utpote pluribus vicissitudini-  
 bus obnoxia, ut iis expediendis, unius vix suffi-  
 ceret hominis vita.

At fortasse sunt hæc quidem viliora, quam  
 nonnulli sibi suaferint. Ne itaque Collectoris tantum

personam induere videar, eo potissimum spectant mea consilia, ut cum Species, tum Genera, quæ hætenus vel solertioris indaginis defectu; vel novarum similium additamentis, manca Botanicis sunt visa, nunc rectius definita (Cl. Allioni, & Cyrilli vestigiis insistendo) tutis, inconcussisque characteribus adpareant; ut omnis perturbationi locus tandem occludatur. Quod si Genera, Specieisque omnes examini subicere minus fuit concessum, nonnullas emendasse iuvabit.

Hoc ut rite peragerem, non parum subsidio mihi fuere & Cl. Virorum tum nostratum, tum exterorum consuetudo: & illustris Halleri Bibliotheca, quæ cum aliis non minoris famæ in hoc Braydensi Lycæo ex copiosis, selectisque Auctorum Disciplinis, servatur: qua duce comperi, tum Genera, tum Species plurimas in nuperibus editionibus relatas, exteram sedem agnoscere; quas ad eam, quæ eis congrueret, an referre deberem, diu anceps fui. Verum enim vero ordinis perturbatio; Botanicorum dissensus quò illæ pertineant, nihil innovandum docent. Sed in tanta rerum obscuritate quid egomet sentiam, ordine, & loco suo, ingenue propono.

At etiam, ut grati animi monumentum præbeam, non parum, ad meum propositum adsequendum, profuerunt Cl. Vahl Haphniensis Antecessoris notitiæ, & quasi lumina ex repetitis itineribus hausta. Hicce enim Vir rei herbariæ peritissimus, ut forte nulli secundus, post peragratas diversas Orbis, &

quidem a se diffitas plagas, ex Africa in Europam redux, Londinum se contulit, Hortum aridum Linnaei exploraturus. Omnibus inde speciminibus rite perspectis, nonnulla a communi mente distare intellexit. Idem dicendum de Plucknetii potissimum Phytologia ob incongruæ Synonymiæ causam. Neque in iis constitit tanti Viri sedulitas. Exemplaribus Forskælianis cum descriptione collatis, plurimas plantas ad Floram Ægyptio-Arabicam relatas, iamdiu innotuisse comperit.

Quod si Specierum definitiones tyronibus ad claram, distinctamque illarum notionem concipiendam incertæ adhuc videantur, ut omnis inde erroris suspicio e medio tollatur, cuilibet speciei brevis quidem, & concisa, sed tamen apta additur totius plantæ descriptio. Notas autem in definitionibus adpositas, in plantæ descriptione renovandas non duxi, ne frustra longus evaderem.

Nomina, quæ audiunt, trivialia religiose servo, utpote Specierum notioni coniuncta; etsi plantæ indolem pluries destruant potius quam designent.

Utque tandem de Speciei essentia ne dubitatione æstuemus, Auctorum tantum Synonima, qui de Plantarum figuris diserte egerunt, me retulisse gratum fore confido: quorum opera Botanice tantum habet nunc temporis honorem, quantum nullo umquam se consecuturam sperasset; cum ex priscis herbarum imaginibus divinare potius, quam scire videamur, quid illæ sibi velint.

Extremum moneo . Non ego mei tam audax  
æstimator sum , ut omnium votis satisfecisse me spe-  
rem . Iter sum ingressus : conficiant alii , & viribus ,  
& doctrina præstantiores .





V

# CLASSIS I. MONANDRIA.

## MONOGYNIA

\* *Scitamineæ*, inferæ: fructu loculari, infero.

2. *Renealmia*. Cal. 1-phyll. Cor. 3-fid. nectario oblongo. Bucca carnosæ.
3. *Amomum*. Cor. 4-fid. lacinia prima patente (In *A. Zingiberæ*, & *Zerumbet* limbus cor. 3-fid. seu bilabiatum, lab. super. integro, infer. diviso, intra quem nectar. 3-lob. In *A. Curcuma* limb. cor. 6-fid. nisi tres lacinie internas nectarium pariter nominandas ducas.)
8. *Curcuma*. Cor. 4-part. lab. ovato. Stam. 4. sterilia, 5. fertili.
10. *Thalia*. Cor. 5-pet. undulata. Drupa nucleo 2-locul.
7. *Maranta*. Cor. ringens, 5-6 fid. lab. magno, lacinii 2 alternis, patentibus.
5. *Myrosma*. Cal. duplex, exter. 3-phyll. inter. 3-part. Cor. irregul. 5-part.
9. *Kamysferia*. Cor. 6-part. lacinii 3 maioribus patulis, unice 2-part. Stigma bil. mellatum.
1. *Canna*. Cor. irregul. 6-part. lab. 2-part. revoluto. Filam. 6. Anth. lineares adnatæ margini nectarifero lacinie superioris.
6. *Alpinia*. Cor. ventricosa, 6-fida, lobis lateralibus binis emarginatis.
4. *Coffus*. Cor. interior inflata, ringens, lab. infer. 3-fido, lacinia media emarginata.

\* *Valeriana rubra*, *Calcitrapa*.

\*\* *Monosperma*.

11. *Boerhaavia*. Cal. 6. cor. 1-pet. campanulata, plicata. Stam. 1-2 Sem. 1. nudum, inferum.
13. *Hippuris*. Cal. & cor. 6. Stigm. simpl. Sem. 1. Fol. verticillata.

A

*Differt ab Equiseto, articulis digito compressis, cum strepitu dissiliantibus.*

12. *Salicornia*. Cal. 1-phyll. ventricosus, integer. Cor. o. Sem. 1. Habitus plerumque aphyllus. Caulis teres, succulentus, sæpe articulatus.

### D I G Y N I A.

\* *Plantæ.*

14. *Corispermum*. Cal. o. Petal. 2. Sem. 1, ovale, nudum.  
 15. *Callitriche*. Cal. o. Petal. 2. Cap. 2-4 locul. 4-sperm.  
 16. *Blitum*. Cal. 3-td. Cor. o. Sem. 1 calyc. baccato contentum. Fl. pl. in glomerum collecti. Habitus Chenopodii.  
 17. *Mniarum*. Cal. 4-part. superus. Cor. o. sem. 1.  
 \*\* *Graminæ.*  
 18. *Cinna*. Cal. gluma 2-valv. 1-fl. Cor. gluma 2-valv.

## MONOGYNIA.

1. **CANNA.** *S*pathæ vix ullæ. Cal. 3-phyll. erectus, coloratus. Cor. irregularis, 6-fida, laciniis tribus interioribus longioribus, quarum una reflexa, reliquæ erectæ. Filamentum oblongum, crassum. Anth. oblongæ, 2-locul.  
*Folia integerrima, firma. Sem. oblonga, nigricantia, dura.*  
 1. *indica*. C. fol. ovatis, utrimque acuminatis, nervosis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr, del. hort. 2. tab. C. 2. Cannacorus &c. Rumph. amb. 5. tab. 71. f. 2. Katu-bala. Hort. mal. 11. tab. 43. Inter tropicos Asia, Africa, America 24.*  
 Caul. 2-cubital. Fol. ampla, pedem longa, semipedem lata; alterna, amplexicaulia, pallenscentia. Cor. coccinea, aut lutea.  
 2. *angustifolia*. C. fol. lanceolatis, petiolatis, nervosis. *Syst. Veg. ed. 14. Arundo &c. Moris. hist. 3. S. 8. tab. 11. f. 6. Albara. Pis. Bras. 213. f. bona. Inter tropicos America, locis umbrosis, spongiosis 24.*  
 Priore humilior, & angustior. Petal. 3 interiora emarginata, ut in priore, quorum alterum laterale ita flectitur, ut intermedium evadat,

# MONANDRIA MONOGYNIA.

3

3. *glauca*. C. fol. lanceolatis, petiolatis, anerviis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cannacorus &c. Dill. elth. tab. 59. f. 69.*

*In Carolinæ aquosis 24.*

Caulis sesqui-2-cubital. Fol. petiolis se invicem amplexantibus, pallidiora, glauca; media & superiora latiora, & longiora. Fl. cæteris majores, flavi, immaculati.

*juncæ*. C. fol. linearibus nervosis. *Retz. Obs. fasc. 1. In China 24.*

Fol. graminea, basi vaginantia, nervis 5. elevatioribus, propè radicem fibris capillaribus obrecta, spitham-pedal. Scapus vaginis pl. lanceolat. instructus, pauciss. Cor. parva, obscurè rufa. Fructus muricatus.

2. **RENEALMIA**. Cal. 1-phyll. Cor. 3-fid. nectar. oblongo.

1. *exaltata*. R. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*Globba &c. Rumph. Amb. 6. tab. 62. 63.*

*In Surinamo h.*

Arb. recta, 18-ped. spadice nutante. Caul. & fol. Cannæ, sed angustiora, & longiora, 2-3 pedal. lanceolata, acumine retuso, glaberrima, nervis obliquis. Racemus cum bracteis alternis, lanceolat. canaliculatis, nervosis, glabris, deciduis. Pedunc. in axillis bractearum, solitarii, breves, incurvati, depressi, pubescentes, spatha terminati. Spatha 1-phyll. apice dehiscens ut calyx, in 2-3 lacinias, ut exeant fl. Inter spatham hanc adest flos, & alia spatha 2-fl. sic singulus pedunculus evadit 3-fl. Calyx spathis omnino similis, ut esset spatha, nisi germine insideret. Fructus in racemo composito dependent, fig. & magnitudine fructus Momordicæ Elaterii. Caro crassa, corticalis, rubicunda, calida, in medio loculum 3-gon. dissepimentis membranaceis, mollibus, succosis. Sem. parva, nigra, glaberrima, Amomi Cardamomi simillima. *Fruct. conditus gratus incolis Surinami.*

3. **AMOMUM**. Cor. 4-fid. lacinia primâ patente. (In A. *Zingibere*, & A. *Zerumbet* limbus cor. 3-fid. s. bilabiat. lab. super. integro; infer. diviso, intra quem nectar. 3-lob. In A. *Curcuma* limb. cor. 6-fid. nisi 3 lacinias internas nectarium pariter nominandas ducas.)

4 MONANDRIA MONOGYNIA.

1. *zingiber*. A. scapo nudo: spica bracteis inflato-concavis, latioribusque protuberante: fol. angustis.  
 A. scapo nudo, spica ovata. *Syst. veg. ed. 14. Jac. hort. 1. tab. 75. Rumph. Amb. 5. tab. 66. f. 1. Inschi. Hort. mal. 11. tab. 12.*  
*In India orient. & in Jamaica 24.*  
 Caul. 2-3 ped. Fol. vaginantia, ensiformia, integerr. plana. Scapus pedul. totus vaginis vestitus. Bractee arcte imbricatæ, fl. unicum continentes. Spatha membranacea. Cor. for-  
 dide flava.
2. *zerumbet*. A. scapo nudo: fol. latis: spica superficie æquissima.  
 A. scapo nudo: spica oblonga, obtusa. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1775. tab. 2. Jacq. hort. 3. tab. 54. Ehret. pict. tab. 14. f. 1. Mill. Dict. tab. 25. Black. tab. 402.*  
*In India 24.*  
 Olor aromaticus. Bulbi conati, subrotundi.  
 Caul. erecti, 3-6 ped. inferne aphylli, vaginis amplexicaulibus. Fol. alterna, petiolata, elongato-lanceolata, acumin. obscure lineata, subditticha, integerr. nitida, supra late virent. subrus pallidiora; infima breviora, summa angustiora, intermedia longissima. Scap. aphyll. oblique adfurgens, vertice obtuso. Spica ovata, dein oblonga, ex squamis imbricatis, concavis, post efflorescentiam rubens. Spathæ albidæ. Cor. ochroleuca.
3. *cardamomum*. A. scapo simpliciss. breviss. bracteis alternis laxis.  
*Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 385. f. 1. 2. 3. & tab. 584-585. Rumph. Amb. 5. tab. 65. f. 1.*  
 Elettari 2. *Hort. mal. 11. tab. 6.*  
*In India umbrosis 24.*  
 Rad. obliqua, nodosa, tuberculosa. Caul. rectus, 3-ped. rotundus, inferne rubens. Fol. pedul. tres digitos lata, alterna, apice longo, angust. longitudinaliter striata, glabra. Fl. flaccidi, albi, macula lutea intus notati.
4. *granum paradisi*. A. scapo ramoso, brevissimo. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 385. f. 4.*  
 Elettari. *Hort. mal. 11. tab. 6.*  
*In Madagascar, Guinea, Zeylona 24.*  
 Planta etiamnum obscura. Fructus rubicundi, sapore fervido.

# MONANDRIA MONOGYNIA.

5

3. *curcuma*. A. scapo spathis laxis, ex centro foliorum. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 4. Herm. Lugd. tab. 209. Black. tab. 396.*

Manjella-Kua. *Hort. mal. II. tab. II. Rumph. Amb. 5. tab. 67.*

In India 24.

Rad. tuberosa pendula, crocea. Petioli 2-4. ped. caulem mentiuntur. Fol. radicalia, plura, 6-pedal. ovalia, lineata, glabra, supra læte, subtus pallide virentia. Bract. spicam efformant semipedalem, oblongæ, obtusæ, albæ, margine purpurascente, quarum singula continet fl. ternos, odoros. Spathæ membranac. ovate, pellucidæ, albæ. Cor. tubo flavo-albente, limbo albo.

6. *mioga*. A. scap. brevissimo: fol. ensiformibus acutis: capsula ovata. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Japon. Kæmph. am. exot. fasc. V. p. 806.*

In Japonia.

Rad. fusiform. fibrosa, aromatica. Caul. ped. & ultra, debilis, totus folior. vaginis decurrentibus tectus. Fol. spitham. alterna, vaginantia, patentia, multinervia, glabra. Scap. florifer distinctus. Fl. fasciculati, sessiles, squamis imbricatis obvoluti. Squamæ alternæ, amplexicaules, albæ. Cor. lacinia exterioribus regulares, albæ; intima cæteris dissimilis, ovata, obtusa, valde concava, inferne biaurita, flavo. Caps. obtusa. Fol. maxime accedit ad A. Zingiber, & Zerumbet: differt spica fl. radicali, absque ullo fere scapo.

*repens*. A. Sonnerat. *Voyag. 2. tab. 136.*

Elettari. *Hort. mal. 7. tab. 4. 5.*

In Malabar. 24.

Caul. pl. 8-10 ped. simplices. Fol. alterna, lanceol. acumin. 8-15 poll. longa, 2 lata, subtus nervosa, nervo medio albido; lateralibus, obliquis, parallelis. Racemi radicales, sesquiped. compositi. Fl. albi, lineis purpureis picti.

*angustifolium*. A. Sonnerat. *Voyag. 2. tab. 137.*

In Madagascar. 24.

Quoad fol. angusta, videtur. A. Zingiber, sed differt fl. spica, si genuina est Rheedi fig. *hort. mal. 2. tab. 12.*

A iij

✕ MONANDRIA MONOGYNIA.

4. **COSTUS**. Cor. interior inflata, ringens, lab. infer. 3-fid.

1. *arabicus*. C. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 394.*

*In India utrinque. 24*

Caul. 1-2 ped. suberecti, geniculati. Fol. dilute viridia, nitida. Spica strobili Abietis similis. Spatha simplex. Cal. ruber. Cor. alba.

*Alpinia spicata. Jacq. amer. 1. tab. 1. edit. 2. pict. tab. 1.*

*Zingiber &c. Sloan. Jam. 1. tab. 105. f. 2. credo quod sit sp. diversa.*

Fol. oblonga, acumin. basi adtenuata, alterna, breviter petiolata, integerrima; floralia sub spica plerumq. quaterna. Spica solitaria, conica, dense compacta, e spathis imbricatis, coccineis, 1-fl. Cor. flava.

5. **MYROSMA**. Cal. duplex; exterior 3-phyll. interior 3-part. Cor. irregular. 5-part.

1. *cannaefolia*. M. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Naru-kila. Hort. mal. 11. tab. 54? sed fructus nimis magnus.*

*In Surinamo. h.*

Frutex more Cannae. Rad. horizontal. brevis, apice adscendens, carnosae, ovatae, leviter compressae, ut in Amomo, anulis cinctae, testae vaginis alternis, amplexantibus, adpressis, ovatis, latis, fibrosis. Fol. ut in congeneribus ovalia, venosa, glabra; inferiora petiolis elongatis, dilatatis, radicatis, caulem formantibus: superiora petiolis extra caulem. Petioli versus insertionem fol. elevantur in anulum cylindricum. Scapi teretes, subpilosi, terminati articulo, ex quo folium caulinis simillimum; & pedunculus vagina petioli involutus. Racemus instar amenti Lupuli, imbricatus squamis bractearum alternis. Bract. 2-phyll. 2-fl. exterior amplexicaulis, latior, ovata, membranacea; interior brevior, angustior, oblonga.

6. **ALPINIA**. Cor. ventricosa, 6-fid. lobis 3. patentibus.

1. *racemosa*. A. fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. tab. 20. Anomum &c. Rottboel. in Collect. Soc. med. Haun. 11. tab. 2.*

*Zingiber &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 105. f. 1.*

*In Amer. calidiore 24.*

Rad. nodosa. Caulis brevissimus. Stolones fasciculum formant intricatum. Fol. Acori, alter-

MONANDRIA MONOGYNIA. 7

na, vaginanta, acuminata, subundulata, striata, nervosa. Racemus grandis. Fruct. ovatus, striatus, umbilicatus. Pertinet ad *Amomi* genus.

2. *spicata*. A. fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
An *Costus Arabicus*?

*multicaulis*. A. *Aubl. Guian. 1.*  
Paco-scrocca &c. *Plum. MSS. 5. tab. 27. 28.*  
In Caienna.  
Fruct. parum succulentus. Sem. Cardamomo similia.

7. MARANTA. Cor. ringens, 5-6 fid. laciniis 2 alternis, patentibus.

1. *arundinacea*. M. culmo ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Mart. cent. tab. 39.*

In America calidiore 24.

Rad. tuberculata. Caul. 2-ped. subramosus, subcompressus, lævis. Fol. alterna, ovata, glabra, integerr. nitida, fibris paralellis. Rami pauci, subnudi, subdivisi in perunculi. floriferos. Cor. alba.

2. *galanga*. M. culmo simplici; fol. subsessilibus, lanceolatis. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. Amb. 5. tab. 63.*

In India orientali 24.

Rad. articulata. Caul. pl. 7-8 ped. nudi, inferne folior. involucris cincti. Fol. alterna, super. semper maiora, glabra, nervo medio. Fl. corymbus vix spitham. Cor. sordide albescens. *Galanga hæc est Offic.*

3. *comosa*. M. coma foliol. reflexis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Surinamo 24.

Fol. Cannæ similia, radicalia, petiolata, lævia. Scap. 3-ped. crassitie pennæ cignæ, teres, lævis. Coma terminalis, foliol. numerosis, confertis, sessilibus, ovatis; inferioribus sensim minoribus. Fl. inter fol. inferiora comæ, sessiles; singulis bracteis bifariis, 3 parium; valvulis superioribus bicarinatis; inferioribus æqualibus. Flosc. terni.

Perian. superum, caducum, foliol. 3 lanceolat. petaloidibus, longitudine cor.

Cor. 1-pet. tubus longitudine fere calyc. Limbus 5-part. lacin. 4 lanceolat. quinta 2-fid.

Filam. breve, tubo insidens. Anth. erecta, oblonga.

A iv

# 8. MONANDRIA MONOGYNIA.

*Pist.* Germ. breve: Styl. filiform. clavatus, inferne tubo adnatus: stigm. simpl. angustum.

*Peric.* Caps. 3-locul.

*Sem.* plurima.

*An novum genus? Certe facies a reliquis aliena.*

- arbuta*. M. caul. inferne nudo. *Aubl. Guian.* 1.  
Bermudiana &c. *Plum. MSS. tab.* 23, 24.  
*In Caribæis* 24.
- tanket*. M. rad. nodosa. *Aubl. Guian.* 1.  
Arundastrum. *Rumph. Amb.* 4. tab. 7.  
*In Guiana* 24.
- alluvia*. M. fol. amplis, ovato-rotundatis: scapo nudo: capitulo foliato, variegato. *Aubl. Guian.* 1.  
*Plum. MSS.* 5. tab. 35. f. 5.  
Naru Kila. *Hort. mal.* 11. tab. 34.  
*In Guiana* 24.  
Rad. tuberculata. Fl. capitati, albi.
- humilis*. M. culmo ramoso, fol. brevioribus: radicibus tuberosis. *Aubl. Guian.* 1.  
*In Caienna* 24.  
Rad. tuberculosa. Fl. albi.
- spicata*. M. fol. ovato-oblong. subsakatis: caul. nudo.  
Fl. spicatis. *Aubl. Guian.* 1.  
*In Guiana*.  
Folior. nervi longitudinales usque ad apicem non perveniunt, & apex est inclinatus. Spath. coriaceæ. Fl. albi.
- lutea*. M. amplissimo folio. *Aubl. Guian.* 1.  
Bermudiana &c. *Plum. MSS. tab.* 21. 22.  
*In Guiana*.
- malacensis*. M. culmo simplici: fol. petiolat. ovatis. *Burm. Ind.*  
*In India*.  
Culm. erectus, villosus. Fol. e viridi tomentosa, lineata, ut in Canna. Fl. 12, alterni.
8. CURCUMA. Stam. 4. sterilia, 5. fertili.
1. *rotunda*. C. fol. lanceolat-ovatis; nervis lateralibus rarissimis. *Syst. veg. ed.* 14.  
Mania-Kua. *Hort. mal.* 11. tab. 10.  
*In India* 24.  
Rad. bulbosa, intus flava. Fol. 4-5, radicalia, petiol. longo, sesquiped. lata 5-6-pollic. erecta, acuminata, Galangæ simillima. Fl. albi, subtus rubri.



MONANDRIA MONOGYNIA.

9

9. KÆMPFE-*Cor.* 6-part. lacinüs 3. majoribus patulis, un-  
RIA. ca 2-part. Stigm. bilamellatum.

1. *galanga*. K. fol. sessilibus ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Hort.*  
*Cliff. tab. 3.*

*Calceolus &c. Pet. gaz. tab. 19. f. 2.*

*Wanbom. Kämp. am. tab. 902.*

*Sonchorus. Rumph Amb. 5. tab. 69. f. 2.*

*Katsjula-Kelengu. Hort. mal. 11. tab. 41.*

*In India 24.*

Planta humilis. Rad. obtusa, plerumq. glandi-  
fernis, nonnullis minoribus lateralibus mixta,  
alba. Fol. radicalia, in orbem posita, Curcu-  
mæ similis, sed breviora, crassiora, 3-4 pol-  
lic. longa, 3-digito lata, breviter petiolata,  
mucrone brevi, supra obscure virid. subtus  
albida, margine undulato, nerv. sa. ut in Plan-  
tagine, longitudinaliter striata. Cor. alb-coe-  
ruleo-purpurea.

2. *rotunda*. K. fol. petiolat. lanceolatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Black. tab. 399.*

*Mal-n-kua. Hort. mal. 11. tab. 9.*

*In India 24.*

Rad. bulbifera, extus cinerea, intus alba. Caul.  
cubital. Fl. radicales. Spath. membranacea,  
alba, 4-5 fl. Cor. ex rubicundo-albo-luteo-  
purpureoq. col. mixta. Stam. purpur.

10. THALIA. Cor. 5-petal. undulata. Diupa nucleo 2-locul.

1. *geniculata*. T. *Syst. veg. ed. 14. Rottb. coll. hav. 2.*  
*tab. 2.*

*Cortusa &c. Plum. gen. ic. 108. f. 1.*

*In Amer. meridion 24.*

Rad. tuberosa, nodosa. Caul. plusquam oryza.  
superne ramosus. Fol. alterna, vaginantia,  
ovat-oblonga, nervis transversis paralellis.  
Spathæ 1-2 fl. Petal. 3. majora sursum erecti,  
concava, & quasi lacera: 2. infer. minora,  
urceolata, & quasi revoluta. Fruct. ovatus,  
glaber.

11. BOERHAAVIA. Cal. o. Cor. 1-pet. campanulata, plicata.  
Stam. 1-2. Sem. 1. nudum, inferum.

1. *erecta*. B. caule erecto: fl. diandris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Jacq. hort. tab. 5. 6.*

*B. diandra. Burm. Ind. tab. 1. f. 1.*

*In Vera Cruce 24.*

Caul. debilis, inferne viscosus, atro-purpurea.

adspersus atomis, seu pilis brevissimis. Fol. opposita, petiolat. ovata, acuta, undulata, margine scabra, subtus pallidiora, petiol. subrubris. Raceni inæquales. Cor. minima, cylindrica, albo-rufescens, laciniis acutis, denticulis interiectis. Stam. 2. Stigm. capitatum.

2. *diffusa*. B. caul. lævi, diffuso: fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Valerianella* &c. *Herm. par. tab. 237.*  
*Talu-dama Hort. mal. 7. tab. 56.*  
*In India 24.*

Caul. pusilli. Fol. opposita, obtusa, subtus albida. Pedunc. axillar. foliar. Fl. capitati, terni, monandri, subsefil. purpur. Sem. oblong. angulata, villosa.

3. *hirsuta*. B. caul. diffuso, pubescente: fol. ovatis, repandis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 7.*  
*In Jamaica 24.*

Caul. 1-fsquiped. plerumque dichotomus. Fol. opposita, petiolata, crassiuscula, margine piloso, subtus albida. Pedunculi sæpe 3-fl. Cor. purpur. Stam. 2. Fruct. sulcatus, 5-gon. truncatus.

4. *scandens*. B. caul. erecto, ramis scandentibus: fol. cordatis, acutis: fl. diandris. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 4.*

*Solanum* &c. *Pluk. alm. tab. 226. f. 7.*

*In Jamaica 24.*

Caul. frutescens, 6-ped. strictissimus, lævis, subtrichotom. Rami alterni. Fol. opposita, petiolat. obsolete angulata, glabra, utrimq. concoloria. Pedunc. laterales. Umbellæ 6-fl. Involuc. 5-phyll. Cor. campanulata, plicata, viridi-flavescentes. Sem. filiform. truncata, apice tuberculata.

5. *repens*. B. caul. repente. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Nubia 24.*

Caul. subped. nodosi, succulenti. Fol. opposita, magnitudine inæqualia, majora vix semipoll. longiora, subundulata, supra læte virentia, venis purpurascentibus picta, subtus albida, lanuginosa. *Variet. omnibus partibus minor.*

6. *angustifolia*. B. fol. linearibus acutis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Habitat . . . . .*

12. *SALICORNIA*. Cal. ventriculosus, integer. Cor. o. Sem. 1. Habitus plerumq. aphyllus.

1. *herbacea*. S. herbacea, parula, articulis apice compressis,

emarginato-2 fidis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 303. Pallas it. 1. tab. A. f. 1. Black. tab. 598. Bult. subs. 2. tab. 50. Dod. pempt. 82.*

*In Europæ, Virginie litoribus maritimis* ☉.

Frutex sæpe cubito altior, erectus. Articuli cylindrici, apice crassiores. Spica articulata. Fl. terni, adproximati, parvi, lutei.

2. *fruticosa*. S. caul. erecto, fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 1. f. 1.?*

*In Europæ maritimis* h.

Sempervirens, erecta, longeque ma. a priore videtur diversa.

3. *virginica*. S. herbacea, erecta, ramis simplicissimis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

Planta viridi-cærulescenti farina tenui obducta.

Rami oppositi, terminati spica longa, articulata. Distinguenda ab herbacea, quæ etiam in Virginia crescit. In specie quadam Virginiana erat calyx squama ovata, cochlearis instar concava, erecta. Stam. certe 2. Pist. superum.

4. *arabica*. S. fol. alternis, vaginalibus, obtusis, hinc dehiscens. *Syst. veg. ed. 14. Pallas. it. 1. tab. A. f. 3.*

Kali &c. *Morif. hist. 3. f. 5. tab. 33. f. 7.*

*In Arabia* h.

Facies Tamarisci, vel Anabuseos. Fruticuli erecti, subped. creberrimi, alterne ramosi. Spicæ terminales, sub 4, parvulæ, alternæ, torulosæ.

5. *caspica*. S. fruticosa; articulis cylindricis: spicis filiformibus. *Syst. veg. ed. 14. Pall. it. 1. tab. A. f. 2.*

Kali &c. *Buxb. cent. 1. tab. 11.*

*In mari Caspio &c.* h.

Facies e longinquo Tamarisci. Frutex 2-3 ped. Ramuli tenuiores dense nascentes.

6. *foliata*. S. fol. linearibus, alternis, amplexicauli-decurrentibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Sibiria* h.

Frutex ramis simplicibus alternis. Fol. carnosæ.

- 
- Strobilacea*. S. *Pall. it. 1. tab. B. f. 1. 2.*

*Ad mare Caspium* h.

Planta e longinquo conspecta vix ab Anabasi aphylla distinguitur. Rad. passim socaliferæ.

Caul. ad terram prostrati, & flexuosi, subped. fruticosi. Surculi erecti, ramosi, nodosi, partim gemmis utrimq. prorumpentibus, partim adultis spicis enatis. Spicæ in crucem alternatim oppositæ, sessiles, cylindricæ, obtusæ; maturitate, vel maceratione, strobilorum instar, squamatim solvendæ: in harum qualibet fl. sub 20.

*foliata.*  
*pallas.*

*S. Pall. it. 1. tab. C. f. 1. 2.*

*In paludibus Dauriæ h.*

Facies squallida, & morbosa: forsan var. *S. arabicæ*. Fruticuli diffusiusculi, subped. informes, caulibus ramosissimis. Fol. ita alterne posita, ut 4-fariam a cauliculis pateant. Surculi adultiores, & a Gallis non corrupti, omnibus ramis spicas alternas proferunt. Plantæ iuniores, & in sicciore loco natæ vix folia proferunt.

*cruciata.*

*S. peduncular. articulis cruciatis; caulis vero globosis. Forsk. Æg-Arab.*

*Alexandriæ h.*

Caul. procumb. fruticosus, teres, brunneus: rami conferti, erecti, articulati, virides. Articuli inferiores steriles, minores, subglobosi, tuberculati sextuplici ordine squamarum; geniculis pallidis, squamatis, arcuatis: superiores floriferi majores, transverse cylindrici: fl. sparsi, nudi ad apicem squamarum, quæ succulentæ facile rumpuntur, si dilatare velis.

*perfoliata.*

*S. fol. carnosis, urceolat-orbiculatis, caule perfoliatis. Forsk. Æg-Arab.*

*In Arabia.*

Frutex diffusus, pedal. Caul. non articulatus. Spicæ axillar. & terminales, sesquipoll. teretes, fl. ternatim positis, ut in *S. europæa*. Fol. contigua, in frugiferis orbiculata, versus peripheriam caule perforata, alterna: in iunioribus non frugiferis vagina crassa, urceolata; decurrentia.

13. HIPPURIS. Cal. O. Cor. O. Stig. simpl. Sem. r. Fol. verticillata. Differt ab Equifeto, articulis cum digito compressis cum strepitu dissilientibus.

*An planta gynandra?*

1. vulgaris. H. fol. octonis, subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 87.*

MONANDRIA MONOGYNIA. 13

*Limnopenace*. Vaill. *Ad. paris.* 1719. *tab.* 1. *f.* 3.

*Polygonum* fem. Cam. *epit.* 649.

*In Europæ fontibus &c.* 24.

Caul. erectus, 1-2 ped. articulatus, albidus. Fol. facie *Equiseti* sylvatici, obtusiuscula, plana, integerr. glabra, læte viridia.

2. *tetraphylla*. H. fol. quaternis, oblongis, obtusis. *Syst. veg.* ed. 14. *Lin. suppl.*

*In Svecia.*

Fol. spathulat-ovata.

*lanceolata*. H. fol. lanceolat. inferioribus quaternis, superioribus quinis. Retz. *Obs. fasc.* 3. *tab.* 1.

*In Finlandia.*

Facies *Elatinet* *Alnus*stri.

DIGYNIA.

14. CORISPERMUM. Cal. O. Pet. 2. Sem. 1., ovale, nudum.

1. *hyssopifolium*. C. fl. lateralibus. *Sist. veg.* ed. 14.

*Rhagostris* &c. Buxb. *cent.* 3. *tab.* 55.

*Monspeli* &c. ☉.

Caul. palmar. & ultra, diffusus, villosus, sed non scaber. Fol. Graminea, alterna.

2. *squarrosum*. C. spicis squarrosis *Syst. veg.* ed. 14.

*Rhagostris* &c. Buxb. *cent.* 3. *tab.* 55. 56.

*In Tartaria* ☉.

Caul. dodrant. angulatus, striatus. Fol. arundinacea, rigida, striata, incana. Sem. duplici aculeo.

15. CALLITRICHE. Cal. O. Pet. 2. Caps. 2-4 locul. 4-sperm.

1. *verna*. C. fol. imis linearibus, superioribus subrotundis.

C. fol. superioribus ovalibus fl. androgynis. *Syst. veg.* ed. 14. *Fl. Dan.* *tab.* 129.

*In Europæ fossis aquosis* ☉.

Hæc major est, etiam pedal. Fol. opposita, integerrima, vel 2-fida, solitaria, flaccida, glabra, læte virent. Superiora in aquæ superficie in rosulas congesta. Fl. terminales, albido-virent.

2. *autumnalis*. C. fol. omnibus linearibus,

C. fol. omnibus linearibus apice 2-fid. fl. hermaphrodit. *Syst. veg.* ed. 14. *Gmel. Sib.* 3. *tab.* 1. *f.* 2.

*Lenticula* &c. *Loef. pruss.* *tab.* 38.

*In Europæ fossis aquosis* ☉.

- Fol. pallide virentia; quæ in rofulis paulo latiora, sed non subrotunda, ut in priore.
16. **BLITUM**. Cal. 3-fid. Cor. o. Sem. 1, calyc-baccato. Fl. pl. in glomerem colliguntur. Habitus Chenopodii.
1. *capitatum*. B. capitellis spicatis, terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. hort. 1. tab. E. 3.*  
*Atriplex &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 32. f. 11.*  
*In Helvetia, Rhetia, Tyrola &c. ☉.*  
 Caul. ped. simplex. Fol. longe petiolat. hastata, semitriloba, quandoque integra, dentata. Globuli florales, sessil. coccinei.
2. *virgatum*. B. capitellis sparsis, lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Atriplex &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 32. f. 2.*  
*In Hispania, Gallia Narbonensi &c. ☉.*  
 Caul. subped. ramosi, angulati. Fol. angulata. Globuli maturi rubri. *Var. fol. lanceolat. integerrim. B. Chenopodioid. Syst. veg. ed. 13. est var. monstrosa huius.*
17. **MNIARUM**. Cal. 4-part. superus. Cor. o. Sem. 1.
1. *biflorum*. M. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen. In nova Zeelandia.*  
 Facies Minuartiæ. Planta dichotoma, glaberrima, undique vestita fol. adproximatis, connatis, acerolis. Fl. terminales, bini, subsessil. fol. fere breviores.
18. **CINNA**. Calyc. gluma 2-valv. 1-fl. Cor. gluma 2-valv. Sem. 1.
1. *arundinacea*. C. *Syst. veg. ed. 14. In Canada.*  
 Gramen magnitudine Avenæ. Culmi plurimi, glabri. Fol. latiuscula, glabra, margine scabra. Panicula oblonga, attenuata, secunda, compressiuscula.

## NOVA GENERA

## QUALEA.

- Cal.* Periant. 1-phyll., profunde 4-partitum, lacin. ovaris, concavis, coriaceis, inæqualibus, lateralibus ma:
- Cor.* 2-pet. Petalis ungue cal. fundo insertis,

MONANDRIA MONOGYNIA. 13

superiore lato, subrotundo, erecto, emarginato, extus albo, intus carneo, basi desinente in nectarium corniculatum, obrusum, intracal. lacinias superiores prominens; inferiore luteo, versus unguem albo, longiore, ampliore, expanso, reflexo.

*Stam.* Filam. 1. incurvum, basi germinis insertum: anth. oblonga, incurva, 2-locul.

*Pist.* Germ. orbiculatum. Stylus longus, incurvus: Stigma obtusum.

*Sem.* Plurima, in pulpa nidulantia.

1. *Rosea.* Q. fl. amplis, carneis.

*Aub. Guian. tab. 1.*

*In Caribæis h.*

Arb. 60-pedal. in apice rami pl. nodosi, latè, & undique sparsi: ramuli oppositi. Fol. opposita, ovata, acuta, obtusa, rigida, glabra, pallide virentia, nervo longitudinali subius prominente, & nervis lateralibus innumeris parallelis insignita. Stipulæ binæ, laterales ad basin petioli, deciduæ. Fl. terminales, paniculati. Bractææ binæ, exiguæ, deciduæ ad basin ramulorum. Fl. expansi odorem suavem spirant.

2. *Cærulea.* Q. fl. parvis.

*Aub. Guian. tab. 2.*

*In Caribæis h.*

Arb. 60-80. pedal. rami, & ramuli ut in priore. Fol. opposita, vel subopposita, petiolata, acuta, obtusa, integerrima, glabra, subviridia, nervo longitudinali subius prominente, & nervulis parallelis, simplicibus, lateralibus insignita. Stipulæ binæ, laterales ad petiolorum basin, deciduæ. Fl. terminales, paniculati. Cal. intus villosus, cinereus. Pet. duo opposita; super. erectum, subrotundum, emarginatum, extus cinereum, intus subcæruleum; infer. majus, latius, & profundius emarginatum, reflexum, violaceum, versus unguem luteum, nigris maculis notatum.



# CLASSIS II. DIANDRIA.



## MONOGYNIA.

\* *Fl. inferi, monopetali, regulares.*

23. *Olea*. **C**or. 4-fid. tubo brevi, lacin. subovatis. Styl. 2 fid. Drupa 1-sperm.
24. *Chionanthus*. Cor. 4-fid. lacin. longissim. Drupæ nucleus striatus.
22. *Phylliræa*. Cal. 4-dent. Cor. rotata, 4-fid. Bacca 1-sperm.
21. *Ligustrum*. Cor. infundibulif. 4-fid. Bacca 4-sperm.
25. *Syringa*. Cor. infundibulif. 4-fid. laciniis linearibus. Caps. 2-locul. 2-valv. 2-sperm.
27. *Eranthemum*. Cor. 5-fid. tubo filiform. lacin. obovatis, planis. Anth. extra tubum. Stig. simpl. Caps.
20. *Iasminum*. Cal. tubulosus, 5-dent. Cor. infundibulif. 5-fid. Anth. extra tubum. Bacca 2-coeca. Sem. arillata.
19. *Nyctanthes*. Cal. 8-10-12-fid. Cor. 8-fid. Bacca 2-coeca.  
\*\* *Fl. inferi, monopet. irregulares. Fruct. capsular.*
30. *Pæderota*. Cal. 5-part. Cor. 4-fid. Cap. 2-locul.
29. *Veronica*. Cal. 4-fid. Cor. rotata, 4-par. lacinia infima angustiore. Caps. 2-locul. Sem. 2.
33. *Gratiola*. Cal. 7-phyll. foliol. 2. exterioribus patulis. Cor. tubulosa, 2-lab. galea emarginata; barbæ 3 fid. Stam. 2 tantum fertilia. Caps. 2-valv. 2-locul. polysper.
34. *Schwenkia*. Cor. subæqual. fauce plicata, glandulosa. Stam. 3. sterilia. Caps. 2-locul. polysper.
31. *Iusticia*. Cor. ringens. Stam. anthera ungue singulari. Caps. 2-locul. ungue elastico dissiliens.
32. *Dianthera*. Differt a *Iusticia*, quod stamen singulum duabus anth. alternis sit præditum.
35. *Calceolaria*. Cal. 4-part. æquilis. Cor. ringens, inflata. Caps. 2-locul. 4-valv.
36. *Pinguicula*. Cal. 2-lab. 5-fid. Cor. tubuloso-ventricosa, calcarata, patens: lab. super. 2-fid. infer. 3-fid.



3-fid. Stam. bifurca. Caps. 2-valv. 1-locular. polytper.

37. *Utricularia*. Cal. 2-phyll. æqual. Cor. ringens, calcarata. Caps. 2-valvis, 1-locul. polytper.

38. *Wulfenia*. Cor. ringens, calcarata, femihians, ad faucem barbata.

\* *Bignonia Catalpa*.

\*\*\* *Fl. inferi, monopet. irregular. Fructus gymnospermi.*

39. *Verbena*. Cal. lacinia suprema brevior. Cor. infundibuliform. subæqual. curva. Stam. 2-4, Sem. 2-4, nuda.

40. *Lycopus*. Cor. subæqual. 4-fid. lacinia unica emarginata. Stam. distantia. Sem. 4, retusa.

41. *Ametyssea*. Cal. subcampanulat. Cor. 5-fid. subæqual. lacin. infima patentiore, concava.

43. *Ziziphora*. Cal. filiform. Cor. ringens, galea reflexa, integra. Sem. 4.

44. *Monarda*. Cor. ringens, galea lineari, obvolvante genitalia.

45. *Rosmarinus*. *Anth. arctissime conjunctæ, ut unicam antheram componere videantur filamentis liberis.* Cor. ringens; lab. super. longum, reflexum, emarginatum; infer. 3-fid. lacinia media maiore, oblonga, in ambitu crenata, profunde emarginata, basi angusta; lacin. lateralibus ovatis, obtusis, marginibus reflexis. Galea a lab. inferiore recta divergit.

46. *Salvia*. Cor. ringens. Stam. bifurcata, pedicello nimirum, sive filamento cor. inserto transverse imponitur filamentum antheriferum.

42. *Cunila*. Cor. ringens; galea erecta, plana. Filam. 4. duo castrata. Sem. 4.

47. *Collinsonia*. Cor. subringens; lab. inferiore capillari, multifido. Sem. 1.

\*\*\*\* *Fl. inferi, tetrapetali.*

50. *Thouinia*. Cal. 4-part. Cor. infera, 4-petala. Anth. sessiles.

\*\*\*\*\* *Fl. inferi, pentapetali.*

26. *Dialium*. Cal. 0. Cor. 5-petal. Stam. ad latus superius.

\*\*\*\*\* *Fl. superi.*

48. *Morina*. Cal. floris 2-fid. cal. fructus dentato-aristatus. Sem. 1, sub cal. floris.

28. *Circaea*. Cal. 2-phyll. superus. Petal. 2, obcordata. Fruct. 2-locul. 2-sperm.

49. *Globba*. Cal. superus, 3-fid. Cor. æqual. 3-fida. Caps. 3-locul. Sem. plurima.

Tom. I.

B

51. *Ancistrum*. Cal. 4-arithatus, aristis terminatis glochidibus cruciatis. Cor. 4-fid. Stigm. penicillatum.

\* *Valeriana cornucopiæ*.

*Boerhaavia diandra*; scandens: erecta.

### DIGYNIA.

52. *Antho-xanthum*. Calyc. gluma 2-valv. 1-fl. Cor. gluma 2-valv. acuminata, Sem. 1. *Avenæ proximum* est, sed duobus tantum staminibus a reliquis Graminum generibus differt.

### TRIGYNIA.

53. *Piper*. Cal. o. Cor. q. Bacca 1-sperma.

## MONOGYNIA.

19. NYCTANTHES. Cal. 8-10-12 fid. Cor. 8-fida. Peric. di-coccum.

1. *arbor triplis*. N. caule 4-gono: fol. ovatis, acuminatis: pericarpis membranaceis, compressis. *Syst. veg.* ed. 14. *Mont. Zann. tab. 15.*

*Mania-pumeran. Hort. mal. 1. tab. 21.*

*Scabrita scabra. Lin. monente Vahl.*

*In India. h.*

Arbor grandis, densis, & opacis frondibus late sparsis, diametro unius brachii. Rami modulosi, cortice spadiceo. Fol. opposita, breviter petiolata, crassa, aspera, e viridi fusca, nitida, subrus dilutiora. Pedunc. ex singula ala ramosi. Fl. in singulis pedicellis 5, albi, odore mellis. Fruct. rotundo-plani, virides, sicci capsulares.

2. *sambac*. N. fol. inferioribus cordatis, obtusis; superioribus ovatis, acutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Jasminum &c. Burm. Zeyl. tab. 58. f. 2. Till. pis. tab. 31. Clus. cur. tab. 3.*

*Flos manoræ. Rumph. Amb. 5. tab. 30.*

*In India. h.*

Caul. fruticosus. Fol. alterna, vel opposita, fæpius terna, breviter petiolata. Fl. corymboli, Petala alba, odora. *Var. fl. pleno.*

3. *undulata*. N. fol. ovatis, acuminatis, undulatis: ramis teretibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Theragam-mulla*. *Hort. mal.* 6. *tab.* 55.

*In Malabarica*. *h.*

Caul. orgyalis: rami late sparsi. Fol. opposita, e viridi-nitentia. Fl. terni-quinati. Petal. 6-7-8. albidæ, odora.

4. *hirsuta*. N. petiolis, pedunculisque villosis, *Syst. veg. ed.* 14.

*Kava-pon*. *Hort. mal.* 4. *tab.* 48.

*In India*. *h.*

Arb. procera: ramuli atro-purp. Fol. decussatim opposita, petiolis rufis, obl-rotunda, acumina-  
ta, crassa, nitida, supra atro-viridia, subtus  
subviridia. Pedunc. rufi. Fl. congesti, candi-  
di, odore Tuberosæ. Fructus virides.

5. *angustifolia*. N. fol. lanceolatis, ovatisq. obtusis. *Syst. veg.*  
*ed.* 14.

*Karu-pissiequam mulla*. *Hort. mal.* 6. *tab.* 53.

*In Malabarica arenosis*. *h.*

Surculi fuscescentes. Fol. obscuro virore niten-  
tia. Pet. 7-11. longa, acumin. cæteris specie-  
bus angustiora, candida, ore rufescente, o-  
dora.

6. *elongata*. N. fol. cordatis, lanceol. acutis, elongatis, mi-  
noribusq. ramis teretibus. *Syst. veg. ed.* 14.

*Lin. Suppl.*

*Berg. Ad. Angl. an.* 1772. *tab.* 11.

*In India Orientali*. *h.*

Fol. infer. cordato-ovata, Fl. terminales, 5-6.  
subumbellati. Cal. minimus, lacin. subulatis,  
pilosus. Cor. tubus superne incrassatus.

7. *glauca*. N. glauca: caule tereti: fol. lanceol. acutis,  
trinerviis: pedunculis 3-fidis. *Syst. veg. ed.* 14.

*Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei*. *h.*

Frutex ramis oppositis. Fol. opposita, petiolata.  
Fl. Jasmini Officin. maiores.

*triflora*. N. fol. alternis; ramulorum oppositis, ovatis: pe-  
dunculis terminalibus ternis: pedicellis 1-fl.  
*Burm. Ind. tab.* 2.

*In Java*. *h.*

Caul. fruticosus, teres, glaber, ramis oppositis,  
divergentibus. Fol. subpetiol. lanceol-ovata,  
integerrima, glabra, subtus fusca. Cal. 6-fid.  
segmentis breviss. linearibus. Cor. longitudi-  
ne pedicellorum.

*multiflora*. N. pedunc. terminalibus multifloris; fol. ovatis.

*Burm. Ind. tab. 3. f. 1.*

*In China, & Malabar* h.

Caul. erectus, fruticosus, ramosus, teres, pubescens. Fol. opposita, petiolata, integerrima, glabra. Fl. capitati.

*acuminata*. N. fol. lanceol-acuminatis; pedunc. bigeminis, 2-fl. *Burm. Ind. & Zeyl. tab. 59.*

10. JASMINUM. Cal. tubulosus, 5-dent. Cor. infundibuliform. tubulosus, 5-fida. Antheræ intra tubum. Bacca dicocca. Sem. atillata.

1. *officinale*. J. fol. oppositis; foliolis distinctis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 13. Du Hamel. 1. tab. 122. Lob. ic. 106.*

*In India; nunc Europæ planta indigena.* h.

Caul. 6-pedal. infirmus. Fol. subseptena, ovato-argute linceol.; impari ma. lanceol. Cor. alba, odora.

2. *grandiflorum*. J. fol. oppositis, pinnatis; foliolis extimis confluentibus. *Syst. veg. ed. 14. Merian. Surin. tab. 46.*

*In Malabar* h.

Simile priori, sed caul. rectus, nec scandens. Foliola cauli propiora, magis ovata, nec minora; extrema 3. confluentia ex petiolo dilatato. Cor. ma. subrus rubra.

3. *azoricum*. J. fol. oppositis, ternatis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 1. tab. 82.*

J. tylv. *Burm. Zeyl. tab. 58. f. 1.*

J. album. &c. *Pluk. Alm. tab. 393. f. 1. phyt. tab. 423. f. 6.*

*In India* h.

Fol. longe petiol. obl-acuminata, obscuro viore nitentia, l. offic. productiora, & latiora. Fl. terminales longe pedunculati, albi, odore Lillii convallium.

*Var. foliolo impari (maiore) cordato.*

4. *fruticans*. J. fol. alternis, ternatis, simplicibusq. ramis angulatis. *Syst. veg. ed. 14. Hort. Angl. tab. 6. Trifolium fruticans. Dod. pempt.*

*In Oriente, & Europa australi.* h.

Virgulæ 2. cubital. & ultra. Linæ 2. elevatae ad basin petiolum decurrunt in caulem. Fol. impar maius. Cal. profunde 5-fidus. Cor. lutea.

5. *humile*. J. fol. alternis, acutiusculis, ternatis, pinnatifid. ramis angulatis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. Hort. 1. tab. 1. Besl. syst. aff. tab. 41. f. 2.*  
*Habitat* ... h.  
 Frutex humilis. Fol. lateralia ovata, impari duplo ma. ovato-acumin. Cor. vix 3-fidus. Cor. lutea.
6. *odoratissimum*. J. fol. alternis, obtusis, ternatis, pinnatifid. ramis teretibus. *Syst. veg. ed. 14. Barr. ic. 62.*  
*In India* h.  
 Frutex ramis rubicundis. Foliola ovata, vix acuminata, glabra. Fl. flavi, odori.
- 
- oblongum*. J. fol. oppositis, simplicibus; pedunculis alternis, axillaribus, 1-fl. *Burm. Ind. tab. 3. f. 2.*  
*In Java* h.  
 Rami simpl. teretes. Fol. petiolata, ovalia cum acumine, integerrima, glabra. Fl. lutei, min. quam in *J. odoratissimo*.
21. **LIGUSTRUM**. Cor. infundibulifor. 4-fida. Bacca 4-sperma.
1. *vulgare*. L. fol. lanceolatis, acutis; paniculae pedicellis oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Matth.*  
*a.* fol. deciduis.  
*b.* italicum, fol. sempervirentibus.  
*Black a. tab. 142.*  
*In Europæ collibus ad sepes* h.  
 Arbuscula 6-pedalis. Fol. breviter petiol. ovata, crassa, nitida, suture virentia. Racemi conici, Fl. albi, graveolentes. Bacca ovata, nigra, pulposa. *Var. fol. ternis; auratis; fructu albo.*
2. *latifolium*. L. fol. ovatis, acuminatis: panicula decomposita, trichotoma. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Thumb. Jap. tab. 1.*  
*In Japonia* h.  
 Frutex sesquiorgyal. Rami oppositi, teretiusculi, erecto-patentes, rugosi, cinerei. Ramuli virgati. Fol. sesquipollicem longa, pollic. lata, opposita, petiolata, integerr. patentierecti, supra viridia, sulco medio exarata, subtus pallida, nervo medio donata, glabra. Petioli unguiculares. Fl. terminalis, paniculati. Bracteæ sub singula dichotomia binæ. Cor. laciniæ ovatae, reflexae. Bacca magnitudine Pisi, ovata, glabra.

22. PHILLYREA. Cal. 4-dent. Cor. rotata, 4-fid. Bacca 1-sperm.

1. *media*. P. fol. ovato-lanc. subintegerrimis. *Syst. veg. ed. 14. Muth. P. III. Clus. hist. 52.*

*In Europæ collibus australibus h.*

2. *angustifolia*. P. fol. lineari-lanceol. integerrimis. *Syst. veg. ed. 14. P. IV., & V. Clus. hist.*

*In Italia, & Hispania h.*

*Var. fol. linearibus.*

3. *latifolia*. P. fol. ovato-cordatis, serratis. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 51.*

*In Europa australi h.*

23. OLEA. Cor. 4-fida, tubo brevi, lacin. subovatis. Drupa 1-sperma. Stylus 2-fid.

1. *europæa*. O. fol. lanceolatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 199.*

*Olivo Muth.*

*b. Sylvestris. Black. tab. 213.*

*In Europa Australi h.*

Arb. sempervirens. Fol. opposita, integerr. supra viridia, subrus alba. Fl. subalbidi.

2. *sapensis*. O. fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ligustrum &c. Dill. Elth. tab. 170. f. 194.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Arb. parum ramosa, cortice ex fusco-nigricante, subhirsuto, punctis cinereis variegato. Fol. opposita, petiolata, 2-pollicar. crassa, subrus pallidiora. Cymæ trichotomæ. Cor. alba, odore Ligustri.

3. *americana*. O. fol. lanceolato-ellipticis.

*Syst. veg. ed. 14. Cates. 1. tab. 61.*

*In Carolina h.*

Arb. 16-pedal. Fol. opposita, petiolata, integerr. nitida, satute viridia, sempervirentia. Racemi axill. breves, brachiati, pedicellis oppositis. Cor. alba, laciniis revolutis. Drupa speciosa, globosa, lævis, violacea. Nux obovata, substriata, basi perforata.

4. *fragrans*. O. fol. lanceol. serratis: pedunculis lateralibus aggregatis, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 2.*

*Moksei Kæmp. am. fasc. V. p. 844.*

*In Japonia h.*

Arb. vasta. Rami, & ramuli trichotomi, obsolete 4-goni, glabri. Fol. digitalia, decussata,

petiolata, margine subreflexo, parallelo-ner-  
vosa, reticulata, glabra, supra sature viridia,  
subtus pallidiora; in ramulis frequentia. Pe-  
toli semiunguicul. Fl. in ramulis umbellito-  
aggregati, 6-8. pedunculati. Cor. flavo-alba.  
nucleus striatus.

14. CHIONANTHUS. Cor. 4-fida, lacin. longissimis. Drupa

1. *virginica*. C. pedunc. 3-fidis, 3-fl.

*Syst. veg. ed. 14.*

*Amelanchier* &c. *Cates.* 1. tab. 68.

*In America septentrionali* h.

Frutex 6-10. pedal. Fol. Limonio similia, dilute  
viridia. Fl. racemosi, pedunculati. Cor. alba.  
Drupa purpurascens. *Var. cor. 4-5-6. fida, &*  
*flaminibus* 24.

2. *zeylanica*. C. pedunc. paniculatis, multifloris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Arbustula* &c. *Pluk. alm. tab. 241. f. 4.*

*In Zeylona* h.

Arb. fol. oppositis, subpetiol. obverse ovatis,  
integerrimis, glabris. Panacula axillar. pedun-  
culus subdivilis. Fl. albi.

*Ad hoc genus spectat Mayapea guianensis. Aubl.*  
*Guian. tab. 31.*

15. SYRINGA. C. infundibulif. 4-fid. Caps. 2-valv. 2-locul.  
2-sperma.

1. *vulgaris*. S. fol. ovato-cordatis, integris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Knorr. del. hort. 2. tab. S. 11.*

*Lilac. DuRoi. arb. 2. tab. 138.*

*In Persia, & collibus Italicis* &c. h.

Arb. 10-ped. Fol. opposita, longe petiolat. late  
virent. nitida, glabra. Fl. thyrsoides. Cor.  
alba, purpureo-cæcul. vel sature purpur.

2. *persica*. S. fol. lanceolatis, integris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Mill. dict. tab. 164. f. 1. Munting. tab. 57.*

*Pluk. alm. tab. 227. f. 8.*

b. *S. laciniata. An spec. diversa?*

*In Persia* h.

Frutex 3-4. cubital. cortice fusco-rubente. Fl.  
laxe racemosi, minores quam in priore, dilute  
purpurasc. odore suaviore.

3. *suspensa*. S. fol. ovatis, ferratis, ternatisque. *Syst. veg.*

*ed. 14. Thumb. Jap. tab. 3.*

*In Japonia* h.

Caul. fruticosus, flexuosus, ascendens, dein  
dependens, parum ramosus, sub 4-gon. 14-

berculis parvis, sparsis muricatus, Rami oppositi, remoti, divaricati. Fol. e gemma plura, unguicular. petiolata; prima simpliciter ovata, acuta, tenuia, glabra, sub florescentia erumpentia, dein ternata. Petioli longitudine fol. Fl. e gemmis oppositis, 1-2-3., pedunculati, flavi, peduncul. unguicularibus rugosis.

*Differt a congeneribus calyc. profundius inciso; cor. campanifor. nec infundibulif.*

26. DIALIUM. Cor. 5-pet. Cal. o. Stam. ad latus superius.

1. *indum*. Dialium. *Syst. veg. ed. 14.*

Cortex &c. *Rumph. amb. 3. tab. 137. Sed mei fol. non serrata.*

*In India h.*

Arb. Fol. alterna, pinnata, foliolis 7. ovato-obl. acuminatis, breviter petiolat. integerrimis, lævibus, palmaribus. Fl. paniculati, nuntantes, rubelli.

27. ERANTHEMUM. Cor 5-fida, tubo filiformi. Anth. extra tubum. St gma simplex.

1. *capense*. E. fol. lanceolato-ovatis, petiolatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Æthiopia.*

Habitus Chironiæ. Caulic. articulati. Fol. sæpe opposita, crassiuscula, glauca. Fl. terminales, subumbellati, punicei.

2. *angustifolium*. E. fol. linearibus, remotis, patulis. *Syst. veg. ed. 14.*

Thymelæa &c. *Burm. Afr. tab. 47. f. 3. Pluck. mant. tab. 445. f. 6.*

*In Æthiopia h.*

Frutex erectus, ramosus. Fol. infer. conferta, sessilia, glabra, viridia. Racemi terminal. simpl. erecti, longiss. purpurasc. Fl. minimi. Cor. tubo longiss. filiformi; limbo parvo, 5-part. obtuso.

3. *parvifolium*. E. fol. ovato-linearibus imbricatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Frutex &c. *Comm. Hort. 2. tab. 60.*

*Ad Cap. b. Spci h.*

Frutex. Fol. brevia, sessilia, carinata, glabra. Spicæ cylindricæ, bract. ovatis, pallidis. Cor. subregul. alba, lacin. obtusis, planis, una paulo latiore, 2-fida.

4. *falsoloides*. E. fruticosum, fol. linearibus, teretiusculis,



carnosis, glaberrimis: racemis axillaribus, calycibusque pubescentibus; tubo recurvo. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Barrancas circa oppidum s. Cruz.*

Frutex fol. simillimus Saisolæ.

28. CIRCÆA. Cal. 2-phyll. superus. Cor. dipetala. Fructus bilocul. 2-spermus.

1. *Lutetiana*. C. caule erecto: fol. ovatis: racemis pl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. 256. Kniph. orig. tab. 22. Lob. ic. 266.*

*In nemoribus 24.*

Caul. cubital. ramosus. Fol. longe petiol. subferrata, opaca, villosula, tenera, sature virentia, venosa, glabra. Racemi laxi, nudi; terminalis longior. Fl. albido-rubentes. Fruct. ovati, villis uncinatis hirti.

b. C. *Canadensis*, latifol. fl. albo. *Tourn. inst.*

2. *alpina*. C. caul. prostrato: foliis cordatis (dentatis, glabris): racemo unico. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 210.*

C. minima. *Col. ecphr. 2. tab. 80.*

*In montibus 24.*

Caul. triental-6. unc. Fol. sordide virentia, fusco tincta, venosa. Cal. rubellus. Cor. albida.

29. VERONICA. Cal. 4-fid. Cor. rotata, limbo 4-part. lacini. infima angustiore. Caps. 2-l ocul. Sem. 2.

\* *Spicata*.

*sibirica*. V. spicis terminalibus: fol. verticillatis, subsenis: caul. subhirsuto. *Syst. veg. ed. 14. Amm. ruth. tab. 4.*

*In Dauria 24.*

Caul. 4-pedal. Fol. V. Virginicæ latiora. Pedunc. terminal. folitarii; laterales foliolis 2. oppositis, ovalibus. Cal. 5-fid. Cor. cœrulea.

*In hortos translata duplo ma. evadit.*

2. *virginica*. V. spicis terminalibus: fol. ternis-quaternis-quinisq. *Syst. veg. ed. 14. Pluk alm. tab. 70. f. 2.*

*In Virginia 24.*

Altitudo humana. Fol. breviter petiolata, ovata, longe acuminata, serrata. Spica terminalis pedalis, axillares breviores. Cor. limbo acuto, lacini infima reflexa.

3. *spuria*. V. spicis terminalibus: fol. (plerumq) ternis, lanceolatis, æqualiter serratis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. it. 1. tab. 39.*

*V. mas* &c. *Barr. ic.* 691.

*In Europa australi* 24.

Caul. ped. & ultra, inferne, & ad genicula coloratus, fistulosus, superne pubescens. Fol. petiolata, pendula, glabra, supra concava, canaliculata, viridia, subtus nervosa, dilutiora. Spica pubescens. Cor. cœruleo-purpur.

*Var. fol. oppositis, vel summis alternis.*

4. *maritima*. *V. spicis terminalibus*: fol. ternis, inæqualiter serratis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. 374. Knorr. del. hort. 2. tab. V.*

*In maritimis Europæ macris apricis* 24.

Caul. erectus sesquiped. Fol. opposita, ovato-obl., accedente sæpe impari, infer. variae magnitudinis; super. obtusiora. Spicæ 5-6. laxiores. Cor. cœrul.

5. *longifolia*. *V. spicis terminalibus*: fol. oppositis, lanceol. acuminat. serratis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. Herom. 2. tab. 49. Clus. ic. 346. bona.*

*In Austria, Svecia ec.* 24.

Caul. ped. & ultra, apice plerumq. ramosi. Fol. petiolata, semiaplexicaul. crassa, triste viridia, subtus quandoq. purpurasc. Spicæ longæ, densæ. Cor. violac.

*Var. fol. latioribus & angustioribus.*

6. *incana*. *V. spicis terminalibus*: caul. erecto, tomentoso; fol. obtusis, crenatis; (inferioribus plerumq.) oppositis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Ucraina, Samara* 24.

Planta incana. Caul. spitham. & ultra. Fol. oblonga, infer. petiolata, crenata, super. sessilia. Cor. cœrul. vel alba.

7. *spicata*. *V. spica terminali*: caule adscendente, simplicissimo: fol. oppositis, obtusis, crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 52. Vaill. par. tab. 33. f. 4. Eph. n. cur. Cent. 5-6. tab. 11.*

*In Europa campis* 24.

*Similis V. longifolia*. Mire ludit. Caul. ped. lanuginosus. Fol. subhirsuta, dura, sicca, firma; super. acutiora, ima ovata. Spica longa. Cal. hirsutus. Cor. cœrul.-alba-carnea.

8. *hybrida*. *V. spicis terminalibus*: caule adscendente: fol. oppositis, obtuse serratis, scabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*V. spicata* &c. *Raii. Angl. 3. tab. 11. f. 1.*

*In Europa variis* 24.

Caul. vix pedal. simpl. Fol. ovalia, obtusiuscula, pubescentia, utrimq. viridia, serraturis grossis, obtusis. Petioli margine dilatato. Spica terminalis, oblonga.

9. *pinnata*. V. spica terminali: fol. linearibus, dentato-pinnatis. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Peurop. 1770. tab. 29. f. 1.*

*In Sibiria* 24.

Caul. palmar. diffusi. Fol. opposita, confertiusculabra, dentibus utrimq. sæpius 3. linearibus elongatis. Cal. æqualis. Cor. dilute cœrul. Caps. ovalis.

*In Sibiria fl. confertissimi.*

10. *officinalis*. V. spicis lateralibus pedunculatis: caul. procumbente: fol. oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 248. Ludvig. cœt. tab. 100. Knorr. del. hort. 2. tab. V. 1. Black. tab. 143.*

b. V. repens &c. *Allion. spec. 1. tab. 4. f. 3. Fl. Ped. tab. 4. f. 3.*

V. mas &c. *Pluk. phyt. 223. f. 1.*

*In Europæ sylvestribus sterilibus* 24.

Caul. caespitosi, duri, villosi. Fol. sessil. ovata, serrata, ad basin sæpe integra, hirsuta. Racemi longe pedunculati, densi, inferne nudi. Foliola cal. æqualia. Cor. pallide cœrulea, lineata.

\*\* *Corymbo-racemosa*.

11. *aphylla*. V. corymbo terminali: scapo (sæpe) nudo. *Syst. veg. ed. 14.*

V. alpina &c. *Bucc. mus. 2. tab. 1. 9.*

V. parva &c. *Seg. Ver. tab. 3. f. 2.*

*In alpinis Europæ Australis* 24.

Caul. radicans, villosus. Fol. 4-5. ovata, subcrenata, villosula, mollia. Racemus sub 7-fl. Cor. cœrulea. *Var. caul. filioso.*

12. *kamtchatica*. V. hirta; racemo 3-fl. elongato; laterali aphylo: fol. ovatis, seu oblongis, serratis: pilis articulatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Kamtschatka.*

Similis priori, sed fol. ma. & serrata. Singularis pilis articulatis, ut *Conservæ*. Caul. procumb. elongati.

13. *bellidioides*. V. corymbo terminali; caule adscendente, aphylo: fol. (plerumq.) obtusis, crenatis; cal. hirsutis, *Syst. veg. ed. 14.*

## DIANDRIA MONOGYNIA.

*V. caule* &c. *Hall. helv. tab. 15. f. 1.*

*In Pyrenæis, & alpibus Helvetiæ* 24.

*Differt a V. alpina, cui similis, habitu duriore; fol. caulinis paucis; racemo congesto.*

*Caul. radicans, inde erectus, dodrant. simpl'ex, lanuginos. Fol. ad terram congesta; caulina 1-3. iuga, dura, scabra, hirsuta, etiam acuminata. Racemi 6-7-12-fl. Cal. hirsutis. Cor. cœrul.*

14. *fruticulosa*. *V. corymbo terminali: caul. fruticul. fol. lanceol. obtusiusculis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. 342.*

*V. alpina* &c. *Pluk. phyt. tab. 232. f. 5.*

*In alpibus Helvetiæ, Austriæ, Pyrenæis.* 24.

*Facies V. serpyllifoliæ. Caul. dodrant. ad terram ramosi, subhirsuti, inferne procumb. perennantes, superne erecti, annotini. Fol. sessil-a, plana, serpyllacea, subcrenata, superne ma. Gemmæ caulinae. Cal. sub 4 fid. glaber, subpubescens. Cor. magna, alba, striis sanguineis, nec ut in *V. alpina* violac. Capsula magna. *Var. statura humilior, multicauli, & fol. rotundioribus.**

15. *alpina*. *V. corymbo terminali: fol. oppositis: cal. hispidis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 16.*

*V. caule* &c. *Fl. Lapp. tab. 9. f. 4. Hall. Helv. tab. 15. f. 2.*

*In alpibus Europæ* 24.

*Caul. humilis, triental. frutescens, simpl. subhirsutus. Fol. ovato-rotunda, serrulata, glabra. Spica brevis, 8-10-fl. Cor. obscure cœrulea, vel alba. *Var. fol. ovatis, integerrimis; calyc. levi.**

16. *saxatilis*. *V. corymbo terminali: fol. oppositis, glabriusculis: pedunculis fol. floralia superantibus. Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*V. fruticans. Clus. hist. 1. p. 347.*

*In Alpibus* 24.

*Caul. diffusi, ramosi. Fol. ovata, integerr. plana. Cal. obtusus. Cor. maxima, cœrul.*

17. *serpyllifolia*. *V. racemo terminali subspicato: fol. ovatis, crenatis, glabris. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. 492.*

*In Europa, & Amer. septentr. ad vias, agros* 24.

*Caul. pl. palmar. ad basin repentes, dein erecti, ex viridi-albentes. Fol. ima opposita, summa*

alterna. Fl. exigui. Cor. alba, lineis cœrul.  
picta, sed inum segmentum immaculatum.

*Var. habitu altiore; fol. ma. rotundis; fl. par-  
vo, fature cœrul.*

18. *Beccabunga*. V. racemis lateralibus: caul. repente: fol. o-  
vatis, planis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab.*  
*511. Ludiv. ed. tab. 30. Sub. H. Rom. II. tab.*  
*50. Black. tab. 48.*

*In Europæ fœffis.*

Planta succulenta. Fol. breviter dentata, nitida,  
glabra. Cor. fature cœrul. ad basin segmenti  
2. lineolæ albæ. *Differt a seq. fol. ovatis, fo-  
lidioribus; fl. ma. fature cœrul.*

19. *anagallis*. V. racemis lateralibus: fol. lanceol. circumfer-  
ratis: caul. erecto (foliofo, & florifero). *Syst.*  
*veg. ed. 14.*

*In Europæ fœffis 24.*

Caulis fluitans. Fol. basi latiuscula caulem am-  
plexante, glabra, & tenera. Racemi multi.  
Fl. longe peduncul. Cor. exigua, carnea ve-  
nis coccineis, vel alba.

20. *scutellata*. V. racemis lateralibus, alternis; pedicellis pen-  
dulis: fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl.*  
*Dan. tab. 209.*

*In Europæ inundatis 24.*

Caul. procumb. radicans, dein erectus, angula-  
tus. Fol. Graminea, rariè ferrata. Pedunc.  
longi, ramosi. Racemi capillares, laxi, diva-  
ricati, paucifl. Cor. segmentis ma. roseis lineis  
picta. Caps. latior. *Var. f.l. ovat-lanceol.*

21. *Teucrium*. V. racemis lateralibus longissimis: fol. ovatis,  
obtusiusculis, rugosis, dentatis: caulib. (sæpe)  
procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Chamædrys &c. Fuchs. 871.*

*Teucrio II. Matth.*

*In Germania, Helvetia 24.*

Caul. pedal. ramoli, rubentes. Fol. brevia, ses-  
silia, vel amplex-caulia, firma, dura, nitida,  
super. angustiora. Ex summis alis pedunc. lon-  
gi. Racemi densi, stricti, subspicati; Cor. cœ-  
ruleo-violacea, segmento superiore ma. *Var.*  
*fl. pleno.*

22. *pilosa*. V. racemis subspicatis: fol. ovatis obtusis, pli-  
catis: caul. prostrato, piloso. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Bauh. hist. 3. p. 286.*

## DIANDRIA MONOGYNIA.

*Teucrium* 2. *Clus. f. 5.*

*In Austria. 24.*

Caul. decumbent. apice adscendentes, ramosiss.  
Fol. serrata, petiolata, summa sessilia. Spicæ  
subterminal. solitar. Bract. ovata, infimæ basi  
dentatæ. Cal. l. cin. 2. exter. ma. Cor. albidocœruleo.

23. *prostrata*. V. racemis lateralibus: fol. oblongo-ovatis, serratis: caul. prostratis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. haff. 1. tab. 1.*

*Chamædrys incana* &c. *Bauh. hist. 3. p. 287.*

*In Europæ collibus 24.*

*Convenit cum V. Teucrio. Hall.*

Caul. duriusculi, canescentes, subtomentosi. Fol. obtusa, subpetiol. exceptis superioribus, e quorum alis racemi longi. Fl. conferti. Cal. 5-fid. inæqual. Cor. læte violac.

24. *pedinata*. V. racemis lateralibus, foliatis: fol. oblongis, pectinato-serratis: caulibus prostratis. *Syst. veg. ed. 14.*

V. Constantinopolitana &c. *Buxb. cent. 1. tab. 39. Constantinopoli 24.*

Caul. palmar. basi suffruticosi, pubescent. Fol. Chamædryos, elliptica, profunde serrata instar pectinis, opposita, subpetiol. pubescentia. Pedunc. palmares, fol. 5-6 similibus, sed alternis, sessilibus. Cal. 5-fid. Cor. pallide cœrul.

25. *montana*. V. racemis lateralibus paucifl. cal. hirsutis: fol. petiolatis, ovatis, crenatis, rugosis: caule debili. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 109.*

*Alysson &c. Col. ecphr. 1. tab. 288.*

*In umbrosis 24.*

Caul. semi-sesquiped. fusco-purp. Fol. lata, obtusa, raro pilosa, sæpe glabra, subtus rubra. Racemi ut in *V. scutellata*, capillacei, fol. multo longiores, paucifl. Cor. purpureo-cœrul. lacia. infima immaculata; reliquæ cum venis saturatioribus. Caps. orbicul. basi, apiceq. emarginata.

26. *Chamædrys*. V. racemis lateralibus: fol. ovatis, (plerumq.) sessilibus, dentatis, rugosis: caul. bifarian piloso. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 448. Riv. tab. 94.*

*In Europæ pratis 24.*

Caul. infirmus, superne brachiatus. Fol. villosa, ad basin integra; ima subrotunda, retusa; super. longe acuminata. Racemi ex summis alis, longi, erecti. Fl. sub 20. Cal. segmenta inæqualia, lanceol. Cor. fature cœrul. venosa, ungue atro.

*V. chamædrys*, montana, & *Teucrium* valde similes sunt. Differt vero montana fol. petiolatis: *V. Chamædrys* fol. sessilibus, imis ovalibus; super. cordatis. *V. Teucrium* fol. sessilibus, imis subovatis; superioribus ellipticis.

27. *austriaca*. *V. racemis* lateralibus: fol. lineari-lanceol. pinato-dentatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 329.*

*Chamædrys spuria* &c. *Moris 3. tab. 23. f. 17. In Austria, & Siberia 24.*

Caul. terne sesquipedal. villosi. Fol. varie ludent, plerumq. Abrotani similia. Racemi longi. Cor. pallide, vel fature cœruleæ.

28. *multifida*. *V. Videtur var. prioris.*

29. *urticæfolia*. *V. racemis* lateralibus: fol. ovato-lanceol. hirtis, argute ferratis: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 59.*

*In Sylvis 24.*

*Similis V. latifoliæ*. Caul. pl. pedales, & ultra, simpl. erecti, aut subinclinati, stricti, villosi, inferne purpureæ. Fol. opposita, sessil. angustiora, modo magis lata, ad basin vix cordata, acuta, rugosa, utrimq. subhirsuta; inferiora obtusiora. Racemi ex alis superioribus, longi. Cor. lacinie obtusæ; superior duplo ma. pallide carnea.

30. *latifolia*. *V. racemis* lateralibus: fol. cordatis, rugosis, dentatis: caule stricto. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 60.*

*V. pratensis*. *Buxb. cent. 1. tab. 34.*

*In Germania, Helvetia &c. 24.*

*Differt a V. Chamædry fol. longioribus & longius acuminatis*. Caul. 3-pedal. erectus, ramulosus, durus. Fol. subsessil. lata, subhirsuta, circumferrata; ima subrotunda, super. longe acumin. Racemi multi, longi, inferne nudi, laxi. Pedunc. fructiferi ita demum inflectuntur, ut emarginatura capsulæ scapum respiciat. Cal. foliola 5, æqualia, ovata, integerrima. Cor. albo-

violac. lineis saturatoribus villosula. Caps. compressa, villis cinata.

31. *paniculata*. V. racemis lateralibus longis: fol. lanceol. (plerumq.) ternis, ferratis: caule adscendente. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Tartaria 24.*

Statua V. latifoliae, sed fol. angustissime lanceol. Fl. satore caerulei, ad tria super. genicula terni. C l. 4-fid.

\*\*\* *Pedunculis 1-fl.*

32. *agrestis*. V. fl. solitar. fol. obcordatis, incis, pedunculo brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 449.*  
V. folio &c. *Riv. tab. 97.*

*In Europæ agris, & arvis ☉.*

Caul. pl. primum erecti, dein procumbent. semiped. subvillosi. Fol. breviter petiol. subhirsuta. Fl. post efflorescentiam reflexi. Cal. foliola ovata, æqualia. Cor. satore caerulea, lineata, segmento infer. pallidiore; vel alba.

33. *arvensis*. V. fl. solitar. fol. cordatis, (plerumq.) incis, pedunculo longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 515.*

*In Europæ arvis cultis ☉.*

Priore magis villosa. Caulic. dodrant. erecti, a terra ramosi. Fol. ad terram multa; caulina pauca, subfessil. ovata, uno, alterove dentium pare; super. sæpe lanceol. integerr. Fl. longa serie plurimi. Cal. foliola lanceol. inæqualia. Cor. calyce minor, caerule. *Var. fol. alternis.*

34. *hederifolia*. V. fl. solitar. fol. cordatis, planis, 3-5 lobis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 418.*

Alfina &c. *Riv. tab. 97. Bauh. hist. 3. p. 368.*

b. V. chia &c. *Burb. cent. 1. tab. 39. f. 1.*

*In Europæ ruderatis ☉.*

Caul. procumb. dein erecti, ramosi. Fol. plus, minus petiolata; ima opposita; sub fl. alterna, varia, lobo medio ma. modo ampliora, modo min. Pedunc. longi, cernui, hirsuti. Cal. foliola cordato-obl. Cor. calyce min. pallida, lineis saturatoribus, vel alba. Sem. umbilicata sunt huic propria.

35. *triphyllos*. V. fl. solitar. fol. digitato-partitis: peduncul. calyce longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 627.*

V. folio rutæ, *Riv. tab. 96.*

Alfina



Alfine &c. *Lob. ic.* 464. *Bauh. hist.* 3. p. 367.

*In Europæ agris* ☉.

Caul. semiped. erecti, ramosi. Fol. sessil. vel subpetiol., ima 3-summa 3-partita, subtrus rubella; ima opposita, alias serrata; summa integra. Cor. fature cœrul.

36. *verna*. V. fl. solitar. fol. digitato-partitis: pedunculis calyce brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan.* 252.

*In aridis apricis* ☉.

Caul. procumb. dein erectus, plerumq. simplex, ramo uno, longo, pedali, villosus. Fol. infer. opposita, super. alterna: primum caulinarum par breviter petiolatum, ovatum, tridentatum, & crenatum: quod sequitur priori simile, sed magis incisum, & laciniatum: tertium fere semper ad caulis divisionem pinnatum, aut digitato-partitum, lacinia media longiore, latiore. Cor. pallide cœrulea, cum venis purpurascentibus.

37. *romana*. V. fl. solitar. subsessilibus. Fol. oblong. subdent. caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

*In agris Europæ australioris* ☉.

Planta palmar. glabra. Fol. infer. opposita, ovata; super. alterna, lanceol. obruta, dente uno, alteroq. obsoleteiore; suprema integerr. Fl. axillares, albi.

38. *acinifolia*. V. fl. solitar. pedunculatis: fol. ovatis, crenatis, glabris: caul. erecto, subpiloso. *Syst. veg. ed. 14.*

V. minima &c. *Bucc. mus.* 2. tab. 102. *Vaill. paris. tab.* 23. f. 3. *optima*,

*In Europa australi* ☉.

Caul. palmar. ramis oppositis. Fol. caulina opposita; floralia alterna, breviter petiol. remota, suborbiculata, denticulis latioribus. Cor. cœrulea. *Differt a V. arvensi, cui similis, pedunculis fl. longis. A. V. chamædrifolia caul. erecto, duriusculo; cum qua tamen convenit fol. flore, & fructu.*

39. *peregrina*. V. fl. solitar. sessilibus. Fol. lanceol-linearibus, obrutis, glabris, integerrimis; caule erecto. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan.* 407.

V. terrestris &c. *Moris. hist.* 3. S. 3. tab. 34. f. 19. *In Europæ hortis, & arvis* ☉.

Caul. digital-spitham. Fol. alterna, exceptis

- ultimis, sessilia. Fl. axill. Cor. parva, & fere nulla, alba.
40. *marilandica*. V. fl. solitar. sessilibus: fol. linearibus: caulibus diffusis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1782. tab. 3.*  
*In Virginia.*  
 Caul. pusilli. Fol. rigida, glabra. Fl. minimi, albi.
- 
- nummularia*. V. fl. axillar. solitar. subsessil. fol. suborbiculat. integerrim. caul. prostrato, fruticoso. *Gouan. Illus. tab. 1. f. 2.*  
 V. nummulariæ fol. Pyrenaica. T. I. R.H.  
*In Pyrenæis 24.*  
*Diversa a V. fruticulosa.* Caul. ramos. basi nudus, nodosus, prostratus, dein erectiuscul. Fol. imbricata, sessil. glaberr. basi ciliata, quædam vix crenata. Cal. pilosus. Cor. cærul. extra bracteam producta.
- carnea*. V. fl. carneis. *Hall. hist. In Helvetia.*  
*Differt a V. alpina, caulibus procumbentibus, crassifloribus, fol. maioribus, lanecol: fl. copiosioribus, carneis, cum venis purpureis, in spicam longiorem dispositis; cal. hirsuto.*
- tenella*. V. repens, fol. rotundis, crenulatis; ramis breviter racemosis. *All. Fl. Ped. tab. 22. f. 1.*  
*In umbrosis alpium Sylvis 24.*  
 Cauliculi reptantes, & novas rad. emittentes. Fol. opposita, petiolata, tenera, raro crenulata, rugosa, glabra. Fl. purpur. Fol. floralia alterna, ovata, aut elliptica, pedunculis breviora. V. *Serpyllifolia differt ab hac fol. duris, firmis, & omnino lævibus, floribusq. densius racemosis, seu spicatis in erecto cauliculo.*
- Bellardi*. V. hirsuta; caule erecto, simplici, toto florifero: fol. linearibus: fructu subsessili brevioribus. *All. Fl. Ped. tab. 85. f. 1.*  
*In pascuis prope arcem Fenscellarum ☉.*  
 Cauliculus digital. Fol. breviter petiolata, alterna, obtusa, integerrima, si excipias foliola 2 radici proxima. Fl. axillar. parvi, læte cærul. Fructus pro ratione plantæ magnus. Tota planta hirsuta.
- succulenta*. V. erecta, spicata, fol. succulentis; caulinis pinato-dentat. floralibus integerrimis. *All. Fl. Ped. tab. 22. f. 4.*

*In saxosis apricis* ☉.

Caul. digitalis, aut spitham. erectus, filiformis, duriusculus. Fol. opposita, petiolata, linearia, utrimq. dentata, viridia, glabra. Spica longa, & rara. *Proxima V. vernæ.*

*pumila.*

*V.* caule simplici, fl. congestis terminato: fol. ovatis, acutis, dentatis. *All. Spec. Ped. tab. 3. f. 3. Fl. Ped. tab. 22. f. 3.*

*In alpium saxosis* ☿.

Fol. acutiora *V. alpinæ*, non crenata, sed dentata, rugosa.

30. *PÆDEROSA*. Cal. 5-part. Cor. 4-fid. Capsf. 2-locul.

*Differt a Veronica cal. 5-part. segmento uno longiore.*

1. *bonæ Spei*. P. fol. pinnatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Veronica &c. Pluk. 320. f. 3.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. prostratus, pedal. Fol. ima terna; summa sæpe alterna; petiolata, lanceol. obrufa, pinnatifida. Fl. axill. alterni, pedicellati. Cor. purpur. cum lineis albidis.

2. *Ageria*. P. fol. ferratis; inferioribus alternis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. H. 2. tab. 121.*

*Habitas . . .*

*Differt a P. Bonarota fol. infimis neque oppositis, neque flaccidis: cor. galea 2-fida.*

Caul. erectus, villosulus. Fol. sicca, acute serrata, supra non lucida. Racemus terminalis, oblong. Cor. lutea.

3. *Bonarota*. P. fol. ferratis; (infimis) oppositis, rotundis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. App. tab. 39.*

*Bonarota. Mich. gen. tab. 15. f. 12. Pluk. phyt. tab. 233. f. 3.*

*In alpidus Italicis, Austriacis* ☿.

Caul. ad summum pedal. debiles, villosi. Fol. terna, subfessil. lanceol.-ovata, acuta, subvillosa. Racemus densus, nutans. Cor. violac.

4. *cærulea*. P. cor. labio super. indiviso. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Austria.*

5. *lutea*. P. cor. labio super. 2-fido. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Austria.*

*Hæc fol. longioribus.*

31. *JUSTICIA*. Cor. ringens. Capsf. 2-locul. ungue elastico diffiliens. Stam. anth. singulari.

\* *Fruticosa*.

1. *Adhatoda*. J. arborea; fol. lanc. ol-ovatis: bracteis ovatis, persist. ntibus (enerviis): cor. galea concava. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 3. tab. 10. Herm. Lugd. tab. 643. Pluk. Alm. tab. 173. f. 3.*

In Zeylona h.

Frutex. Fol. opposita, breviter petiolata, integerr. Fl. spicæ axillar. solitariae, inferne nudæ. Cor. magna, alba, lineis rubris striata.

2. *Ecbolium*. J. fruticosa; fol. lanceol-ovatis: spicis 4-gonis: bract. ovatis, ciliatis; cor. galea reflexa. *Syst. veg. ed. 14.*

*Adhatoda* &c. *Burm. Zeyl. tab. 4. f. 1.*

*Carim-curini. Rheed. Mat. 2. tab. 20. Pluk. Alm. tab. 171. f. 4.*

In Malabarica, Zeylona h.

Arbor facie, & fol. prioris, sed spica constat bract. ovatis, planis, apice aculeis armatis, deciduis. Caul. fruticuli. teretiusc. articulatus, compressus. Fol. petiolata, acuminata, integerr. glabra. Spica terminal. strobiliform. bracteis imbricatis. Cor. tubus filiform. incurvus, bractea longior: limbus cœrulescens: lab. super. lineari, angustiss. refracto, apice 2-fido: lab. infer. 3-fido, media latiore. Anth. ad refracturam labii super.

*Differt a J. infundibulif. quod huic spica terminalis fissilis.*

3. *pulcherrima*. J. fruticosa; fol. ovatis, utrimq. acuminatis, petiolatis: fl. terminalibus, 4-gon. erectis; bracteis ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

J. fl. tetrandris. *Jacq. amer. tab. 2. f. 4. ed. 2. piç. tab. 259. f. 1.*

In Cartagena sylvaticis montibus &c.

Planta 6-pedal. erecta. Caul. ex eodem rad. sæpe pl. vix ramosi. Fol. opposita, breviter petiolata, margine obsolete denticulato, supra glabriuscula, subtus tomentosa, 8-pollicar. Spicæ 3-pollicar. erectæ, 4-gonæ, densæ: axillares oppositæ; terminales binæ-quateronæ. Bract. subrotundo-cordatæ. Fl. sæpe 2-pollic. rubore pulcherrimo, inodori.

4. *Betonica*. J. fruticosa; fol. lanceol-ovatis: bracteis ovatis, acuminatis, venoso-reticulatis, coloratis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 241. f. 1.*

Bem-curini . *H. Mal.* 2. *tab.* 21.

*In India* h.

Caul. magis herbac. Fol. min. remotiora. Cor. galea lata, ut in *J. Adhatoda*, sed lab. superius aliter constructum.

3. *scorpioides*. *J. fruticosa*; fol. lanceol-ovat. sessilibus hirsutis: spicis recurvatis. *Syst. veg. ed.* 14.

*In vera Cruce* h.

Fl. axillares.

6. *picda*. *J. fruticosa*; fol. lanceol-ovat. pictis: cor. fauce inflatis. *Syst. veg. ed.* 14.

Folium bracteatum. *Rumph. amb.* 4. *tab.* 30.

Tiude-maram. *Rhæd. mal.* 6. *tab.* 60.

*In Asia* h.

Caulis striatus. Fol. opposita, subpetiol. acuta, integerrima, glabra, fusca, macula lucida, flav. Fl. ampli. Cal. parvus, 5-dent. Cor. ampla, ringens, sanguinea, fauce inflata: lab. super. incurvum, emarginatum; infer. patens, 3-fid. æquale.

7. *infundibuliformis*. *J. fruticosa*; fol. lanceol-ovatis, quaternis: bracteis lanceol. ciliatis. *Syst. veg. ed.* 14.

Manja-Kurini. *Hort. mal.* 9. *tab.* 62.

*In India* h.

Frutex ramis teretibus. Fol. longe petiolata, integerr. glabra. Pedunc. ad singula caulisgenicula solitar., breves, longitudine fol. Spica oblong. distiche imbricata. Cal. apice pilosus. Cor. speciosa, alba; tubo filiformi, limbo magnitudine *Narcissi Poetici*, lobis 5. expansis, infimo ma.

8. *spinosa*. *J. fruticosa*; spicis axillaribus: pedunculis lateralibus. *Syst. veg. ed.* 14.

*J. monanthera* &c. *Jacq. Am.* 2. *tab.* 2. f. 1. *ed. picda tab.* 2.

*In America* h.

Frutex 5-ped. ramis longiss. foliosis. Fol. subsemipoll. opposita, petiolata, ovata, vel lanceol-ovata, obtusa, integerr. nitida. Spinæ oppositæ, subulatæ, patentiss. Pedunc. breves, oppositi, terni-quaterni. Cor. purpur. lab. super. 2-fido.

9. *fastuosa*. *J. fruticosa*; fol. elliptico-lanceol. thyrsis terminalibus. *Syst. veg. ed.* 14.

Gratiolæ &c. *Pluk. phyt.* f. 3.

*J. paniculata*. Forsk. *Ægyp. monente* Vahl.

*In Tranquebaria*, *Arabia felici* h.

Caul. teres, lævis. Fol. 2-pollic. opposita, petiolata, integerr. venis alternis, subtus, marginem pilosa. Racemus longus, fl. copiosis; racemuli axillar. Cal. lævis, magnitudine grani Tritici. Cor. tubus cal. longior: limbus fauce compressa, dilatata, tubo longior. Lab. super. obtusum, 3-dent; infer. angustius, lanceol. indivisum. Neck. cingens germen, campanul. postice fissum, lacinia utraq. hinc seta terminali.

10. *sessilis*. *J. fruticosa*; fl. axillaribus sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*J. Dianthera* &c. *Jacq. Am. tab. 2. f. 2. ed. pida tab. 3.*

*In America* h.

Caul. sub. 2-ped. Fol. opposita, breviter petiol. ovato-acut. obsolete crenata. Bract. florales plerumq. 2. exiguae, acutæ. Fl. solitar. Cor. purpur. lab. super. integerrimo.

11. *orchioidea*. *J. fruticosa*; fol. ovatis, sessilibus; fl. axillaribus, solitar. peduncularis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei* h.

Frutex rigidus, glaberrimus. Fol. parva, rigidissima, apice fere pungente.

12. *Gandarussa*. *J. fruticosa*, glabra; fol. lanceol. elongatis: spicis verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Rumph. Amb. 4. tab. 28.*

*In Malabar* &c. h.

Caul. erectus, teres, geniculat. glaber. Fol. subpetiol. decussata, glabra, venis rubris. Spica fl. oppositis. Bract. lanceol. apice fetaceo. Cor. lutea.

13. *verticillata*. *J. villosa*; fol. ovatis, integris; fl. axillaribus, verticillat. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei* h.

14. *tranquebarensis*. *J. suffruticosa*; caul. tereti; fol. orbiculatis: spicis terminalibus; fl. solitariis; bracteis obcordatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Tranquebar* h.

Caul. teres, ruber, pilis mollibus, albicantibus obsitus. Fol. quandoque ovalia, petiolata, subcarnosa, undulata, minora.

15. *hyssopifolia*. J. fruticosa; fol. lanceol. integerrimis; peduncul. 3-fl. ancipitibus; bracteis cal. brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 13.*  
*Ecbolii &c. Pluk. Alm. tab. 280. f. 1. Phyt. tab. 313. f. 1.*  
*In insulis Fortunatis h.*  
 Corolla alba.  
 \*\* *Herbaceæ.*
16. *acaulis*. J. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In Trangueraria 24.*  
 Radix rufescens. Fol. radicalia, palmaria, ovata, crenulata, nuda, sæpius lyrata; alia tamen in eadem planta integra. Scapi simpliciss. foliis duplo longiores, imbricati, squamis minoris, adpressis, acutis. Spica oblonga.
17. *ciliaris*. J. herbacea; fol. lanceolatis: fl. oppositis, sessilibus: bracteis, calycibusque setaceis, hispidis, flore longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Jacq. H. 2. tab. 104.*  
*In Zeylona.*  
 Tota planta scabra. Caul. pl. sesquipedal., erecti, debiles, superne ramosi, pilosi. Fol. opposita, petiolati, obrusiuscula, ciliato-dentata, hirsuta, supra atro-virentia. Fl. axillar. parvi, inodori. Cor. alba, cum punctis fulvis.
18. *procumbens*. J. fol. lanceol. integerr. spicis terminalibus, lateralibusque alternis; bract. setaceis: caule procumbente. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Euphrasia &c. Pluk. Alm. tab. 36. f. 1. & tab. 393. f. 4.*  
*In Zeylona 24.*  
 Caul. herbaceus, ramis alternis. Fol. opposita, petiolata, scabra. Spicæ subnudæ.
19. *pedinata*. J. diffusa; spicis axillaribus, sessilibus, tomentosis, secundis, dorso imbricatis: bract. semilanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Asia.*  
 Habitus sequentis. Fol. opposita, petiolata, oblonga, integerr. lævia. Flosculi minimi.
20. *repens*. J. fol. ovatis, subcrenatis: spicis terminalibus: bracteis lanceol. caule repente. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Adhatoda &c. Burm. Zeyl. tab. 3. f. 2.*  
*In Zeylona 24.*  
 Habitus Thymi Acinos. Caul. geniculati, radices agentes, ramosiss. Fol. opposita, viridia, sca-

bra. Bract. utroq. margine late membranaceæ.  
Cor. albicans. *Var. fol. lanceol. sessilibus.*

21. *chinensis*. J. herbacea; fol. ovatis; fl. lateralibus, pedunculat. 3-5-fl. bract. ovalibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
J. sexangularis. Forskal *Ægyp. manente Vahl.*  
*Burm. Ind. tab. 4. f. 1.*

*In China.*

Caul. pedal. angulati, inferne ramosi. Fol. opposita, petiolata, acuminata, obtusiuscula, vix crenata. Pedunc. axill. 2-3. breves, involuc. 3-phylo, setaceo, nudo. Cor. tubus albidus; limbus violac.

22. *echioides*. J. fol. lanceol-linearibus, obtusis, sessilibus: racemis adscendenti-secundis: bract. setaceis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Indiæ subhumidis.*

Caul. pedal. Fol. opposita, digitum longa, unguem lata, læte viridia, subaspera. Racemi axill. simplic. patuli. Fl. remoti, sessil. erecti. Cal. longus, setaceus. Cor. basi candida, alioquin purpurascens. Sem. ex fusco-flavescentia.

23. *sexangularis*. J. pertinet ad priorem.

24. *carthagenensis*. J. fol. lanceol-ovalibus; fl. spicatis: bract. oblongo-cuneatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Am. tab. 5. ed. picta tab. 7.*

*In America.*

Caul. 3-6. pedal. Fol. semipedal. opposita, breviter petiol. integerr. supra scabriuscula, subtus nitida. Spicæ lateral-terminal. Bract. sub singulo fl. ternæ. Fl. sesquipollic. Cor. purpurascens, filamentis candidis.

25. *affurgens*. J. fol. ovat. integerr. bract. subulatis: ramis hexagonis. *Syst. veg. ed. 14. Brow. Jam. tab. 2. f. 1.*

*In Jamaica.*

Similis priori, sed bract. angustæ, acuminatæ.

26. *nasuta*. J. fol. lanceol-ovat. integerr. pedunc. dichotomis. *Syst. veg. ed. 14.*

Pulcolli. *Rheed. Mal. 9. tab. 69.*

*In India.*

Caul. 3-4. pedal. ramis obsolete angulatis. Fol. obtuse acumin. minus glabra. Fl. sessiles, carnei; bracteis minimis, lineatis. Cal. minimus. Cor. rubus longus, filiform. Limbi lab. super. lineare, angustum, brevius, reflexum. Lab.



infer. æquale, 3-fid. Stam. extra faucem prominentia.

27. *bivalvis*. J. fol. lanceol-ovat. pedunc. 6-fl. pedicellis lateralibus 2-fl. bract. ovatis, parallelis. *Syst. veg. ed. 14.*

Adel-odagam. *Rheed. Mal. 9. tab. 43. Sed differt fol. serratis, & fl. albo.*

*In Asia indica.*

Caul. brachiat. Fol. opposita, integerr. Pedunc. breves, involuc. 2-phyll. fetaceo; pedunculique 4. parvis, parallelis; mediis duobus 1-fl. lateralibus iterum diphyll. 2-fl. Cor. lab. super. lanceol., inferius ovatum.

28. *purpurea*. J. fol. lato-ovat. utrumque mucronatis, integerr. glabris: caule geniculato: spicis secundis. *Syst. veg. ed. 14.*

Folium tinctorum. *Rumph. amb. 6. tab. 22. f. 1. In China.*

Facies Galeopfidis Tetrahit. Caul. pedat. ramosiss. radicans, brachiatus. Fol. petiolata. G-niculi tumidi. Spicæ lateral-terminales. Bract. angustæ. Cor. purpur. lobiis erectis, altero linearari, angustiss., altero lato, trilobo. Stam. purpur.

29. *gangesica*. J. fol. ovatis: racemis simplicibus, longis: fl. alternis, secundis: bract. obsoletis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 4.*

Carua Caniram. *Rheed. Mal. 9. tab. 36.*

*In Asia indica.*

Caul. ad genicula pilosus. Fol. opposita, breviter petiol. integerr. Racemi ex alis super. erecti, solitar. Fl. remoti, erecti, subsessil. Bract. geminæ, minimæ. Cal. oblong. hispida. Cor. minuscula, alba.

30. *japonica*. J. fol. ovatis, serratis: spicis terminalibus: bracteis fetaceis: caule patulo. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. subdecumb. 4-gonus, pubescens, ramis oppositis. Fol. unguicul. p-lucar. opposita. petiolata, acuta, villosa, supra viridia, subtus pallida, inæqualia. Spicæ pollic. Bract. ciliatæ.

- madurensis*. J. fruticosa; fol. ovalibus obtusis, dentatis: fl. axillaribus solitariis. *Burm. In tab. 4. f. 3.*

*In Madura h.*

- Caul. teres, glaber, albicans. Fol. opposita, subpetiol. apice vel emarginata, vel acumin. Bract. 2. deciduæ. Fl. rariores. Caps. oblong. acutiusc. basi angustata.
- moretiana*. J. herbacea: fol. lanceol. integerr.: fl. axill. solitar. *Burm. Ind. Rumph. umb. 6. tab. 23.*  
*In India arenosis.*
- Caul. angulatus. Fol. remota, opposita, subpetiol. acuminata. Caps. ut in priore.
- nutans*. J. herbacea; fol. lanceolat. denticulat. pedunculis terminalibus cernuis: bract. setaceis. *Burm. Ind. tab. 5. f. 1.*  
*In India.*
- Caul. erect. teres, striatus. Ramis axillaribus, alternis. Fol. 2-pollic. opposita, petiolata, glabra. Pedunc. breviss. Bract. lanceol., singulo pedicello tres. Cor. lutea.
- coccinea*. J. fol. ovato-obl. acutis: fl. amplis, spicatis. *Aubl. Guian. tab. 3.*  
*In Caienna.*
- Caul. 5-6 ped. simplex, erectus. Fol. petiolis longis violac. innixa, integerr. glabra. Fl. verticillato-spicati, bracteati. Cor. tubuloso-ventricosa, utrimq. compressa, incurva, phœnicea; lab. super. longo, erecto, acuto, concavo; infer. 3-fid. lacin. reflexis, acutis, intermedia longiore.
- variegata*. J. fol. ovatis: fl. spicatis. *Aubl. Guian. tab. 4.*  
*In Guiana h.*
- Frutex 5-pedal. ramis longis, rectis, cylindraceis. Fol. subsessil. acuta, integerr. glabra. Fl. terminal. bracteati, verticillis 4-fl. floribus utrimq. binis, subsessilibus. Cor. tubuloso-ventricosa, incurva, alba: lab. super. erecto, 2-fido; infer. 3-fid. laciniis lateralibus cœrul. intermedia crocea, punctis violac. adspersa.
- triflora*. J. inermis; pedunc. axillaribus, folio longioribus, apice 3-4 fl. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia q.*
- Caul. cubital. annuus, diffuso-decumb. brachiat. articul. villosus. Articuli 3-pollic. 6-fulcati, sæpe basi incrassati, tenues. Fol. sesquipollic. ovato-lanceol. denticulata, pubes. en. petiolis connatis, canaliculat. ciliatis, villosis. Stipulæ nullæ. Pedunc. 2-pollic. erecti, solitar.,

utrimq. parvo foliolo petiolato præditi. Fl. albi. Cor. lobia erecta; super. integrum, infer. 3-dent. in fauce violaceo-punctatum. Bract. 2. erectæ, apice reflexæ, adpressæ, cal. exteriorum mentientes, longe lanceol. villosæ, exter. maiore.

*cærulea*. J. inermis; fol. ovato-oblong. ciliatis: fl. verticillatis, sessilibus. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Petoli semipollic. villosi. Fol. acuta, integerr. subpilosa. Fl. in summis alis utrimq. terni, cærulei: fol. mutatis in bract. parvas, lanceolat.

*fatida*. J. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Fol. 3-pollic. petiolo semipollic. opposita, ovato-obl. integerr. glabra. Stipulæ nullæ. *Var. fl. viridi, vel cærul.*

*Dum Vuccæ plantam edunt, lac inficitur odore Alliaceo.*

*viridis*. J. spinosa; fol. oblongis, integris: spinis terminalibus imbricatis: bracteis ovato-acutis; galea lineari, 2-dent. reflexa. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Fol. opposita. Spicæ digitum crassæ. Bract. latæ. Cor. tubus albidus, villosus, pollic. cylindric: superne angustior, curvatus: limbus viridis: lab. inferius latum, trilobum, patens, lobis ovato-acumin. medio latiore. Caps. spatulato-acuta, 2-locul. *Var. fl. cærul. & viridi-cærul.*

*trispinosa*. J. fol. lanceol-ovat. spicis terminalibus, imbricatis: lab. cor. super. brevi. *Forsk. Æg.*

*In Arabia h.*

Fruticulus. Fol. unguicul. opposita, petiolata, integra, ciliata, margine scabro. Spinæ axill. Bract. lato-ovatæ. Flos fulvo-flavus, bracteis duplo longior, resupinatus. Cor. lab. infer. 3-lobatum.

*bispinosa*. J. spinis axillaribus, 2-fid. cor. labiis æqualibus. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Differt a priore, ut ex definitione. Cor. alba, vel pallide cærul.

*appressa*.J. spinis axillaribus, compositis: fl. fulvo; lab. super. brevior. *Forsk. Æg.**In Arabia h.*

Priori similis. Frutex diffuso-cespitosus, vix ped. l. Spina 3-4-duplex, semper uno ramo erecto, &amp; cauli adpresso. Lab. super. staminibus brevius; inferius 4. lobis crenatis, obtusis, margine non imbricantibus, sed parallelo intervallo distantibus.

*lanceata*.J. fol. inermibus: spinis stipularibus: bracteisque foliaceis, margine spinosis. *Forsk. Æg.**In Arabia.*

Fl. subsolit. sessiles, erecti: bracteis latis, ovatis.

32. DIANTHERA. Cor. ringens. Caps. 2-locul. ungue elastico diffiliens. Stam. singulum antheris 2. alternis.

1. *americana*. D. spicis solitar. alternis. *Syst. veg. ed. 14.**Gratiolæ &c. Pluk. alm. tab. 423. f. 5.**In Virginia, Florida &c.*

Caul. simplex. Fol. linearia. Spicæ ovatæ, terminal. imbricatæ, bracteis lanceol. Pedunc. alterni, longitudine folior. Cor. flava, vel alba.

2. *comata*.D. spicis filiformibus, verticillatis; inferioribus umbellatis. *Syst. veg. ed. 14.**Antirrhinum &c. Sloan. Jam. 1. tab. 103. f. 2.**In Jamaica.*

Fol. lanceol.-ovata. Cor. dilute cœrul.

3. *malabarica*. D. fl. paniculat's; pedicellis 2-3. fid. fl. bicalyculatis: lacinia dorsali ma. *Syst. veg. ed. 14.**Lin. Suppl.*D. bicalyculata. *Retz. Ad. Holm. 1775. tab. 9.**Cara-carinam. Rheed. Mat. 9. tab. 56.**In Malabaræ graminosis h.*

Caul. fruticos. angulat. hirtus. Fol. opposita, petiolata, ovata, integerr. Panic. terminalis. Cor. purpur.

4. *pedoralis*. D. panic. dichotoma, terminali. *Syst. veg. ed. 14.**Jacq. Amer. tab. 3. ed. picta tab. 4.**In Domingo, & Martinica &c.*Planta 2-3. pedal. erecta, herbacea. Fl. numerosi, sessiles, rubelli, bract. setaceis. Cor. lab. super. integrum, concavum. *Tota planta odorem spirat sæni recentis.*5. *eustachiana*. D. fol. lanceol.-obl. pedunc. multifl. bracteis linearibus, apice latiusculis, acuminatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Am. tab. 4. ed. picta tab. 5.**In collibus apricis insulæ S. Eustachii h.*

Frutex 3-ped. erectus. Fol. 3-pollic. breviter petiol. integerr. glabra. Pedunc. racemosi, parum divisi, terminales multifi. axillares sub 3-fl. Bract. plerumq. ternæ. Fl. sesquipollic. inodori. Cor. purpur.

6. *martinicensis*. D. fol. ovat-acuminatis: pedunc. 3-fl. bracteis ovatis, cal. longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Am. pict. tab. 6. Hort. 1. tab. 22.*

*In Martinica ad sepes, & margines sylvarum.*

Planta 2-pedal. suberecta, ramosa, geniculata, ascendens. Caules obsolete 6-angular. glabri. Fol. opposita, in petiolum tenuem attenuata, integerr. glabra; infima 5-pollic. reliqua sensim min., summa vix semipollic. Pedunc. axill. breves, oppositi, 3-fidi. Bract. oppositæ, sessiles, acumin. concavæ, integerr. glabræ. Fl. fere sesquipollic. inodori. Cor. rubra.

7. *japonica*. D. pedunc. axillar. solitario, sub 4-fl. bracteis oblongis, ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Japon. tab. 4.*

*In Japonia ☉.*

Radix fibrosa. Caul. pedal. erect. herbaceus, 6-gonius, leviter villosus, parum ramosus, supra genu tumidus. Fol. semi-2. pollic. superior. sæpe ma. opposita, petiolata, ovato-obl. inferne attenuata, apice acumin. integerrima, villosa, patentia, inæqualia, petiol. unguicularibus. Pedunc. villosi. Bract. 2. oppositæ. Cor. purpur. bracteis paulo longior. *Dissert a J. sexangulari bracteis oblong. nec cuneatis. A. D. Chinensi, cui similis, fl. pedicellatis, non aggregatis, & ex una tantum ala &c.*

*hirsuta.*

D. (Justicia) fol. lanceol-acumin. fl. subspicatis: bracteis setac. caule hirsuto. *Jacq. Am. p. 4. In Martinica fruticetis h.*

Planta fruticosa, 4-ped. erecta, ramulis hirsutis. Fol. semiped. opposita, petiolata, supra glabra, subtus hirsuta. Racemi terminal. semiped. villosi, bracteati. Cor. candida; lab. super. semi 2-fidi. inferioris lacinia intermedia paulo lateralibus latiore; punctis rubris variegati.

*nitida.*

D. (Justicia) fol. lanceol-acumin. fl. subspicatis: bracteis setaceis: caule nitido. *Jacq. Am. In Martinica ad ripas torrentum h.*

Frutex totus nitidissimus, cæterum priori similis.  
Fol. crassiuscula.

*hyssopifolia*. D. fl. terminalibus, pedunculat. fol. lanceol. scabris. *Burm. Ind. tab. 5. f. 2.*

*In Java.*

Caul. herbaceus. Fol. petiolata. Pedunc. ex involuc. super. fol. pollic. 5. erecti, circa medium sæpius divisi. Bract. 2. lanceol. calycem obvolventes.

*trifulca*. D. *Forsk. Æg.*

*In Arabia h.*

*Planta speciosa, & charactere novi generis.* Frutex ramis brachiatis. Fol. conferta, opposita, breviter petiol. inferiora decidendo cicatricem relinquunt; ovata, obtusa, integra, glabra, margine utrimque incurva, venis simplicibus oppositis. Pedunc. ex axilla super. 2-fl. utrimq. bractea pro singulo fl. lanceol. flava. Periant. duplex; exterius 2-phyll. interius triplo longius, 1-phyll. 5-fid. lanceol. villosum, viride. Cor. decuplo longior cal. infra villosa, flavo-rubescens; labio super. multo latiore.

*odora*. D. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Frutex ramis confertis, articulatis. Fol. vix pollic: opposita, petiolata, ovato-obl. obtusa, integra, margine subciliato. Flos in ramulis ultimis axill. foliar. sessilis, flavus. Cor. extus villosa, lab. super. flavo-virescente, venis violac. inferius totum flavum. Caps. 4-gono-subulata.

*verticillata*. D. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Fol. lanceol. ovata, integra. Fl. capitato-verticillati, sessiles, violac. bracteis ciliatis, cal. ma.

*debilis*. D. fol. oblong. spicis axill. imbricat. : bracteis late ovatis, ciliatis, quaternis. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Caul. cubital. villosi, articulis basi ventricosi. Fol. opposita, petiolis sensim dilatatis in fol. pollicare, obtusum, integrum, subvillosum. Spicæ sesquipoll. 4-gonæ, bracteis imbricatis. Fl. bini, sessil. 1-lateral. Cor. rubus albus; lab. super. apice violac: infer. superne violac. venis obscurioribus. Caps. 1-sperma.

33. *GRATIOLA*. Cor. tubulosa, 2-lab. Galea emarginata: barba 3-fida. Stam. 2. sterilia. Caps. 2-loc. polysper. Cal. 7-phyll. 2. exterioribus patulis.

1. *officinalis*. G. fol. lanceol. superne ferratis: fl. pedunculatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 363. Ludw. ed. tab. 61. Sabb. hort. rom. 2. tab. 87. Black. tab. 411.*

*In Europæ locis humidis 24.*

Caul. pedal. ramos. Fol. sessil-semiamplex. Pedunc. axill. solitar. 1-fl. Bract. 2. lineares, cal. longiores. Cor. dilute purpurasc. vel alba.

2. *Mannieria*. G. fol. ovali-oblong. pedunc. 1-fl. caule repente. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. obs. 1. tab. 1. amstr. ed. 2. picta tab. 261. f. 64. Ehr. pict. 14. f. 2. Pluk. phyt. tab. 130. f. 1.*

*Anagallis &c. Sloan. Jam. 1. tab. 129. f. 1.*

*In Jamaica.*

Caul. 6-7. pollic. Fol. breviter petiol. obtusa, crassiuscula, plana, integerr. glabra. Pedunc. axillar. Cor. nivea, vel ex albo-cœrul. Stam. 4. antherifera. Stigma capitatum.

3. *rotundifolia*. G. fol. ovatis, trinerviis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tianga-puspam. Rheed. mal. 9. tab. 57.*

*In Malabaræ arenosis.*

Caul. digital. 4-goni, læves, basi repentes. Fol. sessil. obtusa, lævia, ferratura una, alterave obsoleta. Pedunc. axill. solit. alterni, nudi, 1-fl. fol. longiores. Cal. 5-part. Cor. cœrul. Caps. subrot. compressa.

4. *hyssopioides*. G. fol. lanceol.-subserrat. articulo caulino brevioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*G. indica &c. Pluk. Alm. tab. 193. f. 1.*

*In Tranquebariæ agris oryzaeis ☉.*

Caul. erect. pedal. filiform. lævis, articulis fol. pluries longioribus. Fol. sessil. ovar-lanceol. lævia; inferiora una, alterave ferratura. Pedunc. axill. solitar. alterni, 1-fl. fol. multoties longiores. Cal. minimus. Cor. ringens, fol. multo maior.

5. *virginica*. G. fol. lanceol. obtusis, subdentatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Gratiolæ &c. Pluk. Alm. tab. 193. f. 2.*

*Tsiera Maya nari. Rheed. Mal. 9. tab. 85.*

*In Virginia, Malabaræ.*

Caul. procumb. varians magnitudine. Fol. sessil. versus apicem serrata; *variant trifida*. Pedunc. axill. 1-fl. Cor. cœrul.

6. *peruviana*. G. fl. subsessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Fœwil. peruv. 3. tab. 47.*

*In Peru.*

Fol. *officinali* ma. 15. lineas longa, 6. lata, acumin. denticul. pulchre virentia. Cor. alba;

*Lobelioides*. G. caul. subnudo, stipulato: fol. lineari-oblong. integerr. panicul. dichotom. capsul. subglobosis. *Retz. Fasc. 4.*

*In Tranquebaria.*

Caul. erect. pedal. varius, supra medium divisus, articulis plerumq. 5. Fol. supra radicem 2m. l. 3m. parium, opposita, sessil. erecta, subsfriata, pollic. quandoq. basi, potissimum subtus, colorata. Stipul. 2. sessil. semiovat. integerr. parvæ. Panicula laxa, rara. Pedunc. remoti, subrubro-virides. Bract. parvæ, stipulis simil. Cor. tubo col. obscuriore striato: limbo cœruleo, albo-variegato.

*grandiflora*. G. caulibus decumbentibus: fol. ovatis, ferratis: peduncul. oppositis: capsulis subulatis. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In Tranquebaria &c.*

Caul. angulosi, bifidi, glabri. Fol. opposita, sæpe etiam crenata, glabra. Fl. ratione reliquarum partium magni.

*veronicifolia*. G. caul. repente: fol. ovato-lanceol. acute serratis: fl. terminalibus, oppositis. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*Crescit cum priore.*

Caul. radicanter. Fol. opposita, sessil. Fl. peduncul. bracteati, parvi, sature cœrulei. Caps. subulatae.

*oppositifolia*. G. caul. ascendente: fol. lanceolat. ferratis: peduncul. oppositifol. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In Tranquebaria.*

Caul. 4-gon. striati. Fol. nuda; inferiora opposita. Caps. subulata.

34. SCHWENKIA. Cor. subæqual. fauce plicata, glandulosa. Stam. 3. sterilia. Caps. 2-locul. polysperma.

1. *americana*. S. *Syst. veg. ed. 14. Schwenk. Hort. Med. Hag. 1776. tnb. 1.*

*In Barbeyce.*

Fol.



Fol. petiol., ovalia, integerr. *In ordine naturali Browallii proxima. Fol. etiam alterna.*

35. CALCEOLARIA. Cor. ringens, inflata. Caps. 2-locul. 4-valv. Cal. 4-part. æqualis.

1. *pinnata*. C. fol. pinnatis. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Stock. 1770. tab. 8. Fewil. 3. peruv. tab. 12. f. 7. In Peru locis humentibus* ☉.

Caul. erect. 2-ped. teres, brachiatus, fragilis, densissime pubesc. 16-20. articulatus. Basis caul. muricata tuberculis radicanibus. Rami axillares, oppositi, similiter brachiati. Fol. opposita, exstipulata, fragilia, mollia, patentia, internodiis longiora, supra pube setacea, pellucida, rorida, subtus nuda atomis subviscidis. Foliol. 7-11. subalterna, seu opposita, serrata, pinnatifida, (summa 2-pinn.) sessil. obtusiuscula, sinu latiore, purpurascente separata. Petioli teretes, supra plani, basi utrimq. coeuntes, magisve pubescent. Fl. e singulis apicibus & caul. gemini, pedicellati. Cor. flava. Lab. super. minimum, subglobosum, inflatum, antice emarginatum: infer. maximum, inflatum, subglobosum, margine antice coarctato, totaliter inflexum apice subemarginato. Caps. subrotunda, 2-locul. apice compresso, acuminato.

2. *integrifolia*. C. fol. ovatis, indivisis, serratis. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Stock. 1770. Fewil. peru. 3. tab. 7. Mutis amer. 1. tab. 2.*

*In Peru.*

Similis reliquis. Caul. pilosus. Fol. petiolata, inæqualiter serrata.

3. *perfoliata*. C. fol. perfoliat. spatulato-sagittatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Mutis Am. 1. tab. 3.* ☉

*In nova Granada.*

Hæc magnitudine reliquas superat; villosissima, cor. excepta. Caul. teres. Fol. opposita, petiolis attenuatis. Fl. reliquis ma.

36. PINGUICULA. Cal. 2-lab. 5-fid. Cor. tubuloso-ventricosa, patens: lab. super. 2-fid. infer. 3-fid. Stam. bifurca. Caps. 2-valv. 1-locul. polysperma.

1. *lusitanica*. P. nectario apice incrassato. *Syst. veg. ed. 14. In Lusitania &c. 24.*

Fol. margine reflexa, & veluti convoluta, sub-

- striata, subpellucida, venis rubentibus. Calcar prælongum. Fl. carnei, vulgari min.
2. *vulgaris*. P. nectario cylindræco, longitudine petali. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 93.*  
*In Europæ uliginosis ad radices alpium* 24.  
 Planta parva. Fol. 6-7. elliptica, crassa, compacta, nitida, e viridi lutea. Fl. magni, nuntantes. Cor. purpurea, violac. alba.
3. *alpina*. P. nectario conico, petalo brevior. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 453. Fl. Lapp. tab. 12. f. 3. Gunn. norv. tab. 4. f. 4.*  
*In alpihus Helveticis &c.* 24.  
 Similis priori, sed cor. alba, media barba 2. maculis luteis adpersa: calcaris finis flavus, aut ruber.
4. *villosa*. P. scapo subvillosa. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Lapp. tab. 12. f. 2.*  
*In Japonia, Sibiria, Pedemontio* 24.  
 Differt a *P. vulgari*, quod sextuplo omnibus partibus minor. Scapus setaceus, vix manifeste pubescens. Fol. rubro col. striata. Flos violac. vel carneus, calcaris exserto.
37. UTRICULARIA. Cal. 2 phyll. æqualis. Cor. ringens, calcarata. C. pf. 1-locul., 2-valv. polysperma.
1. *alpina*. U. nectar. subulato: fol. obovatis, integerr. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Am. tab. 6. ed. 2. picta tab. 8.*  
*In alpihus Martinicæ.*  
 Radix tuberculosa, Scap. semiped. erect. simpl. 1-2-fl. Fol. 2. opposita, basi in petiol. attenuata, sesquipollic. acuta, nitida, crassiusc. avenia, convexa, Flos magnus, elegans, albus: col. & nectar. tinctis levi flavedine.
2. *foliosa*. U. nectar. conico: fructibus cernuis: radicul. utriculo destitutis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Linaria &c. Plum. ic. 165. f. 2.*  
*In America Australi.*  
 Simil. *U. vulgari*, sed radix repens: fl. in scapo pl. 6-10. & nulli utriculi ad radículas. Planta poludosa. Radix repens. Scapi pauci, axillar. erecti. Fol. alterna, foliol. alternis, ramolis. Fl. alterni, sparsi, erecti, peduncul. flavi.
3. *vulgaris*. U. nectar. conico; scapo paucifloro. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 138.*  
*In Europæ fossis, paludibus &c.* 24.

Caul. longi, ramosi. Ad divisiones fol. vesiculæ  
fessiles, cavæ, purpur. Spica brevis. Fl. ma-  
gni. Pedunc. squamosi. Cal. lividus. Cor.  
flava. Nectar. labio infer. adproximatum.  
Faux clausa palato gibbo.

4. *minor*. U. nectar. carinato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 128.*

Lentibularia &c. *Petiv. herb. Brit. tab. 36. f. 12.*

Millefolium &c. *Pluk. alm. tab. 99. f. 6.*

Aparine &c. *Bocc. mus. 1. tab. 4.*

*In Europæ fessis rarius.*

Omnia fere prioris, sed fl. parvi, pallide flavi,  
sicuti tota planta. Nectar. obsoletum, deor-  
sum spectans. Faux hians, & pervia, absque  
gibbo palato.

5. *subulata*. U. nectar. subulato. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

Scap. 1-2. fl. Fol. capillacea. Cor. alba.

6. *gibba*. U. nectar. gibbofo. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

Scap. 1-2. fl.

7. *bifida*. U. scapo nudo, 2-fid. *Syst. veg. ed. 14. Osb. it. tab. 3. f. 2.*

*In China.*

Scap. digit-palm. filiform. teres, duplici racemo.  
Bract. minutæ, alternæ, ovatæ. Fl. parvi,  
lutei.

8. *sarulea*. U. scapo nudo: squamis alternis, vagis, subu-  
latis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Nelip. Rheed. mal. 9. tab. 70.*

Scap. semiped. erect. ramosus, Fl. terminal. pau-  
ci, subsessil. Cor. cœrulea.

9. *stellaris*. U. verticillo utriculario bractearum ciliari. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*U. inflexa. Forskal. Æg. monente Vahl.*

*In Indiæ aquosæ.*

Radices absque utriculis. Scap. digital. filiform.  
apice ramosus. Folliculi verticillati 4-6. sessil.  
ovati, ciliati, 2-locul. in medio scapi. Cor.  
destituta nectario: lab. infer. faccato.

38. **WULFENIA**. Cor. ringens, scalcarata, semihians, ad  
faucem barbata.

1. *carinthiaca*. W. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. aust. 2. tab. 8. f. 1.*

Caul. pl. remoti, flavo-fuscescent. Scap. 1-2.

- spithameus, teres, viridis, villosus, tandem nudus. Folior. loco squamulæ foliaceæ, remote sparsæ, sessil. lanceol. Fl. spica terminalis, 2-3 pollic. secunda, & veluti disticha. Fl. breviter pedunculati, bracteis ex virore fusciscentibus, sicuti cal. Petalum cœrul. barba lab. infer. densa, crispa, nivea. Fol. tandem radicalia multa, magna, crassa, oblong-oval, obtusa, crenata, in petiolum decurrentia, satore virid. glaberrima, nitida, supra veluti canaliculata, & rubra.
39. **VERBENA**. Cor. infundibul. subæqual. curva. Cal. unico dente truncato. Stam. 2-4. Sem. 2-4. nuda.
1. *erubica*. V. diandra; spicis longissimis, foliolis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 228. f. 4. & 327. f. 7. Sherardia & c. Ehret pîd. tab. 5. f. 1. In Oruba insula Amer. septentrionalis.*  
Caul. 3-pedal. lignosus. Fol. ovata, acuta, serrata, sensim in petiolum definentia. Spica sesquiped. foliis integris. Cor. 2-lida, violac. cum macula nigra.
2. *indica*. V. diandra; spicis longiss. carnosis, nudis: fol. lanceol-ovai. oblique dentatis: caul. lævi. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. obs. 4. tab. 86. In Zetlona ☉.*  
*Differet a seq. caulibus, ramisque glabris: fol. angustioribus, vere lanceol. utrimq. attenuatis. Spica eadem, sed cor. purpur. Caul. viridis. Fol. undulata, minime ciliata.*
3. *jamaicensis*. V. diandra; spicis longiss. carnosis, nudis: fol. spathu-ovatis, serratis; caule hirtio. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. obs. 4. tab. 85. Sloan. Jam. tab. 107. f. 1. In Jamaica, & Caribæis.*  
Caul. 3-4. ped. diffusus, valde ramosus, purpur. Fol. sensim in petiol. attenuata, glabra, basi ciliata. Rami 2. oppositi ex ultimis alis. Spica terminal. pedal., stricta, virens. Cor. pallide cœrul.
4. *prismatica*. V. diandra; spicis laxis: calycibus alternis, prismaticis, truncatis, aristat.: fol. ovai. obius. *Syst. veg. ed. 14. Sloan. Jam. 1. tab. 107. f. 2. Pluk. Alm. tab. 70. f. 1. In Jamaica.*  
Planta parva.

5. *mexicana* . V. diandra ; spicis laxis ; calycibus fructus reflexis , rotuncato-didymis , hispidis . *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 302. f. 309.*  
*In Mexico 24.*  
 Caul. sesquicubit. margine scabro . Rami oppositi , superne dichotomi . Fol. opposita , breviter petiol. cordata , oblonga , scabra , venis multis obliquis exarata , subtus pallidiora . Racemi dichotomiae longi . Cor. dilute purpur.
6. *lappulnea* . V. tetrandr. ; calycibus fructigeris subrot-inflatis : seminibus echinatis . *Syst. veg. ed. 14. Jacq. obs. 1. tab. 24. Amer. pict. tab. 9.*  
*Scorodoniae &c. Sloan. Jam. 1. tab. 110. f. 1.*  
*In Jamaica ☉.*  
 Caul. 1-3. ped. herbac. erect. ramis oppositis . Fol. opposita , breviter petiol. ovata , serrato-crenata , scabriusc. venosa . Spicae spitham-pedil. Fl. alterni subsessil. Cor. pallide purpur. Sem. 2-locul.
7. *eurosavita* . V. diandra ; spicis longis : calycibus aristatis : fol. ovatis , serratis . *Syst. veg. ed. 14.*  
*Tamonea spicata. Aubl. Guian. tab. 268.*  
*In Curassao.*
8. *stæchadifolia* . V. diandra ; spicis ovato-obl. obtus. : fol. lanceol. serrato-plicatis : caul. fruticoso . *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lavandula Plum. ic. 162. f. 1.*  
*V. suffruticosa. Aubl. Guian. Brow. tab. 3. f. 1.*  
*Burm. Amer. tab. 162. f. 2.*  
*In Amer. Gallia æquina.*  
 Rami nodosi . Fol. subpetiolata . Pedunc. axill. oppositi , longiss. Cal. patens .
9. *Aubletia* . V. tetrandra ; spicis solitar. cor. fasciculatis : fol. subcord. inciso-serratis . *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 176.*  
*Buchnera canadensis. Syst. veg. ed. 13.*  
*Erinus Peruvian. an hujus var. ?*  
*In America ☉.*  
 Caul. ped. brachiat. erectus ; dichotom. 4-gonus , subhispid. Fol. opposita , petiolata , sublobata , rugosa , scabriusc. st; ul. nūllæ . Spica terminal. solitar. Fl. peduncul. Cor. sanguinea .
10. *nodiflora* . V. tetrandra ; spicis spirato-conicis : fol. (ovatis) serratis , caul. repente . *Syst. veg. ed. 14.*  
*V. capitata. Forsk. Ægyp. huc pertinet , montente*

*Vahl. Barr. ic. 855. Pluk. phyt. tab. 232. f. 4.  
Burm. Ind. tab. 6. f. 2. similima erecta, minus glabra, fol. lanceolat.*

*In Virginia, & Sicilia.*

Planta albida. Fol. ovata, vel cuneiform. crassa, aspera. Pedunc. axill. foliis longiores. Cor. cœrul.

11. *bonariensis*. V. tetrandra; spicis fasciculat.: fol. amplexicaul. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 300. f. 387.*

*In agro Bonariensi 24.*

Altitudo hñs. Caul. hirsutus, bicanalicul. Fol. longa, rugosa, aspera, venis obliquis. Spicæ per maturitatem crassiores. Cor. purpur.

12. *hastata*. V. tetrandra; spicis longis, acuminatis: fol. hastatis. *Syst. veg. ed. 14. Herm. par. tab. 242.*

*In Canadæ humidis 24.*

Priore humilior. Caul. 6-ped. Fol. Urticæfor. spithemam longa, palmum lata, integra, vel laciniata. Spicæ digitum longæ, filiform. Cor. pusilla, purpuro-cœrul. *Var. fol. lanceol.*

13. *caroliniana*. V. tetrandra; spicis filiformibus: fol. indivisis, lanceol. obtusiusc. ferratis, subsessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 301. f. 388.*

*In Amer. septentrion. 24.*

Caul. sesqui-2. ped. ramosi, hirsuti. Fol. Melissæ simil. aspera. Fl. parvi, pallide purpur.

14. *urticaefolia*. V. tetrandra; spicis filiform. paniculatis: fol. indivisis, ovatis, acutis, ferratis, petiolat. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. rom. 3. tab. 55. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 25. f. 3.*

*In Virginia, & Canada 24.*

Caul. 3-ped. & ultra, ex albo-purpur. Fol. breviter petiol., duplicato-ferrata, hirsuta, nervosa, scabra, sature viridia.

15. *spuria*. V. tetrandra; spicis filiformibus: fol. multifido-lacin.: caulibus numerosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Canada, Virginia.*

*Differt a V. officin. quod. duplo maior sit.*

16. *officinalis*. V. tetrandra; spicis filiform. paniculatis: fol. multifido-laciniat. caul. solitar. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. T. 628. Ludw. ed. T. 149. Sabb. H. rom. T. 56. Black. tab. 41.*

*In Europæ ruderatis ☉.*

Caul. plerumq. pl. 1-2. ped. ramosi, purpur.

Fol. sessil. oblong. ad basin angustiora, rugosa. Fl. axill-terminal. Cor. ex albo-cœrul. vel albo-rufesc. *Var. fol. 3-part. dentat. quandoq. vix dissectis: & summis lanceol-obl. integerr.*

17. *supina*. *V. tetrandra*; spicis filiform. solitar. fol. 2-pin-natifid. *Syst. veg. ed. 14.*

*V. procumbens. Forsh. Æg. huc pertinet monente Vahl.*

*In Hispania.*

Caul. supinus, teretiuseul. subcompressus, sub-pubesc. Cor. cœrul.

- triphylla*. *V. tetrandra*; fl. paniculatis: fol. (plerumq.) ternis: caul. fruticoso. *Herit. stirp. nov. fasc. 2. tab. 11.*

*Aloysia Citridora. Ortega, & Palau. Diss. mss.*

*In Chile, Bonaria, Montivideo &c.*

*Diagnosis.*

Caul. fruticosus. Fol. verticillata. Fl. paniculati. Stam. 4. Sem. 2. Otor. Citri.

Susfrutex totus odore Citri. Caul. erectus, orgyal. ramolior, odoratus, subrimosus. Rami verticillati, terni-quaterni, patentiss. scabri. Ramuli hexagoni. Fol. verticillata, breviter petiolat. lineari-lanceol. utrimque acuta, patentia, supra, & margine vix manifeste muricata, reclinata, scabra, nervosa, late viridia, odoratissima, 2-3. pollic. longa, 6-8. lineas lata: iuniora lanceol. laxè dentata, seu serrata. Panicula villosa, bracteata, inferne spicis nonnullis immixtis, 3. pollic. longa, 2½ pollic. lata. Spicæ ternatim verticillatæ, patentès, imis axillaribus, summis nonnumquam verticaliter duplicibus. Fl. erecti, sessil., ex violacæ-albidi, odorati, 2. lineas longi, 1½ lin. lati. Filam. 4. brevissima, quorum 2 super. breviora. Sem. 2.

- globiflora*. *V. tetrandra*; fl. capitatis: caul. fruticoso. *Herit. Stirp. fasc. 2. tab. 12.*

*Nepeta &c. Sloan. Jam. Hist. 1. tab. 108. f. 2.*

*In America calidiorè &c.*

*Differt a V. stœchadisfol. fol. lanceol. planis, nec linearibus plicatis: a V. triphylla fl. capitatis, nec paniculatis: fol. opposit. nec verticillat. a V. nodiflora caul. fruticoso.*

Frutex humilis, odore gravi, ingrato. Caul. altitudine humana, erectus, cinereus, ramis ramulosis. Fol. opposita, raro terna, breviter petiol. lanceol. utrimq. acuta, patentia, crenata, ima basi integra, in petiolum attenuata, nervis alternis, erectis, venosissima, rugosa, villosa, scabra, reclinata, persistens, fragrantia, 1.  $\frac{1}{2}$  pollic. longa, 8. lin. lata. Capitula axillar. pedunculata, subrotunda, imbricata, bracteata, 3. lin. lata. Fl. albi, 1.  $\frac{1}{2}$  lin. longi. Bract. ovatae, acutae, hirsutae, calyc. longiores. Stam. brevissima, quorum 2. altiora. Sem. 2.

40. LYCOPUS. Cor. 4-fid. lacinia unica emargin. Stam. distantia. Sem. 4 retusa.

1. *europæus*. L. fol. sinuato-ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. h. rom. 3. tab. 33.*

Marrubium &c. *Riv. tab. 21.*

In *Europæ ripis humentibus*  $\mathcal{U}$ .

Planta modo glabra; modo villosa. Caul. 2-ped. Fol. varia: 1.<sup>o</sup> ovato-lanc. acute, & magnis dentibus incisa. 2.<sup>o</sup> petiolata, tribus paribus pinnarum augetur, 3.<sup>o</sup> integre pinnata. Verticil. fl. densissimi. Cor. parva, alba. *Var. caul., 4-ped. fl. omnibus femin.*

2. *virginicus*. L. fol. æqualiter ferratis. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Virginia*  $\mathcal{U}$ .

Fol. lanceol. tenuissime ferrata.

3. *exaltatus*. L. fol. basi pinnati fid-ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

L. fol. in profundas lacin. divis. *Tourn. inst.*

In *Italia*  $\mathcal{U}$ .

Altitudo hñā, qua nota a L. europeo differt. Caul. ramosus, angulat. scaber. Cor. alba, segment. rubro-punctatis.

41. AMETHYSTEA. Cor. 5-fid. lacinia infima patentiore. Stam. adproximata. Cal. supcampanul. Sem. 4-gibba.

1. *cærulea*. A. *Syst. veg. ed. 4. Comm. Goutin. 1751. tab. 10. Ad. Ups. 1742. f. 1.*

In *Sibiria montosis*  $\odot$ .

Planta fragrans. Caul. erect. ped. totus ramosus, fem. maturo, cærulesc. Fol. infer. petiol. super. sessil. parva, digitata, 3-fid. ferrata. Flores. veluti umbellati, comosi, e cærul-janthini.



42. CUNILA. Cor. ringens: lab. super. erect. plano. Filam. caltrata 2. Sem. 4.
1. *mariana*. C. fol. ovatis, ferratis: corymb. terminalibus, dichotomis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Calamintha* &c. *Pluk mant. tab. 344. f. 1. phyt. tab. 163. f. 4. Moris 3. f. 11. tab. 19. f. 7.*  
*In Virginia.*
- Odor, & fapor aromaticus. Caul. erect. ped. lignosi, ramis oppositis. Fl. superne plurimi, parvi.
2. *pulegioides*. C. fol. lanceol-ovat. bidentat: fl. verticillatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia, & Canada* ☉.  
 Planta spitham. brachata. Fol. scabriusc. super. angustiora. Verticilli per totam longitudinem caulis. Bract. utrimq. 2. fl. maiores, præter alias min. Cor. albi, fauce violac.
3. *thymoides*. C. fol. ovalibus, integerr. fl. verticillatis: caul. 4-gono. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Acinos* &c. *Moris 3. f. 11. tab. 19. f. 6.*  
*Monspeltii* ☉.  
 Habitus prioris. Caul. erectus, spitham. ramis paucis, brevibus, simplicibus. Fol. obtusa, glabra, subtus striata. Verticil. ut in priore.
4. *capitata*. C. fol. ovatis, fl: terminalibus; umbella subrotunda. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In Sibiria.*  
 Caul. palm. Fol. oblongiuscula, nuda. Cor. purpur. anth. nigræ.
43. ZIZIPHORA. Cor. ringens; lab. super. reflexo, integro. Cal. filiform. Sem. 4.
1. *capitata*. Z. fasciculis terminalibus: fol. ovalibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Clinopodium* &c. *Pluk alm. tab. 164. f. 4.*  
*Thymus* &c. *Buxb. cent. 3. tab. 51. f. 1.*  
*In Syria, Armenia, Sibiria* ☉.  
 Caulic. palm. brachiati. Fol. Acini, sed ma. Fl. terminal. fasciculati. Cor. absque macula palati, quæ in Z. tenuiore.
2. *hispanica*. Z. fol. ovatis, fl. racemoso-spicatis; bracteis obovat. acut. nervosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Hispania* ☉.  
 Caul. brachiati. Fol. petiolata, vix crenata. Fl. terni intra singulam bracteam. Cor. parva.
3. *tenuior*. Z. fol. lanceol. fl. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Acinos &c. *Morif.* 3. f. 11. tab. 19. f. 3. 4.  
In Syria ☉.

*Var. Z. capitatae*. Caul. semiped. pubesc. Fol.  
sæpe integerr. Fl. 3-4. Cor. dilute violac.

4. *acinoides*. Z. fol. ovat. fl. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
In Sibiria ☉.

Habitus Thymi Acinos, sed omnia 5-tuplo ma.  
Fol. Z. capitatae: fl. laterales ut in Z. te-  
nuiore, sed copiosiores. Planta incana. Caul.  
1-fesquiped. crebro-genicul. Fol. semuncem  
raro longiora, sæpe breviora, breviter petiol.  
lævia, rigidiusc. nervosa. Fl. in capitula laxa  
dispositi, suave rubentes.

44. MONARDA. Cor. inæqualis; Lab. super. lineari, fila-  
menta involvente. Sem. 4.

1. *fistulosa*. M. capitul. terminalibus, caule obrufangolo. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 122. f. 2.*

*Origanum* &c. *Corn. Canad. tab. 14.*

b. M. mollis.

In Canada 24.

Tota planta subincana lanugine pubescit. Caul.  
cubital. ramosi, geniculati, subhirsuti. Fol.  
opposita, 2-3. unc. longa, unc. lata, breviter  
petiol. acuta, pauci-crenata, subhirsuta, di-  
lute virid. Fl. longi, dilute purpurasc. *Var.*  
*fol. integerr.*

2. *didyma*. M. fl. capitatis, subdidynamis: caul. acutangu-  
lo. *Syst. veg. ed. 14. Trew. Ehret. tab. 36.*

In Pennsylvania, Noveboraco 24.

Caul. 4-gon. concavus. Fol. opposita; petiola-  
ta, ovat-acumin. serrata, satore virid. summa  
canescentia. Verticilli densissi. Invol. multiplex.  
Cor. coccinea.

3. *clinopodia*. M. fl. capitatis: fol. levissi. ferratis. *Syst. veg.*  
*ed. 14.*

In Virginia 24.

Facies prioris quoad staturam, at fol. Clinopodii  
incani: spicæ purpur. nec fl. tetrandri & fol.  
glaberr. Radix repens. Caul. 4-gon. magis  
aquam in prima minus argute quam in secunda.  
Capitulum bracteis radiatum. Cor. pallida.

4. *punctata*. M. fl. verticillatis: cor. punctatis: bracteis colora-  
tis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. h. rom. 3. tab. 86. 87.*

*Clinopodium* &c. *Morif.* 3. f. 1. tab. 8. f. 8.  
*mala Pluk. Alm. tab. 24. f. 1.*

In Virginia 24.

Caul. pedal. ignos. Fol. opposita, petiol. 2. unc. longa, femunc. lata, angusta, mucronata. Bract. subviol. 4. ma. 4. min. præter fol. verticill. Cor. lutea, punctis purpur.

3. *ciliata*. M. fl. verticillatis: corollis involucre longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Clinopodium* &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 8. f. 6. Pluk. Alm. tab. 164. f. 3.*

*In Virginia.*

Caul. pedal. & ultra, hirtus, stolonibus procumbentibus. Fol. unci l. opposita, petiolata, inferiora subrotund.: super. sessil. longa, & angusta. Verticill. ampli. Fl. ampli, cœul. lab. super. maculis atro-purpur.

45. **ROSMARINUS**. Anth. staminum arctissime conjunctæ, adeo ut unicam antheram componere videantur filam. liberis. Cor. ringens. Lab. superius longum, reflexum, emarginatum; inferius 3-fid. laciniis lateralibus acutis, media maxima oblonga. Galea a lab. inferiore recta divergit.

1. *officinalis*. R. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 159. Riv. tab. 39. Scbb. h. rom. 3. tab. 67. Ludw. ed. tab. 196.*

b. R. angustifol.

*In Europæ collibus h.*

Prutex 10-pedal. cultus ramosiss. Fol. sessil. linear. supra hilari-virent. subtus albescent. margine revoluti. Fl. axill. Cal. subtoмент. Cor. subcœrul.

46. **SALVIA**. Cor. ringens. Stam. bifurcata, pedicello nimirum, sive filamento cor. inserto transverse imponitur filamentum antheriferum.

1. *egyptiaca*. S. fol. lanceol. denticulat. fl. peduncularis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. h. 2. tab. 108.*

*In Ægypto h.*

Caul. pedal. strictus, brachiatus. Fol. sessil. nuda, scabra, subtus rugosiss. odora, parum aromatica. Rami elongati. Spicæ quasi spinosæ, verticillis raris. Bract. parvæ. Fl. bini-terni, pedicellati, minutiss. albi: lab. super. breviss. emarginato, non compresso; infer. 3-fid. intermedia violacea, punctata. *Fl. sæpe tetrandri.*

2. *cretica*. S. fol. lanceolatis: calycibus 2-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 57. f. 1. sine flore.*

*In Cretensi insula.*

Caul. toment. basi lignos. Petioli filifer. Fol.

- opposita, obtusa, crenulata, rugosa, toment.  
Fol. floralia sessil. ovata, integerr. concava,  
subtus tomentosa.
3. *lyrata*. S. fol. radicalibus lyratis, dentat. cor. galea brevissima. *Syst. veg. ed. 14.*  
Horminum &c. *Morif. Hist. 3. f. 11. tab. 13. f. 27.*  
b. Horminum *Virginicum*. *Sp. plant. In Europæ hortis fl. clandestinis.*  
Melissa &c. *Dill. elth. tab. 175. f. 216.*  
*In Virginia, Carolina.*
4. *officinalis*. S. fol. lanceol-ovat. integris, crenulatis: fl. spicat. cal. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 10. Kniphof. orig. cent. XI. tab. 89.*  
b. S. minor aurita, & non aurita. *Black. tab. 71. Kniphof. orig. cent. 2. tab. 79.*  
*In Europæ australis collibus incultis 24.*  
Planta aromatica. Caul. frutescens. Fol. rugosa, subalbida. Fl. laxè spicati. Cal. ruber. Cor. cœrul. aut cœrul-purpureasc.
5. *pomifera*. S. fol. lanceol-ovat. integris, crenulatis: fl. spicat. cal. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Tourn. it. 1. tab. 92.*  
S. nivea *Allion. auct.*  
*In Creta.*  
Caul. frutesc. Petioli longiss. Fol. longa, brumali præsertim tempore incana, & crispa. Cor. cœrul.
6. *urticifolia*. S. fol. ovat-oblong. duplicato-ferratis; cal. trident. lacinia summa trident. *Syst. veg. ed. 14.*  
Horminum &c. *Pluk. alm. tab. 420. f. 1. Morif. hist. 3. f. 11. tab. 13. f. 31.*  
*In Virginia, Florida h.*  
Planta valde hirsuta. Fol. Urticæ, aut Scrophulariæ æmula. Cor. parva, purpur. lab. super. brevi. Pistil. lab. superiore longius. *Var. cal. labio super. integro.*
7. *scrotina*. S. fol. cordat. ferratis, mollibus: fl. racemoso-spicatis: cor. vix cal. excedentibus. *Syst. veg. ed. 14. Arduin. Sp. 1. tab. 1.*  
*In Chio? ♂. h.*  
Caul. suffruticos. sesquiped. brachiat. 4-gon. vix tomentos. ramis inferior. caulescentibus. Fol. undulata, tenuissime ferrata, vix toment. subtus pallidiora. Spicæ vix peduncul. Cor. cœrul. Odor Nepetæ ingratus, validus.

8. *viridis*. S. fol. obl-obtus. crenatis: cor. galea semiorbiculata: cal. fructiferis reflexis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ic. pl. rar.*  
*Habitat . . . .* ☉.  
 Caul. herbac. subpilosi. Fol. infer. longe petiol. super. sessil. floralia cordata, integerr. Fl. verticilli utrimq. subterni. Cor. viridis. *Convenit cum S. Hormino, habitu, fol. modo florendi, odore &c. In hac flos brevior est, galea recta: styli non porrecti &c.*
9. *viscosa*. S. fol. oblong. obtus. suberosis, crenatis, viscidis: fl. verticillatis: bract. cordat. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ic. rar. tab 14.*  
*Habitat . . . .*  
 Caul. pl. erecti, sesquiped. herbacei, parum ramosi, ut rota planta odori, & obtiti villis capitato-glandulosis, & viscidis. Fol. petiolata, basi cordata, obsolete crenulata, rugosa, venosa. Verticil. distantes, breviter peduncul. 6-fl. Galea purpuro-sanguin. extus villosa-viscida: lab. infer. col. dilutiore, lacin. lateralibus oblong.
10. *Horminum*. S. fol. obtus. crenatis: bract. summis sterilib. majoribus coloratis. *Syst. veg. ed. 14. Gesn. fasc. 17. tab. 11. f. 21.*  
*In Græcia, Apulia, Pedemontio, secus arva* ☉.  
 Caul. articul. ramosus, villosus, subrubus. Fol. infer. petiol. super. sessil. Fl. terminal. verticillati. Bract. purpuro-violac. rubræ, aut virid.
11. *sylvestris*. S. fol. cordato-lanceol. undulat. biserratis, (interdum) maculatis: bract. ovatis coloratis, (3-fl.) flore brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 212.*  
*In Germania, Pedemontio, collium sylvis* 24.  
 Caul. cubital. subvillosi. Fol. subtus villosa, ex incano-fordide virent. Fl. longe spicati. Cal. quandoq. purpur. Cor. cyanea, purpur. vel alba, galea compressa.
12. *nemorosa*. S. fol. cordato-lanceol. serratis, planis: bract. colorat. cor. lab. infimo reflexo. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Austria, Tartaria* ♂.  
 Caul. palm-cubital. pubesc. sæpe fusce punctiti. Fol. radical. cordata; caulina ovato-lanceol.

æqualiter ferrata, supra nuda, sordide virid. subtus subtomentosa, glauca. Spicæ ante efflorescentiam exacte 4-gonæ, bract. coloratis fl. brevioribus. Galea albido-cærul. barba saturationis, lacin. media arcte sub cal. reflexa.

13. *syriaca*. S. fol. dentatis; inferioribus repandis: bracteis breviter cordat. acutis: cal. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Horminum &c. *Bauh. prod. tab. 114.*

*In Oriente, Palæstina.*

Planta 2-triennis, suaveolens. Statura *S. pratensis*. Caul. obtuse angulati, pilosi. Fol. radical. elliptica, petiol. super. ovata, sessil. rugosiss. subtoment. Panicula brachiata, virgata. Bract. cal. breviores, cordatæ. Fl. in quolibet verticil. 6. Cal. tomentosus. Cor. parva, alba. Styl. galea duplo longior.

14. *harmatodes*. S. fol. cordato-ovat. rugosis, tomentos. calycibus hispids: radice tuberosa. *Syst. veg. ed. 14. Triumph. obs. tab. 69. Barr. rar. tab. 185.*

*In Italia, Istria &c.*

Planta tota hispida. Caul. erect. viscidus. Fol. repanda, supra lævia, maculis ferrugin. summa parva, sessil. Verticilli multi, aridis bract. instructi. Pedunc. inæqual. Cor. cærul. S. Styl. lab. super. falcato; infer. 3-fid. media latissima, emarginata, falcata, reflexa: styl. galea longior. Anih. nigræ.

15. *austriaca*. S. fol. cordat-ovat. crenat. incis, vel lobatis, supra nudis: caul. calyc. bracteisque hirsutissim. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 112.*

*In collibus herbidis.*

Caul. 1-raro 2-ped. simpl. vel superne ramos. villos. Fol. radical. in orbem posita, lata, obrussil. pinnatifide incisa, inæqualiter ferrata, magis, minusve cordata, rugosa, supra atrovirent. glaberrima, subtus pallida, petiolat. caulina sessil. minora, acuta. Bract. cordatæ, integræ. Fl. terni, breviter peduncul. Cal. glutinosus. Cor. albida, vel pallide ochroleuca.

16. *pratensis*. S. fol. (inferior.) ovat-obl. (caulinis cordato-sagittatis) crenatis; summis, amplexicaulibus: verticillis subnudis: cor. galea glutinosis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 258.*

*In Europæ pratis &c.*

Caul. cubital. inferne pilosi. Fol. infer. longe petiol. quandoq. sinuata, squallida. Verticilli ad 6-fl. distiti. Cal. coloratus. Cor. purpur. cœrul. rubra, alba. *Var. fol. profundius incis.*

17. *indica*. S. fol. cordatis, lateralibus lobatis: summis sessilibus: verticillis subnud. remotissim. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. H. 1. tab. 78.*

Horminum &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 13. f. 16. In India 24.*

Caul. 3-ped. herbac. 4-gon. obtusus, albo-pilos. uti petioli. Fol. rugosa, nudiusc. subtus pilosa, suberosa, petiolata: floralia parva, acuta, integra. Cor. magna, cœrul. lab. super. compresso, emargin. inferiore 3-fid. intermedia magna, faccata, biloba, fundo albido, lobis maculis violac. margine albo, mox luteo.

18. *dominica*. S. fol. cordat. obtusis, crenat. subtoment. cor. calyce angustioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Domingo.*

19. *Verbenaca*. S. fol. sinuatis, ferratis, læviusc. cor. calyce angustioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Horminum &c. *Barr. ic. 208. Triumph. obs. tab. 66. In Europæ, & Orientis pascuis 24.*

Caul. frutic. ramis oppositis. Fol. radical. humifusa, Verbenæ form. sed apice rotundiore, petiolata. Fl. spicat-verticillati. Cor. purpur.

20. *nilotica*. S. fol. sinuat. angulatis, crenato-dent. calycin. dentibus spinosis; angulis, margineq. faucis ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. gott. 1778. tab. 2. Jacq. H. 5. tab. 92.*

Odor, & sapor paucus, nec gratus. Caul. 2-pedal. erecti, vel adscendent. ramosi, hirsuti, subviscosi. Fol. opposita, subviscosa, utrimq. villosa, rugosa, venosa, mollia; infima obl. obrusa, longiuscule petiolata; subsequa ovata; summa sessil. cordata, acuta. Fl. in caule elongato, & ramis: verticilli distantes, 6-fl. bractæ parvæ, cordatæ, acuminatæ. Pedunc. semper horizontal. Cor. exigua, purpureo-cœrul.

21. *nubia*. S. fol. lanceol-ovat. duplicato-crenat. tubo cor. incurvato. *Syst. veg. ed. 14. Comm. gott. 1778. tab. 3.*

*In Nubia, & Abissinia.*

Habitus tomentosus. Caul. erectus, sesquiped. ramosus. Rami decussatim oppositi, præter in-

finum. Fol. cordata, rugosiss. radicalia multa, petiolata, sesquipalm. obtrusa; caulina sessil. latiora. Spica decomposita: spiculæ ovatæ, verticilli 6-fl. Bract. latæ, cordatæ. Cal. cœrul-virid. Cor. calyce longior, tubo albo, limbo pallide cœrul.

22. *elandestina*. S. fol. pinnatifid. serrat. rugosissimis: spica truncata: cor. calyce angustioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Horminum &c. *Barr. rar. tab. 220.*

*In Italia* ♂.

Herba *S. Verbenacæ*: fol. *S. ceratophylla*, *pumila*; unde potius var. *S. Verbenacæ*.

Caul. adscend. spitham. 4-goni, obtusi, villosi; ramis superne sæpe 2. Fol. petiolat. oblong. obtusa, crenata; in caule 2-3. paria. Verticil. remoti. Bract. cordatæ, 3-fl. Cal. pilis glutinosis. Cor. violac. labii infer. lobo medio albo.

23. *pyrenaica*. S. fol. obtus. eros: staminibus cor. duplo longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Horminum &c. *Herm. par. tab. 187.*

24. *disfermas*. S. fol. (plerumq. ovato-lanceol.) eros: staminibus cor. æquantibus. *Syst. veg. ed. 14. Arduin. Spec. 1. tab. 1.*

Horminum &c. *Barr. ic. 187. bona.*

*In Syria* ♀.

Planta tota pubesc. villis apice glutinos. Caul. 2-3. ped. erecti, frutic. ramosi. Fol. rugosa. Bract. cordatæ, acutiusc. villosæ. Cor. alba, lab. super. erecto; infer. concavo, lacin. lateralibus porrectis. Anth. exertæ. Styl. albus. *Fol. in caldario cordata.*

25. *mexicana*. S. fol. ovat. utrimq. acuminat. serratis. *Syst. veg. ed. 14.*

Sclarea &c. *Dill. elth. tab. 254. f. 330.*

*In Mexici humentibus* h.

26. *hispanica*. S. fol. ovat. petiolatis, utrimq. mucronatis: spicis imbricat. calycibus 3-fid. *Syst. veg. ed. 14. Kniph. orig. tab. 2. Sabb. hort. rom. tab. 22. Arduin. Sp. tab. 2.*

Sclarea &c. *Tabera. Hist. ic. 374.*

*In Italia, Hispania* ☉.

Caul. sesquiped. 4-gon. obtusus, 4-fulcat. superne pilis reflexis, albis obsitus. Fol. acuta, serrata, rugosa, basi acuta. Spica 4-gona. Bract. ovatæ,



ovatae, ciliatae. Cor. caerulea, galea brevior subvillosa; lab. infer. basi maculis 2. pallidis.

17. *verticillata*. S. fol. cordat. crenato-dent. verticillis subnud. stylo cor. labio infer. incumbente. *Syst. veg. ed. 14. Kniph. orig. VI. tab. 79.*

*In ruderatis* 24.

Caul. pilosus, superne purpureo-violaceus. Fol. pilosa, rugosa, scabra. Pedunc. purpureus. Cor. violaceo-purpureus, fauce patula; galea ovali, 2-fida, clausa, basi coarctata.

28. *napiifolia*. S. fol. cordat. crenato-dent. verticillis subnud. cor. labio super. cordato-emarginato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Hort. 2. tab. 152.*

*In Caldario.*

Habitus, & fol. *S. verticillatae*: cor. vero satius purpureus, labio super. cordato, emargin. obtuso, patente; inferioris laciniae laterales subovatae. Fol. radical. terrae incumbens.

29. *virgata*. S. fol. cordat. crenatis, erosis, rugosis: verticillis in ramis virgatis longiss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 37.*

Caul. erect. 4-ped. hirsutus: rami longi, ad angulum acutum ascendentes. Fol. radical. obl. obtusa, petiolata, sinuato-undulata: caulina infer. petiol. superiora sessil. crenato-dent. vix hirsuta. Bract. cordat. acut. integrae. Fl. terni, breviter peduncul. Cor. nivea; pallide rosea; caeruleisc.

30. *glutinosa*. S. fol. cordato-sagittat. acutis, serratis. *Syst. veg. ed. 14. Kniph. orig. IV. tab. 70. Subb. hort. rom. tab. 21.*

*In Europae umbrosis* 24.

Planta viscida odore ingrato. Caul. cubital. ramosus. Fol. longe petiol. hirsuta; infer. palmaria. Spica laxa. Verticilli 6-fl. Cal. trilobus. Cor. ampla, falcata, flava, fusco-punctata; lab. infer. intermedia crenata.

31. *canariensis*. S. fol. hastato-triangularibus, oblong. obtus. crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Kniph. orig. cent. 6. tab. 77.*

Horminum &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 13. f. 17. Pluk. phyt. tab. 301. f. 2.*

*In Canariis* 24.

Altitudo humana. Caul. tomentos. Fol. longe petiolat. rugosa, cum binis auriculis: caulina

*Tem. I.*

*E*

- parva, mucronata, subrubent. Geniculi rari.  
Cor. ampla, purpur.
32. *africana*, S. fol. subrotundis, ferratis, basi truncat. dentatis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 2. tab. 91.*  
Hortumum &c. *Pluk. alm. tab. 301. f. 2.*  
*Ad cap. b. Spei, locis argillosis 21.*  
Caul. 3-4. ped. ramosus, dem fuscus. Fol. unc. longa, mediam lata, subpetiol. rigida. Caul. & pedunc. araneosa lanugine obsiti. Cor. violac.
33. *aurea*. S. fol. subrot. integerr. basi truncatis, dentat. *Syst. veg. ed. 14.*  
S. *africana* &c. *Comm. hort. 2. tab. 92.*  
*Ad cap. b. Spei iuxta rivulos h.*  
Caul. 4-pedal. lignosus, ramosus, fuscus. Fol. crassa, gaucha, maiora plicata. Fl. magni, aurei. Cal. campanul. trilobus, basi villotus.
34. *colorata*. S. fol. ellipticis, subintegerr. tomentosis: cal. limbo membranac. colorato. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ad cap. b. Spei litora maris.*  
Caul. 6-ped. interne radicanes. Fol. pollic. petiolata; inferiora ferrata, raro auriculata; summi integerr. Cal. campanul. laciniis rotundatis; demum evasuri ampli, scariosi, sanguinei.
35. *paniculata*, S. fol. obovat-cuneiformibus, denticulatis, nudis: caul. frutescente. *Syst. veg. ed. 14. Morf. hist. 3. c. 11. tab. 16. f. 1. Mill. ic. tab. 225. f. 1. Breyn. cent. tab. 5.*  
*In Africa h.*  
Cul. erect. frutesc. teres, purpurasc. scaber. Fol. parva, subpetiol. venosa, lævia. Cal. 3-fid. vix pilosus. Cor. cœsul. galea labio vix longior. Stylus cor. longior.
36. *coccinea*, S. fol. cordat. ovat. acutis, ferratis, subtus mollissime tomentosis: racemo terminili, verticillato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Comm. goti. 1778. tab. 1.*  
*In Æthiopia 24.*  
Habitus tomentosus. Caul. pl. recti, sed debiles, 3-ped. Rami elongati, oppositi, patentes. Fol. petiol. obtusè serrata, rugosa, varie flexa, sæpe virid. supra pubescentia. Petioli patentiss. fusci. Spica elongata, verticill. 6-fl. Pedunc. fusci. Bract. 2. oppositæ. Cor. magna, coccinea, extus tomentosa.

37. *acetabulosa*. S. fol. obovat. dentat. cal. campanulatis, patentibus pilosis: caul. fruticuloso. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Oriente* ♂.  
 Rami brachiati. Fol. petiolata, versus basin dentata, subtus tomentosa. Racemi elongati, remote verticillati. Fl. utrinq. 3. pedicellati; Bract. ovatae, acumin. integerr. ciliatae, glabrae. Cor. albida, lab. super. 2-fid. patulo, non falcato, seu elongato; infer. 3-fido, media ma. Stam. longitudine cor. Stylus cor. duplo longior.
38. *spinosa*. S. fol. oblong. repandis: cal. spinosis: bracteis cordat. mucronat. concavis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Horminum* &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 16. f. 2.*  
*In Ægypto* ♂.  
 Caul. ped. obsolete 4-gon. brachiati. hirsutus. Fol. petiol. subcord. seu ovata, obtusif. rugosa, subtus magis pilosa; summa acumin. sessil. ferrato-crenata. Verticill. utrinq. 3-fl. sessiles. Cor. alba, galea erecta, subfalcata, emargin. longitudine tantum lab. inferioris. Lab. 3-fid. media ma. concava, 2-loba, lateralibus deflexis. Stam. alba, galea longiora. Anth. flavæ. Styl. purpur.
39. *Sclarea*. S. fol. cordat. oblong. ferrat. rugosis, villosis: bracteis coloratis cal. longioribus acuminat. concavis. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 171.*  
*Horminum* &c. *Blackw. tab. 122.*  
*In Syria, Italia* ♂.  
 Altitudo humana. Fol. magna, canescent. Hircum olentia. Fl. verticill. Cor. purpuro-cœrul.
40. *ceratophylla*. S. fol. pinnatifid. rugosis, albescens: verticillis summis sterilibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Kniph. orig. cent. 6. tab. 78.*  
*Horminum* &c. *Pluk. alm. tab. 194. f. 5. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 3. f. 6.*  
*In Persia* ♂.  
 Caul. ped. & ultra, ramosus. Fol. radical. in orbem posita, pallide virid. in patrio solo incana; floralia mucronata, margine e viridi purpurasc. Cor. purpuro-violac.
41. *Æthiopis*. S. fol. oblong. erosus, lanatis: verticillis lanatis: cor. labio crenato: bracteis recurvatis,  
 E ij

subspin. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 211. Sabb. h. rom. 3. tab. 23. Barr. rar. tab. 188.*

*Marum &c. Vest. alp. tab. 212.*

*In Europa ♂.*

Altitudo fere humana. Caul. articulatus, ramosus. Fl. verticillati. Cor. dilute carnea. Lab. infer. antice cohæret, & saccum format.

42. *pinnata*. S. fol. lyrato-pinnatis. *Syst. veg. ed. 14. Boerh. Lugd. 1. tab. 167.*

*Horminum &c. Pluk. alm. tab. 164. f. 6.*

*In Oriente, & Arabia.*

Caul. pilosus. Fol. erosa, impari ma. suprema minus pinnata. Cal. hirtus, ovatus, inflatus, ore compresso, obtuto, absq. dentibus. Cor. non sulcata, parva, purpur.

43. *argentea*. S. fol. oblongis, dentat-angulat. lanatis; verticil. summis sterilibus; bracteis concavis, *Syst. veg. ed. 14.*

*In Creta ♂.*

Media inter *S. Sclaream*, & *Aethiopem*. Fol. erosa, in sterili maxime tomentosa. Panícula minus brachiata, pubescens, viscosa, ramorum summitatibus sterilibus, quasi spinosis. Bractææ muticæ. Cor. alba, galea purpurasc-pubescente; lab. flavicante. Stylus cor. longior.

44. *ceratophylloides*. S. fol. pinnatifid. rugosis, villosis; caule paniculato, ramosissimo. *Syst. veg. ed. 14. Ard. sp. 2. tab. 2.*

*In Sicilia, Ægypto.*

Media inter *S. clandestinam*, & *ceratophyllum*.

Caul. pl. sesqui-2 cubital. & ultra, brachiato-ramosi, pilosi, superne punctis atro-purpur. adspersi. Fol. infer. petiol. profundius pinnatifida; summa fissil. sinuata; pinnulis 2. inferioribus auriculat. Fl. laxe verticillati. Bract. sub quolibet verticillo 6. In cæteris partibus fructificat convenit cum *S. pratensi*.

45. *Forskælei*. S. fol. lyrato-auriculat. caule subaphyl. cor. galea semibifida. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente ♀.*

Caul. secundi anni florens, erect. sesquiped. Rami 2. oppositi, infra verticil. infimum. Fol. radical. ovata, obtusa, repando-crenata, vil-

lofa, virid. Bract. cordatæ, acutæ, integerr.  
Verticil. utrimq. 3-5. fl. Cal. pilis viscidis.  
Cor. cœrul. calyce triplo ma. Galea falcata,  
femi 2 fid: lobis incumbenribus. Lab. 3-lob.  
intermed. 2-loba, ma. crenata, basi punctis  
cœrul. reticulatum. Stylus cor. duplo longior.  
*Faci-s S. nutantis.*

46. *nutans*. S. fol. cordatis inæqualiter basi excisis: caul.  
subnudo: spicis ante florescentiam cernuis.  
*Syst. veg. ed. 14. Nov. Ad. Petrop. T. 1. tab.*  
*14. Comm. gott. 1751. tab. 11.*

*In Imperio Rutheno 24.*

Caul. 2-cubit. torus ramofus, incanus. Fol. ra-  
dical. petiolata 5. fere unc. longa, & 4. circa  
bafin lata, fupra intente virid nuda, obrufa,  
rugofa, fubundulata, crenata; caul. na infer.  
petiol. fuma fefsil. fpicæ ternæ. Cor. labium  
fuper. violac. extus punctis candidis.

47. *abyffinica*. S. fol. cordat-ovatis, rugofis, erofis: bract.  
integerr. lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. fuppl.*  
*An S. nubia Murr.?*

*In Abyffinia.*

Caul. pedal. erect: fimpl. herbaceus, obtrufe 4-  
gon. fcaber. Fol. radical. cordat-obl. fereq.  
lanceol. obrufufc. bafi trinerv. viridia: cauli-  
na 2-3. iuga, margine fere erofa, bafique fub-  
laciniata: fuma fefsil. Panicula brachiata ex  
verticil. 6-fl. fubaphyllis. Cor. cœrul. *Odor*  
*Humuli gravis.*

48. *triloba*. S. tomentofa; fol. petiolat. rugofiff. trilobis; lobo  
intermedio produeto, oblon., lateralibus ovat.  
obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In monte Sypili b.*

*Habitus S. officin.* Tota cana ex tomento. Sin-  
gularis foliis bafi quafi auriculatis.

49. *aurita*. S. villofa; fol. ovato-dentatis, auriculatis: fl.  
verticillato-fpicatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*  
*Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

50. *fcabra*. S. fcabra; fol. lyrato-dentat. rugofis: caul. pa-  
niculato-ramolo. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

51. *runcinata*. S. fcabra; fol. runcinato-pinnatifid. dentat.: fl.  
fpicatis, verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*  
*Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

E iij

52. *japonica*. S. fol. inferior. 2-pinnat. glabris. *Syst. veg. ed.*  
14. *Thumb. Jap. tab. 5.*

*In Japonia* ☉.

*Differt a S. pinnata, cui adfinis, fol. inferior.*  
*2-pinnat. planta infra nuda, glabra: fl. paniculato-verticillat.*

Caul. 1-2. ped. simpl. erect. glaber. Fol. pinnis  
ovat. acut. subpetiol. sinuato-dentat. superiora  
pinnata, brevia, petiolata: summa, seu pe-  
duncularia lanceol. integra. Fl. verticillati,  
paniculati, panícula trichotoma. Bract. lan-  
ceol. glabræ. Cor. duplo longior calyce, ex-  
tus pilosa, rubra.

*merjamsa*. S. fl. verticillatis, sessilibus, cœrul. caule subnudo:  
fol. oblong. subrenat. rugosis. *Korsk. Ægyp.*

*In Arabia.*

*formosa*. S. fol. subcordat. cor. palea barbata: calycibus  
trilobis: caule frutescente. *Herit. stirp. fasc.*  
*3. tab. 21.*

S. pyrifolia. *Domb. per. MSS.*

S. Leonura. *Picq. reg. &c.*

*In saxofis Peruvæ h.*

Suffrutex venustus, altitudine humana. Caul. e-  
rectus, brachiatus, subnodosus, laxe rimosus,  
cinereus. Rami, & ramuli oppositi, patentes,  
basi denudati, rufi. Fol. opposita, sat densa,  
petiol. patentia, in horto obtusiuscula, crena-  
to-ferrata, subrugosa, venosa, subcoriacea,  
virentia, subtus squallide pallidiora, plana,  
fragrantia, 2-3. poll. longa, 2. pollic. lata.  
Fl. plurimi, secus turionem axillar. uti verti-  
cillati: in horto sæpius 5 e singula ala, quo-  
rum inferi 2 serotini, pedunculis horizontal.  
coccin. 1.  $\frac{1}{2}$  poll. long. Pedunc. breves, pa-  
tuli, 1-fl. apice articulati. Bract. nonnullæ,  
duæ ma. e singulo latere singula, foliac. acu-  
tæ, reflexæ. Cor. lab. super. rectum, elon-  
gato-galeatum, subintegrum, dense barba-  
tum, lateribus conniventibus. Lab. infer. ad  
angulum rectum dependens, subrotun. obtu-  
sum, 3-fid. villosum; lacin. lateralibus obtusis;  
extima lata, brevi, emarginata.

*Spielmanni*. S. caule, ramisque verticillo terminatis: fl. me-

dio erecto; cæteris horizontalibus patentibus.

*Scop. Delic. Insub. fusc. 3. tab. 15.*

*Habitat . . . .*

Caul. sub 2 ped. obtuse 4-gonus, rigidus, pilosus; ramulis angulum acutum cum caule efficientibus ramulosis. Foli. ovata, crenata, rugosa, nervo medio dimidia parte albicante; inferiora petiolata, superiora sessilia. Verticil. 6-10-fl. remoti. Cal. 10. angulata, dentibus brevi, rubellâ spinula terminatis; villosus. Cor. rubro-viola. galea obrusa, compressa, villosa, labio vix longior: labio pallidior, trilobo; lobo medio maiore, emarginato, subrotundo, sursum concavo; lateralibus parvis, obtusis, subellipticis: rubo albo. Sem. 2-4. fusca.

47. COLLINSONIA. Cor. inæqu. l. lab. infer. multifido, capillari. Sem. 1. perfectum.

1. *canadensis*. C. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Upf. 1743. pag. 85. Cold. noveb. 8.*

*In Virginia, Canada sylvis 24.*

Caul. simpl. vel brachiat. Fol. magna, opposita, longe petiol. ovato-acumin. serrata. Spicæ laxæ. Cor. dilute lutea. Odor *Melissæ*.

48. MORINA. Cor. inæqual. Cal. fructus 1 phyll. dentat. Cal. floris 2-fid. Sem. 1. sub calyce floris.

1. *persica*. M. *Syst. veg. ed. 14. Tourn. it. 3. tab. 132.*

*In Persia ad Hispahan 24.*

Caul. 2-ped. & ultra, purpurasc. Fol. Carlinæ æmula, 4-5. poll. longi, pollicem lata; laciniis undulatis, spinis subluteis. Fl. spicati, albi, aut purpur. margine albescente, odore Caryophylli.

49. GLOBBA. Cor. æqualis, 3-fid. Cal. superus, 3-fid. Caps. 3-locul. Sem. plurima.

1. *marantina*. G. spica terminali, erecta. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India orient. 24.*

Caul. herbac. simpl. Fol. alternæ, petiolata, (omnino Marantæ) petiol. membranac. vaginantibus vaginis apice truncatis. Spica fl. remotis: bract. ovata; fl. longiores.

2. *nutans*. G. spica terminali, pendula. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 6. tab. 62. 63. (In Suppl. hos Synon. ad Renealmiam pertinet.)*

*In India Orient.*

Datur ma. & min. In ma. caul. 14-18. ped. Fol. alterna, 3-ped. & ultra, 2-palmos lata, tenuia, glabra, venis paralell. transversalibus. Fl. rubri. Fruct. ovi columbini magnitudine, rubri. In min. caul. 2-3. ped. 2-phyl. Fol. magis vaga, & arguta; inferiora acut. Fl. racemosi, albi, rufi, lutei.

3. *uniformis*. G. spica laterali. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 6. tab. 69. f. 2.*

*In India Orient. 24.*

Radix articulata. Caul. 12-14. ped. in Amboina 7-8. Fol. poll. 14-16. longa, 5-6. digit. lata, supra glabra, iomense virid., subtus lanuginosa, pallidiora. Fl. albid. Baccæ paulo maius, albescences; siccæ nigræ, e rotundo-angulosæ.

4. *japonica*. G. racemo terminali cernuo: fol. ensiformibus, integris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Jamma Myoga. *Kamp. Aman. ex. Fasc. V. pag. 827.*

*In Japonia.*

Sc. p. 2-ped. & ultra, simpl. fol. vaginatus, striatus. Fol. pauca, pedalia, 2-poll. lata, glabra, supra satore viridia, subtus pallidiora. Fl. multi. Caps. ovata.

50. THOUINIA. Cal. 4-part. Cor. 4-pet. Anth. sessiles.

1. *nutans*. T. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Zeylona.*

Arbor glabra. Fol. opposita, breviter petiol. elliptica, obtusiusc. integerr. glaberrima, venosa. Panicul. axill. solitar. Fl. nutantes, purpur. *Singularis eo quod flam. singulum continet 2. petala.*

51. ANCISTRUM. Cal. 4-aristat. aristis terminatis glochidibus cruciatis. Cor. 4-fid. stigma penicillatum.

1. *Sanguisorbæ*. A. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. A. Anserinaefolium. Forst. Gen.*

*In nova Zeelandia.*

Herba, & efflorescentia refert Sanguisorbam. Fol. alterna, impari-pinn. foliol. cuneiform. profunde ferrat. subtus canis. Stipul. profunde incisæ. Pedunc. terminal. solitar. longus. Capitulum globosum, 9. aggregatis. Cal. cum cor. extus hiscitus. *Singularis aristis calycin. luteis, glochidatis, seu hamis vulpium similibus.*



## DIGYNIA.

52. ANTHO- **C**al. gluma 2-valv. 1-fl. Cor. gluma 2-valv.  
 XANTHUM. acumin. sem. 1. *Avenæ proximum est, sed*  
*duobus tantum flaminibus a reliquis Graminum*  
*generibus distinguitur.*

1. *aculeatum*. A. spicis subglobosis: involuc. foliaceo, brevi,  
 mucronato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*Schœnus aculeatus* sp. plant.

*Agrostis aculeata*. All. Fl. Ped.

*Phleum Schœnoides*. Jacq. Austr. 1. tab. 7. Schreb.  
 gram. tab. 32. *Licet Jacq. cum Lin. iun. duo*  
*flam. modo numeret, ob defectum tamen necarii,*  
*aristaliū dorsaliū, removet ab hoc genere;*  
*& vel Phleis adnumerandum, vel pro singulari*  
*genere habendum censei Jacq.*

*In Hispania, Sibiria, & agro Nicœnsi* 24.

Culm. pl. diffusi, palm. ramosi, vaginis fol. ve-  
 stiti. Fol. Graminea, lævis, margine scabra;  
 super. sensim latiora. Spica subglobosa, fere  
 fastigiata, fl. fere sessilibus in sinu involuc.  
 Involuc. 3-phyll. foliaceum, spica paulo lon-  
 gius. Foliola sessil. ovata, oblonga, apice  
 mucronata. Tertium in sinu paucos fl. contin-  
 et. Reliqua, glumæ instar, fl. in capitulum  
 spicatos gerunt.

2. *odoratum*. A. spica obl. ovata: flosc. subpeduncul. arista  
 longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab.*  
*666. Schreb. gram. tab. 5. Stillingbl. misc. tab.*  
*1. Gisech. ic. fasc. 1. f. 2.*

*Gramen Alopecurum* &c. *Morls. Hist. 3. tab.*  
*7. f. 25.*

*Gramen avenaceum* &c. *Monti. ic. 84.*

*In Europæ pratis* 24.

Culm. 1-2. ped. Fol. hirsuta, super. breviter  
 lanceol. attrita odore *Asperulæ odoratæ*. Spi-  
 ca ex sinu folii, laxa, flavescens. Glumæ gla-  
 bræ. *Var. spica multo longiore, & interrupta.*

3. *indicum*. A. spica lineari; flosculis sessilibus, arista bre-  
 vioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India.*

Caul. ped. ascendens, articulatus. Fol. bre-  
 via, lata, Spica angustiss. rara.

4. *crinitum*. A. penicula spicæfor. cylindrica, aristata; aristis longis, patentibus, laxis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*  
*In nova Zelandia.*  
 Gramen altum, glabrum. Panicula coarctata. Gluma corallinea, aristata.
5. *paniculatum*. A. fl. panicularis. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Gramen &c. *Rudb. elys. 1. f. 14.*  
*In Europa australi.*  
 Habitus A. odorati. Panic. flavesce. Cal. 4-fl. Fl. mutici.
- 
- avenaceum*. A. spica secunda: calyc. pilos: flosculi arista longa, torta, geniculata. *Retz. Obs. fasc. 3.*  
*In Tranquebaria.*  
 Facies omnino Avenæ propter aristas, sed stam. tantum 2.
- 

## TRIGYNIA.

53. PIPER. Cal. o. Cor. o. Bacca monosperma.
1. *nigrum*. P. fol. ovat. subseptemnerviis, glabris; petiol. simpliciss. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 437. f. 1. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 1. f. 1. Black. tab. 348.*  
 Melago codi. *Rheed. mal. 7. tab. 12.*  
*In India h.*  
 Caul. articul. dichotom. spongiosus, lævis. Fol. alterna, petiolat. obtusiusc. crassa, integerr. Spica oblong. peduncul. constans baccis multis, sessilibus.
2. *Betle*. P. fol. oblongiusc. acumin. 7-nerviis, petiolat. 2-dentat. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 82. f. 2.*  
 Betela-codi. *H. mal. 7. tab. 15.*  
*In India h.*  
 Caul. angulati, striati, læves. Fol. basi subobliqua. Spica cylindrica, sæpe pendula.
3. *Malamiri*. P. fol. ovat. acutiuscul. subrus scabris: nervis 5. subtus elevatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Sirium. *Rumph. amb. 5. tab. 116. f. 2.*

*Amalago*. *H. mal.* 7. tab. 16.

*In India utraque.*

Frutex caul. volubill, striato, tereti. Fol. tenuia, supra virid. subtus cinereo-scabra.

4. *Amalago*. *P.* fol. lanceol-ovat. 5-nerviis, rugosis. *Syst. veg. ed. 14. Sloan. hist. 1. tab. 87. f. 1.*

*P.* frutex &c. *Pluk. alm. tab. 215. f. 2. Rumph. amb. 5. tab. 116. f. 1.*

*In Jamaica.*

Rami flagelliform. Ad nodos folia solitaria, 5-6. poll. longa, palmum lata, petiolata, supra glabra, parum nitida, quandoq. auriculata. Pedunc. axillar. *Var. fol. ma. nigrovirentibus, aut flavescenibus.*

5. *Siriboa*. *P.* fol. inæqualiter cordatis, subseptemnerviis, venosis. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 5. tab. 117. f. 2.*

*Betela*. *Bont. jav. tab. 91.*

*In India.*

Caul. lævis. Fol. spithamea, alterna, petiolata, acuta. Spica tenuis, angusta.

6. *longum*. *P.* fol. cordatis, petiolat. sessilibusq. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 356. Rumph. amb. 5. tab. 116. f. 2. Pluk. alm. tab. 104. f. 4.*

*Cattu-tirpali*. *Rheed. mal. 7. tab. 14.*

*In India.*

Facies *Aristolochiæ Pistolochiæ*. Fol. super. sæpe sessil. angustiora. Rami dichotomi.

7. *decumanum*. *P.* fol. cordatis, 9-nerviis, reticulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Saururus* &c. *Plum. Am. tab. 6.*

*Sirum* &c. *Rumph. amb. 5. tab. 27.*

*In Indiis*  $\bar{h}$ .

*Adfinis nimis P. reticulato, ut forte varietas.*

Caul. articul. Fol. magna, sub 7-pedal. 5-6. poll. lata, petiolata, rugosa, scabra, subtus pallidiora; inferior fol. pars plerumq. brevior est superiore. Fruct. primum pallide viridis, dein fuscus.

8. *reticulatum*. *P.* fol. cordatis, 5-nerviis, reticulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Saururus* &c. *Plum. Am. tab. 75.*

*Jaborandi*. *Marogr. bras.*

*In Martinica, Brasilia.*

Frutex sarmentosus, scandens. Spica axillar.

9. *aduncum*. P. fol. ovat-lanceol. nervis alternis: spicis uncinatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
P. longum &c. *Sloan. Jam. 1. tab. 87. f. 2.*  
Saururus &c. *Plum. Am. tab. 77.*  
*In Jamaica.*  
Frutex. Caul. pl. ramosi. Fol. Lauriform. 8. poll. longa, 3. lata, rudia, subrus saturatio-  
ra. Fruct. aduncus.
10. *pellucidum*. P. fol. corlatis, petiolat. caul. herbaceo. *Syst. veg. ed. 14. Hort. cliff. tab. 4.*  
Saururus &c. *Plum. Am. tab. 72.*  
*In America calidiore* ☉.  
Caul. pedal. anceps, unctuosus, subdiaphanus:  
rami alterni, ramosi. Fol. sub singulo ramo  
unicum, subrotundum, albescens, subdiapha-  
num. Spicæ axill. longitudine digiti dimidii.  
Fl. & spica viridi *Comeditur crudum ut Lac-  
tuca.*
11. *acuminatum*. P. fol. lanceol-ovat. nervosis, carnosiss. *Syst. veg. ed. 14.*  
Saururus &c. *Plum. Am. tab. 71.*  
*In America calidiore.*  
Similis obtusifolio, sed fol. acuminata.
12. *Cubeba*. P. fol. oblique ovat. seu oblong. venosis, acu-  
tis; spica solitar. peduncul. oppositifol. fruc-  
tibus pedicellatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*  
*In Java.*  
Frutex glaberrimus. Caul. flexuosus, articulatus.  
Fol. non tenera, ut in pl. huius generis spe-  
ciebus, alterna, petiolata, integerr. venosa:  
margo in uno latere non tam longe decurrit,  
quam in altero. Spicæ breves, in quibus  
baccæ illæ pedicellatæ, quæ in Offic. nomine  
*Cubebæ* sunt notæ.
13. *sapense*. P. fol. ovatis, acuminat. nervosis, nervis villo-  
sis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spec.*  
Differt a reliquis maioribus huius generis, qui-  
bus simillimum, venis pagina inferior. villosis.
14. *retusum*. P. fol. obovat. retusis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spec.*
15. *latifolium*. P. fol. cordatis, multinerviis, petiolatis: spi-  
cis axillar. plurimis pedunculatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In Tahiti.*

Fol. magna, subrotunda, profunde cordata, acuta, integerr. glabra, tenera, nervosa, petiol. basi dilatatis, & amplexicaul. Spicæ 5-pl.

16. *obtusifolium*. P. fol. obovatis, enerviis. *Syst. veg. ed. 14.*  
Saururus &c. *Plum. am. tab. 70.*

*In America calidiore.*

Caul. volub. ramosi, nodosi. Fol. subsessil. 3. poll. longa, 1.  $\frac{1}{2}$  lata.

17. *rotundifolium*. P. fol. orbiculat. solitar. carnosus. *Syst. veg. ed. 14.*

Saururus &c. *Plum. am. tab. 69.*

*In America calidiore.*

Fol. parva, odore fragranti, crassa, lacte vi-  
rentia.

18. *maculosum*. P. fol. peltatis, ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Saururus &c. *Plum. am. tab. 66.*

*In Domingo.*

Caul. volubil. maculatus. Fol. semiped. & ultra  
longa, 4. poll. lata, ad basin emarginata, te-  
nera, succulenta, subrus saturiora.

19. *peltatum*. P. fol. peltatis, orbiculato-cordat. obtusis, re-  
pandis: spic. umbellatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Saururus &c. *Plum. am. tab. 74.*

Lomba. *Rumph. amb. 6. tab. 59. f. 1.*

*In Indiis.*

Frutex fol. amplis.

20. *distachion*. P. fol. ovat. spicis coniugatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Saururus &c. *Plum. am. tab. 67.*

*In America Gallia æquinoct.*

Caul. samentosi, ramosi, maculati. Fol. longe  
petiol. 4-poll. longa, 2-lata. Spicæ pedun-  
culatæ.

21. *umbellatum*. P. fol. cordat. subrot. acut. venosis: spicis  
umbellatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Saururus &c. *Plum. am. tab. 73.*

*In Domingo.*

Caul. 4-5. pollic. nodosus, verrucosus, medul-  
losus. Fol. ampla, 2-pedal. petiolata, subrus  
saturiora.

22. *trifolium*. P. fol. ternis, subrotundis. *Syst. veg. ed. 14.*

Saururus &c. *Plum. am. tab. 68.*

*In America Gallia æquinoct.*

Caul. nodosi, albescentes. Fol. succulenta, as-  
pera, subrus saturiora.

23. *quadrifolium*. P. fol. quaternis, cuneiformibus, sessilibus.  
*Syst. veg. ed. 14.*  
*Saururus &c. Plum. ic. tab. 242. f. 2.*  
*In America meridionali.*  
 Planta humilis, repens, ramosa, dichotoma.  
 Cauliculi erecti, Folia crassa, emarginata,  
 nervosa. Spica terminal. simplex, strigosa.
24. *reflexum*. P. fol. quaternis, ovatis, obtus. reflexis: caul.  
 fulcato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Refert Valantiam.
25. *verticillatum*. P. fol. verticillat. ovatis, trinerviis. *Syst.*  
*veg. ed. 14.*  
*In Jamaica ☉.*  
 Planta tenera, digital. erecta. Fol. petiolata,  
 obtusa, integerr. succulenta. Spicæ simpl. fo-  
 liis multo longiores.
- 
- arborescens*. P. amplissim. foliis. *Aubl. Guian. Sloan. Jam.*  
*hist. 1. tab. 88. f. 1.*  
*In Jamaica &c.*

## NOVA GENERA.

## GYMNANDRA.

- Cal.* sessil. basi hinc gibbus, biangulat. compres-  
 sus, inæqualiter truncato-3. dent. dentibus la-  
 teralibus obtusangul. geminatis, infero acuto,  
 altius discreto.
- Cor.* parva, ringens; tubus cernuus: labia par-  
 va; super. obl. obtuso.
- Stam.* ex cor. laterali margine denticulum seta-  
 ceo-obl. pro filamentum. Anth. didyma.
- Pist.* Germ. ovatum: stylus cor. longior: stigma  
 capitatum, didymum.
- Peric.* Capl. ovato-acuta, compressa, apice 4-  
 dent. dehiscens, ut in Pediculari; 2-loc.
- Sem.* in singulo loculo unicum, oblon. utrimq.  
 acutum, fulcat. luteum.
- Ordine naturali, licet diandra, Bartsia, & Pe-*  
*diculari proxima videtur.*

1. *borealis*, G. Pall. it. 3. tab. A. f. 1.

*In rupibus Dauriæ* 24.

Caul. dodrant. simpl. erect. inferne nudus, ad apicem foliis vel 2. parium oppositis, vel 4. usque ad flores, alternis, sessilibus, ovatis, subserratis, vel integris. Spica florida vix pollic. confertim imbricata; gravida triplo longior. Bract. sessil. ovatis-acut. cœruleis. venosæ, cal. maiores. Cal. bracteis cœcolor, sessil. subdiaphan. Cor. cœrul. *Var. fol. lato-lanceol. serratis: spica tenui: fl. paucioribus distantibus.*

## A R O U N A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. minimum, 5-part. lacin. acutis.

*Cor.* nulla.

*Stam.* Filam. 2. opposita, disco pistil. inserta.

*Anth.* subrot. 2-locul.

*Pistil.* Germ. conicum: styl. tenuis, incurvus: stig. obtus.

*Peric.* Caps. 2-sperma, ab uno latere fulcata.

*Sem.* 2. pulpa rufescente, acida obvoluta; sæpe unum abortiens.

1. *Guianensis*, A. Aubl. *Guian.* tab. 5.

*In Guiana* h.

Arb. 30-40. ped. superne ramosus, ramulis hinc inde divaricatis. Fol. alterna, impari-pinn.

Foliol. alterna, ovata, obtuse acumin. glabra.

Stipul. 2. deciduæ. Fl. racemoso-panicul. numerosi, virid. Caps. fusca.

## V O C H I.

*Cal.* Periant. 1-phyll. 4-part. lacin. subrot. ad oras villotis; duabus ma.

*Cor.* 4-petal. petalis inæqualiter calyci insertis: superius pone elongatum in tubum obtusum, incurvum, clausum; pars super. expanditur in lobum erectum, oblong. emarginatum, limbo utrimq. incurvo. Petala 2. lateral. min. ungue lato inserta, mutuo conviventia; inferius amplum intra lateralibus positum, ipsisque incumbens.

## DIANDRIA TRIGYNIA.

*Stam.* Filam. unicum, oblong. latum, membranac. apice concavum, cal. fundo insertum. *Anth.*

2. oblon. nigricantes, in cavitate filam. partim reconditæ.

*Pistil.* Germ. subrot. subtrigon. Styl. longus, incurv. carnosus. Stigma ab una parte convexum, ab altera complanatum.

*Peric.* immaturum, transverse sectum, 3-locul.

*Sem.* plurima.

1. *Guianensis*. V. Aublet. *Guian.* tab. 6.

*In Sylvis Sinemariensibus* h.

Arb. 60-80. ped. superne ramosus: rami multi, erecti, concinne sparsi. Fol. opposita, breviter petiol. ovata, acuta, integerr. glabra, e luteo-virentia. Stipul. 2. breves. Fl. recemosis, bracteati, lutei, odori.

## CYRTANDRA.

*Cal.* Periant. 1-phyll. inferum ovat-obl. 5-fid. sub 2-lab. lacin. acuminatis, 2. inferior. profundius divisus.

*Cor.* monopet. irregul. Tubus cylind. erect. dein parum inflexus, basi oblique scissus, ad faucem ampliatus, cal. longior. Limb. 3-part. lacin. orbiculatis; 2. super. min. planis; 3. inferior. patentiss. concavis. Nectar. brevill. urceolatum, germen ambiens.

*Stam.* Filam. 2. brevia, filiform. spiralia, in fauce cor. labio infer. adnata. *Anth.* ovat. compressæ. Rudimenta 2. filamentorum tenuia, infra stam. fertilia tubo inserta.

*Pistil.* Germ. conicum. Stylus cylindric. rectiusc. longitudine tubi. Stigm. clavatum, 2-lab.

*Peric.* Bacca obl. succulenta, 2-locul.

*Sem.* plurima, minima, in arcubus involutis disposita.

*Adfinis* *Besleria*.

1. *biflora*. C. involucr. 2-floris. *Forst. gen.*

2. *cymosa*. C. peduncul. nudis. *Forst. gen.*



## BANKSIA.

*Cal.* nullus.

*Cor.* monopet. tubulosa. Tubus cylindric. Limb.  
4-part. patenti-reflexus, lacin. æqualibus, ova-  
libus tubo brevioribus.

*Stam.* Filam. 2. fauci inserta, recta, filiform.  
fere longitudine tubi cor. Anth. ovatz.

*Pistil.* Germ. ovatum. Styl. filiform. longitudine  
tubi. Stig. mausc.

*Peric.* ovat. villotum, 1-locul. non dehiscens.

*Sem.* solitar. involucr. oblong. glabrum.

1. *Gnidia*. B. fol. subpetiolat. lanceol. rigidis. *Forst. gen.*

2. *tomentosa*. B. fol. subpetiolat. oblon. flaccidis, pilosis.  
*Forst. gen.*

3. *prostrata*. B. fol. sessilibus, ovat-oblong. carnosis. *Forst. gen.*



# CLASSIS III. TRIANDRIA.



## MONOGYNIA.

\* *Fl. superi.*

54. *Valeriana*. Cal. o. Cor. 1-pet. supera, basi hinc gibba, limbo 5-fid. Sem. 1.  
 61. *Melothria*. Cal. 5-fid. Cor. 1-pet. campanulata. Bacca 3-locul. polysper.  
 67. *Crocus*. Cor. 6 fid. erecto-patula. Laciniae 3 minores, quæ filamentum ungui adnexum non habent, ad basin gerunt barbulam, pl. pilis compositam. Barbula hæc in reliquis limbi lacinis desideratur. Stigmata convoluta, colorata. Caputula subrotunda. Numero stam. & spatha duplici differt a Colchico.  
 72. *Iris*. Cor. 6 part. lacinis alternis, reflexis. Tubæ apex 3-nd abt in 3 lacinias petalisfor. tegentes itam. Capf. 3-locul. polytpr.  
 73. *Moræa*. Cor. 6-pet. petalis omnibus patulis.  
 71. *Antholyza*. Cor. tubulosa, recurvata, irregular. 6-fid. Capf. infera.  
 70. *Gladiolus*. Cor. 6-part. ringens; peral. 3 superioribus convergentibus. Stam. ascendente. Tuba 3-fid.  
 68. *Wistenia*. Cor. cylindrica, 6-part. Stigma emarginatum.  
 69. *Ixia*. Cor. 1-pet. tubulosa, tubo recto, filiformi; limbo campanulato, 6-part. æquali, patente. Stigm. 3, simplicia.  
 74. *Dilatris*. Cal. o. Cor. 6-pet. hirsuta. Filam. tertium reliquis minus. Stigm. simpl.

\*\* *Fl. inferi.*

75. *Wachen-* Cal. o. Cor. 6-pet. inæqual. patens. Capf. 3-  
*dorsia*. locul.  
 76. *Commelina*. Cor. 6-pet. Pet. 3-4 calyciformia. Nect. 3 cruciata, filamentis propriis inserta.  
 66. *Hippocratea*. Cal. 5-part. Cor. 5-pet. Capf. 3, obcordatæ, 2-valv.

64. *Læsingia*. Cal. 5-phyll. Cor. 5-pet. minima. Capsl. 3 valv. 1-locul.
60. *Willichia*. Cal. 4-fid. Cor. 4-fid. Capsl. 2-locul. polysper.
56. *Tamarin-* Cal. 4-part. Cor. 3-pet. Nectar. setis 2 brevibus  
*us*. sub filamentis. Legum. pulposum.
77. *Callisia*. Cal. 3-phyll. Cor. 3-petal. Antheræ geminæ.  
Capsl. 3-loc. *Adfinis Commelinæ, sed Nectar.*  
*orbata.*
57. *Rumphia*. Cal. 3-fid. Cor. 3-pet. Drupæ nucleus 3-locul.
58. *Cneorum*. Cal. 3-dent. Pet. 3, æqualia. Bacca 3-cocca.
78. *Xyris*. Glumæ 2-valv. in capitulum. Cor. 3-pet. æqua-  
lis, crenata. Capsl. 3-locul.
59. *Comocladia*. Cal. 3-part. Cor. 3-part. Styl. o. Drupa ob-  
longa, nucleo 2-lobo.
55. *Olax*. Cal. integer. Cor. infundibulif. 3-fid. nectar. 4-  
phyll. Glanf.
62. *Rotala*. Cal. 3-dent. Cor. o. Capsl. 3-loc. polysper.
63. *Ortega*. Cal. 5-phyll. Cor. o. Capsl. 1-locul. 3-valv. po-  
lysp.
65. *Polychne-* Cal. 5-phyll. Fol. inæqual. lanceol. petaliform.  
*mum*. Sem. 1, subnudum, lanceolat. involacro se-  
riceo inclusum.

\*\*\* Fl. Graminei, valvulis Glumæ calycinæ.

79. *Schænus*. Glumæ paleaceæ, 1-valv. congestæ. Cor. o.  
Sem. 1, subrotundum inter Glumas. *Differt a*  
*Scirpo squamis omnibus fertilibus. A Cypero,*  
*glumis folliculi incerti numeri, laxè sine ordine*  
*congestis, aut laxè imbricatis. Locusta, sive*  
*spica multiss.*
80. *Cyperus*. Pl. spicæ in capitulum congestæ, multiss. com-  
planatæ. Glumæ paleaceæ, distiche imbricatæ.
81. *Scirpus*. Glumæ paleaceæ, undique imbricatæ. Cor. o.  
Sem. 1, imberbe. *Differt a Cypero spicis non*  
*distiche imbricatis, & non complanatis, sed obæ-*  
*fis, & sem. setulis circumvallato.*
84. *Eriophorum*. Spica brevis, pauciss. imbricata, squamis ob-  
longis. Cor. o. Sem. 1, lana longissima cin-  
ctum, ut capitulum reddat tomentosum.
85. *Nardus*. Fl. solitar. spicati. Glumæ follicali binæ, an-  
gustæ, acuminatæ, etiam aristatæ. Sem. lanig-  
erum.
87. *Lygeum*. Cal. spatha 1-phyll. Cor. binæ supra idem ger-  
men. Nux 2-locul.
82. *Kyllingia*. Amentum ovatum, oblong. imbricatum. Cal. &  
cor. 2-valv. F ij

83. *Fuirena*. Ament. imbricatum squamis aristatis. Cal. o. Cor. glumis 3, petaliformibus, obcordatis, cirrho terminatis.
86. *Pomme-reulla*. Cal. turbinatus, 2-valvis: valvulæ 4-fid. dorso aristatæ.

## DIGYNIA.

\* *Fl. uniflora, vagi.*

83. *Bobartia*. Cal. multivalv. imbricatus. Cor. gluma 2-valv. supera.
93. *Panicum*. Cal. 3-valv. valvula tertia dorsali minima, post alteram posita.
89. *Cornucopia*. Involuc. comm. 1-phyll. infundibulif. crenatum, multifi. Cal. 2-valv. Cor. 1-valv. *Alopecurus nudus* adfines.
112. *Aristida*. Cal. 2-valv. Cor. 1-valv. aristis 3 terminalibus.
95. *Alopecurus*. Cal. 2-valv. Gluma cor. sive folliculi 1-valv.
94. *Phleum*. Cal. glumæ 2-valv. cuspidatæ, & intus truncatæ.
91. *Phalaris*. Cal. 2-valv. carinatus, acuminatus, æqualis longitud. corollam includens.
92. *Paspalum*. Cal. 2-valv. valvis subrotundis fig. cor. Stigmat. penicilliform.
96. *Milium*. Cal. 2-valv. 1-fl. valvulis ventricosis, subæqualibus, cor. maioribus. Stigmat. penicilliform.
97. *Agrostis*. Glumæ cal. & folliculi acumin. aut etiam aristatæ; sed glumæ follic. calycin. glumis longiores. Fl. distantes.
103. *Dasylis*. Cal. 2-valv. compressus, altera valvula maiore, carinata. Cor. compressa.
107. *Stipa*. Cal. 2-valv. 1-fl. Cor. valvul. exter. arista terminali, basi articulata. *Dignoscitur glumæ corollinæ arista longissima.*
110. *Lagurus*. Cal. glumæ aristatæ, arista villosa. Follicul. 2-glumis, valvula maiori, terminata duplici arista, cum tertia dorsali retorta; valvula altera min. acuminata. Sem. oblong: aristatum, folliculo arcte inclusum.
90. *Saccharum*. Cal. lanugo longa extra calyc. in quo differt ab *Arundine*. Cor. 2-valv.
- \* *Arundo epigejos, calamagrostis, arenaria.*
- \*\* *Fl. biflora, vagi.*
98. *Aira*. Cal. 2-valv. 2-fl. Flosculi absque rudimento tertii

99. *Melica*. Corpuscul. pedunculatum inter flosculos (rudimentum fl.) characterem essentialem præbet. Cal. 2-valv. 2-fl. glumis ovatis, muticis, æqualibus. Follic. glumæ muticæ, inæquales.  
\* *Tripsacum hermaphroditum*.  
\*\*\* *Fl. multifl. vagi*.
102. *Uniola*. Cal. multivalv. carinatus. Spicula ovata, carinata.
101. *Brixa*. Locusta multifl. mutica. Cal. glumæ cordato-concavæ, æquales, obtusæ. Fl. in spicam cordatam, disticham collecti. Folliculi valva inferior ventricosa, maior, gumis calycin. similis: superior minor, plana. Sem. ex folliculo secedens.
100. *Poa*. Cal. 2-valv. multifl. Spicula ovata, valvulis margine scariosis, acutiusculis. Sem. folliculo arcte involutum.
105. *Festuca*. Locusta tenuis, multifl. Cal. inæquivalv. 2-glum. glumis acuminatis, muticis. Follicul. 2-valv. valvula infer. ma: acuminata, aut etiam ex dorso aristata.
106. *Bromus*. Cal. glumæ acumin. muticæ, infer. min. Follic. gluma infer. ma: concava, apice 2-fid. aristam rectam infra apicem emittens: super. min. est, mutica: Sem. folliculo arcte inclusum.
108. *Avena*. Cal. 2-glum. multifl. glumis ventricosis, non aristatis. Arista e dorso cor. articulata, contorta. Germina pappus sericeus sæpe circumdat.
111. *Arundo*. Cal. 2-valv. Flosc. vagi, congesti, lana cincti. Sem. lanuginoso folliculo arcte inclusum.
109. *Anthistiria*. Cal. æqualiter ad basin fissus in lacinias 4, æquales.  
\* *Dactylis glomerata*.  
\*\*\*\* *Spicati receptaculo subulato*.
116. *Secale*. Cal. oppositus, 2-fl. 2-valv. solitarius.
118. *Triticum*. Cal. 2-valv. solitarius, sub 3-fl. Flos obtusiusculus, acutus. Scapus alterne flexuosus, & scrobibus excisus. *Solus suus spicular. distinguit Triticum a Bromis*.
117. *Hordeum*. Locusta 3-fl. sive ex 3 distinctis fl. constans. Cal. comm. 6 angustis foliol. componitur; duobus nempe, glumarum instar, singulo folliculo subiectis, & aristatis. Follicul. 2-valv. valvula ex-

- teriore ventricosa, in aristam longam desinente; inter. plana. Sem. follic. acutè involutum. Scapus alterne flexuosus, & scrobibus excavatus.
114. *Rottbœlla*. Rachis articulata, teretiuscula, in pl. filiformis. Cal. ovat-lanceol. planus, simpl. seu 2-part. Floscul. alterni, in rachi flexuosa.
115. *Elymus*. Fl. dentibus flexuosi scapi insidentes. Locustæ geminæ, multifl. quælibet spicula duabus non glumis, sed rigidis setis excipitur. Follic. quilibet 2-valv. valvula exter. aristata; inter. plana.
113. *Lolium*. Fl. spicati, distichi, locust. multifl. ad flexuosum scapum sessilibus. Fovea nimirum in scapo est loco valvæ calycinae, atque ex altera parte gluma una, longa, calycina, sive foliol. in cuius ala sedet spicula. Follic. quilibet 2-glumis ex valvis inæqualibus. Sem. nudum.
104. *Cynosorus*. Cal. 2-valv. multifl. Receptacul. proprium unilater. foliaceum. *Differt a Phleo follicul. integerrim.*

## TRIGYNIA.

\* *Fl. inferi.*

123. *Holosteum*. Cal. 5-phyll. Petal. 5. æqualia, emarcida, Caps. subcylindrac. 1-locul. apice dehiscens, polysper.
125. *Polycarpon*. Cal. 3-5. phyll. Cor. 5-pet. minima, ovata, emarginata, persistens. Caps. 1-locul. 3-valv.
129. *Lechea*. Cal. 3-phyll. Petal. 3. linear. Caps. 3-locul. 3-valv. valvulis totidem interioribus. Sem. 1.
119. *Eriocaulon*. Cal. comm. capitulum imbricatum. Pet. 3. æqualia. Stam. supra germen. Sem. 1. coronatum cor.
126. *Montia*. Cal. 2-3. phyll. Cor. parva, 1-pet. irregular. 5-part. lacin. 3. alternis minoribus.
126. *Mollugo*. Cal. 5-phyll. Cor. o. Caps. 3-loc. 3-valv.
127. *Minuartia*. Cal. 5-phyll. Cor. o. Caps. 1-locul. 3-valv. Sem. nonnulla.
128. *Queria*. Cal. 5-phyll. Cor. o. Caps. 3-valv. 1. locul. 1-sperma. *Simil. Minuartiæ, sed differt semin. numero.*
124. *Koenigia*. Cal. 3-phyll. Cor. o. Sem. 1., ovatum, nudum.

22. *Triplaris*. Cal. maximus, 3-part. Cor. o. Nux triquetra intra cal.

\* *Tillaea*.

\*\* *Fl. superi*.

22. *Proserpinaca*. Cal. 3-part. superus. Cor. o. Sem. 1., trilocol.

# MONOGYNIA.

54. VALERIA-  
NA. Cal. o. Cor. 1-pet. basi hinc gibba, su-  
pera, 5-fida. Sem. 1.

1. *rubra*. V. fl. monandris, caudatis: fol. ovato-lanceol. subintegerr. *Syst. veg. ed. 14.*

V. marina &c. *Moris. hist. scđ. 7. tab. 14. f. 15.*  
*In Italia, H-tvetia &c. maris, & rudratis 24.*

Caul. cubital. ramosus. Fol. ima petiolat. super. sessilia, lævia, interdum pene cordata, quandoq. dentata. Cor. purpur. vel alba.

2. *calcitrapa*. V. fl. monandris: fol. pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 7. tab. 14. f. 7.*

*In Lusitania, Oriente ☉.*

Caul. cubital. ramosi. Fol. humifusa. Cor. dilute rubra.

3. *cornucopiæ*. V. fl. diandris, ringentibus: fol. sessilibus, ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. rom. 2. tab. 19.*

Pseudo-Valeriana &c. *Moris. hist. 3. f. 7. tab. 16. f. 27.*

*In America, Hispania, Sicilia ☉.*

Caul. pedal-cubit. tenellus, plerumq. ad singulos nodos in 2. ramos divisus, ac subdivisus.

Fol. pauca, pallide virent: super. quandoq. sinuata. Pedunc. in-rassati. Sem. absq. pappo.

4. *dioica*. V. fl. triand. dioicis: fol. (caulinis) pinnatis, integerr. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 687.*

*Moris. umb. tab. 10. Black. tab. 284. Riv. mon. tab. 2.*

*In Europæ, & Orientis campis uliginosis 24.*

*Fl. numquam dioici, sed hermaphroditi, seu monoici. Scop. Fl. Carn. Ex rad. odorata ex-unt stolones foliosi. Caul. pedal. trichotomus. Fol. radicalia ovata, & elliptica. Cor. subrubella,*

F iv

5. *officinalis*. V. fl. triandris: fol. omnibus pinnatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 570. Ludw. ed. tab. 99. Black. tab. 271.*  
*In Europæ nemoribus paludosis* 24.  
 Altitudo humana. Caul. sulcatus. Fol. valde incisa, dentata, crassis venis, subtus subhirsuta. Cor. ex albo-purpureo. *Var. fol. angustioribus, & latioribus, splendentibus.*
6. *Phu*. V. fl. triandris: fol. caulinis pinnat. radicalibus (plerumq.) indivisis. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 98. Black. tab. 250.*  
*In Alsatia, Silesia* 24.  
 Differt a priore caule non sulcato; & foliol. exterior. ma. *Variat fol. radicalibus lyratis.*
7. *tripteris*. V. fl. triandris: fol. dentatis: radicalibus cordat. caulinis ternatis, ovato-oblong. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 268.*  
 V. alpina &c. *Pluk. alm. tab. 231. f. 7. Barrel. tab. 742.*  
*In alpinis Helvetiæ, & Austriæ* 24.  
 Radix odora. Caul. subped. Fol. radical. longe petiol. caulina non precise ternata, sed 3-fid. lacinia intermed. ma. lanceol. summa linear. & indivisa. Involuc. propria sunt 2-phyll. setacea. Fl. purpureo. quandoq. albi, odori.
8. *montana*. V. fl. triandris: fol. ovato-oblong. subdent. caule simplici. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 269.*  
*In alpinis Helveticis, Pyrenæicis, Austriacis &c.* 24.  
 Differt a *V. tripteri*, fol. indivisis, & panicula densiore.  
 Radix quandoq. odora. Fol. radical. petiolat. basiq. attenuata, obtusa: super. oblong. acumin. dentata: summa sessil. Fl. sæpe purpur.
9. *cellica*. V. fl. triandris: fol. (inferior.) ovato-oblong. obtus. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Vind. 203.*  
*In alpinis Helvetiæ, Austriæ &c.* 24.  
 Radix obliqua, fibrosa, capillaris, nigricans, odore fragranti, sapore aromat. Ramuli procumbent. palmar. tenues. Fol. parva, radical. petiolata, crassa, succulenta, e virid-flavescent. Fol. 2. caulina linear. obtusa. Fl. verticill. bini-terni. Cor. pallida.
10. *tuberosa*. V. fl. triandris: fol. radicalibus lanceolat. integerr. reliquis pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Dalmatia, Sicilia &c.* 24.



Radix Olivæform. Fol. caulina utrimq. pinnis 2.

11. *Saxatilis*. V. fl. triandris: fol. subdentat. radicalibus ovat. caulinis lineari-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 167. Clus. hist. 1. p. 256. bona.*

*In alpinis Austriae, Baldi &c. 24.*

Planta nitida. Caul. spitham. simpl. Fol. subtrinervia, ad oras obsolete pilosa: radical. 4. caulina 2. opposita. Rami brachiati. Pedunc. oppositi. Fl. paniculat. Cor. alba.

12. *elongata*. V. fl. triandris: fol. radicalibus ovatis: caulinis cordatis, sessilibus, inciso-fimbriatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 219.*

*In alpinis Austriae inferioris.*

*Differt a V. montana, gemma radicali: caul. paniculato &c. A. V. tripteri, fol. dentat. radicalibus petiolo proprio semper longioribus, & caulinis ovatis.*

Caul. erect. spitham. simpl. Fol. radical. longe petiol. obtusa, raro subdent. caulina amplexicaul. Racemus terminal. erectus, longus; pedicell. oppositis, dichot. breviusc. Bract. linear. Cor. fusco-flava.

13. *pyrenaica*. V. fl. triandris: fol. caulinis cordatis, dentat. petiolat. summis ternatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*V. Orientalis &c. Buxb. cent. 2. tab. 11.*

*In Pyrenæis 24.*

Fol. Alliarie similia. Cor. alba.

14. *scandens*. V. fl. triandris: fol. ternatis: caul. scandente. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Cumana.*

Caul. dichotom. Fl. lateral. paniculati. Cor. e viridi-rosea. Sem. ovata, compressa.

15. *chinensis*. V. fl. triandris: fol. omnibus cordat. repandolobatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 6. f. 3.*

*In China.*

*Simil. Boerhaavie scandenti, sed oppositis ramis, & peduncul.*

Caul. herbac. erecti, plusquam ped. ramis florifer. opposit. Fol. petiolata, acuta, glabra, lobis lateralibus utrimq. binis, obtusis. Umbel. proliferæ, seu paniculatæ. Fruct. min.

16. *Locusta*. V. fl. triandris: caul. dichot.: fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*a. olitoria. Fructu simplici. Fl. Dan. tab. 738.*

Caul. dichot. Fol. lanceol. vel integer. dentata. Sem. nuda.

- b. *vesicaria*. Cal. inflatus, dent. 6. inflexis: involucl. 3-  
phyl. 3-fl. *Boer. Lugd. 1. tab. 75.*  
Caul. dichotom. Fol. lanceol. serrata.
- c. *coronata*. Fructu subdent. *Colum. ecph. 1. tab. 209.*  
Caul. dichotom. Fol. lanceol. dentata.
- d. *discoidea*. Fructu 12-dent: hypocrater. acuminibus 12, re-  
trorsum uncinat. *Moris. hist. 3. f. 7. tab. 16.*  
f. 29.
- e. *dentata*. Semin. corona 3-dent.  
Caul. dichotom. Fol. oblon. subserrata. *Mon-  
strosa evadit.*
- f. *radiata*. Involucro fl. cingente.
- g. *pumila*. Caul. dichotom. fol. imis dentat: summis lineari-  
bus multifid.  
Phu &c. *Lob. ic. 716.*  
*In Europa ☉.*
17. *mixta*. V. fl. triandris: caul. 4-fid. fol. imis 2-pinnati-  
fid: sem. pappo plumoso. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Monspelt.*  
Sæpe 4. rami oriuntur a radice absq. caul. Sem.  
umbilic. hirsutum.
18. *echinata*. V. fl. triandris, regularibus: fol. dentat. fruct.  
linear. 3-dent. eximo mar: recurvato. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Colum. ecphr. tab. 204. f. 206.*  
*In Italia, & Monspelt ☉.*  
Caul. dichotom. Fol. sessil. lanceolata, obtusa,  
Fl. e dichotomia solitar. sessil. Cor. 5-fid. al-  
ba. Summi fl. in spicas dichotomas, coalu-  
natas, obtusas.
19. *supina*. V. fl. tetrandris: involucl. 6-phyl. 3-fl. fol.  
integris. *Syst. veg. ed. 14. Arduua. sp. 2. tab.*  
*3. Barr. rar. tab. 868. sed maior.*  
*In alpinis Italicis, Carinthiæ ☿.*  
Radix repens, odore V. *celticæ*. Caul. pollic.  
vix Bellide ma. Fol. subhirsuta, limbo cilia-  
to: radical. petiolata, obovat. integer: caulina  
sessil. lanceol. Corymb. terminal. e pedunc. op-  
positis. Cor. purp. vel alba.
20. *fibrica*. V. fl. tetrandris, æqualibus: fol. pinnatifid. sem.  
paleæ ovali adnatis. *Syst. veg. ed. 14. Amm.*  
*Ruth. tab. 3. Comm. gott. 1751. tab. 9.*  
b. Anonimus &c. *Pluk. alm. tab. 443. f. 1.*  
*Videtur potius sp. differens.*  
*In Sibiria campis ☉.*  
Radix lignosa, fusca. Caul. ped-cubit. teres,

glaber, plerumq. rubens. Fol. radical. quandoque pinnat-dentata, margine ferrata, raro ovata: caulina sessil. lanceol.; impari pinnatifido, supra satore virid. subtus pallidiora. Ex summis alis ramuli foliosi, hirsuti. Cor. flava.

21. *villosa*. V. fl. tetrandris, æqualibus: fol. inferior. auriculat. superior. dentat. villosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. fig. 6.*

*In Japonia.*

*Planta tota dense hirsuta. Radix fibrosa. Caul. erect. ped. simpl. Fol. radical. aggregata, palmar. petiolat. ovat. auriculato-lyrata, lobo terminal. ovat. maximo, 2. poll. longo, 1. poll. lato, inæqualiter inciso-ferrato. Caulina semipoll. opposita, sessil. ovata, acuta, inciso-sublyrata, dentata. Petioli in folium sensum dilatati. Fl. axil. & terminal. paniculat. trichotom. bracteati. Cor. subretata, flava. Differt a V. sibirica, hirsutie totius plantæ, & fol. ovatis.*

- angustifolia*. V. *All. Fl. Pedem. Bauh. hist. 3. p. 211.*

*In vallibus & locis lapideis.*

*Differt a V. rubra fol. angustissimis.*

- saliunca*. V. *All. Fl. Ped. tab. 70. f. 1.*

*Lugl. p. 982.*

*In editis alpium iugis.*

Rad. crassa, sublignosa, sapore acri, valde aromatico. Fol. rosulæ ad terram. Fol. lingulata, ovata, aut elliptica, firmula, glabra. Caulic. 3-4. unc. uno, aut altero pari folior. quæ interdum tridentata. Cor. infundibulif. subringens, odore Heliotropii Mexicani.

35. *OLAX*. Cal. integerr. Cor. infundibulif. 3-fida: Nectar. 4-phylo.

1. *Zeylanica*. O. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Zeylona h.*

Arb. ramis flaccis, rugosis. Fol. alterna, petiolat. ovata, glabra, avenia. Pedunc. axill. breviss. subramosi.

56. *TAMA-RINDUS*. Cal. 4-part. Pet. 3. Nect. fetis 2. brevibus sub filamentis. Legum. pulposum.

1. *indica*. T. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Am. tab. 10. & 179. f. 98. ed. picta tab. 13. Black. tab. 201. 221. Rumph. amb. 2. tab. 23.*

Balam-pulli. *Rheed. mal.* 1. tab. 23.

In India, America, Ægypto, Arabia h.

Arb. vasta, coma ampla, densa, ramis numerosis. Fol. 5-pollic. alterna, pinnata: foliola parva, opposita, oblonga, obtusa cum exiguo acumine, integerr. glabra. Racemi simpl. penduli, sub 12-fl. Cor. lutea, cum venis rubris, odora. Legum. oblong. crassum, maturum ferrugineum, Sem. numero varia.

57. RUMPHIA. Cal. 3-fid. Pet. 3. Drupa 3-locul.

1. *amboinensis*. R. *Syst. veg. ed.* 14.

Tiem-tani. *Rheed. mal.* 4. tab. 11.

In India h.

Arb. vasta, Fol. inordinata, petiolata, e rotundo-acumin. serrata, & horrentia, aspera, hirsuta, nervosa, venosa, supra atro-virid. subtus vividiora, odore aromatico. Fl. racemosi, longe peduncul. Pet. oblon-rotunda, reflexa, candida. Drupa pyriform. umbilicata, cortice viridi, spinulosa. Caro odorata, amara.

58. CNEORUM. Cal. 3-dent. Pet. 3. æqualia. Bacca 3-coeca.

1. *triccoccum*. C. *Syst. veg. ed.* 14.

Camelea. *Matth.*

In Hispania, Narbona, &c. glareosis h.

Frutex humilis. Fol. sessil. oblong. angusta, integerr. Pedunc. solitar. 1-fl. Cor. lutea. Bacca rubra, dein fusca.

59. COMO-CLADIA. Cal. 3-part. Cor. 3-part. Drupa oblong. nucleo 2-lobo.

1. *integrifolia*. C. foliol. integris. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. am. pið.* 12.

Prunus &c. *Sloan. Jam.* 2. tab. 222. f. 1.

In America calidiore h.

Arb. 20-ped. ramis paucis. Fol. ad apicem pinnata, glabra. Pinnæ plerumq. 8-iugæ, cum impari, 4-pollic. petiolat. ovato-lanceol. integerr. lateralibus revolutis. Racemi axill. penduli, ramosi, laxi, sesquiped. Fl. exigui, sessil. fature rubentes. Drupa rubra, nitida. Succus aqueus, dein niger.

2. *dentata*. C. foliol. spinoso-dentatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. am. tab.* 173. f. 4. *ed.* 2. *piða tab.* 259. f. 2. *quoad folium.*

In America.

Arb. similis priori, odore stercoreis. Succus niger

vix eluendus. Fol. pinnata cum impari: pinnarum iuga 6-10. oblong-acumin. subtridentosa. *Arboris umbra subtus dormienti læthalis.*

60. WILLICHIA. Cal. 4-fid. Cor. 4-fid. Caps. 2-locul. polysperma.

1. repens. W. Syst. veg. ed. 14.  
In Mexico ☉.

Radix fibrosa. Caul. repens, herbac. sub 2-ped. filifor. ramosus, hirsutus. Fol. alterna, petiolat. remotiuscula, orbicul. subpelt. crenata, hirsuta, subtus rubescent. pollic. Petioli longiss. crassi, hirsuti. Pedunc. axillar. gemini, filiform. hirsuti, 1-fl. longitudine petiol. Fl. parvi, rosei, cal. hirsuto.

61. MELO-THRIA. Cal. 5-fid. Cor. campanulata, 1-pet. Bacca 3-locul. polysperma.

1. pendula. M. Syst. veg. ed. 14.

Cucumis &c. Pluk. alm. tab. 85. f. 5. Sloan. 1. tab. 142. f. 1.

Bryonia &c. Plum. sp. ic. 66. f. 2.

In Canada, Virginia, Jamaica ☉.

Caul. 2-ped. debilis, angulat. striatus, lævis. Fol. magnitudine 2. pollic. transversorum, petiolat. cordata, palmato-5. angulata, scabra. Cirrhus axillar. solitar. longus. Pedunc. axill. filiform. laxi, 1-fl. Cor. lutea. Fruct. Olivæfor. pendulus, tuberculatus, niger. Mire variat.

Vidi 2-fl. masculos præter hermaphroditos, semel.

62. ROTALA. Cal. 3-dent. Cor. o. Caps. 3-loc. polysperma.

1. verticillaris. R. fol. verticillatis. Syst. veg. ed. 14.

Enapæl. Rheed. mal. 9. tab. 81.

In India Orient. ☉.

Radix simpl. repens. Caul. ascendens, palmar. articul. teres, lævis. Rami simplic. stricti, infer. oppositi, super. alterni, rariores; articulis inferne teretibus, superne sub-4 gonis. Fol. quaterna (raro in ramis 5-8.) sessil. linearia, acutiusc., lævia, subcarinata, patentia. Fl. quaterni, (ex singulis fol. alis singuli) minuti, sessil. Verticilli remoti. Cal. totam caps. obvestiens, tenuissime membranac. Fruct. magnitudine sem. Sinapios.

63. ORTEGIA. Cal. 5-phyll. Cor. o. Caps. 1-loc. 3-valv. polysper. Sem. plurima.

1. *hispanica*. O. caul. simpl. fl. subverticillatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Juncaria. Clus. hist. 174.*

*In Castilia, Bæica, Salmantica.*

Caul. erect. spūham. articulat. 4-gon. striatus, scabriuscul. Fol. semiunc. opposita, sessil. linearia, vel lanceol-linear. acuta, erecta, scabriusc. Fl. corymbosi, conferti, sessil. albi.

2. *dichotoma*. O. caul. dichotomo: fl. axillar. solitariis. *Syst. veg. ed. 14. Allion. alig. tab. 4. f. 1.*

*Prope Javentum in saxosis 24.*

Caul. erect. rigens, scabriusc. utrimq. canalicatus, genicul. incrassatis. Fol. opposita, linear. patentia, dorso minime glabra. Stipulæ 2. utrimq. inter fol. oppositiones, minutæ, setaceæ, basi crassiuscula colorata. Rami alterni. Panic. terminal. *Adfinis maxime Polycarpo.*

64. LÆFLIN-GIA. Cel. 4-phyll. Cor. 5-pet. minima. Caps. 1-loc. 3-valv.

1. *hispanica*. L. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Stock. 1758. tab. 1. f. 1. Læfl. it. tab. 1. f. 2.*

*In Hispania colibus apricis.*

Habitus Scleranthi. Radix tortuosa. Caul. subprocumb. digital. articulatus. Fol. minima, opposita, mucronata: infer. lineari-acuta, ad basin denticulo acuto; super. subulato-trident. Rami prostrati, alterni, pubescent. viscid. Fl. axillar. sessil. in spicis lateralibus, alternis conferti, imbricati. Bract. parvæ, imbric. subulatæ, 3-dent. Cor. pallida.

65. POLYCHNEMUM. Calyc. fol. 5. inæqual. lanceol. petaliformia. Sem. 1. subnudum, lenticulatum, involucri sericeo inclusum.

1. *arvense*. P. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 365.*

*In Italia, Gallia, Germania arvis ☉.*

Planta procumb. vel erecta, glabra. Caulic. a 2. unc. ad sesquiped. longi, toti foliosi, quandoq. purpurasc. Fol. sparsa, sessil. subulata (sicuti stipulæ) supra plana, subtus teretia, arista alba terminata. Fl. axill. parvi, solitar. sessil. Cal. albidus.

---

*sclerospermum*. P. *Pallas it. 3. tab. M. f. 2. &c.*

*In Dauria.*

Planta glauca, succulenta. Caul. digit-dodrant.

rami, præter duos infimos, alterni. Fol. teretia, spinula mucronata: radical. 2. opposita; reliqua alterna. Fl. axill. solitar. inter 2. foliola subulato-mucronata.

*morandrum*. P. Pallas it. 1. tab. D. f. 1.

*In Dauuria* 24.

Caul. pl. recti, fere ab imo ad summum toti ramulis subflexuosis, floriferis confertim obfisti. Fol. linear. acuta, tomentosa, exsucca. Fl. alterni, dispositi inter foliol. vaginale. Stam. constanter 1.

*triandrum*. P. Pallas it. 1. tab. D. f. 2. & tab. E. f. 1.

*In Dauuria* 24.

Planta sæpe cubital. diffusior, ramosiss. in siccis vix spithum, hispidior, & fl. fol. magis confertis. Fol. alterna, elongata, filiformi-atrenuata, succulenta, tomento-glaucæ, basi vaginant. Cor. 3 glum. flam. 2-3.

*oppositifolium*. P. Pallas it. 1. tab. E. f. 2.

*In Dauuria* 24.

In paludibus falsis sæpe subcubital. ramosior, vel subsimplex. Caul. erecti, geniculati, pallidi. Fol. ad genicula vaginant: infer. opposita; super. & ramea alterna, semicylindrico-attenuata, apice in cuneum compressa, carnosa, tomentoso-glaucescen. Rami axill. subfastigiati, flexuosi. Fl. alterne spicati, minuti, Graminei, intra foliol. vaginale sessiles. Cor. 2-glum. flam. semper 3.

66. HIPPOCRATEA. Cal. 5-part. Pet. 5. Caps. 3. obcordatæ.

1. *volubilis*. H. Syss. veg. ed. 14.

H. scandens. Jacq. amer. tab. 9. ed. piñ. tab. 12.

Coa &c. Plum. gen. ic. 83.

*In America australi* h.

Arb. ramis longiss. scandentibus. Rami foliosi, & floriferi. Fol. opposita, petiolat. interdum semipedal. ovat-lanc. nitida, pingua, denticulis subtilibus. Corymb. axill. raro terminal. oppositi, ramosi, ampli. Fl. exigui, e luteo-virent. Caps. fuscae, glabræ. Sem. fusca.

67. CROCUS. Cor. 6-fida: lacinae 3. min. quæ filamentum ungui adnexum non habent, ad basin gerunt barbulam, pl. pilis compositam. Barbula hæc in reliquis limbi laciniis desideratur. Stigmata convoluta. Cap. subrotunda.

- 1. fativus.** C. spatha radicali, 1-valv. cor. tubo longiss. *Syst. veg. ed. 14.*  
**officinalis.** a autumnalis, fol. angustioribus margine revolutis. *Black. tab. 144. f. 1. Moris. hist. 2. f. 4. tab. 2. f. 1.*  
**vernus.** b. vernalis, fol. latioribus, margine patulo. *Jacq. Austr. 3. tab. 36. Black. tab. 144. f. 2. Kniph. orig. cent. 1. tab. 21.*

*In alpinis Helveticis, Pyrenæis &c. 24.*

Bulbi alii aliis impositi, orbiculati, e quibus fol. exeunt Graminea, bina-terna. Cor. expansa, mire varians col., albo, ex purpura rubente, cœrul. luteo &c.

C. *fativus* a spontaneo diversus tuba profunde 3-fida, in 3. longa segmenta divisa, quorum finis æque 3-fid. est, uti tota tuba spontanea verni croci. Dein ea tria tubæ cornua odorata sunt, & aromatica; non ita spontanei; & in officinas Croci nomine recipiuntur: unde species diversa.

**68. WITSENIA.** Cor. cylindr. 6-part. Stigm. emarginatum.

**1. maura.** W. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Thumb. Diff. nov. gen. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 17.*

*Antholyza maura. Syst. veg. ed. 13.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Caul. 2-ped. anceps, tectus vaginis folior. Fol. ensiformia, alterna, adproximata, angusta, striata; super. caule longiora, vaginis imbricatis. Spica composita e spicul. alternis, imbricat.: spathulis laxis, scariosis, lanceol. sub 2-fl. Cor. tubo atro; limbo luteo; lacin. 3. exterior. extus tomentosis. Stam. alba.

**69. IXIA.** Cor. 1-petala, tubulosa; tubo recto, filiformi; limbo 6-part. campanulato, æquali, patente. Stigm. 3. simplicia.

\* caule, ramisq. foliosis.

**1. fruticosa.** I. caule ramoso; fol. imbricatis tecto. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. de Ixia.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. semiped. fruticos. fuscescens, cicatricibus transversis. Fol. in apice ramorum, pollicor. similia Sisyrrinchio, ensiform. equitantia. Fl. terminal. sessil. cœrul.

\*\* scape



\*\* *scapo foliis breviorē.*

2. *minuta*. I. scapis 1-fl. fol. lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*

*Ad cap. b. Spei.*

*Plantula pusilla.*

3. *Bulbocodium*. I. scapo ramoso; fl. solitariis: fol. fulcatis, reflexis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*

I. rosea. *Syst. veg. cl. 13. videtur huc convenire.*

*Sisyrinchium &c. Col. ceph. 2. tab. 7. f. 1.*

*Romulea Maratti.*

*In alpinis Italicis 24.*

Planta parva. Fol. subulata. Spatha 2-valv. glumiform. longitudine fere cor. cœrul. fundo flavo.

4. *humilis*. I. scapo ramoso: fl. secundis: fol. fulcatis, erectis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*

\*\*\* *scapo fol. longiore.*

*a. hirsutæ.*

5. *pilosa*. I. scapo simpl.: fol. linearibus pilosis: fl. alternis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*

*Ad cap. b. Spei.*

6. *hirta*. I. fol. ensiformibus hirtis: fl. secundis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*

7. *secunda*. I. fol. elliptico-ensiformibus, scapo villoso-scabro. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*

An I. scularis. *Syst. veg. ed. 13.*

I. secunda. *Berg. Fl. cap.*

*Ad cap. b. Spei.*

Radix bullosa. Caul. dodrant. erectus, teres, a flore ad florem valde arcuatus. Fol. vix spitham. alterna, vaginant. erecta, lineari-ensiform. Fl. spicæ sub 3. laxæ, cernuæ, flexuosæ. Fl. 5-6. remoti, sessil. secundi. Cor. fauce purpurasc. limbo saturo cœrul.

*b. glabræ.*

*a. fol. crispis.*

8. *crispa*. I. fol. linearibus crispis: fl. alternis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*

*Ad cap. b. Spei.*

Fol. longitudine vix digiti, radicalia. Scap. erect. spitham-filiform. spicatus. Fl. distantes. Gluma, e qua flos exit, hyalina. Tubus filiform. Limbus lacin. obovat. oblong.

*Tom. I.*

G

9. *cinnamomea*. I. fol. lanceol. crispis: fl. alternis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Spica secunda. Fl. odore Cinnamomi.
10. *corymbosa*. I. fol. lanceol. crispis: scapo ancipiti. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Caul. femiped. vagina membranacea cinctus. Fol. 1-2. verticalia. Fl. corymbosi, cœrul. cal. 2-valv. instructi. Germen inter cor. & spatham. b. foliis aequalibus.
11. *linearis*. I. scapo simpl. erecto: fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Fol. convexa, striata.
12. *capillaris*. I. scapo polytachio: fol. linearibus, spathis scariosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Fol. erecta. Scap. multifi. peduncul. erectis.
13. *setacea*. I. scapo flexuoso, glabro: fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*
14. *scillaris*. I. fol. linearibus: fl. secundis; rachide flexuosa. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*
15. *aristata*. I. fol. linearibus, spath. aristato-dentatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*
16. *pendula*. I. scapo polytachio: fol. lineari-ensiformibus: spicis pendulis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*
17. *bulbifera*. I. fol. ensiformibus, spathis membranac. setaceo-lucris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*  
*Mill. ic. tch. 2. 6. f. 2.*  
*Ad cap. b. Spei 24.*  
 Radix bulbosa. Scap. ped. simpl. Fol. 2-3. alterna, angusta, linea laterali elevata. Fl. 2-3. Cor. campanul. fl. vescenti-albida, fundo flavo.
18. *trieda*. I. fol. ensiformibus, scap. polytachio: fl. alternis, immaculatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit. Mill. ic. 155. f. 2. bona.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Radix bulbosa. Fol. 4-6. radicalia, angusta, lævia, interiora caulem arcte involventia. Spicæ multifloræ, præter terminalem, etiam nonnullæ inferius, alternæ. Fl. distantes. Cor. infundibulif. lacin. patentibus, ovat-lanceol. obtusis, niveis punctis adspersa. Filam. & pistil. violac.

19. *maculata*. I. fol. ensiform. scapo polyſtachio: fl. alternis; cor. baſi maculatis. *Syſt. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit. Mill. ic. tab. 156. f. 1.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Spica rartior fl. ſeſſilibus. Petala ſublan-  
ceol. flava, baſi interiore nigricant. Stam. & piſtil.  
flava. *Statura I. bulbiferæ.*

20. *crocata*. I. fol. ensiformibus: fl. ſecundis: cor. baſi hya-  
lino-ſeneſtratis. *Syſt. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit. Lin. fil. Dec. 13. tab. 7. Mill. ic. tab. 239. f. 2.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Radix bulbosa. Scap. pedal. erect. ſimpl. fufcus,  
ſuperne nudus, inferne ſubluteſcens, fol. in-  
volutus. Fol. 4-5. radical. vaginant. erecta,  
longitudinaliter nervoſo-ſtriata. Vaginæ longæ.  
Spicæ ſæpe 2. Fl. rari.

21. *lancea*. I. fol. ensiformibus, ſcap. ſimpl. flexuoſo: fl. ſe-  
cundis. *Syſt. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*

22. *pentandra*. I. fol. ensiformibus, fl. pentandris. *Syſt. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit.*

An *Ixia Scillaris* Lin. *ſp. pl.?*

*Ad cap. b. Spei.*

23. *falcata*. I. fol. ensiformibus, reflexo-falcatis. *Syſt. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit. eum. ic.*

*Ad cap. b. Spei.*

24. *excisa*. I. fol. ovatis: ſcapo flexuoſo: fl. ſecundis. *Syſt. veg. ed. 14. Thumb. loc. cit. cum ic.*

*Ad cap. b. Spei.*

Radix bulbosa. Scap. digital. ſimpl. ſæpe etiam  
altero ramo, filiform. Fol. oblong. lato-lan-  
ceol. lævia, latere interiore exciſa. Fl. al-  
terni, ſeſſiles. Glumæ breviff. ovatæ. Cor.  
tubus filiform. limbus violac.

- longiflora*. I. polyſtachia; tubis cor. filiform. longiff. nu-  
tantibus. *Berg. Fl. cap.*

*Ad cap. b. Spei.*

Radix bulbosa. Scap. ſpitham. erect. teres, læ-  
vis, ſubluteſc. ramosus, ſuperne nudus. Fol.  
ſub 6. triſpitham. radical. erecta, lineari-enſi-  
form. longitudinaliter ſtriato-nervoſa, glabra,  
virid-luteſcent. Fl. ſpicæ pl. fl. alternis, di-  
ſtantibus, nutantibus, huteis.

- inflexa*. I. caul. ad angulum inflexo: fl. erectis, ſecun-  
dis: ſpatha exter. calycina cor. fere longitu-  
dine. *De la Roche. Pl. nov. G ij*

*Ad cap. b. Spei.*

Bulbus simpl. squamatus. Scap. ped. simpl. inflexus ad spicam. Fol. lineari-ensiform. raris villis adperso, scapo breviora. Fl. spica horizontal. secunda, col. obscuro-subviolac-luteo. Spathæ marcescen. Pet. ovato-lanc.

*quadrangula*, I. bulbo squamato, squamis exterioribus maximis: scap. simpliciss. fol. canalicul-quadrangulis breviora, *De la Roche. Pl. nov.*

*Ad cap. b. Spei.*

Bulbi 2. alter alteri impositus. Scapus foliorum vaginis vestitus. Fol. pauca, vaginant. stricta. Fl. pauci, laxè spicati. Spathæ persistentes. Pet. ovata.

*imbricata*, I. bulbo squamis imbricatis testō: scapo erecto, ramoso: spatha exter. calycina tubi cor. longitudine. *De la Roche. Pl. nov.*

*Ad cap. b. Spei.*

Scap. dodrant. Fol. vaginant. linearia, scapo breviora. Fl. laxè spicati. Pet. 3. extus rubro col. tincta, omnia intus luteo-alba.

*Fabricii*, I. scap. dichotomo, ancipiti, dentato. *De la Roche. Pl. nov.*

*Ad cap. b. Spei.*

Scap. spirham. Fol. caulina opposita, vaginant. axillar. lineari-lanc. Fl. spicati, subviolac. Spathæ persistentes.

*Bulhocodionides*, I. scapo foliis breviora, ramis 1-fl. *De la Roche. Pl. nov.*

*Ad cap. b. Spei.*

Bulbus parvus. Scap. 3-4. pollic. ramosus. Fol. radical. nonnulla, linearia: caulinum unicum ad axillam rami; omnia scapo paulo longiora. Fl. solitar. magni, lutei. Spathæ persistentes.

*thyrsiflora*, I. scapo polystachio: spicis alternis, cauli adproximatis: germinibus intra spathas pedunculatis. *De la Roche. Pl. nov.*

*Ad cap. b. Spei.*

*monanthos*, I. scapo 1-fl. fol. lanceol-linearibus longiore. *De la Roche. Pl. nov.*

*Ad cap. b. Spei.*

Scap. dodrantal. erect. simpl. inferne articulatus. Fol. radicalia lineari-lanc. caulina vaginant. ad articulos. Flos unicus, terminal. luteus. Pet. in medio macula nigricante notata. Spathæ laceræ, marcescentes.

- latifolia*. 1. scapo erecto, simpl. fol. ensiformibus. *De la Roche. Pl. nov.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Scapus ped. & ultra. Fol. vaginantia, nervosa, scapo paulo breviora. Fl. spicati, cœruleo-purpureasc. Spathæ marcescent. pellucidæ. Cor. laciniz ovatz.
- monadelphæ*. 1. filamentis staminum coalitis: scapo ramoso: fol. lineari-ensiformibus. *De la Roche. Pl. nov.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Scap. ped. erect. Fol. vaginant. scap. breviora. Fl. laxè spicati, cœruleo-purpureasc. Spathæ coloratz, marcescentes. Cor. laciniz ovato-lanceol.
- grandiflora*. 1. scapo simpliciss. fol. lanceol-linearibus: fl. distichis. *De la Roche. Pl. nov.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Scapus dodrant. Fol. caule breviora. Fl. terminal. magni, satore violac. Spathæ marcescentes. Cor. laciniz lineares, ad apicem dilatatz.
- flabellifolia*. 1. fol. flabelliformibus: cor. tubo spathis calycinis duplo longiore. *De la Roche. Pl. nov.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Scapus ped. ramosus. Fol. radicalia sub 7. lineari-ensiformia, margine exteriore vaginantia: caulina 2. vaginantia, spathæform. axillar. marcida. Fl. spicæ secundæ. Cor. albido-cœrulesc.
- Iridifolia*. 1. fol. flabelliformibus: genitalibus declinatis. *De la Roche. Pl. nov.*  
 1. *crocata. Syst. veg. ed. 14.*  
*Ad cap. b. Spei.*
- paniculata*. 1. caule paniculato: tubo fl. longiss. arcuato: *De la Roche. Pl. nov. tab. 1.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Scap. 2-3. ped. divisionibus alternis, remotis, patentibus. Fol. tantum radical. vaginant. ensiform. striata. Fl. laxè spicati, alterni, flavi. Spathæ membranac. siccz. Cor. laciniz lineares, obtusæ, leviter emarginatz: alterne latiores, apice recurvæ: superior. 3. leviter approximatz.
- americana*. 1. fol. ensiformibus, plicatis, glabris: caule ræ

moso. *Aubl. Guian. Burm. Amer. tab. 46. f. 2.*

*In America 24.*

Radix bulbosa, tunicata. Fol. petiolat. striata, nervosa, longitudinaliter secundum nervos plicata.

70. GLADIO. Cor. 6-part. ringens, petalis 3 superioribus convergentibus. Stam. adscendentia. Tuba 3-fida.

LUS. 1. *communis*. G. fol. ensiformibus, fl. distantibus. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 24. Knorr. del. Hort. 1. tab. A. S.*

*In Europa australi 24.*

Bulbi alii alios impositi. Caul. pedal. & ultra, anceps, foliosus. Spatha inferior sæpius cor. longior. Fl. unilateral. 4-5. purpur. vel albi. Cor. laciniz inferior. lanceol. cum maculis albis.

2. *imbricatus*. G. fol. ensiformibus: fl. imbricatis. *Syst. veg. ed. 14. In Russia citeriore 24.*

Fl. parvi, versus unum latus imbricati.

3. *ulatus*. G. fol. ensiformibus: petalis lateralibus latissimis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Sisyrinchium &c. Pluk. phyt. 224. f. 8.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Caul. spirham. inter fl. flexuosus. Fol. obtusiusc. striata, lævia: floralia distiche digesta.

4. *plicatus*. G. fol. ensiformibus, plicatis, villosis: scapo laterali: cor. regularibus.

*Ixia &c. Mill. ic. 155. f. 1.*

*Sisyrinchium &c. Breyn prod. 3. tab. 9. f. 2.*

*In Æthiopia 24.*

Bulbus tunicatus. Scap. 2-3 fl. Bract. ternæ, angustæ. Petal. violac-alba.

5. *tristis*. G. fol. lineari-cruciatis: cor. campanulatis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 235. f. 1. Breyn. prod. 3. tab. 7. f. 1. Trew. chret. tab. 19.*

*In Æthiopia 24.*

Fol. singularia, subensiform. sed utroq. latere carinata, carina elevata, obtuss. ut fere quadrangulo-cruciata. *Var. a caule 2-fl. ad multiss. & tum fol. rite ensiformibus.* Cor. col. tristi, sed æstivatione omnino Gladioli; petalo supremo intra lateralibus proxima.

6. *undulatus*. G. fol. ensiformibus: petal. subæqual. lanceol. undulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Æthiopia 24.*

Statura G. communis. Culm. sesquipedal. Fol. striata. Fl. distiche alterni. Spathæ propriæ 2 phyll. valvula interiore min. Cor. tubus longus, filiform. limb. 6-part. Petala in formam Lili digressa, alternis imprimis undulatis. *Media inter Ixias, & Gladiolos.*

7. *recurvus*. G. fol. ensiformibus: petal. subæqualibus, linceol. recurvatis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 235. f. 2.*

*Ad cap. b. Spei.*

Differt a priore, petal. non undulatis, minusq. acuminatis; & tubo cor. non filiformi, laxo, aut pendulo: cæterum adfinis.

8. *spicatus*. G. fol. linearibus caul. simpliciss. fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Africa 24.*

9. *aloppecuroides*. G. fol. linearibus: spica disticha, imbricata. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Æthiopia.*

Caul. ped. vestitus foliorum vaginis ancipitibus, latiusculis, nervosis, in folium lineare; acutum terminatis. Spathæ ovatæ, duplicatæ. Spica ut in Plantagine, obrecta fl. parvis, numerosiss. sed disticha.

10. *angustus*. G. fol. linearibus: fl. distantibus; cor. tubo limbis longiore. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 142. f. 2. Hort. Cliff. tab. 6.*

*In Africa 24.*

Caul. simplex. Fl. alterni, carnei, macula rhombæi purpurea præditi.

11. *ramosus*. G. caul. ramoso: fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Africa 24.*

12. *capitatus*. G. caul. ramoso: capitul. pedunculat. rad. tuberosa. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Africa 24.*

Planta maxima. Fl. cœrul.

13. *crispus*. G. fol. lanceol. crenatis, undulatis: fl. secundis; spicis duabus tubo filiformi, longo. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Differt omnino ab *Ixia crispa* in pluribus. Caul. 2-pedal. uno, alterove fol. instructus, crenato, undulato. Fol. longa.

14. *iunceus*. G. fol. lato-lanceol. culmo ramofo: fl. secundis, stylo 6-part. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Culm. palmar. filiform. lævis, uno, alterove ramulo patulo. Fol. culmo dimidio breviora, lævia. Fl. alterni, sessil. Glumæ ovatæ, integræ. Cor. violac. tubo filiform. limbo longiore.

15. *anceps*. G. fol. ensiformibus, undulatis: caule ramofo, ancipiti, divaricato. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Fol. caule breviora, in caulem decurrentia, striata, carina crispa. Fl. ad apices ramorum, alterni. Spathæ obtusiss. ore purpureo. Cor. tubus limbo ter, quater longior.

*Adfinis Ixiæ corynboſæ; similis caule angulato, sed differt ab illa, & a palmari tubis cor. longis, filiformibus.*

16. *gramineus*. G. peral. lanceolat. setaceo-acuminat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. plusquam pedal. teres, lævis, ramis aliquot floriferis. Fol. graminea, longitudine fere caulis, lævia, luxa, nervosa. Fl. terminal. Spathæ ovatæ, acuminatæ. Cor. parva, absque tubo, 6-part. albida, fundo violac.

17. *marginatus*. G. fol. cartilagineo-marginatis, glabris, multinerviis: spica elongata; fl. alternis nutantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. crassitie pennæ anserinæ. Fol. pedalia, gladiiform. marginibus triplo crassioribus. Spica leviter a flore ad florem flexuosa. Spathæ distantes. Bractæ sæpe apice laceratæ. Cor. tubus spathis duplo longior. Limbi lacinia subæqual. oblong. ellipticæ, purpur.

18. *montanus*. G. fol. ensiformibus, nervosis, glabris: fl. spicatis; cor. ringente. *Syst. v-g. ed. 14. Pluk. phyt. 24. f. 8.*

*Ad cap. b. Spei.*

Bubus cortice fibroso. Fol. radical. linearia, angusta, lineæ latitudine, longitudine fere scapi, lævia. Scapus teres. Spica oblong. fl. remotiusculis. Bractea propria, ovata, 2-valv. Cor. galea 3-part. lacinia media incurva; la-



terales divaricatæ, recurvatæ. Lab. 3-part.  
æquale.

19. *falcatus*. G. caule simpl.: fol. falcatis: fl. alternis; stylo  
3-fido. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Similis G. iuncea.

20. *flexuosus*. G. caule simpl. flexuoso: fol. linearibus: fl. spi-  
catis, ringentibus, tubo longo. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

21. *longiflorus*. G. caule tereti, tubo longiss.: spathis, foliisque  
linearibus, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

22. *tubiflorus*. G. caule tereti, tubo longiss.: spathis, foliisque  
hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

23. *spatha-*  
*ceus*. G. caule ramoso: fl. spicato-imbricat. spathis  
membranaceis, aristatis: fol. plicatis. *Syst.*

*veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

24. *latifolius*. G. caule ramoso. fol. infimo filifor. setaceo:  
cor. ringente. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

- permeabilis*. G. caule ramoso: fol. subulato-quadrangulis: fl.  
imbricat. secundis. *De la Roche. Pl. nov. tab. 2.*

*Ad cap. b. Spei.*

Bulbus sphaericus. Scapus sesquiped. divisus.  
Rami nudi florigeri. Fol. caulina vaginant.  
patentia, summa brevia, spathæform. Fl. ter-  
minal. spicis secundis, imbricatis. Cor. laci-  
niæ trapeziform. plicatæ, fimbriatæ, fauce  
inflato, permeabili. Color dilutiss. violac. ex  
purpura, luteoq. variegatus. Spathæ persisten-  
tes. *Ludis num flam. a 3-6.*

- involutus*. G. caule ramoso: fol. linearibus: spicis distichis.  
*De la Roche. Pl. nov. tab. 3. Mill. ic. tab.*  
*236. f. 1.*

*Ad cap. b. Spei.*

Bulbus compressus. Scap. sesquipedal. erectus,  
articulat. divisus. Fol. caulina vaginant. pa-  
tentia. Fl. rosei, sed laciniae lateral. lab. in-  
ferior. purpur. Cor. laciniarum extrema revo-  
luta. *Ludis in fructificationis partium numero.*

- carneus*. G. caule simpliciss.: petal. superior. divergentib.  
fol. ensiformibus. *De la Roche. Pl. nov. tab. 4.*

*Ad cap. b. Spei.*

Scap. pedal. simpl. rectus, articul. Fol. radical. pauca, vaginant. acumin. nervosa, caule breviora: caulina breviora, acumin. vaginant. Fl. laxe spicati, distichi, carnei.

71. **ANTHOLYZA**. Cor. tubulosa, irregul. recurvata. Caps. infera.

1. *ringens*. A. cor. labiis divaricatis, fauce compressa. *Syst. veg. ed. 14*

Gladiolus &c. *Comm. hort. 1. tab. 41. Rudb. elysf. 2. f. 15.*

Gladiolus &c. *Breyn. ic. tab. 8. f. 1.*

*In Æthiopia 24.*

Caul. sesquipedalis. hirsutus, purpur. Fol. radical. 6-7. bipalmar. semiunc. lata, breviter petiolat. erecta, sulcata. Pedunc. hirsuti. Cor. extus primum ex viridi-flava, dein pallide rubens; intus sanguinea.

2. *plicata*. A. fol. plicatis; caule ramoso, hirsuto; cor. ringente, staminibus brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Ad cap. 6. Spei.*

Differt a priore habitu, & præcipue quod organa generationis non adeo elongata, ut in illa.

3. *Cunonia*. A. cor. subpapilionaceis; labii lobis duobus externis latioribus, ascendentibus. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 113. Buttn. cun. tab. 1.*

*In Persia 24.*

Radix undique emittit fibras filiform. apice bulbiferas. Caul. pedal. spica longa, disticha. Cor. sæpe papilion. monopet. coccinea. Vexil. inter alas, cochleariforme, alis longius. Alæ 2. pares, laterales, ovatae, ascendentes. Car. minima, rudis, viridis, 3-fida, gibba, complicata instar nectarii sub cor.

4. *Æthiopica*. A. cor. incurvatis; labii 5-part. lobis 2. alternis, patulis, maioribus lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

Gladiolus &c. *Marif. hist. 2. f. 4. tab. 23. f. 1. Rudb. elysf. 2. f. 14.*

Hyacinthus &c. *Pluk. phyt. 195. f. 2.*

*In Æthiopia 24.*

Bulbus gustui acerrimus. Thyrsus ex nigro-purpureo. Cor. tubulosa, coccinea; lab. super. maximo, lanceol.

*Hæc cum priore Gladiolis valde adfinis.*

5. *Meriana*. A. cor. infundibul. fol. ensiformibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Watsonia* Mill. ic. tab. 276.

*Meriana*. Trew. chret. tab. 40.

*Ad cap. b. Spei* 24.

Cor. Polyanthis, supera, æstivatione Gladioli, fere regularis, dependens, rubra.

6. *Merianella*. A. cor. infundibulifor.: fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Watsonia* &c. Mill. ic. tab. 297. f. 2.

*Habitat.* . . . .

Radix bulbosa. Culmus sesquiped. teres, lævis.

Fol. alterna, 3-4. vaginanti striata, pubescentia, præter vaginas, brevia. Fl. 3. alterni, sessiles, secundi. Glumæ lanceol. 2-valv.

Cor. tubus incurvus, purpurasc. limbo longior. Limb. 6-part. æqual. laciniis ovat. acutiusc. flavis. Stam. adscendent. longitudine cor. Anth. linear. adscendent. Stylus filiform. Stigm. 3. filiform.

*Meriana differt facie, sed limites a Gladiolis, & Ixiis separantes non foccurrunt. Fl. in hac palide rubri, in priore ruberrimi.*

7. *Lucidor*. A. fol. radicalibus; basi filiformi, apice dilatato-fubulatis, sulcatis: caul. simpl. folioso spicato. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Radix bulbosa. Fol. basi quasi in longum petiolium angustata. Caul. sesquiped. teres. Fl. alterni, sessiles, elongati, parum incurvati, superne purpur. laciniis 6. inæqualibus. Spathæ 3-valv.

7. IRIS. Cor. 6-part. laciniis alternis, reflexis. Tubæ apex trifid. abit in 3. lacinias petaliform. tegentes stam. Caps. 3-locul. polysperma.

\* *Barbata* (quarum petala patentia pilis instruuntur.)  
a. fol. ensiformibus.

1. *ciliata*. I. barbata, fol. ensiformibus ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Folia undulata.

2. *minuta*. I. barbata, fol. ensiformibus, glabris; scapo 1-fl. petal. oblong. acutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

3. *pumila*. I. barbata, fol. ensiformibus, glabris: scapo 1-fl. petal. oblong. obrutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. I. tab. 1.*

- b. *I. angustifol. maritima*, min. *Bauh. pin.*  
 c. *Chamæiris fl. luteo*, & pallide luteo. *Bauh. pin.*  
 d. *Chamæiris saxatilis* &c. *Bauh. pin.*

*In Austria, Pannonia collibus apricis* 24.

Radix extus fuscesc. intus alba. Caul. plerumq. breviss. interdum fol. longior evadit. Fol. nunc fl. breviora, nunc longiora, acuta. Petala cœrul. purpur. per ætatem rubentia, alba, pallida, flavescent. variegata. Barba extus cœrul. intus alba, apicibus luteis.

4. *fustiana*. I. barbata, fol. ensiformibus glabris: scapo 1-fl. petal. rotundatis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr, del. hort. 1. tab. L. 6. Moris. hist. 2. f. 4. tab. 6. f. 6.*  
*In Oriente* 24.

Caul. teres. Fol. lata. Flos omnium specierum maximus, cum venis obscuris in campo cinereo discurrentibus. Petala 3. interiora ma. reflexa. Germ. 3-gono-teretiuse.

5. *florentina*. I. barbata, fol. ensiformibus, glabris, breviorib. scapo sub 2-fl. *Syst. veg. ed. 14. Knorr, del. hort. 1. tab. L. 7. Black. tab. 414.*

*In Europa australi* 24.

Simil. *I. Germanicæ*, sed radix candidior, & odoratior. Fol. glauciora. Cor. alba, petal. integris; inferioribus marginum basi reflexis; superioribus magis erectis. Stigm. magis erecta, & parum ferrata.

6. *biflora*. I. barbata, fol. ensiformibus, glabris, breviorib. scapo sub 3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Besl. syst verna. 114.*

*In Lusitania rupibus, & Sibiria* 24.

Caul. teres. Fol. extrorsum subfalcata. Germ. teres, exaratum 3. striis. Cor. violac. non emarginata. Petala erecta, barba alba, adiectis striis albis, ramosis. Floret bis quotannis

7. *aphylla*. I. barbata, fol. ensiformibus, glabris, æquantibus scapo multifloro, subnudo. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat. . . . .*

Cor. lutea, variegata.

8. *variegata*. I. barbata, fol. ensiformibus, glabris, æquantibus scapo multifl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Aust tab. 5. Knorr, del. hort. 1. tab. L. 2. Ehre pich. tab. 10. f. 3.*

*In Hungaria* 24.

Radix foris fusca, aut flavesc. intus albida. Cau

subflexuosus, subcompressus. Fol. pallide vi-  
rentia. Petala lutea, subodora; in reflexis  
venæ atro-purpur. Barba lutea.

9. *germanica*. I. barbata; fol. ensiformibus, glabris, falcatis,  
brevioribus: scapo multifl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Black. tab. 69. Ludw. ed. tab. 112.*

*In Germaniæ, Etruriæ, Helvetiæ &c. muris ve-*  
*tustis 24.*

Radix grandis, cylindrica. Caul. cubital. paucifl.  
Fol. pedal. disticha, plana. Spathæ albæ. Fl.  
magni, odori. Petala-extus ex livido col. in  
cinereum; intus violac. cum venis albis: in-  
fer. plana; interiora integerr.

10. *sambucina*. I. barbata, fol. ensiformibus, glabris, erectis,  
brevioribus: scapo multifloro, petal. deflexis,  
planis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 2.*

*In Europa australi 24.*

Simil. I. Germanicæ, sed deflexa petala satura-  
tius violac. plana, sed submargin. Erecta pal-  
lide, saturatius tamen, cœrul. & emarginata.  
Stigm. ferrata, acutiusc. carina cœrulesc.

11. *squallens*. I. barbata: fol. ensiformibus, glabris, erectis,  
brevioribus: scapo erecto, multifl. petal. defle-  
xis, replicatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europa australi 24.*

Simil. I. Germanicæ, sed petala deflexa, in medio  
replicata, saturatius violacea, venis albis flave-  
scent., & in medio cœrulescentib. Erecta petala,  
uti & stigmata squallide flava, valde emarginata.

12. *compressa*. I. barbata; fol. ensiformibus, glabris: scapo pa-  
niculato, compresso. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

13. *dichotoma*. I. barbata; fol. ensiformibus, glabris: caul. pani-  
culato, tereti. *Syst. veg. ed. 14. Pall. it. 3. tab.*  
*A. f. 2.*

*In Dauuria 24.*

Fol. radical. alterne vaginantis, disticha. Caul.  
e vagina fol. semiuln. & ultra, vix compres-  
sus, subflexuos., quandoq. dichotomus, foliolo  
uno, alterove axillari. Fl. ex spatha 2-phylla,  
2-3-raro 4 omnium conspecierum minimi, di-  
lute purpurasc. Pet. exter. paulo ma: villis vix  
conspicuis barbata, violac. albo-punctata: in-  
teriora erecta, saturatiora, extrema latiuscula,  
biloba.

*b. fol. linearibus.*

14. *tripetala*. I. barbata; fol. linear.: scapo 1. fl. petal. alternis, subulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. glaberrimus. Fol. radicale, unicum, canaliculatum.

15. *tricuspis*. I. barbata; fol. lineari, longiore scapo sub-2-fl. petalis alternis, 3-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

16. *plumaria*. I. barbata; fol. linearibus: scapo multifl. stigmatibus setaceo-multifidis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Moræa Iriopetala. Lin. suppl.*

*M. iuncea Syst. ed. 13.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Bulbus squamis latere connexis, basi distinctis, dentibus 10. compressis, totidemq. alternis brevioribus. Culmus ramis 3-4. Glumæ 2-valv. 2-fl. Fl. albid.

*M. vegeta Syst. ed. 13. ubi citatur Mill. ic. tab. 238. f. n. 11. Bulb. squamis basi connexis, 2-bd. depressis, non compressis. Gluma 2-valv. 2-fl. Fl. pl. quam duo, cærul.*

**\*\* Imberbes.**

a. *foliis ensiformibus.*

17. *Xiphium*. I. imberbis; fol. ensiformibus, canaliculato-subulatis, brevioribus: scapo sub 2. fl. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. hort. 1. tab. L. 9.*

*In Hispania, & Sibiria 24.*

Radix bulbosa. Fol. lata, margine connivente. Cor. plerumq. cæruleo-violac.

18. *pseudo-acorus*. I. imberbis; fol. ensiformibus: petalis alternis, stigmate minoribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Den. tab. 494. Knorr. del. hort. 1. tab. L. 8. Ludw. ed. tab. 101.*

*Acorus adulterinus. Black. tab. 261.*

*In Europa ad ripas fuffarum &c. 24.*

Caul. 4-ped. alterne reflexus, foliosus. Fol. longiora, & angustiora I. *Germanica*. Spatha 3-fl. Cor. lutea, cum lineis nigris. Pet. exter. utrimq. ad filamenta dentem exferunt. Germ. 3-gonum, angulis fulco 2-fid.

19. *sætida*. I. imberbis; fol. ensiformibus: scapo uniangulato. *Syst. veg. ed. 14.*

*Spatula &c. Black. tab. 188.*

*In Europa 24.*

Caul. teres, hinc angulatus, longitud. fol. obtusus

foliis foetidiss. Cor. cœrulescenti-tristis, ingratisf. col. nec noctu odora. Pet. exter. ungue subtus plicis rugoso: interiora stigmatē maiora, patentia. Germ. 3-gonum, angulis fulco 2-fid.

20. *virginica*. I. imberbis; fol. ensiformibus: scapo ancipiti. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia 24.*

Radix reptans. Fol. angusta. Cor. ex pallido-cœrul. & nigra variegata.

21. *versicolor*. I. imberb. fol. ensiformibus: scapo tereti, flexuoso: germinibus subtrigonis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. Elth. tab. 155. f. 187. Ehret. pict. tab. 6. f. 2.*

*In Virginia, Marilandia &c. 24.*

Fol. ad alterum latus inclinantia. Scap. fol. non altior, 2-3 fl. Cor. variegata. Pet. inter. longitudine stigmatum. Stigm. linearia.

22. *ochroleuca*. I. imberb. fol. ensiformibus: scapo subtereti: germinibus hexagonis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente 24.*

*Adfinis l. spuria, facie tamen dissimilis; at cor. non cœrulea; fol. magis striata; florescentia serior.*

Caul. ped. fere teres, ut vix manifeste compressus. Fol. alterna, 5-6, erecta, striata venis eminentibus, I. Germanica dimidio angustiora. Spathæ 4-fl. lanceol. acumin. Germ. oblong. profunde 6-angul. angulis obtusis. Pet. reflexa, basi dilatata, venis obscurioribus, limbo flavo, marginibus albis. Pet. erecta, longitudine exteriorum, nivea, basi venis flavescens. Stigm. nivea supra anth. ochroleucas.

23. *spathacea*. I. imberb. fol. ensiformibus, rigidis: scap. tereti, 2-fl. spathis longiss. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. de Iride.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

24. *ramosa*. I. imberb. fol. ensiformibus: caul. paniculato, multifl. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. de Iride.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

*b. fol. linearibus.*

25. *Sisyrinchium*. I. imberb. fol. linearibus, undulatis, reflexis: scapo 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 1. p. 216.*

*In Hispania, Lusitania 24.*

Scap. spitham. multifl. Pet. purpur. macula lutea loco barbæ. Radius ex gemino bulbo, altero alteri imposito, ut in Gladiolo, Croco.

26. *verna*. I. imberb. fol. linearibus, planis: scap. 1-fl. petal. alternis, æquantibus. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. Alm. tab. 196. f. 6.*

*In Virginia 24.*

Radix reptans, Cor. ex violac. & aureo variegata, vel alba, odora.

27. *persica*. I. imberb. fol. linearibus, planis: scap. 1-fl. petal. alternis brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. f. 9. Dodart. mem. 83. fig. bona.*

*In Persia 24.*

Bulbus exferit gemmam e duobus paribus squamarum, intra quæ fol. & flos unicus spatha simplici. Scap. parvus, carnosus, inferne albus, superne dilute cœrul. Fol. plerumq. utrimque 3. subulato-canaliculata, caule longiora.

28. *angusta*. I. imberb. fol. filiformi-lineari, erecto, glabro: scap. glabro, sub 1-fl. spathis obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. de Iride.*

29. *setacea*. I. imberb. fol. filiformi-lineari, erecto, glabro: scap. glabro 1-fl. spathis acutis, membranaceis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. de Iride tab. 1. Ad. cap. b. Spei.*

30. *tenuifolia*. I. imberb. fol. filiformi-linearibus: scap. 2-fl. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. de Iride. Pall. it. 3. tab. E. f. 2.*

*In Dauria 24.*

Fol. subfoliar. scap. multo longiora, crassiusc. utrimque convexa, striata. Scap. breviss. foliolo ensifer. vaginante. Cor. pollide cœrul. odore caryophylli. Petal. longa, angusta.

31. *graminea*. I. imberb. fol. linearibus: scap. sub 2-fl. ancipiti: germinibus hexagonis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 2.*

*In Austria, & Italia ad rad. montium 24.*

Radix extus nigra, intus alba. Caul. fol. duplo brevior, compressiss. bifol. ante anthesin procumbens. Folia quandoq. latiora. Petala odore Pruni: in reflexis inferior pars purpur: exterior albida, venis cœruleis; in erectis color violaceus.

32. *spuria*. I. imberb. fol. linearibus: scap. sub 2-fl. tereti: germinibus



germinibus hexagonis. *Syst. veg. ed. 14. Fl.*

*Dan. tab. 734. Jacq. Austr. 1. tab. 4.*

*In Germania, Sibiria pratis 24.*

Radix nigricans. Caul. 2-3. ped. Fol. fontida.  
Fl. inodori. Cor. ex purpureo-cærul.

33. *sibirica*. I. imberb. fol. linearibus: scap. sub 2-fl. tereti:  
germinibus trigonis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.*  
*Austr. 1. tab. 3.*

*In Helvetia, Germania &c. 24.*

Radix cespitosa. Caul. 3-ped. fol. altior. Spat-  
hæ aridæ, ut in I. verficolor. Petala ex  
purpureo-cærul. suaveolentia. In reflexis un-  
gues fuscescunt, transversim albescent, parte  
super. cyanaea: petala inter. erecta. Germ.  
non sulcatum.

34. *flexuosa*. I. imberb. fol. linearibus flexuosis: caul. 3-fl.  
tereti, crasso: germinibus 3-gonis. *Syst. veg.*  
*ed. 14. Murray Comm. Gutt. 1776. tab. 4.*

Similis priori. Cor. alba.

35. *martini-*  
*censis*. I. imberb. fol. linearibus: petal. basi foveolis  
glandulosis: germinibus trigonis. *Syst. v. g. ed.*  
*14. Jacq. Am. 7. tab. 7. ed. 2. picta tab. 10.*  
*Xiphion &c. Plum. ic. tab. 261. f. 1.*

*In Martinica 24.*

Caul. 2-pedal. simpl. vel bifariam divisus. Fol.  
parva, disticha. Fl. pauci, peduncul. flavi,  
inodori, a congeneribus in multis structura  
diversi.

36. *pavonia*. I. imberb. fol. lineari glabro: scap. sub. 1-fl. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Thumb. diff. de Iride tab. 1.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. subtoment. Cor. aurantiaca, macula ba-  
seos cærul.

37. *crispa*. I. imberb. fol. linearibus, crispis. *Syst. veg. ed.*  
*14. Thumb. diff. de Iride tab. 1.*

*Ad cap. b. Spei.*

Planta glabra.

38. *papilion-*  
*cea*. I. imberb. fol. linearibus, reflexis, hirtis. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Thumb. diff. de Iride tab. 2.*

*Ad cap. b. Spei.*

Planta parva.

39. *edulis*. I. imberb. fol. lineari, pendulo, glabro, multifi.  
*Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. de Iride.*

*Ad cap. b. Spei.*

*Tom. 1.*

H

Folium radicale scap. vaginans, longissimum.  
*Bulbus edulis Hottentottis.*

40. *tristis*. I. imberb. fol. linearibus, glabris: scapo hirsuto, ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. de Iride.*

*Ad cap. b. Spei.*

41. *polystachia*. I. imberb. fol. linearibus, planis: scap. glabro, ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. de Iride.*

*Ad cap. b. Spei.*

42. *viscaria*. I. imberb. fol. linearibus, planis: scapo viscoso. *Syst. veg. ed. Thumb. diff. de Iride.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. ramosus, bituminose olidus.

43. *bituminosa*. I. imberb. fol. linearibus, spiralibus: scap. viscoso. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. de Iride tab. 2.*

*Ad cap. b. Spei.*

Ram. sa, bituminosa, ut in priore. c. fol. tetragonis.

44. *tuberosa*. I. imberb. fol. tetragonis. *Syst. veg. ed. 14. Morris. tust. 3. f. 4. tab. 5. f. 1.*

*In Arabia, & Oriente 24.*

Radix tuberosa. Fol. canaliculata. Cor. obscure purpur. & nigra.

- ventricosa*. I. *Pall. it. 3. tab. B. f. 1.*

*In Dauria 24.*

Fol. pauca, caule longiora, angustiss. lineari-ensiform. Caul. dodrant. folio vaginante, latiusc. lanceol-ensiformi. Spatha ventricosa, 2-fl. Fl. tubo elong. elevati. Petal. imberb. oblongo-linear. pallide cœrul.

- kalophyla*. I. *Pall. it. 3. tab. B. f. 2.*

*In Dauria 24.*

*Differt a priore statura proceriore: caul. folios: spatha minus ventricosa: petal. latioribus, extimis apice dilatatis: stigma laciniis brevibus, latiuscul. obtusis.*

Fol. Pseudo-Acori, glaucescent. Scapi sæpe sesquiped. foliis longiores, foliosi, 3-fl. Spathæ magnæ, inflatæ, margine membranaceo. Fl. min mi. Petala imberbia, pallida.

- flavissima*. I. *Pall. it. 3. Gmel. Sibir. tab. 5. f. 2.*

*In Dauria 24.*

*Adfinis I. pumilæ: differt fol. angustioribus: scap.*

proceriore, tenuiore, longius inter 2. fol. exserto. Petala intense flava, venis fuscescentibus striata; exter. barba flavissima.

73. *MORÆA*. Cor. hexapet. Petala 3. interiora patentia: reliqua lreos.

1. *polyanthus*. M. caul. ramosiss. fol. subulatis, glabris: petalis alternis minoribus: stigmatibus bifidis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

2. *spathacea*. M. scap. tereti: fol. teretibus, dependentibus, longis: fl. aggregatis, capitatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Fol. & caul. omnium tenacissimi, filiform. glaberrimi. Spatha 2-phyll. cum capitulo fl. spathis minoribus subulatis obvallato. Cor. lutea. Stigm. 3.

3. *lugens*. M. caul. ancipiti, 1-2-fl. fol. ensiformibus, infimis subfalcatis: fl. terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Petala alterna; 3. exter. alba; 3. interiora nigra, min. Stig. multipart.

4. *spiralis*. M. caul. compresso, articulato, multiss. fol. ensiformibus, erectis: fl. axillaribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Cor. æqualis, extus albo-viresc. intus alba, per noctem spiralit. convolvitur. Stig. simpl. villosum.

5. *chinesis*. M. caul. compresso: fol. ensiformibus: panícula dichotoma, fl. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ixia Chinenfis. Syst. veg. ed. 13. Trew. chret. tab. 32. Ad. Petrop. 6. tab. 7. Rhced. Mal. 11. tab. 37.*

*In India 24.*

Caul. 2-pedal. Fl. crocei, maculati.

6. *aphylla*. M. scap. compresso, nudo, glaberrimo: spatha longiss. subulata: fl. capitatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Omnino aphylla. Fl. ut in Junco laterales. Cor. flava. Stigm. 3.

7. *g'adiata*. M. scap. compresso: spatharum squamis muticis; stylis 3. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ixia gladiata*. *Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Scap. longus, anceps, lævis. Fol. angusto-ensiform. longiss. lævia, subtiliter striata. Spicæ terminal. sæpe 3. imbricatæ, glumis amplectentibus, obtusiusc. muricis. Bractea ensiform. spici non longior. Cor. lutea, petal. exterior. exius rubris.

8. *filiformis*. M. scapo, totiusque filiformibus: fl. terminalibus, solitariis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Fl. cum spathis referunt fl. Dianthi. Cor. lutea. *Staug. 3.*

9. *flexuosa*. M. caul. tereti, articulato, ramofo: fol. planis, laxis, revolutis: spica flexuosa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ixia longifolia*. *Jacq. hort. 3. tab. 90.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. sub 2-pedal. flexuoso-recti, raro in horto ramofo. Fol. longiss. vaginant. Petala obl-acuta, pallide flavescent. Caps. oblong-acumin. fuscescens.

10. *africana*. M. fl. capitatis: spathis laceris. *Syst. veg. ed. 14. Ixia afric. Syst. veg. ed. 13. Burm. Afric. tab. 70. f. 2.*

*Ad cap. b. Spei.*

Caul. spitham. purpureus: Fol. radical. graminea, nervosa. Pedunc. axill. Spatha ex squamis hirtis. Fl. pl. parvi cœrul.

11. *vidioides*. M. fol. gladiatis. *Syst. veg. ed. 14. Giseck. ic. fasc. 1. tab. 3. Mill. ic. tab. 239. f. 1.*

*Iris &c. Till. p. f. tab. 33.*

*In Oriente, Constantinopoli 24.*

Caul. spitham. erectiusc. longitudine fol. Fol. disticha. Fl. ex alis supremis fol. 3. Spatha propria 2-valv. Germ. pedicellat. sub 3-gon. striata. Cor. hexapetala. Petal. 3. exter. ob-ovata, oblonga, patula, barbata, patentia, macula lutea in medio. Petala 3. interiora alba, immaculata, facie exteriorum, patenria. Styl. brevis, crassus. Stigm. 3. petaloidea, min. patentia, cœrulesc. 2-fida, ut in Iride. Stam. 3. albida sub stigmate. Caps. exterta, truncata.

*Differt ab Iride cor. tota patente; modo hæc suffi-*

TRIANDRIA MONOGYNIA. 117

12. *fugax*. M. fol. gramineis, tandem convolutis: stem. petaloideo: petal. imberbibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 20.*  
 Bulbus subrotund. Caul. unc-pedil. gracilis, ex latere bulbi aphylli. Fol. 2. sublinear. plana, supra nitida, subtus tenuiter striata, acuta, involuta, unum altero maius. Spathæ amplexantes, membranaceæ. Fl. pl. suaveolentes, Petala patentiss. acutiuscula, ex carneo-purpur. Caps. oblong.
74. DILA- Cal. o. Cor. 6-pet. hirsuta. Filamentum tertium  
 TRIS. reliquis minus. Stigma simpl.
1. *umbellata*. D. petalis ovatis corymbo fastigiato, hirsuto. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Wachendorfia umbellata. Syst. ed. 13.*  
*Dilatris Fl. Cap. 1. tab. 3. f. 5.*  
*In campis arenosis cap. b. Spei 24.*  
*Planta tota cana, villosiss. exceptis fl. interne.*  
 Radix fibrosa. Fol. radicalia, cyperina, erecta, lævia, stricta: caulina 1-2. lanceol. brevissima. Umbel. fastigiata, regularis. Involuc. universale hexaphyll. lanceol. breve. Radii peduncul. sub 6. bipartiti; brachio utroq. racemoso; fl. alternis, ascendentibus, pedicellatis. Cor. intus subglabra, atro-purpur. petalis ovalibus connexa. Tubus nullus. Fruct. inferus.
2. *viscosa*. D. petal. linearibus: corymbo fastigiato, villoso, viscoso. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
3. *paniculata*. D. petal. lanceol. panicula oblong. villosa, viscosa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Fl. purpureo-flavescent.
75. WACHENDORFIA. Cor. 6-petala, inæqualis, infera: Caps. trilocul. supera.
1. *thyrsiflora*. W. scapo simplici. *Syst. veg. ed. 14. Burm. monogr. 2. f. 2. Nov. ad. N. C. 1. tab. 2. f. 1.*  
*Ad cap. b. Spei 24.*  
 Radix tuberosa, phœnicea. Fol. maiora 2-pedal. 3. digitos lata, 5-nervia, flabelli instar plicata, lanceol. late virentia. Scap. 4-pedal. cum fol. vaginantibus, superne pilosus cum maculis rubris. Thyrsus pedal. Fl. extus crocei, intus lutei. Caps. subovata, triquetra, hirsuta.
2. *paniculata*. W. scapo polystachio. *Syst. veg. ed. 14. Burm.*  
 H iij

*monogr.* 4. f. 1. *Nov. ad. N. C.* 1. tab. 2. f. 10.

*Asphodelus* &c. *Brcyn. prodr.* 3. tab. 9. f. 1.

*Ad cap. b. Spei* 24.

Fol. vaginantia, ensiformia, trinervia. Scap. nodosus. F. quini in singulo pedunc. colore, ut in priore.

3. *graminifolia*. W. caul. polytachio, hirsuto: fol. ensiformibus, canaliculatis, glabris. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Rarissima inter Liliaceas capenses.

76. *COMBELINA*. Cor. 6-pet. Neclaria 3. cruciata, filamentis propriis inserta.

\* *Dipetala*, ob 2. petala maiora.

1. *communis*. C. cor. inæqualibus: fol. ovat-lanceol. acutis: caul. repente, glabro. *Syst. veg. ed.* 14.

C. procumbens &c. *Dill. Elth. tab.* 78. f. 89.

*In America* ☉.

Caul. ramosus. Fol. vaginantia, margine imberbi. Pedunc. bini eodem spatha vaginati; alter 1-fl. longior, alter sub 4-fl. Cor. cœrul.

*Coaser plantam Kämpf. Jap. tab.* 899. cum tinctoria inde paranda.

2. *africana*. C. cor. inæqualibus: fol. lanceol. glabris: caul. decumbente. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Ethiopia*.

Caul. 2-fid. Fol. 2-pollic. basi vaginant. Pedunc. axill. plerumq. 2-fl. Petala lutea.

3. *benghalensis*. C. cor. inæqualibus: fol. ovat. obtusis: caule repente. *Syst. veg. ed.* 14. *Murr. Comm. gou.* 1779. tab. 5.

C. cucullata. *Syst. veg. ed.* 13.

*Ephemerum* &c. *Pluk. alm. tab.* 27. f. 3.

*In Benghala*.

Caul. pedul. articulati, hirsuti. Fol. horizontalia, petiolata, pubescenti-undulata. Petala 2. interiora sature cœrul. reliqua pallidiora. *Variat fl. flavo*.

4. *erecta*. C. cor. inæqualibus: fol. ovat-lanceol: caul. erecto, subhirsuto, simplicif. *Syst. veg. ed.* 14. *Dill. Elth. tab.* 88.

*In Virginia* 24.

Caul. sesquiped. Petioli vaginant. scabri. Cor. pallide cœrul.

\*\* *Tripetala*: *Zanonia*, *Pl. petalis* 3. ma:

5. *virginica*. C. cor. subæqualibus: fol. lanceol. subpetiol. ore  
barbatis: caulibus erectis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ephemerum* &c. *Pluk. alm. tab. 174. f. 4.*  
*In Virginia* 24.

Caul. 2-petal. simpl. læves. Fol. supra retror-  
sum scabra, vaginis nervosis, subpubescent.  
pilis ferrugineis. Spathæ terminal. subcorda-  
tæ. Cor. cœrul. Petal. cordata, integerr. in-  
feriore brevius pedicellato.

6. *tuberosa*. C. cor. æqualibus: fol. sessilibus, ovato-lanc. sub-  
ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. Elth. tab. 79.*  
*f. 90.*

*In Mexico* 24.

Radix tuberosa. Caul. debilis, dichotomus, in  
aquoso solo repens. Fol. plana, viscidula.  
Cor. pallide cœrul.

7. *Zanonia*. C. cor. æqualibus: fol. lanceol. vaginis tumidis,  
margine hirsutis: peduncul. incrassatis: brac-  
teis geminis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Periclymenum* &c. *Sloan Jm. 1. tab. 147. f. 1.*

*In America Gallia æquinoctiali.*

Caul. erectus. Fol. Gentianæ simil: vaginæ la-  
tissimæ, & a caule distantes. Bract. lanceol.  
oppositæ.

8. *vaginata*. C. cor. æqualibus: fol. linearibus: fl. diandris,  
involucro vaginatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India orientali* ☉.

Caul. multi, adscendentes, subscabri. Fol. ses-  
sil. vaginantia, acuta. Pedunc. terminal. &  
axillar. elongati. Involuc. lanceol. striatum,  
convolutum ut fere cylindricum. Cal. apice  
coloratus.

9. *nudiflora*. C. cor. æqualibus: fol. linearibus: pedunc. ca-  
pillaribus: involuc. nullo: fl. diandris. *Syst.*  
*veg. ed. 14.*

*Ephemerum* &c. *Pluk. alm. tab. 27. f. 4.*

*In Indiæ Or. aridis graminosis* ☉.

Caul. erectus; basi decumbens, spitham. sub-  
scaber. Fol. sessil. vaginant. acuta. Pedunc.  
terminal. duo, maior, minorve. Fl. 4 6. pe-  
dicellati, nutantes. Cal. foliol. ovato-lanceol.  
acutis, cor. minoribus. Petala ovata, inæqua-  
liter distributa, infima magis distantia.

H iv

- nudicaulis*. C. cor. æqualibus: scapo indiviso: fol. lanceol. radicalibus. *Burm. Ind. tab. 8. f. 1.*  
*In Java.*  
 Radix repens, fibrosa. Caul. procumbens. Fol. radical. ad ortum vaginantia. Scap. erectus, filiform. in cuius medio bractea revoluta. Fl. bini, cœrul.
- papilionacea*. C. involuc. 3-phyll. alterum recipientibus: caul. repente: fol. lanceol-linearibus. *Burm. Ind. tab. 7. f. 1.*  
*Habitat Coromandeli.*  
 Radix fibrosa, alba. Caul. 2-pollic. articulatus, ad singula genicula radicans, e rubro-virid. Fol. sessil. vagina latiuscula, breviss. acuta, subciliata, succosa. Spatha terminal. cordata, complicata, subciliata, sub qua foliola 2. lanceol. lunata.
- diffusa*. C. cor. æqualibus: pedunculis capillaribus: fol. ovat-oblong. involuc. nullo. *Burm. Ind. tab. 7. f. 3.*
- Commelinoides*. C. ramis paniculæ spicatis, lateralibus; arista calyce fl. longiore. *Forsk. Ægyp.*  
*In Arabia.*
- hexandra*. C. fl. ramosis, cœruleis. *Aubl. Guian. tab. 12.*  
*In Cayenna, & Guiana 24.*  
 Caul. pl. 3-pedal. & ultra, flexuosi, nodosi. Fol. alterna, subpetiolat. petiolo vaginam oblongam, ventricosam, pilis coronatam efformante; ovata, acuta, striata, integerr. Fl. terminales, racemosi, racemulis 4-fl. Petala inæqualia, ovata, concava, cœrul.
77. **CALLISIA**. Cal. 3-phyll. Petal. 3. Anth. geminæ. Caps. 2-locul.  
*Adfinis Commelinæ, sed Nectariis orbata.*
- 1. repens*. C. Syst. veg. 14.  
*Hapalanthus &c. Jacq. am. tab. 11. ed. piñ. tab. 14.*  
*In Americæ merid. locis umbrosis ☉.*  
 Planta herbacea, repens, viridis, superne erectiuscula, basi ramosiuscula, glabra. Caul. digital-spitham. teres. Fol. alterna, vaginant. ovat-acum. basi subcord. integerr. crassiusc. pinguis, nitida, margine purpur. Fol. summa adgregata, & imbricata in rosulam patentem.



Fl. axill. parvi, plerumq. terni, sessiles, tenelli, virentes.

78. XYRIS. Cor. 3-pet. æqualis, crenata. Glumæ 2-valv. in capitulum. Caps. supera.

1. *indica*. X. fol. gladiatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gladiolo &c. *Pluk. alm. tab. 416. f. 4.*

Gramen &c. *Moris hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 28.*

*Rheed. Mal. 9. tab. 139. f. 7.*

*In India.*

Caul. pl. plusquam ped. iuncei. Fol. graminea, ped. Capitulum terminale, ovale, squamatum, lucens, col. ex luteo, & pallido variegatum.

*americana*. X. fol. setaceis: fl. cœrul. *Aubl. Guian. tab. 14. In Guiana 24.*

Planta herbacea. Fol. parva, fasciculata, basi se mutuo amplexantia, angusta, acuta, plana, rigida. Scapi numerosi, 3-4. unc. nudi, compressi, anulati. Capitul. squamosum, squamis ovatis, concavis, flores distinguuntibus.

79. SCHÆNUS. Glumæ paleaceæ, 1-valv. congestæ. Cor. o. Sem. 1. subrotund. inter. glumas. *Differt a Scirpo squamis omnibus fertilibus.*

*A Cypero glumis folliculi incerti numeri, laxè sine ordine congestis, aut laxè imbricatis. Locusta, sive spica multiflora.*

\* *Culmo tereti.*

1. *Mariscus*. S. culmo tereti; foliis margine, dorsoq. aculeatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Pseudo-Cyperus &c. *Scheuchz. gram. tab. 8. f. 7. 11.*

Cyperus &c. *Moris hist. 3. f. 8. tab. 11. f. 24.*

Gramen &c. *Bocc. Sic. tab. 39.*

*In Europæ paludibus.*

Culm. 2-cubital. Fol. pene triquetra, nervo valde eminente. Aculei marginis dorsique digitos fere vulnerant. Panícula subspitham. valde ramosa. Pedunc. axill. alterni, ramosi. Stipulæ sub panícula longæ, fuscæ. Locustæ ovar-acum. lignæ.

2. *mucronatus*. S. culm. tereti, nudo: spicul. ovatis, fascicular. involuc. sub-6-phyll. fol. canalicul. *Syst. veg. ed. 14.*

*Juncus* &c. *Barr. ic.* 203. f. 1.

*Gramen* &c. *Moris. hist.* 3. f. 8. tab. 9. f. 6.

*Scirpus* &c. *Scheuchz. gram. tab.* 8. f. 1.

*In Europæ maritimis arenosis* 24.

*Radix repens*. Fol. plurima, radical. in fasciculum coll. &c., longiss. canaliculata, subteretia, margine sabra (non carnosâ, nec plana).

Culm. foliis crassior, longeque brevior, firmus, lævis. Involuc. foliola inæqualia.

*Proximus est Cypero, quam Schærro: spiculæ enim constant ex glumis laxè quidem, sed tamen ut in Cypero, sibi alterne succedentibus, & imbricatis.*

3. *nigricans*. S. culm. tereti, nudo: capitulo ovato; involucri diphylli valvula altera longa, subulata. *Syst. veg. ed.* 14.

*Juncus* &c. *Moris. hist.* 3. f. 8. tab. 10. f. 28.

*Juncus* &c. *Magn. montp. tab.* 144.

*Juncus* &c. *Scheuchz. gram. tab.* 7. f. 13. 14. 15.

*In Europæ paludibus æstate exsiccatis* 24.

*Planta cespitosa*. Culm. pedalis bitul. Fol. carinata, convexa. Involuc. 2-phyll. inæquale. Spicæ multæ, adpressæ, peduncul atro-spadic.

4. *ferrugineus*. S. culmo tereti, nudo: spica duplici; involucri valvula ma. spicam æquante. *Syst. veg. ed.* 14.

*Gramen* &c. *Moris. hist.* 3. f. 8. tab. 12. f. 40.

*In paludibus* 24.

Adūis priori, sed brevior, & angustior. Num. & magnitudine spicarum; divisione, & proceritate paniculæ insigniter variat.

5. *fuscus*. S. culmo tereti, folioso: spiculis subfascicul. fol. filiformibus, canaliculatis. *Syst. veg. ed.* 14.

*Cyperus* &c. *Moris. hist.* 3. f. 8. tab. 11. f. 40.

*In Europæ paludibus cespitosus* 24.

S. fasciculato simillimus flutura, facie, loco: differt spiculis glomeratis, fuscis, nec fastigiatis, albis: præcocius floret.

Culm. digit-palm. obtuse triquet. Fol. canaliculata, passim cum maculis fuscis.

6. *compar*. S. culm. tereti, nudo: spica composita: spiculis geminatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Rotb. descr. & ic. plant.* 1. 1. tab. 18. f. 4.

*Ad cap. b. Spei.*

Culmi pedalis. læves. Spica terminal. plerumq. ex 6. congesta. Spiculæ pares, scissil. ovatæ, ferrugin.

7. *ustulatus*. S. culm. tereti, folioso: spicis pedunculat. pendulis, oblong. aristatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Culm. 2-pedal. absque geniculis. Fol. caulina pauca, pedal. filiform. lævia, laxa, acuta, canaliculata, vagina striata, superne fuscescente. Fol. floralia 2. alterna, culmum non superantia, vagina dilatata, ferruginea. Pedunc. e singulis vaginis sæpius duo, levi, ut fere membranacei, longitudine spicæ. Spicæ compositæ, atro-ferrugineæ, fusculæ bractea concol. aristata. *Differt a S. glomerato spicis oblong.*

8. *radiatus*. S. culmo teretiusc. apitulo subrotundo. involuc. 8-phyll. longiss. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Fol. plura, spitham. linearia, canaliculata, lævia, rigidiuscula. Capitulum magnitudine Pruni. Involuc. flavum. Foliola alia inter florum acervos, involucri similia.

\*\* *Culmo triquetro.*

9. *bulbosus*. S. culm. triquetris, nudis: fl. glomerulis alternis: fol. lineari-filiformibus. *Syst. veg. ed. 14. Scirpus &c. Rottbæll. descr. & ic. plant. 1. 1. tab. 16. f. 3.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Radix bulbosa, vestita foliorum præteritorum rudimentis. Fol. numerosa, setacea, erecta, striata, longitudine fere culmi, basi membranacea, alba. Culmi spithamæi, fol. vix longioresq., latioresque. Glomeruli 3-4 sessiles. Fl. parvi, rubri. Singulis glomerul. folium setaceum subiectum. *Facies Junci bulbosi.*

10. *compressus*. S. culm. subtriquetro, nudo: spica disticha; involuc. 1-phyllo. *Syst. veg. ed. 14. Pollich.*

*Pal. tab. 1. f. 2.*

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 34. f. 9. Scheuchz. gram. tab. 11. f. 6.*

Cyperella &c. *Mich. gen. tab. 33. Synonyma Caricis uliginosi ad hunc refert Hall.*

*In Europa.*

Culm. pedal.-cubital. compressus, sulcatus. Fol. plana. Spica fusca e sinu culmi, ut in Juncis: locusta elliptica, spadicea, nuda. Sem. arillis 6. oblitum.

*Huius etiam spiculæ ita componuntur, ut ab aliis Schoeni speciebus longe recedant, atque Cyperi spiculas referant.*

11. *glomeratus*. S. culm. triquetro, folioso: fl. fasciculat. fol. planis: pedunculis lateralibus geminis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

*Distincta est species.*

12. *termalis*. S. culm. triquetro, folioso: capitulis lateralibus, compositis, subsessilibus: fol. ensiformibus, carinatis. *Syst. veg. ed. 14. Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 12. f. 2.*

*Ad aquas calidas Cap. b. Spei. 74.*

Culmi 6-ped. crassitie pennæ cignæ, lignosi, subrigentes, læves. Fol. vaginant. erecta, striata, lævia. Capitula versus summitatem culmi, alterna, subsessil. singulum e vagina foliacea.

13. *albus*. S. culm. subtriquetro, folioso: fol. setaceis: fl. fasciculatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 320. Cyperus &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 39. Gromen &c. Pluk. alm. tab. 34. f. 11. Scheuch. gam. tab. 11. f. 11.*

*In Europæ paludosis 74.*

- Fabri.* S. culm. compresso: capitul. solitar. involucrio maximo tectis; apicibus exteriorum squamarum longiss. folio terminatis. *Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 19. f. 2.*

*Flos, & tota structura novum genus indicare videntur.*

Culm. altus, flexuos. geniculat. compressus, striatus. Fol. longiss. linear. dependentia, flexuosa, carinata, striata, basin versus præcipue pilosa. Capitula lateralia, & terminalia maxima; erecta, squamis coriaceis hirsutiss. Totum receptaculum intus fl. pedicellatis obtectum.

- Setaceus.* S. culm. triquetro: fol. setaceis: spicis aggregatis, fl. diandris. *Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 21. f. 2.*

*In Suriname.*

Culm. spitham. simpl. setaceus, debilis. Fol. alterna, longiss. præter supremum, quod fasciculo fl. terminalium vix longius est. Pedunc. axill. inferior. solitarii, superior. 3-4. brevissimi, in fasciculum collecti. Spicæ 3-4.

- cuspidatus*. S. culm. teretib. subnudis: panicula tenuissima, lineari: bract. anularibus, obliquis, breviss. mucrone longiss. terminatis. *Rottboell. descr. pl. l. 1. tab. 18. f. 3.*  
Culm. pl. sesquiped. iuncea. Vaginæ sanguineæ, vel ferrugineæ. Panicul. sesquiuncial. Rami breves, fasciculati, subdichotomi. Bract. brunneæ. Spic. axill. & terminal. parvæ, 3. lineas longæ, distichæ, ferrugin.
- fasciatus*. S. culmis, foliisque setaceis, longiss. fl. tenuissim. aristatis. *Rottboell. descr. pl. l. 1. tab. 19. f. 3.*  
Culm. pl. pedal. ad basin fusci, telaque cancellata atro-purp. cincti. Fol. ad radicem fasciculata, convoluta-setacea; caulina alterna, remota, vagina cylindrica, atro-purp. Pedunc. axil. sub 3-fl., inferior. solitarii; super. bini-terni. Spicæ vagina spathacea.
- surinamensis*. S. culm. triquetro, folioso: pedunc. corymbosis, inferioribus alternis, superioribus in umbellam aggregatis. *Rottboell. descr. pl. l. 1. tab. 4. f. 1.*  
Culmus altissim. striatus, scaber. vaginæ laxæ, uno latere mucrone obtuso; fol. longiss. lineari, carina, & margine aculeato, terminatæ. Corymbi laterales, pedunculati, compositi. Spicæ terminal. aggregatæ, cylindrico-subulatæ, ferrugineæ, vel rufæ, 3-lineares.
- incanus*. S. *Forsk. Ægypt.*  
*In Arabia.*  
Caul. & fol. villosa-tomentosa, aculeata. Fol. 3-pollicar. basi obliqua, margine sinuato-repando-obtuso. Cal. spinosus. Fruct. globosus, sesquipollic. diametro, flavus.
- deustus*. S. culm. tereti, nudo, folia æquante: capitul. oblong. glumis calycinis subæqualibus, mucronatis, spicam involventibus. *Berg. Fl. Cap.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
*Differt a S. nigricante fol. glabris, nec margine scabridis: culmo longitud. folior. vaginis membranac. glumis maximis spicam involventibus.*  
Gramen paludosum. Radix bulbis ovatis. Culmi pl. singuli ex suo bulbo, palmares, & ultra, striati. Fol. plurima, radical. basi vaginant. linearis-semisubulata, erecta, glabra, superne concava. Vaginæ membranac. Spicæ terminal. solitaria.
- tuberosus*. S. culm. triquetro: capitul. ternis, sessilibus in-

volucro longiss. viridi : radic. tuberosa. *Burm. Ind.*

Mottenga. *H. Mal.* 12. tab. 12.

*In Java, & Malabar.*

*paniculatus.* S. culm. triquetro, folioso: panicula alterna, colorata; calycibus aristatis: feminibus globosis, lævibus. *Burm. Ind.*

*Carex* &c. *Rumph.* 6. tab. 8. f. 1.

*In India.*

Fol. alterna: panicula axillar. setæ plurimæ, pollic. Sem. splendens, ut *Lithospermi*, sæpe nigricant.

*odoratus.* S. spica compacta, subrotunda, viridi. *Aubl. Guian. Sloan. hist.* 1. tab. 78. f. 2.

*In Guiana.*

*cyperoides.* S. culmo compresso, femitereti, nudo: spicis sessilibus, lanceolat. tortis; infima involucrata. *Retz. Obs. fasc.* 4.

*In Zeylona.*

Culm. solitar. ped. & ultra, striatus. Fol. filiform. vaginis fuscis. Spicæ 2-7 forma, & torsione *Cyperis monostachii*, sed plus duplo latiores, nitidæ. Squam. cymbiform. compressæ.

*Bobartia.* S. culmo compresso: capitul. terminali; involucr. 5-phyll. *Retz. Obs. fasc.* 4.

*In Zeylona.*

Rad. veluti bulbosæ. Fol. linearia, laxa. Culm. subpedal. Capitul. breve, spiratum. Spicul. pl. squamis sub 5. ovatis, scariosis, cavis.

80. *CYPERUS.* Pl. spicæ in capitulum congestæ, multiss. complanatæ. Glumæ paleaceæ, distiche imbricatæ. Cor. o. Sem. 1, nudum, triquetrum.

\* *Culmo tereti.*

1. *articulatus.* C. culmo tereti, nudo, articulato. *Syst. veg. ed.* 14.

*Juncus* &c. *Sloan. Jam. hist.* 1. tab. 81. f. 1.

*Cyperus Niloticus.* *Forsk. Ægyp. monente Vahl.*

*In Jamaica rivulis* 24.

Culm. ped. & ultra, col. cæsius. Umbella nuda, subimpli: radii 8-9. flexuosi, inæqual. apice sub-3. fid. Spicæ confertæ, lineares, ferrugineæ.

2. *minimus.* C. culm. tereti, nudo; spicis sub apice. *Syst. veg. ed.* 14.

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 300. f. 5. Sloan.*  
*Jam. hist. 1. tab. 79. f. 3.*

*In Jamaica, Africa.*

Culm. spitham. Fol. capillacea. Spicæ 3-5. compactæ, imbricatæ, ovatæ. Sem. triquetrum.

3. *lateralis*. C. culmo teretiusc. nudo: spica laterali, sessili.  
*Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*Ad cap. b. Spei* ☉.

Culmi pl. longitudine aciculæ, setiform. non rigidi. Spica ovata, squamis 7-9. dilichis, acutiuscul. lævibus.

4. *Monti*. C. culm. tereti: foliis carina lævibus: umbella  
 supradecompos. *Lin. suppl. Syst. veg. ed. 14.*  
*Mont. Gram. tab. 1. f. 2.*

*In India, nunc in Italia, locis inundatis* 24.

Culm. teres, apyll. Fol. longiss. Invol. longiss. 6-phyll. Spicul. ovatæ, ferrugineæ.

5. *tenellus*. C. culm. nudo, setaceo: spicis solitariis, geminisq: sessilibus. *Lin. suppl. Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei.*

Culmi digito breviores, crassitie setæ equinæ. Spicæ intra apicem culmi, compressæ, ancipites, ovatæ; squamis 10-12.

\*\* *Culmo triquetro.*

6. *monostachys*. C. culm. triquetro, nudo: spica terminal. simpl. ovata; squamis mucronatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Rottbætl. descr. pl. l. 1. tab. 13. f. 3.*

*In India Orient.*

Fol. radicul. numerosa, linear. angustiss. laxa, lævia, spitham. Culm. vix pedat: filiform. debilis. Spica magnitudine sem. Cucumeris, imbricata, compressiusc. lævis, squamis carinatis. Foliolum sub spica 1-raro 2. subulatum, longitudine spicæ.

7. *lævigatus*. C. culm. triquetro, nudo; capitulo 2-phyll. fl. lævigatis. *Syst. veg. ed. 14. Rottbætl. descr. pl. l. 1. tab. 16. f. 1.*

*Ad cap. b. Spei* 24.

Culm. 2-ped. læves. Capitul. terminal. subrotund. e spicul. pl. sessilibus. Involucr. foliol. p'ano-canicul. subulat. capitulo longioribus, strictiusc. ma: erecto, inferior. patulo. Spicæ obl-ovatæ, imbricatæ, glaberr. obtusiusc. squamis ovatis.

8. *Huspan.* C. culm. triquetro, folioso: umbella supra decompos: spicul. umbellato-fessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Rottbæl. descr. pl. 1. p. tab. 6. f. 2.*  
*Gramen &c. Pluk. alm. tab. 192. f. 2.*  
*In India, Æthiopia &c.*  
 Culm. ped. Fol. ovata. Involucr. 2-phyll. vix umbella longius. Umbel. sparsa. Spiculæ in apice ex eodem puncto ortæ.
9. *longus.* C. culm. triquetro, folioso: umbella foliosa, supradecompos: pedunc. nudis; spicis alternis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 11. f. 13.*  
*In Italiæ, Galliæ, Carniolæ &c. paludibus &c.*  
 Radix longa, odorata. Culm. angulis asperis. Umbellulæ crassæ, rufescentes, e variis spicarum congestarum agminibus constantes, quarum medium brevi pediculo insidentibus pl. spicis constat; reliquæ, quæ illud circumstant, pediculo oblongo inhærent.
10. *esculentus.* C. culm. triquetro, nudo: umbella foliosa: radicem ruberibus ovatis; zonis imbricat. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 11. f. 10. Lob. ic. 75.*  
*In Italia, Oriente &c.*  
 Fol. graminea, acuta, dorso triquetra.
11. *rotundus.* C. culm. triquetro, subnud. umbell. decomposita; spicis alternis, linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
 C. hexastachyos. *Rottbæl. descr. pl. 1. 1. tab. 14. f. 2.*  
*In India.*  
 Radix aliquot bulbos gerit. Culmus subped. inferne vestitus fol. 4. alternis, gramineis. Involucr. 2-3. phyll. longitudine umbellæ.
12. *squarrosus.* C. culm. triquetro, nudo: umbella foliosa, glomerata: spicis striatis, squarrosis. *Syst. veg. ed. 14. Rottbæl. descr. pl. 1. 1. tab. 6. f. 3.*  
*Gramen &c. Pluk. alm. tab. 397. f. 2.*  
*In Asia.*  
 Culmi pl. conferti, pollic. Fol. graminea, basi culmum obvolventia. Involuc. 3-4-phyllum umbella longius, basi latius. Umbella nulla distincta, sed radii umbellæ undique spiculis conferti.
13. *difformis.* C. culmo triquetro, subnudo: umbella simpl. 2-phylla,



2-phylla, 3-fid. spicis cuspidatis, intermedia  
sessili. *Syst. veg. ed. 14. Rottboell. descr. pl. l.*  
*1. tab. 9. f. 2.*

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 317. f. 1. phyt.*  
*tab. 417. f. 5.*

*In India.*

Culm. ped. ad basin uno, alterove fol. vesti-  
tus. Involuc. foliol. altero longiss. Partiale  
nullum. Spicæ numerosæ, sessil. lanceol. squa-  
mis ovatis, concavis, obrusis, latere scariosis.

14. *Iria.* C. culm. triquetro, feminudo: umbell. foliosa,  
decomposita: spiculis alternis, granis distin-  
ctis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 191. f. 7.*

*Iria* &c. *Rheed. Mal. 12. tab. 56.*

*In India.*

Culm. ped. striatus. Fol. lanceol-linear. vaginant.  
striata, carinata, mollia. Involuc. universale  
3-phyll. umbella longius. Partialis squamæ  
fetacæ, flexuosæ, pedicellis subiectæ. Pe-  
dunc. in umbella plurimi, apice umbelliferi:  
umbella ex 3-4. radiis. Grana triquetra, ob-  
tusiss. vix manifeste palea vestita, parum di-  
stantia. Color baseos culm. & radiorum fer-  
rugin: culmi reliqui, & fol. incanus: spica-  
rum fulvus, micans.

15. *elatus.* C. culm. triquetro, nudo: umbel. supradecom-  
posita, foliosa; spicis digitalibus, imbricatis;  
secul. subulat. (distichis). *Syst. veg. ed. 14.*  
*Rottboell. descr. pl. l. 1. tab. 10.*

*In India.*

Gramen altum. Umbell. inæqual. Involucr. uni-  
versale longiss. Partial. spicis brevius. Spicæ  
sessil. ferrugin.

16. *glomeratus.* C. culm. triquetro, nudo: umbell. supradecom-  
pos. 3-phylla: spicis glomerato-rotundatis;  
spicul. subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Segu. Ver.*  
*3. tab. 2. f. 2. Mont. gr. tab. 1. f. 1.*

*In Italia paludosis, & in India ☉.*

*Simil. priori, sed brevior. Spicæ congestæ.*

17. *glaber.* C. culm. triquetro, nudo, lævi: umbella 3-phyll.  
fl. glomeratis; inferior. brachiatis: fol. gla-  
bris. *Syst. veg. ed. 14. Segu. Suppl. tab. 2. f. 1.*  
*In Veronæ &c. humentibus ☉.*

Culm. palmar. Fol. radical. erecta, longitudine  
*Tom. I.*

culmi. Umbel. simpl. fl. sessilibus, alternis, infinis pedicellat. Fl. ovati, compressi, distiche iumbricati, per maturitatem fuscescentes.

18. *elegans*. C. culmo triquetro, nudo: umbella foliosa; pedunc. nudis, proliferis: spicis confertis, mucronibus patulis. *Syst. veg. ed. 14. Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 6. f. 4. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 75. f. 1.*

*In Jamaica paludosis maritimis.*

Culm. ped. & ultra, asper. Fol. longiss. linear. vaginant. carinata, involuta, scabra. Umbell. decompos. strictiss. Radii sub 8. Spicæ pl. breves, ovatæ.

19. *odoratus*. C. culmo triquetro, nudo: umbella decompos. simpliciter foliosa; pedicellis distiche spicatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 8. f. 2. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 74. f. 1. & tab. 8. f. 1.*

*In America ad fluviorum ripas.*

Gramen giganteum. Culm. crassitie digiti. Umbell. sesquiped. ramosiss. Radii principal. 24. longiss. Spicæ confertæ, horizontal. ferruginæ.

20. *compressus*. C. culmo triquetro, nudo: umbella universali triphylla, glumis mucronat., lateribus membranac. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 12. Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 9. f. 3. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 76. f. 1.*

*In Amer. Septentrion. pratis arenosis, & in Piedemontio 24.*

*Diagnosticur panicula, & spicis viridibus; glumis mucronatis, non patulis; & marginibus lateralibus membranac. Umbel. partial. nudæ; universalis glomerata.*

Planta inodora. Radix tuberculata, extus nigra, intus alba. Culm. 1-2. ped. nitidus. Fol. angusta, acuta, canaliculata, retrorsum scabra. Involuc. foliola exter. longiss., intima brevissima.

21. *flavescens*. C. triquetro, nudo, umbella 3-phyll. pedunc. simplicibus, inæqualibus: spicis confertis, lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 11. f. 37.*

*b. Gramen &c. Scheuchz. gram. tab. 8. f. 3.*

*In Europæ paludosis ☉.*

Caulic. cespitosi, ad summum dodrant. Spicæ ad 15. oblong. Spicul. conglomeratæ, ovatæ, distichæ, ex viridi-sublutæ.

b. Culm. 2-unc. Fol. capillac. lineæ quadrantem lata. Spicul. 2-3. minimæ.

22. *fuscus*. C. culmo triquetro, nudo: umbella 3-fid. pedunc. simplicibus, inæqualibus: spicis confertis, lineari-bus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 179. Leerf. herb. tab. 1. f. 2. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 38. Pluk. phys. tab. 191. f. 3.*

In Europæ, & Ægypti pratis humidis ☉.

Differt a priore vix manifeste, culmis ad terram sparsis: fol. magis scabris: spicul. angustioribus, fuscis.

Raro altitudo pedal. Fol. linearia. Panicula laxior, & ramosior. Spicæ nigro-purpur.

23. *pumilus*. C. culmo triquetro, nudo: umbella composita, 2-phylla: spicul. alterno-digitat. lanceol. glumis mucronatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 191. f. 8.*

In India.

Simil. C. compresso, sed brevior, distinctus glumis minus imbricatis, & apice mucronat. Involucrum umbella longius.

24. *triflorus*. C. culm. triquetro, nudo: umbella tristachya; intermedia sessili: spicul. lævigatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In India orient. 24.

Culmi pedal. læves. Involuc. terminale, 2-phyll. subulatum, spica brevius. Spicæ 3. ovatae, compressæ, ancipites, læves, acutæ, squamis acuminat.

25. *strigosus*. C. culmo triquetro, nudo: umbella simpl. spicul. confertiss. linearib. horizontalib. *Syst. veg. ed. 14. Cyperus &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 74. f. 2. 3.*

In Jamaica, Virginie paludibus.

Radix subrotunda. Culm. pedal. Fol. inæqual. panicula longiora, lanceol-linearia, canalicul. glauca. Umbellæ radii simpl. erectiusc. instructi spicul. longiuscul. numerosis, ferrugineis.

26. *ligularis*. C. culmo triquetro: umbellæ spicul. capitatis, sessilibus, oblong. involuc. longiss. serrato-asperis. *Syst. veg. ed. 14. Rottboell. descr. pl. l. 1. tab. 11. f. 2. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 9.*

Ira. *Rheed. mal. 12. tab. 55.*

In Jamaica.

Culm. altissim. crassus, glaucus. Capitula terminal. & lateral, inæqual. solitar. oblong. cras-

5. Umbellæ decompos. intermedia sessili. Radii 5-6. inæquales, parentes. Spicæ cylindrico-subulatæ, distichæ, ferrugin. & coccineæ.

27. *Papyrus*. C. culmo triquetro, nudo: umbella involucris longiore: involucell. 3 phyll. fetaceis, longioribus: spicul. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cyperus* &c. *Mich. gen. tab. 19. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 11. f. 41.*

*In Calabria, Sicilia, Syria, Ægypto.*

Culm. crassus, triquet. Color totius plantæ glaucus, vel albidus. Involuc. 8-phyll. foliol. exterioribus 4. lanioribus. Umbel. universalis subæqual. copiosiss. radius basi vaginatis. Umbellul. peduncul. ternis, brevissim. Spicul. pl. alternæ, sessil. subulatæ.

28. *Spathaceus*. C. culmo vaginis fol. vestito: pedunc. pinnatis, lateralibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Pluk. atm. tab. 301. f. 1.*

*In Virginia, ad cap. b. Spei 24.*

Magnitudo Sacchari. Spathæ magnæ, 1-phyll. alternæ, deciduæ, racemos floriferos involvunt.

29. *alternifolius*. C. culmo triquetro, nudo, apice alternatim folioso: pedunc. lateralibus, proliferis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Morif. hist. 3. f. 7. tab. 3. f. 17.*

*In Virginia 24.*

Culmi pedal. Fol. semipedal. conferta, ensiform. lævia, margine scabriusc. Bract. parva, subulata, e singulis alis. Pedunc. filiform. Spica ovata.

30. *denudatus*. C. culmo triquetro: involuc. subnullo. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Culm. 2-pedal. vagina unica in medio culmi. Umbel. composita, non multum expansa. Spicæ oblong. purpurasc. carina viridi, apice patentiusc.

31. *distans*. C. culmo triquetro, nudo; umbella supradecompos. foliosa: spicis alternis, filiformibus, floscul. distantibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl. Rotboel. d. sc. pl. tab. 10.*

*In Malabar.*

Culm. 2-ped. ad medium foliosi.

32. *pannonicus*. C. culmo triquetro: spicis sessilibus: glumis lateralibus, sphaelatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl. Jacq. H. 3. tab. 6.*

*In Hungaria.*

Planta glabra, & nitida. Cespes densiss. Involuc. foliol. 2-raro 3. inæqualia. Spiculæ ovat-oblong. umbellatum sessiles, obtusæ, compressæ. Sem. late ovata, compressa.

- mucronatus*. C. culmo nudo, vaginato, triquetro: involuc. 1-phyll. striato: spicis subterans, sessilibus. *Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 8. f. 4.*

Culmi pl. pedal. vagina ferruginea. Spicæ raro solitar. oblong. sed numero variae, sæpius 2-7 aggregatæ, frequenter ternæ, dense imbricatæ, squamis coriaceis, ovat. obtulis, nitidis.

*Simil. C. lævigato; differt teneritudine ma. defectu involuc. infimi: spicarum longe minore numero.*

- dubius*. C. culmo triquetro, setaceo: capitul. terminali: involuc. longiss. 4-phyl. *Rottboel. descr. pl. l. 1. n. 22.*

Culm. pl. palmar. erecti. Fol. linear. striata, carinata, mollia. Capitul. solitar. spicis innumeris glomeratum. Spicæ parvæ, lineari-lance. compressæ, distichæ, imbricatæ, squamis compressis, ovatis, obtusiss.

- erectus*. C. culmo triquetro: involuc. polyphyl. longo: umbella simplici, spicis conglomeratis: flosc. sulcato-punctatis. *Rottboel. descr. pl. l. 1. n. 23.*

Culm. aggregati, ad b. sin. bulbosi, inferne vaginis albidis obfiti. Fol. sub 6 longiss. linear. striata, carinata, conduplicata. Involuc. folia 3-plura, patentia: parziale nullum. Capitulum centrale, sessile, cinctum radiis paucis, patentibus, glomere spicarum terminatis. Spicæ distichæ, lanceol. acutæ, torosæ, 4. circiter lineas longæ, coloris testacei, imbricatæ, squamis alternis, membranaceis.

- conglomeratus*. C. culmis subtriquetris: fol. sesquipetalibus, fasciculat. strictiss. canalicul. capitulo terminali, paniculato, 3-phyl. *Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 13. f. 7.*

Culmi fasciculati, torti. Fol. glauca, vaginis

nigro-purpur. Capituli umbellul. central. sessiles; laterales breviter pedicellatæ. Spicæ ovato-lanc. distichæ, dense imbricatæ, squamis membranaceis, glaucis, vel gryseis, cum purpura mixta.

*effusus.*

C. culmo tereti, subligneo: umbella rara: spicis conglomeratis: involucr. subulato, 3-phyll. *Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 12. f. 3.*

Culmi apex pulverulentus, albus. Involuc. universale inæquale: partiale foliolo ovato, basin radiorum obvolvante. Capitulum solitar. sessile, spicis divaricatis glomeratum; interdum præter hoc, 2-3. lateralia. Spicæ longiores, distichæ, oblon-lanceol. squamis subpubescent. col. grysei, cum purpura mixta.

*Jemineus.*

C. culmo triquetro, incurvo, basi bulbofo: fol. fasciculat. setaceis: umbella simpliciss. spicis conglomeratis. *Rottboel. desc. pl. l. 1. tab. 8. f. 1.*

Radix bulbosa. Culm. palmar. super. parte nudus. Fol. ferruginea. Involuc. universale diphyll. umbella paulo longius, partial. squamæ lanceol-acumin. ad ortum spicarum. Umbel. 3-4 rad., cum umbellula intermedia 1-2. Spicæ vix uncial. lineares, distichæ, compressæ.

*sphacelatus.* C. culmo triquetro: umbella simpliciss. spicis alternis, linearibus, compressis: floscul. margine sphacelatis. *Rottboel. desc. pl. l. 1. n. 32.*

Radix bulbosa. Fol. radical. 5-plura, linear. glauca. Culm. pedal. Involuc. universale foliol. 3. linearibus, patentibus, umbella longioribus, partiale, squamæ lineari-setaceæ ad pedicellorum ortum. Umbel. radii pauci, 2-3, sesquiunc. cum umbellula una, alterave intermedia. Spicæ 4. lineas longæ, linear. distichæ, imbricatæ, complanatæ.

*tuberosus.*

C. culmo triquetro, basi folioso, involuc. 3-phyl. umbella composita; spicis lanceol. teretiuscul. *Rottboel. desc. pl. l. 1. tab. 7. f. 1.*

Radix tuberosa, fulca, vel ferruginea. Culm. 2-ped. testaceus. fusco-maculatus. Fol. 4-5 alterna, longiss. lanceol. glauca, margine, & carina scabra. Involuc. universale foliol. 3 inæqualibus, maximo umbella duplo-triplo longiore: partiale, bractæ setaceæ ad divisionem paniculæ,

& ad fl. exortum. Umbel. radii 4-5 inæquales, sub-2-unc. cum umbellulis centralibus. Spicæ, semiunc. alternæ, lanceol. crassæ, distichæ, imbricatæ, squamis dilute ferrugineis, marginibus membranac. albidis.

*tenuifloras.* C. culmo triquetro: fol. linearibus, umbella decomposita: spicul. linearibus, angustiss. acutis. *Rottbœl. descr. pl. l. 1. tab. 14. f. 1.*

Culm. tenuis, ad basin foliosus. Fol. margine revoluti, flavescentia. Involuc. universale foliol. 3-4. inæqualibus, quorum maximum umbella duplo circiter longius: partiale fol. lanceol. acuto, umbellæ divisionibus subiecto. Umbel. radii 7-pl. 1-2. unc. inæqual. cum umbell. centrali. Spicæ 5-7. lineas longæ, alternæ, imbricatæ, nitidæ, obscure purpur.

*Pangorei.* C. culmo triquetro: involuc. 3-phyt. umbella universaliter decomposita; partialibus sub 3-fid. spicis alternis; filiformibus. *Rottbœl. descr. pl. l. 1. tab. 7. f. 3.*

Culm. sesquiped. & ultra, fungosus, fusco-maculat. Involuc. universale foliol. 3. linearibus, glaucis; tertium dimidio brevius: partiale, squamula ovat-lanceol. ad pedicellorum, & spicarum ortum. Umbellulæ central. 1-2. sessil: cæteræ radiis pl. inæqualibus, uncial. patentissim. apice sub 3-fid. Spicæ sesquiunc. alternæ, distichæ, linear. Squamæ ferrugin. cum. carina, & margine pallidiore.

*fastigiatus.* C. culmo triquetro: umbella decomposita; pedunc. longiss. filiformibus, sexquinguesid. spicis pl. linearibus, sparsis. *Rottbœl. descr. pl. l. 1. n. 41.*

Culm. glaucus. Involuc. universale foliol. 6. margin. & carina aculeata; maximo umbella 2-3. duplo longiore; partiale foliol. 2. setaceis ad divisionem peduncul. Umbella universalis ex pedunc. 10. inæqualibus, filiformibus (quorum longiss. palmar. & ultra) minimi, vix uncial. Umbellæ partial. subsessil. pedicel. subquinis, capillaribus. Spicæ C. longi similes.

*Surinamensis.* C. culmo triquetro, nudo: umbella decomposita: spicis obl-ovatis, glomeratis, mucronibus incumbentibus. *Rottbœl. descr. pl. l. 1. tab. 6. f. 5.*

Culm. plusquam pedal. flaccidus, striatus. Involuc. universale 3-phyll. lineare; parziale, squama lanceol. concava, spicis subiecta. Umbellæ pedunc. plurimi, 16. inæquales: umbella partialis brevis, nuda; pedicelli 4-5. breviss. inæqual. reflexi; singuli glomere spicarum densissimo terminati. Capicula 1-2. in centro umbellarum, sessilia. Spicæ obl-ovatæ, sub 2-unc. distichæ, dense imbricatæ.

*alopecuroides.* C. culmo triquetro: umbella supradecomposita: spicis digitat. oblon. spicul. conf. riss. erectis, imbricatis. *Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 8. f. 2.*

Culm. crassus, striatus, supra nudus. Involuc. universale inæquale, sub 5-phyll. Fol. lanceol. sulcata, revoluta, rugosa, margine lævia, extrema umbella 2-3. longiora, interioribus eadem multo brevioribus. Partiale fol. lanceol.-linearibus, 3-4. acutiss. inæqualibus, ad divisionem peduncul. umbellulis, quibus breviora, subiectis. Umbellæ radii 8. patentes, extimi palmar. & ultra, intimi sensim breviores. Spicæ fere 2-unc. sessiles, ad basin bractea linearis suffultæ. Spicæ paucæ in centro umbellæ.

*polystachios.* C. culmo triquetro: involuc. polyphyl: panicula terminali, subsess. ramosiss: spicis linearilanceol. confertissim. complanatis. *Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 11. f. 1.*

Culm. 2-ped. & ultra, striatus, flavescent. Fol. ad basin plura, linear. glauca, vaginis purpureis. Involuc. foliol. 4-6. lanceol.-linearibus; quorum 2-3. panicula multo longiora. Panicula fere semicircul. Spicæ alternæ, distichæ, squamis testaceis, vel ferrugineis, margine, & carina albidis.

*paniculatus.* C. culmo triquetro: involuc. subæquali, 6 phyl. panicul. terminali, sessili, densiss: spicis compressis, linearilanceol. pauciss. *Rottboel. descr. pl. l. 1. n. 53.*

Gramen Cyperoides &c. *Pluk. phytol. tab. 91. f. 3.*

Culm. spitham. striatus, ad basin fol. lanceol-linearibus dimidio brevioribus, glabris, flavescentibus cinctus, supra nudus. Spicæ 3. circiter lineas longæ, acutæ, complanatæ, squam.



alternis, lanceol. testaceis, carina pallide viridi.

*Santonici.*

C. panicul. sessilibus & peduncul: spicis linearibus: flosculis alternis, remotis, obtusiss. *Rotboel. descr. pl. l. 1. tab. 9. f. 1.*

*Cyperus* &c. *Scheuchz. gr. tab. 9. f. 2. Pluk. phyt. tab. 419. f. 4.*

Culm. pedol. & ultra, triquet., debilis, supra nudus. Fol. linear. striata, mollia, margine subaculeato, pallide viridia. Involuc. universale 3-phyl. inaequale, foliolo maximo pedali. Partiale, squamæ setaceæ ad divisionem paniculae. Spicæ deli. atæ, alternæ, distichæ, imbricatæ, squamis distantibus, obtusissim. pallide flavis, cum carina subfusca, 3. striis picta.

*In Tranquebaria.*

*corymbosus.*

C. involuc. polyphyl: umbella supradecompos. pedunc. fil. formibus, strictis, corymbosis. *Rotboel. descr. pl. l. 1. tab. 7. f. 4.*

Culm. triquet., crassius, glaucus, fusco-maculatus. Involuc. universale foliol. 4. lineari-lanceol. inaequalibus, margine scabro: partiale, squamæ lineari-setaceæ, ad ramificationes umbellæ. Umbella diffusa. Spicæ tenuiss. teretes, subulatae, distichæ, 4-5. lineas longæ, imbricatæ, squamis oblong. dorso testaceis, margine albid.

*flabelliformis.*

C. culmo triquetro, sulcato, contorto: involuc. alternis; pedunc. axillar. solitar. terminalibus, umbellatis, corymbiferis. *Rotboel. descr. pl. l. 1. tab. 12. f. 2.*

*In Arabia.*

Color totius Graminis glaucus, vel castus; spicarum albus.

Involuc. polyphyllo, trifariam imbricato, flabellum referente: pedunc. axillar. solitar. continua serie intra umbellam terminalem exeuntibus, a cæteris specibus distinct.

*hirsutus.*

C. culm. tereti, foliis: spicis ovatis lobato-conglomeratis terminalibus: glumis mucronatis ciliatis: foliol. lineari, lobis spicæ subiecto.

*Berg. Fl. cap.*

*Juncus hirsutus* &c. *Buxb. cent. 3. tab. 33.*

*Ad. cap. b. Spei.*

Gramen paludosum. Radix repens. Culm. pl.

- pedal. simplic. erecti, striati, hirsuto-scabri. Fol. 5-pollic. linear. basi vaginante, hirsuto-scabra, striata. Spicæ pl. obtusæ.
- gradatus*. C. culmo tereti, angulato, ad basin folioso; bracteis ad apicem pedunculis duplo longioribus, spiraliter remotis. *Forsk. Ægyp.*  
*In Arabia.*  
 Culm. 2-cubital. Spicul. lanceol. compressæ, virides.
- globosus*. C. culmo triquetro, basi foliosa: spicis conglomeratis, subglobosis; spiculis convexis, viridibus, nitidis. *Forsk. Ægyp.*  
*In Arabia.*  
 Culm. spitham. Spicæ umbellatæ. Spicul. congestæ, lanceolat.
- globulosus*. C. culm. triquetro, nudo: umbel. foliosa: spicis compactis, subrotundis, flavicantibus. *Aubl. Guian. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 79. f. 1.*  
*In Caienna.*
- fastigiatus*. C. culm. triquetro, cubitali, basi foliosa: umbella foliosa; denuo umbellifera; spicis cylindricis; spicul. utrimq. convexis, flavidis. *Forsk. Ægyp.*  
*In Arabia.*
- complanatus*. C. culmo triquetro, sesquispitham. basi foliosa: spicis subrotundis; spicul. compressis, planissimis, ovato-obl. brunneis. *Forsk. Ægyp.*  
*In Arabia.*
- ferrugineus*. C. culmo triquetro, pedali, basi foliosa: umbella foliosa: spicul. fasciculat. linearibus compresso-convexis, ferrugineis, margine viridibus, raro pedicellatis, coacervatis ad apicem pedunculi; bract. pedicellis longioribus. *Forsk. Ægyp.*  
*In Arabia.*
- umbellatus*. C. culm. triquetro, nudo: umbel. 2-phylla; pedunc. longiss. spicatis. *Burm. Ind. tab. 9. f. 6.*  
*In India.*  
 Fol. longitudine culmi. Pedunc. inæqual. ad medium vaginantes. Spicæ capitatæ, oblong. spiculæ linear. flosculis alternis.
- pygmeus*. C. culmo tereti; umbella composita, involucreta: spicis lanceolatis; glumis mucronatis. *Retz. Obs. fasc. 4.*  
*In Tranquebaria.*  
 Radiculæ fasciculatæ, Fol. radical. filiform. cul-

mo duplo longiora. Culm. vix sesquipoll. striatus. Umbella pedunculis 5-6. spicul. umbellular. 4-6. compressæ, pallidæ, medio rufo-fuscæ. Involuc. 4-phyll. umbella triplo longius.

*arenarius.* C. culmo compresso, nudo: spicis capituli glomeratis, sessilibus: involuc. sub 1-phyll. Retz. *Obs. fasc. 4.*

*In India Orient.*

Radic. repentes, articulatae. Fol. filiform. nuda, 3-6. pollic. compressa; flavo-virid. Culm. e fasciculo folior. folitar. folius non nihil altior. Spicæ 8-12. spiculæ distichæ, crassiores; squamis fuscis, albo marginatis. Involuc. capitulo longius.

*capitatus.* C. culmo subanguloso, striato, medio folioso: capitulo 3-phylo; spicis sessilibus. Retz. *Obs. fasc. 4.*

*In India.*

Culm. 4-pollic. basi folium unum, vel alterum. Fol. basi multum latiora, culmo parum longiora. Capitul. globosum, spicul. lineari-oblong. Glum. imbricatæ, scariosæ.

*stoloniferus.* C. culm. nudo triquetro: umbella composita, involucreta: spicul. lanceol. Retz. *Obs. fasc. 4.*

*In Tranquebaria.*

Rad. bulbosa, stolones emittens. Fol. palmar. & semiped. vaginantia, linear. complicata. Culm. spitham. Umbella depauperata, umbellulam unicam sessil. tresque circiter pedunculatas habet. Involuc. sub 2-phyll.

*cinnamomeus.* C. culm. triquetro, folioso: umbella spicul. capitatis, pedunculat. sessilibusque: involuc. 5-phyll. ferrulato-scabro. Retz. *Obs. fasc. 4.*

*Habitat.* . . . ☉.

Caul. 3-ped. & ultra, folitar. basi foliosi, superne nudi. Fol. culmo altiora, plicata, pollicem dimidium fere lata. Capitula ovata, composita, cinnamomea. Spiculæ congestæ, compressæ, distichæ, lineares.

81. SCIRPUS. Glumæ palcææ, undique imbricatæ. Cor. o. Sem. 1. imberbe.

Differt a Cypero spicis non distiche imbricatis, & non complanatis, sed obæsis; & sem. setulis circumvallato.

\* *Spica unica.*

1. *trigynus*. S. culmo tereti, nudo: spica cylindrica, squamis lanceol. basi laterali membranaceis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India Orient. 24.*

*Facies S. palustris*. Fol. radical. copiosa, conferta, palmaria, filiform. interiore latere canal. culata, basi membrana laterali, lata, alba. Culm. spitham. enodis, striatus. Spica terminal. pollicar.

2. *mutatus*. S. culmo triquetro, nudo: spica terminali, cylindrica. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Jamaica 24.*

Similiss. *S. geniculato*, sed culm. triquet., molliusculus, nec articulatus.

3. *articulatus*. S. culmo tereti, nudiusculo, semigeniculato: capitulo laterali, glomerato. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 197. f. 6.*

S. fistulosus, *Forsk. Ægyp. monente Vahl.*

Isieli *Rheed. mal. 12. tab. 71.*

*In Malabaria aquosis arenosis.*

Culm. pedal. & ultra, cavus, geniculis cinctus, at non undique. Capitulum magnum, sessile, semiverticillatum. Spicæ basi turgidæ, squamis magnis, testaceo & purpur. seu ferrug. n. colore variegatis.

4. *palustris*. S. culmo tereti, nudo: spica terminal. subovata (imbricata). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 273. Leerf. herb. tab. 1. f. 3.*

b. S. equiæti &c. *Scheuchz. gr. tab. 3. f. 17.*

*In Europa fossis, & inundatis.*

*S. acicularis* Fl. Dan. tab. 167. potius *Scirpus palustrem* refert Mil. sed Lin. ad *S. cæspitosam* refert.

Culmi cæspitosi, pedal. Fol. compressa, basi ferruginea. Spica imbricata, acuminata, squamis arcte compactis, muticis.

5. *geniculatus*. S. culmo tereti, nudo: spica terminali, oblonga. *Syst. veg. ed. 14.*

*Juncus* &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 75. f. 2: & tab. 81. f. 3.*

*In Jamaica.*

Culm. vix spitham. Spica pollic. dense imbricata, squamis membrac. testaceis.

6. *cæspitosus*, S. culmo nudo, striato: spica terminali, 2-valv.

TRIANDRIA MONOGYNIA: 141

longitudine calycis; radicibus squamula inter-  
stinctis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 167.*

*S. montanus* &c. *Scheuchz. gr. tab. 7. f. 18.*  
*Pluk. phyt. 40. f. 6.*

*Juncus* &c. *Morif. hist. 3. tab. 10. f. 35.*

*In Europæ paludibus caespitosus, sylvaticis* 24.

7. *capitatus*. *S. culmo tereti, nudo, setiformi: spica termi-  
nali, subglobosa. Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

8. *acicularis*. *S. culmo nudo, tereti, setiformi: spica ovata,  
2-valv. femimbus nudis. Syst. veg. ed. 14. Fl.  
Dan. tab. 287.*

*Juncellus* &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 10. f. 37.*

*Juncus* &c. *Scheuchz. gr. tab. 7. f. 4.*

*In Europa sub aquis purioribus* 24.

*Omnium minimus. Cespitosus, mollis. Spica iu-  
nior compacta; adulta disticha. Fl. 2-5. Glumæ  
fuscæ, non nitentes.*

9. *fluitans*. *S. culmis alternis, nudis, teretibus: caule fo-  
lloso, flaccido. Syst. veg. ed. 14.*

*S. equiseti* &c. *Scheuchz. gram. tab. 7. f. 20.*

*Gramen* &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 10. f. 31.*  
*Pluk. alm. tab. 35. f. 1.*

*In Europæ udis, & rivulis* 24.

*Culm. crebri, ad terram supini, articulati. Ra-  
mi subdivisi. Fol. multa. Capitul. parvum,  
squamosum, Pphyllii æmulum.*

\*\* *Culmo tereti, polystachio.*

10. *lacustris*. *S. culmo nudo, tereti: spicis ovatis pl. pedun-  
cular. terminilibus. Syst. veg. ed. 14.*

*Juncus* &c. *Lob. ic. 25.*

*In Europæ aquis puris stagnantib. & fluviantib.* 24.

*In lacubus altitudo hñaa. Culm. sæpe solitar. simpl.  
fungosus, mollis, ad terram vaginosus. Fol.  
simili. Stipulæ sub panicula, & sub ramis  
lanceol. aristatæ, siccæ. Spicul. squamæ 2-  
fidæ. Glumæ, & locustæ Cinnamæi col. Sem.  
3-gon. Nimia aquæ copia culmis destituitur &  
fol. producuntur, *Datur var. humilior.**

11. *holoschæ-  
nus*. *S. culmo nudo, tereti: spicis subglobosis glo-  
meratis: involucr. inæquali, 2-phyl. mucro-  
nato. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 454.  
Pluk. phyt. tab. 4.*

*Scirpoides* &c. *Scheuchz. gram. tab. 8. f. 2. 3. 4. 5.*  
*In Europa australi* 24.

Culm. ad basin alatus. Fol. teretia. Vaginarum margines lacero-ciliati.

12. *australis*. S. culmo nudo, tereti: capitulo laterali, bractea reflexa: fol. canaliculatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat.* . . . .

Simill. *S. romano*, sed foliol. seu culmis sterilibus binis, erectis, læviter canaliculatis, nec teretibus, basi vaginantibus, margine scarioso. Culmi vix ped. læves, supra capitulum apice erecto, sed canaliculato. Capitul. sessile, conglobatum, rotundatum, obrusum, ferrugin. valvulis imbricat. apice sub 3-lob. obtusis, lobis lateralibus apice fuscis.

13. *romanus*. S. culmo nudo, tereti: capitulo laterali, conglobato; bract. reflexa. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 448. Barr. rar. tab. 255. f. 3.*

*h. Juncus &c. Pluk. alm. tab. 40. f. 3.*

Culm. cespitosi, 1-3. ped. fili crassitie: in *S. holoschoëno* crassi ut in *S. lacustri*, & apice pungentes. Fol. semiteretia. Vaginæ fuscae, nitidæ. Capitul. subfuscum, inter 2. involuc. foliola, unum longiss. alterum brevius.

14. *setaceus*. S. culmo nudo, setaceo: spica terminali, sessili. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 311. Leerf. Herborn. tab. 1. f. 6.*

*Juncellus &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 10. f. 23.*

*In Europæ litoribus maritimis, ad stagna &c. 24.*

Culmi cespitosi, digital. & ultra, crassitie fol. Fol. setacea. Spica lentis magnitudine, 1- raro 3. oblong. fusco-rubra, squama infima subulata, longitudine spicæ.

*Tenuitate, & magnitudine culmi; longitudine involuc. numero, & crassitie, spicarum; ratione ætatis, & soli admodum variat.*

15. *supinus*. S. culmo nudo, tereti: spicis sessilibus in medio culmo glomeratis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Paristis.*

Planta minima, supina. Fol. rotundo-teretia.

16. *autumnalis*. S. culmo ancipiti, nudo: umbella decomposita; spiculis ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

*Facies Junci pitoff.* Fol. radical. laxa, nonnihil scabra, sæpe culmi longitudine. Culmi palm. compressi, altero latere subcarinati. Involuc. terminal. 2-phyll. fol. simile, umbella

fere longius. Umbel. patula, inæqual. Pedunc. sæpius spicis 3. Spicæ squamis ovatis, ferrugineis, carina viridi, vix mucronatis.

17. *capillaris*. S. culmo nudo, capillari: spicis pedunculatis, intermedia sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

S. tristachyos. *Rottb. descr. pl. l. 1. tab. 13. f. 4.*

Græmen &c. *Eurm. Zeyl. tab. 47. f. 2.*

In *Virginia*, *Æthiopia*, *Zeylona*.

Fol. capillaria, vix digitalia. Culmi vix fol. longiores. Foliol. setaceum sub umbella, spicis longius. Spicæ terminal. 3. ovatae, squamis ferrugin. carina viridi, obtusis.

18. *tristachyos*. S. culmo nudo, setaceo: spicis, (sub) ternis, sessilibus; involucr. 2-phyllo, setaceo. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Rottb. gram. tab. 13. f. 4.*

*Ad cap. b. Spei.*

Fol. & culmi setacei, glaberrimi. Capitulum laterale, mox infra apicem culmi, ex spicis 3 ad 7. *Variat magnitudine. Simil. S. capillari, sed spicæ non pedunculatæ; forte illius var.*

19. *globiferus*. S. culmo nudo, tereti: umbel. terminali, composita: capitul. globosis ex pl. spiculis arcte congestis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In *Teneriffa*.

Culm. glaberrimus, terminatus spatha breviss. 2-phyllo; foliol. æqualibus. subulatis, mucronatis. Hi globuli circa basin emittunt novos radios globiferos, iterum dividendos.

20. *crispicatus*. S. culmo angulato, seu sulcato, nudo: spicis terminalibus, ternis, sessilibus, nudis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In *Africa*.

Culm. pl. 1-2. pedalis. glaberrimi. Fol. vix ulla, nisi squamæ radical. ferrugin. Spicul. parvæ, oblong. erectæ, æquales. Involucr. polyphyl. fol. breviss. subulatis.

\*\*\* Culmo triquetro, *Panicula nuda*.

21. *triqueter*. S. culmo triquetro, nudo: spicis subsessilibus, pedunculatisqu. mucronem æquantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Juncus* &c. *Pluk. alm. tab. 40 f. 2.*

In *Europa australi*, locis paludosis.

Culmus angulis planis, nec excavatis.

22. *mucronatus*. S. culmo triangulo, nudo, acuminato: spicis sessilibus, conglomeratis, lateralibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Scirpocyperus &c. *Scheuchz. gram. tab. 9. f. 14.*

Juncus &c. *Moris. hist. 3. f. 8. tab. 10. f. 20.*

*Pluk. alm. tab. 40. f. 1. 3.*

In Europæ, & Virginie stagnis, & locis maritimis 24.

Culm. 1-2. ped. tricarinati, angulis compressis, glauci. Pedunc. simplic. aut ramosi, 4-6 fl. Stipula brevis, spathacea, mucronata. Spicæ ferrugineæ. Mucro fl. multo longior, ad latus reflexus. Setæ ad basin seminis.

23. *grossus*. S. culmo triquetro, nudo: umbella supradecomposita: spicis pedicellatis; involuc. longiss. subulato, lanceol. 3-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In India.

Similis S. miliaceo, sed magnitudine, & crassitie valde differt.

Culm. orgyal. erectus, glaberrim. Fol. radicata, lanceol. glaberrima, subverrucosa. Spicul. ovata, ferrugineæ.

24. *dichotomus*. S. culmo triquetro, nudo: umbella decomposita: spicis dichotomæ sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Rottboel. deser. pl. 1. 1. tab. 13. f. 1.*

S. bifumbellatus Forsk. *Ægyp. monente Vahl.*

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 119. f. 3.*

In India.

Culmi digital. Fol. in cespitem congesta, plana, hirsuta. Involuc. 2-phyll. longitudine umbellæ. Radii interior. breves. *Vnr. culm. 2-ped. Umbel. magna diffusa, ramosiss.*

25. *echinatus*. S. culmo triquetro, nudo: umbella simplici: spicis ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 91. f. 4.*

In India utraque.

Culm. spitham. Invol. longum, 4-5. phyll. Spicæ 8. pedunc. propriis, tamquam in umbella, foliarie.

26. *retrofractus*. S. culmo triquetro, umbel. simplici; spicarum flosculis retrofractis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cyperus &c. *Pluk. phyt. 415. f. 4.*

In Virginia 24.

27. fer-



27. *ferrugineus*. S. culmo triquetro, subnudo; involuc. longitudine paniculæ, ciliatis. Syff. veg. ed. 14.  
Schænus polymorphus. Rottboel. descr. pl. l. 1. p. 67.  
Gramen &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 77. f. 2.  
In Jamaica paludibus maritimis.  
Culm. 2-ped. striatus, flavescent. Squamæ coriaceæ, concavæ, fusco-maculatæ, basi culmum ambientes. Umbel. terminalis, decomposita, cum spica intermedia sessili. Radii 3-4. triquetri, inæqual. Spicæ solitar. oblong. ovatæ, ferrugineæ, magnitudine varice.
28. *spadiceus*. S. culmo triquetro, nudo: umbella subnuda: spicis sessilibus, terminalibus, oblongis. Syff. veg. ed. 14.  
Gramen &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 76. f. 2.  
In Jamaica fluvii.  
Pedunc. longi, terminal. Paniculæ pl. sparsæ, parvis foliol. instructæ. Nonnulli pediculi sunt floriferi. Spicæ oblongo-rotundæ, spadiceæ.  
\*\*\*\* Culmo triquetro, Panícula foliacea.
29. *miliaceus*. S. culmo triquetro; nudo: umbel. supradecomposita; spicis intermediis sessilibus: involuc. setaceo. Syff. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 9. f. 2. Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 5. f. 2.  
In India.  
Culmi plurimi, semiped. simpl. læves. Fol. graminea, basin culmi obvestientia, lævia. Umbel. diffusa, laxa. Spicæ ovatæ, minutissimæ, ut sem. Milii.
30. *cyperoides*. S. culm. triquetro, nudo: umbell. simpl. spicul. oblong. floscul. subulat. 1-fl. reflexis. Syff. veg. ed. 14.  
Kyllinga umbellata. Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 4. f. 2.  
Koll-pullu. H. Mal. 12. tab. 63.  
In India Orient. 24.  
Facies Cyperi strigosi, seu Scirpi retrofracti, sed flosculi laxi, reflexi. Fol. graminea, carinata. Culmi pedal. læves. Involuc. polyphyl. umbella. longius, foliol. gramineis. Umbel. inæqual. Spicæ plurimæ, pedunculat. obtusæ; squamis calycin. convolutis, imbricatis.
31. *maritimus*. S. culmo triquetro; panicula conglobata, folia-

cea: spicularum squamis 3-fid. intermedia subulata. *Syst. veg. ed. 14. Scheuchz. gram. tab. 9. f. 9. 10.*

*In Europæ litoribus maritimis, & locis arenosis inundatis* 24.

Culm. pedat. in aquis 3-4 pedat. Fol. recta, acuta, plana, pulposa. Spicæ plerumq. peduncul. oblong. ferrugineæ, obesæ, rubis, & filamentis testæ. Sem. feris obitum. *In aquis omnia altiora, maiora.*

32. *luxulæ*. S. culmo triquetro, nudo: umbella foliosa, prolifera, spiculis subrotund. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Pluk. mant. tab. 417. f. 3.*

*In India.*

Culm. plusquam pedat. lævis. Involuc. universale polyphyll. fol. entiformibus, umbella longioribus. Partial. vix ullum, nisi sera breviss. Umbellæ intermediæ brevissimæ.

33. *sylvaticus*. S. culmo triquetro, folioso: umbel. foliacea; pedunc. nudis, supradecomposit. spicis confortis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 307. Leers herb. tab. 1. f. 4.*

*Cyperus* &c. *Morif. hist. 3. tab. 11. f. 15.*

Gramen &c. *Loef. pruss. tab. 33.*

*In Europæ sylvis humentibus, secus lucus, flumina* 24.

Culm. 1-2 pedat. Fol. planiuscula, margine, & carina asperissima; florale unicum maximum, paniculam superans. Stipulæ foliatæ, longæ, mucronatæ. Pedunc. inæqual. Panic. sparsa, nigricans. Spicæ ovatæ. Semen inter setas positum.

34. *corymbosus*. S. culmo triquetro, folioso: corymbis lateralibus simplicibus; terminali prolifero: spicis subulat. *Syst. veg. ed. 14.*

Kadira-pullu. *H. Mal. 19. tab. 43.*

*In India.*

Culm. 2-ped. Fol. basi vaginant. Involuc. universale corymbis longius. Spiculæ ferrugineæ.

35. *squarrosus*. S. culmo triquetro, nudo, setaceo: spicis ternis, sessilibus, ovatis, squarrosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ruthvel. descr. pl. tab. 17. f. 5. Pluk. phys. tab. 350. f. 83.*

*In India Orient.*

Fol. radicalia, setacea; canalicul. erecta, culmis

breviora. Culm. palm-pedal. Involuc. terminale 2-phyll. foliol. setaceis, inæqualibus.

36. *intricatus*. S. culmo triquetro, nudo: umbel. foliosa simplicia: squamis calyc. subul. recurvis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cyperus aristatus. Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 6. f. 1.*

*In India Orient. & ad cap. b. Spei.*

Fol. graminea, erecta, lævia. Involuc. terminale, 3-phyll. foliol. umbella longioribus. Spicæ sæpe 3. peduncular. quarta intermedia sessili; ovato-cylind. obtusæ, fl. confertiss. horizontalibus.

37. *melichiana*. S. culmo triquetro: capitulo globofo: involuc. longo, polyphyll. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cyperus &c. Tutti pis. tab. 20. f. 5.*

*In Italia, Monspeli, pratis &c. paludosis ☉.*

Culm. minimus, quandoque unico fol. præditus, sæpe rubescens. Involuc. 2-3. phyll. foliol. uno ma. Capitulum rubescens.

38. *ciliaris*. S. culmo triquetro, folioso: umbel. sparsis: squamis calyc. aristis ciliaris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Pluk. phyt. tab. 192. f. 4. & tab. 417. f. 6.*  
*Rottboel. descr. pl. tab. 17. f. 1.*

*In India Orient. ☉.*

Culm. palm. erecti, laxi. Fol. caulina 4-5. alternata, late graminea, vaginant. laxa. Pedunc. axill. & terminal., spicis 3-5. sessilibus, in capitulum divaricatis. Spicæ ovatae, hirtæ pilis raris. Involuc. loco sub capitulo sæpe foliol. 1-2. parva, subulata.

\*\*\*\* *Culmo triquetro, Capitulo terminali.*

39. *horrentosus*. S. culmo triquetro, folioso: capitulo globofo, squamis calyc. lanceol. hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Rottboel. descr. pl. tab. 16. f. 4.*

*Ad cap. b. Spei locis paludosis.*

Culm. 2-3-ped. stricti, læves. Fol. caulina 3. alternata, remotiss. vaginant. erecta, acuta, subcarinata, lævia. Capitulum congestum e pl. slossculorum acervis: involuc. 3-phyll. inæquali.

40. *antarcticus*. S. culmo triquetro, nudo: capitulo globofo; involuc. 1-phyll. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Fol. radical. filiform. extus semiteret. intus ca-

nalicul. Culm. subpedal. filiform. Capitul. e spicis numerosis, æqualibus, sessilibus. Involuc. setaceum, capitulo longius. Spicæ 3-fariam imbricatæ, ovatæ, triquetrae, fulcæ, margine pallido.

41. *cephalotes*. S. culmo triquetro, nudo: capitulo ovato, squaroso: involuc. 3-phyl. longo. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. H. 1. tab. 97.*

Schoenus cephalotes. *Rottb. descr. pl. l. 1. tab. 20. In India.*

Caul. 2-3-ped. striatus, lævis. Fol. ped. alterna, remota, lineari-lanc. margine, & carina aculeata. Capitul. ad basin brevissime paniculatum, ovatum. Calyc. imbricati, recurvati. Involuc. universale longiss. 3-4-phyl. reflexum, margine scabro.

*annuus.*

S. culmo triquetro, nudo; involucro 2-phyllo: pedunculis nudis; spicis solitariis. *All. Fl. Ped. Circa lucus, & locis humidis* ☉.

Fol. linearia, striata, mollia, lævia. Culmi pl. 4-6-unc. striati. Spicæ terminales, umbellatæ. Involuc. foliola inæqualia. Spicul. ovato-acumin. quarum una in centro umbellæ; reliquæ pedunculatæ, pedunc. inæqualibus, qui aliquando proliferi. Sem. ellipticum, striatum, cinereum.

*Plantaginoides*. S. culmis ventricosis, fulcatis, nudis: spica terminali, cylindrico-subulata; strobil. oblong. carinatis. *Rottboel. descr. pl. l. 1. tab. 15. f. 2.* Color Graminis glauco-viridis: squamarum albidus, dorso virescens, margine testaceus. Spica 2-3-pollic.

*monander.*

S. culm. setaceo: involuc. longo, 3-phyl. capitulo sessili, glomerato; strobil. monandris. *Rottb. descr. pl. l. 1. tab. 14. f. 3.*

Culmi pl. palm. triquetri, glauci. Fol. linearisetacea, mollia, vaginis membranac. albis. Involuc. patens, capitulo triplo longius.

*argenteus.*

S. culmis triquetris, setaceis: involuc. longiss. 4-phyl. spicis pl. cylindricis, in capitulum glomeratis. *Rottb. descr. pl. l. 1. tab. 17. f. 6. H. Malab. 12. tab. 54.*

Culm. 1-4-unc. Fol. plurima, fasciculatim in cespitem congesta, imbricata, ovato-lanc. pal-

lide ferruginea, supra convoluta-subulata, striata, glauca. Squamæ argenteæ, cum striis ferrugineis.

*barbatus.* S. culmo triquetro, vaginis suboppositis, ora super. barbatis: capitulo terminali, subrot. polystachio. *Rottb. descr. pl. l. 1. tab. 17. f. 4.*

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 299. f. 3.*

Culm. plurimi, palm-dodrant. prostrati, fasciculati, setacei. Fol. radical. 2-3. setacea, basi vaginant. Invol. univertiale foliol. 4-5. setaceis: partiale, squama minima, ciliata, ad basin spicarum: squamæ purpur. margine albo.

*nodosus.* S. culmo compresso, nodoso: capitulo glomerato, mucronato. *Rottb. descr. pl. l. 1. tab. 8. f. 3.*

*Ad cap. b. Spec.*

Culm. intortus. Capitul. magnum. Spicæ ferrugineæ.

*prolifer.* S. culmo tereti, nudo, compresso: capitulis glomeratis, nudis, tandem proliferis. *Rottb. descr. pl. l. 1. tab. 17. f. 2.*

Culm. procumb. Spicæ terminal. linear-lanc. initio pauciores, dein plurimæ, imbricatæ, squamis lanceol. ferrugin. punctis coccineis intermixtis. Pedunc. vel rami pl. fasciculati, ex apice culmi inter spicas adultioris capituli prorumpentes: singuli capitulo solitar. terminati, cuius inter spicas simili ratione fasciculatim progerminat nova proles.

*Dipsaceus.* S. culmis setaceis: umbel. simpl. capitul. oblong. squamosis: floscul. subulat. recurvis, diandris; germine echinato. *Rottb. descr. pl. l. 1. tab. 12. f. 1.*

*Similis priori.* Culm. pl. digital. triquetri, striati, supra nudi, ad basin vaginis purpurasc. foliol. breviss. terminatis, cincti, & a fociis distincti. Involuc. foliol. 3-4. basi lata, concava, apice subulata, cum capitulo intermedio sessili. Radii pauci, 2-6. breves, incurvi, triquetri. Capitula dense imbricata, squamis basi membranac. ovatis, apice recurvo.

*lateralis.* S. spicis ovatis, lateralibus, pedunculat. & sessilibus. *Forsk. Ægyp.*

*In Arabia.*

Culm. triquet. nudus, pedul-cubital. basi foliosa. Pedunc. lateral. pollic. fasciculati, filiform.

æquales. Spicarum squamæ ovatæ, ferrugine. margine membranac.

- Kali* 3. *alpini*. S. culmo tereti; folioso: spicul. terminalib. confertis, sessilibus: involuc. longitudine foliorum. *Forsk. Ægyp.*

*In Arabia.*

Radix bulbosa, repens. Culm. inarticulat. Fol. subulata, superne canaliculata, carnofo-coriacea.

- Scheuchzeri*. S. minimus; fol. teretibus, lineatis: spica unica, 10-fl. *Hall. Emen. & Ad. Helv. Scheuchz. gr. tab. 7. f. 1.*

*In alpinis Helveticis.*

5. *florus*. S. fol. teretib.: spica unica, minima, 5-fl. *Hall. Emen. Scheuchz. tab. 7. f. 19.*

*Circa Bernam.*

- Haller*. S. (*Mariscus*) culm. tereti: fol. gramineo: capitulis lateralibus ternis, ovatis. *Hall. Helv.*

*In fossis.*

Culm. cespitosi. Fol. radicalia plura, unciam longa, ad sesquilineam lata. Culm. 1-4-6. unc. Fol. vaginale, fescunc. super spicam elatum, convolutum. Spica ovato-conica, etiam 2-3. crassa, semunc. longa, ad 3. lineas lata. Glumæ ovato-lanc. mucronatæ, spadiceo-virides. Sem. breve, triquetrum, cortice rugoso: villi nudi.

- glomeratus*. S. culmo nudo, teretiuscul. umbella glomerata: involuc. 2-phyl. brevi: fl. diandris. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In Zeylana.*

Fol. radical. conferta, brevissima, curvata, rigida. Culm. solitar. palm. Umbel. composita. Involucc. squamæ nonnullæ, scariosæ. Spicul. ovatæ, e squamis latis, obtusis, concavis, fuscis, albo-marginat.

- arvensis*. S. culmis compressis, striatis: umbell. simplicibus: involuc. plerumq. 1-phyl. brevi. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In Zeylana.*

Culm. 2-ped. basi vagina fusca, 2-pollic. Fol. breve e vagina exiens. Umbel. 5-8. stachya. Raro pedunc. intermedius spicas 2. pedicellatas gerit. Spic. ovatæ, fuscae, peduncul. e squamis lanceol. a basi sensim deciduis.

*polytrichio-* S. culm. compressis, setaceis: spicis terminalibus, solitar. subnutantibus, monandris. Retz.

*ides.*

*Obs. fasc. 4.*

*Gramen polytrichum. Rumph. amb. 6. tab. 7. f. 1.*

*In Zeylona.*

Rad. nigricantes. Culmi cespitosi, 4-6-pollic.

Fol. breviora, filiform. Spica subovata, bracteata. Squam. ovatae, carinatae, obtusae, scariosae, apice fuscae. Stam. raro 2.

*nutans.*

S. culm. compresso, sub 4-gon. nudo: spica ovata, solitaria, terminali, nutante. Retz. *Obs. fasc. 4.*

*Habitat Malacca.*

Culm. pl. spitham. filiform. basi squamis brevibus, fuscis. Spica nuda, e spicis ovatis, subfuscis.

*lateralis.*

S. culmis triquetris, nudis: spicis subternis, lateralibus: involuc. 1-phyll. brevi. Retz. *Obs. fasc. 4.*

*In Zeylona.*

Culm. spith-pedal. filiform. basi vaginati. Fol. conformia, sed breviora. Spica una peduncul.

*caribaeus.*

S. culmis fasciculatis, setaceis, sulcatis: spica minima, terminali, ovata. Retz. *Obs. fasc. 4. Friis Roth. Descr. tab. 15. f. 3.*

*In Zeylona.*

Sem. ovato-subtriquetrum.

*aestivalis.*

S. culmis depressis, triquetris, nudis: umbellis compositis, involucreis: fl. monandris. Retz. *Obs. fasc. 4.*

*In Zeylona fluvii, fundo limoso exsiccato.*

Radic. nigricantes. Culm. 3-pollic. filiform. Fol. filiform. canaliulata, hirta. Involuc. filiform. hirta, foliol. 5-8. quorum 3. umbella longiora. Involuc. brevia, capillaria. Spicul. teretibusubangulatae. Squam. fuscae, carinatae, acuminibus divaricatis.

81. KYLLIN- Ament. ovar. seu oblongum, imbricatum. Fl. cal. corollaq. 2-valvi.

GA.

1. *monoccephala.* K. culmo filifor. triquetro: capitulo globofo, sessili: involuc. longiss. 3-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Roth. descr. pl. l. 1. tab. 4. f. 4.*

Schœnau coloratus: *Syst. veg. ed. 13. Sloan. K iv*

*Jam. hist. 1. tab. 78. f. 1. - Rumph. Amb. 6. tab. 3. f. 2.*

*In Indiis.*

Radix farmentosa. Culm. pl. sesqui-2 pedal. ad radicem foliosi, supra nudi. Fol. digitalia, linearia, culmo breviora, canaliculata, aspera. Capitulum refert receptaculum Fragariæ, magnitudine Pisi.

2. *triceps*. K. capitulis terminalibus subternis, sessilibus, glomeratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Schœnus niveus. *Syst. veg. ed. 13. Jacq. hort. 1. tab. 97. Rottb. descr. pl. 1. 1. tab. 4. f. 6. H. Mal. 2. tab. 53.*

*In Indiis.*

*Similis priori, sed differt capitulo trilebo.*

Planta cespitosa, densa. Radix aromatica. Culm. 1-2-ped. erectus, nudus. Fol. culmo breviora, ensiform-linear. Involuc. 4-phyl.

3. *panicea*. K. umbel. terminali; spicis sessilibus, pedunculatisq. cylindric. imbricat: involuc. universali sub 4-phyl: partiali nullo. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Rottb. descr. pl. tab. 4. f. 1.*

*In Indiis.*

4. *umbellata*. K. umbel. terminali; spicis sessilibus, pedunculatisq. cylindricis, squarrosis: involucr. universali polyphyl. partiali 3-phyl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Rottb. gram. tab. 4. f. 2.*

*In Indiis.*

*sumatrensis*. K. umbella terminali; spicis sessilibus, pedunculatisq. cylindricis, squarrosis: involuc. universali polyphyllo; partiali nullo. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In Sumatra.*

83. FUIRE-NA. Ament. imbricat. squamis aristatis. Cal. o. Cor. glumis 3. petaliformibus, obcordat. cirrho terminatis.

1. *paniculata*. F. culmo angulato: fol. lanceol. striatis, remotis: fl. umbellatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Rottb. descr. pl. 1. 1. tab. 19. f. 3.*

*Facies Scirpi.* Culm. altus, simplex, angulatus, striatus. Fol. alterna, in summo caule, glauca, longitudine internodiorum, vaginis urceolatis, laxis, culmum ambientibus, breviter pilosis, membrana oris ciliata, ferruginea. Pedunc. 2-3. axillar. apice umbellati, hirsu-



- tiff. Spicæ oblong. conglomeratæ, nigricantes.
84. ERIOPHORUM. Spica brevis, pauciflora, imbricata, squamis oblongis. Sem. 1. lana longissima cinctum, ut capitulum reddat tomentosum.
1. *vaginatum*. E. culmis vaginatis, teretibus: spica scariosa. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 236.*  
*Juncus &c. Scheuchz. gr. tab. 7. f. 1. 2. 3.*  
*In Europæa frigidis alpium sterilibus 24.*  
 Culmum ped. terminat globus bombagyno pappo tectus. Fol. radical. plus, minus triquetra, ætata; caulina murica; summa basi purpur. Spica erecta, ovata, squamis fuscis. Sem. 3-gonum, apice dilatatum.  
*In alpiibus humilioribus, mollioribus; capitulo latiore, rotundiore, glumis fuscis, minus lividis &c.*
2. *polystachyon*. E. culmis teretibus; fol. planis: spicis plerisque pedunculatis. *Syst. veg. ed. 14. Leerf. Herborn. tab. 1. f. 5.*  
*Linagrossis &c. Vaill. Paris tab. 16. f. 1. & var. f. 2.*  
*Gramen &c. Garid. Aix. tab. 44.*  
*In Europæa uliginosis turfosis 24.*  
 Culm. ped-cubital. Panícula tomento nivea. Spicæ usque 7. immaturæ erectæ, per ætatem pendulæ, primo rotundæ, dein longiores. Spicul. squamæ pellucidæ, membranaceæ, per ætatem rufescentes.
3. *virginicum*. E. culmis foliosis, teretibus: fol. planis. Spica erecta. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Gramen &c. Pluk. alm. tab. 299. f. 4. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 2.*  
*In Virginia.*  
 Culm. 1-sesquiped. erectus, enodis. Fol. Triticea, summa 3. e geniculo, palmaria. Paniculæ glomeratæ 6-7. tomentosæ, subfuscae.
4. *cyperinum*. E. culmis teretibus, foliosis: panícula supradecomposita prolifera; spicul. subternis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Cyperus &c. Pluk. mant. tab. 419. f. 3.*  
*In America Septent.*  
 Statura omnino Cyperi, sed spiculæ Scirpi, nisi sem. maturefcentia producerent lanam gilvam, seu testaceam, vix spiculis longiorem.
5. *alpinum*. E. culmis nudis, triquetris: spica pappo brevior. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 620.*

*Linagrostis* &c. *Scheuchz. gram. tab. 7. f. 4. prodr. tab. 8.*

*In Europe alpinis* 24.

Culm. semiped. spica unica, ovat-oblon. Glumæ cinnamo-virides. Pappus fluitans pedicellum refert. Sem. acuminatum, fuscum.

85. **NARDUS.** Fl. solitarii, spicati. Glumæ folliculi binæ, aneustæ, acuminatæ, etiam aristatæ.

1. *thomæa.* N. spica triflori, recta, utrimque imbricata. *Syst. veg. ed. 14. Linn. suppl.*

*In Tranquebaria.*

Fol. in cespitem nata. 2-pollic. alterna, setacea. Culm. 2-pollic. Spicæ terminal. solitariae, scissiles, teretes, flavescentes, flosculis vix conspicuis.

2. *striata.* N. spica setacea, recta, secunda. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 7. Leerf. herb. tab. 1. f. 7.*

*Gramen* &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. f. 8. Monti ic. 31. Schuchz. agrost. tab. 2. f. 10.*

*In Europæ asperis, sterilibus, montanis* 24.

Planta cespitosa. Culm. palmar. & ultra. Fol. capillacea. Spica longa, linearis, rara. Glumæ lanceol. in setas desinentes, sæpius coloratæ. Locustæ sæpe violac.

3. *gangitis.* N. spica recurva. *Syst. veg. ed. 14. Lob. ic. 84. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 13. f. ult.*

*In Gallia narbonensi.*

*Obscura: an N. aristatæ var.?* Culm. erecti, nudi. Fol. plura, in cespitem disposita, longa. Spica longa, convoluta. Fl. unilateral. pilosi.

4. *aristata.* N. calycibus aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Gramen* &c. *Bocc. Mus. 2. tab. 57. Barr. rar. tab. 117. f. 1.*

*Romæ, in agro Nicænsi, & Pedemontano* ☉.

Culm. pl. semiped-palm. ex quorum geniculis alii exeunt, brachiati, recurvi. Fol. plura, breviora, angusta. Spica 2-3-unc. Locustæ alternæ.

5. *ciliaris.* N. spica incurva, ciliata. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India.*

Fol. graminea, plana. Culm. spitham. Spica dimidiata, seu altero latere tantum floscul. alternis, 12-15.

6. *indica.* N. spica setacea, secunda, subincurvata. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*In Tranquebaria.*

Gramen longitudine digiti, subramosum, læve.  
Fol. culmo breviora, alterna, remota, plana.  
Spica imbricata, versus fl. angustissima.

86. POMME-REULLA. Cal. turbinatus, 2-valv. valvulæ 4-fid. dorso aristatæ.

1. cornucopiæ. P. Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.

In India.

Gramen parvum, valde singulare. Radix fibrosa, repens, alba. Fol. vix digitalia, equitantiæ, bitariam imbricata, compressa, lævia. Culm. ramosi, vix fol. longiores. Spica subracemosa, alba, basi obvallata fol. subspathæformi. Flos florem Caryophyllæum plenum referens. Sem. rufum.

87. LYGEUM. Spatha 1-phyll. Cor. binæ supra idem germen. Nux 2-locul.

1. sparteum. L. Syst. veg. ed. 14. Læst. it. tab. 2. Cius. hist. 2. fig. 2.

In Europæ campis argillofis 24.

Plantæ color e virili-paleæ. Culm. & fol. in cespitem fasciculata. Culmus unico articulo versus apicem donatur, spith-2-pedal. Flos unicu-  
sus, terminalis, inclinatus.

## DIGYNIA.

88. BOBARTIA. Cal. imbricatus. Cor. gluma 2-valv. supera.  
1. indica. B. spicis capitatis; involuc. folioso. Syst. veg. ed. 14.

Gramen &c. Pluk. tab. 300. f. 7.

In India.

Refert ita Schoenum mucronatum, ut eius fig. pro huius ubique venditari possit.

Culm. altus, nudus, teres. Spicæ pl. in capitulum collectæ, sessil. oblong. cylindricæ. Involuc. 2-phyll. altero brevior ex fol. horizontal. ventricoso, acumin. longitudine capituli; altero basi ventricoso, capitulo quin-  
quies longiore, horizontali.

89. CORNU-COPIÆ. Involucr. 1-phyll. infundibulifor. crenatum, multifid. Cal. 2-valv. Cor. 1-valv. Alopecuro nimis affine.

1. *cucullatum*. C. spica mutica; cucullo crenato. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Juncus &c. Pet. gaz. tab. 73. f. 5.*  
*Smyrna.*  
 Caul. fistulos. geniculatus, ramosus. Fol. basi  
 spathæform. inferiora media angusta: reliqua  
 linearia. Pedunc. incurvati, spica duplo lon-  
 giores. Involuc. lucido-lividum. Spica obscure  
 violacea, cum striis lucido-purpur.
2. *aloppecuroides*. C. spica aristata, cucullo hemisphærico recepta.  
*Syst. veg. ed. 14.*  
*In Italia.*  
*Similis Alopecuro pratensi.* Culmi adscendent. læ-  
 ves. Fol. lævia. Spica termin. ovata, laxa,  
 floscul. brevissime pedicellatis. Vagina supremi  
 fol. ventricosa, ut in Phalaride. Singularis  
 nota est urceolus hemisphæricus, integerr.  
 (consistens fol.) qui instar cal. communis  
 cingit basin spicæ.
90. SACCHARUM. Cal. lanugo longa extra calycem, in quo differt  
 ab *Arundine*. Cor. 2-valv.
1. *spontanæum*. S. fol. convolutis: panicula effusa; spicis simpli-  
 cibus, capillaribus: fl. remotis, involucratiss.,  
 geminatis; altero pedunculari. *Syst. veg. ed. 14.*  
 S. fl. paniculatis &c. *Syst. veg. ed. 13.*  
*Kerpa. H. Mal. 12. tab. 46.*  
*In Malabaræ aquis 24.*  
 Culm. 12-ped. sed non arboreus, crassitie pen-  
 næ anserinæ, læves, recti vaginis fol. inanes.  
 Fol. 2-pedal. lateribus convoluta, lævia, la-  
 titudine graminis. Panicula magna, effusa, e  
 spicis capillaribus, simpliciss. longiss. erectiusc.  
 Fl. remoti.
2. *officinarum*. S. fol. planis: fl. paniculatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Arundo saccharifera. Sloan. Jam. hist. 1. tab.*  
*66. Rumph. amb. 5. tab. 74. f. 1.*  
*In Indiæ utriusq. locis inundatis. Colitur in Persia.*  
 Culm. 8-10. ped. simpl. articul. subincurvus.  
 Fol. ad nodos magna, 4-pedal. 3. digitos lata,  
 striata, nervo albo, rugosa, pallide glauca.  
 Panic. arundinacea, albo-lanuginosa.
3. *Ravennæ*. S. panicula laxa, rachi lanata: fl. aristatis. *Syst.*  
*veg. ed. 14.*  
*Arundo &c. Zan. hist. 1. tab. 24. Monti in Zann.*  
*tab. 19. f. 3. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 8. f. 32.*  
*In Italia.*

Altitudo arborea. Culm. medullofus. Fol. 2. ulnus longa, viridia cum punctis rubentibus, ad basin argentea lanugine adfperfa. Panicul. albo-purpurefc.

4. *Teneriffæ*. S. fol. fubulat. planis: fl. paniculat. muticis: involuc. pilolo nullo; cal. villoliff. *Syft. veg. ed. 14. Lin. fuppl.*

*In Teneriffa.*

*Differt a reliquis speciebus cal. hirsuto, qui in illis nudus. Caret involuc. floscul. Glumæ ovatæ, nec fubulatæ, ut in S. fponaneo.*

Culm. pedal. & ultra, geniculatus, articulis adproximatis, foliatis. Fol. brevia, recta, glaberrima. Panicul. medioc. magnitudinis, fimil. *Holeo lanato.*

5. *fpicatum*. S. fol. undatis: fl. fpicatis (paniculatis). *Syft. veg. ed. 14.*

*Gramen &c. Pluk. alm. tab. 119. f. 1.*

*Tieria. H: Mal. 12. tab. 62.*

*In Indiæ petrofis.*

Culm. 1-2-ped. rectus, fimplex, geniculat. Fol. uncial. lata, bafi caulem amplectentia, margine pilolo. Panicula palmar. coarctata, ovata, vel cylindrica, ariftis fericeis, fufco-purpur.

- arundinaceum*. S. paniculæ confertæ peduncul. divifis: flosculis geminis, feflilib, pedicellarioque, cor. 3-valv. polygamis. *Retz. Obf. fæf. 4.*

*In Trunkebaria ad ftagnorum margines.*

Culmi alti ufq. 10-ped. craffi, foliofi, femi-inanes. Fol. verticillata, culmo adproximata, lata. Panicula 2-ped. contracta, rachi 4-gon. Pedunc. verticillati, triquetri, articulati. Cor. valvulis hyalinis, una longiore, acuminata.

- fagittatum*. S. *Aubl. Guian.*

*In Guianæ locis humidis, & fabulofis.*

Caul. maculati fuccum effundunt dulcem, & faccharatum.

- biflorum*. S. panicula lanata, fecunda: calycibus 1-fl. geminatis, extus lanatis. *Forsk. Æg.p.*

*In Arabiæ locis aquofis 24.*

Culm. plufquam oryza. quandoq. ramosus. Fol. nervola, bafi fuperne lanato-hifpida; fubtus obtufe carinata, tota viridia; in medio fuperior. canaliculata linea alba longitudinali. Fl. geminati, alter feflilis, alter pedunculat.

*hirsutum*. S. spica hirsuta: spiculis geminis; altera sessil. altera pedicellat. *Forsk. Æg. p.*

*In Arabia.*

Culm. ped. simpl. Fol. vaginæ longæ, glabræ, intra fol. barba terminatæ. Spica 4-pollic. hirsutæ alba.

91. PHALARIS. Cal. 2-valv. carinatus (acuminatus), longitudine æqualis, corollam includens.

1. *canariensis*. P. panicula ovata, spiciformi; glumis carinatis. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 10. f. 2. De Leerf. herb. tab. 7. f. 3. Ludw. ed. tab. 117. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 3. f. 1.*

*In Canariis inter segetes, & in Comitatu Nicænsi ☉.*

Caul. 3-4 cubital. geniculati, graciles. Fol. hordeacea, subulata, cœsia. Spica 1-fesunc. squamæ candicantes lineis viridibus. Sem. candidum, nitens.

2. *bulbosa*. P. panicula cylindrica; glumis carinatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente.*

Radix bulbosa. Spica 2-pollic. Glumæ ovatæ, carinatæ, arcte congestæ. Sem. album.

3. *nodosa*. P. panicula oblong. fol. ringentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europa australi.*

Radix ex pl. tuberculis Avellanæ magnitudine constans. Altitudo humana. Culmi paucis geniculis. Fol. rigida Arundinis, margine scabra; summum leviter ventricosum. Spicæ 4-5-unc. digiti crassitie, compactæ, ovat-oblong. mucicæ, acerosæ. Calyc. ovat-oblong.

4. *aquatica*. P. panicula spiciform. ovat-oblong: glumis lanceol. carinatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Barr. rar. tab. 700. f. 1. Buxb. cent. 4. tab. 53.*

*Ad Tyberim, & in Ægypto ☿.*

Culm. Arundinaceus. Fol. solidiuscula. Panicul. erecta. Glumæ glabræ.

5. *phleoides*. P. panicula spiciformi, cylindrica, glabra, passim vivipara. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 531.*

Gramen &c. *Morif. hist. tab. 4. f. 2. Bar. ic. tab. 21. f. 2.*

*In Europæ versuris, & ad vias ☉.*

*Habitus Phlei, sed fl. alii. Culm. sesquiped. ple-*

rumq. violac. Spica arcuata, pallens, in lobos divulsibilis, adsperta hinc inde glumis viviparis. Spiculæ alternæ, distichæ, culmo adpressæ, imbricatæ.

6. *utriculata*. P. panicula spicata: petalis arista articulata; vagina supremi folii spathifor. *Syst. veg. ed. 14. Scop. Delic. Insuh. fasc. 1. tab. 12.*

*In Italia* ☉.

Culmi solitar-pl. pedal. erecti, sæpe simplic. Fol. lata, mucronata, basi membrana albida. Spica 6-9-linear. e viridi-paleaceo-alba, vel spandacea.

7. *paradoxa*. P. panicula cylindrica, floscul. mucronatis; neutris plurimis; infimis præmorsis. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 12.*

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 33. f. 5. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 3. f. 6.*

*In Oriente, & Comitatu Nicæensi* ☉.

Radix fibrosa, minime bulbosa. Culm. pl. pedal. erecti, ante anthesin decumbent. læves, sicuti fol. similis priori.

8. *arundinacea*. P. panicula ampla, oblong. ventricosa. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 259. Leerf. herb. tab. 7. f. 3.*

Gramen &c. *Schreb. tab. 3. f. 4. A. B. C. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 41.*

b. *Phalaris pida*.

*In Europæ subhumidis ad ripas lacuum* ☉.

Caul. ogyd. crassus. Fol. ad 8. lineas lata, glabra, subglauca. Panicul. pedal. ramosissima, sed ramis fascicul. fl. rectis, confertis, imbricatis, alterne longioribus, col. purpurasc. quandoq. albo. Loco nectarii sub quavis gluma corollina penicillum pilorum gerit.

9. *cruciformis*. P. panicula secunda, lineari: calycibus 2-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*Daçylis* &c. *Gmel. Sibir. 1. tab. 29.*

Gramen &c. *Barr. rar. 1158. tab. 2.*

*In Europa australi.*

*Paspalum refert, sed valvula fl. modo contrario dehiscent.*

Caul. 1-2. ped. Fol. palmaria, pulchre viridia. Panic. erecta.

10. *xizanioides*. P. panicula simplicifl. fl. muricatis; altero sessili. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India Orient.*

Culmi 2-ped. læves. Fol. rariora, breviora, vaginantia. Fl. ad paniculæ dentes singulos 2.

*Facies aliqua P. oryzoides, sed corolla instruitur.*

11. *oryzoides*. P. panicula effusa: glumarum carinis ciliatis.

*Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 22.*

*Gramini &c. Sloan. Jam. 1. tab. 71. f. 1.*

*Gramen miliaceum &c. Mont. prodr. ic. 58.*

*Asperella. Italis.*

*In Italiæ agris Oryzæis; & alibi secus aquas 24.*

*Petalis caret. Culm. 3-ped. & ultra. Fol. 2-lineas lata, aspera. Ex sinu fol. supremi exit panicula erecta, ramosa, stricta, pedicellis flexuosis. Flosc. albicant. lineis virentibus.*

12. *dentata*. P. spica cylindrica, glumis muticis, carinatis, carina dentata; dentibus apice globosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Africa.*

*Gramen pulchrum, & distinctissimum p.\* intuitu.*

*Statura P. Phleoidis. Culm. geniculati, glabri, fol. brevibus. Spicæ terminal. solitaræ.*

13. *hispida*. P. spicis digitatis: glumis scabris: fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Japon.*

*In Japonia.*

*Differre omnino videtur a P. Zizanoide. Culmi decumbent. pedal. ramosi, capillar. apice erecti, articulati, glabri. Fol. vix pollic. vaginant. acuta, patula, ciliata, glabra. Spicæ pl. 3-6. unguicul. Floscul. alterni, sessil. imbricati.*

- aspera*. P. panicula spicata, tereti: calycibus obcordatis, mucronatis. *Reiz. Obs. fasc. 4.*

*In alpibus Europæ merid.*

*Culm. spitham. basi ramosi, vaginati. Fol. brev. angusta, nuda. Panicul. 1-4-poll. longa. Cal. pallide viridis. Sem. ovale, oblong. minime compressum.*

- alpina*. P. panic. cylindrica, spicata: glumis calycin. subaristat. dorso ciliatis. *Turre Giornale di Venezia. T. 1.*

*Culm. 2-pedal. erect. Panic. variegata, villosa, ex spicul. compactis spicam cylindricam efformantibus. Cal. glumæ carinatæ, subaristatæ, dorso ciliatæ. Cor. calyce duplo brevior.*

- semiverticillata*. P. paniculæ ramis semiverticillatis, patentibus: spicul. muticis, ciliatis: fol. glabris. *Forsk. Eg.*

*In Arabia.*

*Culm.*



- disticha*. Culm. erect. sesquiped. glaber. Fol. spitham. linear. plana. Panic. rami iterum paniculati. P. panicula ovata, mutica: fol. distichis, involutis: culm. repente, ramoso. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*
- eriflata*. Culmi pars erecta spitham. Fol. conferta, subpungentia, basi barbata, viridia. Bractea panic. folium magnum, pallidum. Panic. ovata, patens, diffusa. P. panicula spicifor. oblonga; valvula calycina utrimq. arista, cal. duplo longiore. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*
- velutina*. Spica aristis pilosa. Vaginæ, & fol. glabra. Ad basin fol. membrana erecta, cauli adpressa, alba. Fol. plana, valde striata. Panic. sesquipollic. varie ramosa. P. spicis alternis, filiformibus: culmo, soliisq. villosiss. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*
- setacea*. Culm. ped. Fol. 3-pollic. lineari-lanc. angusta, velutina. Spicæ multæ, terminal. 3-pollic. sparsæ, erecto-patent. P. solitaria, spicata; spiculis solitar: involuc. setaceis: fl. sesquilongioribus. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*
- vaginiflora*. Culm. ped. simpl. Fol. 2. pollic. involuta, plana, glabra. Fol. supremum latius, ante efflorescentiam spicam includit in spatha. Spica 2-pollic. cylindrica, alba. P. culm. repentibus, spicarum capitulis axillaribus, sessilibus, vagina fol. circumdatis: calyce cor. angustiore, fere filiform. 2-valv. 1-fl. valvis compressis, angustis, altera longiore. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*
- minor*. Fol. suprema opposita. P. panicula spiciform. cylindrica: calycibus carinatis, nudis; nectar. solitar. *Retz. Obs. fasc. 3.*  
 Nulla habet tubera. Simil. P. *canariensis*. sed minor, panicul. haud ventricosa, & angustior.
92. PASPALUM, dissectum. Cal. 2-valv. orbicularis. Cor. eiusdem magnitudinis. Stigm. penicilliformia. P. spicis alternis, rachi membranac. fl. alternis, apice pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Tom. I.* I.

## TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen &c. *Pluk. mant. tab. 350. f. 2.*

*In America calidiore* ☉.

Gramen prostratum, fol. vaginis fere spathaceis, Spicæ paucæ rachi membranac. dilatata ad latitudinem spicæ ipsius distichæ, & secundæ. Fl. orbiculati. Fol. utrimq. pubescentia.

2. *serobiculatum*. P. spicis alternis, rachi membranac. fl. alternis: calycibus multinerviis, extus serobiculatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India Orient. 24.*

Culm. erecti, pedal. & ultra, basi hirsuti. Vaginæ fol. purpureo-sc. margine ciliatæ, hirsutæ. Fol. lævia, supra linea albida, longitudinali. Spicæ sæpe reflexæ.

3. *villosum*. P. spicis alternis, secundis, rachi hirsuta; fl. duplici ordine, alternis, secundis. *Syst. veg. ed. 14. Thum. Japon. tab. 8.*

*In Japonia.*

Culm. 3. pedal. glaber. Fol. breviss. subscabrida, striata. Spicæ 3-4.

4. *virgatum*. P. spicul. paniculatis, alternis, basi villosis: fl. geminis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 69. f. 2.*

*In Jamaica.*

Valvula cal. exterior breviss. margine hirsuta.

5. *paniculatum*. P. spicis paniculatis, verticillato-aggregatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 72. f. 2.*

*In Jamaica.*

Erectius hoc est. Spicul. linear. secundæ, filiform. angustiss. Fl. duplici ordine digesti, acutiusculi.

6. *distichum*. P. spicis duabus, altera sessili; fl. acuminatis, *Syst. veg. ed. 14.*

*In Jamaica.*

Gramen pedale. Fol. involuto-subulata. Spicæ erectæ, adproximatæ, secundæ. Cal. & cor. ovata.

- hirsutum*. P. spicis alternis, subbinis, rachi membranac. calycibus multinerviis, lævibus: fol. pedicellisq. hirsutis. *Retz. Obs. fasc. 2.*

*In China.*

Culmi erecti, foliosi, superne pilosi. Fol. & vaginæ undiq. pilosæ, oris barbatis. Spicæ

TRIANDRIA DIGYNIA.

163

- longiflorum*. P. erectiusc. subsessil. Fl. secundi, alterni, pedicellati, glabri.  
P. spica gemina: floscul. ovali-oblongis. *Retz. Obs. fusc. 4.*  
*In Malabar.*  
Culmi adscendentes, filiform. Fol. brevia, acuta, patentia, ad culmi basin vaginantia. Spicæ terminal. erectæ; lineares. Fl. alterni, pedicellati, adpressi. *Facies Panicæ distachii.*  
Cal. 3-valv. valvula tertia minima, post alteram posita.
93. PANICUM.

\* *Spicata.*

1. *polystachion*. P. spicis teretibus: involucl. 1-fl. fasciculato-setosis: culmis erect. superne ramosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Gramen &c. Rumph. amb. 6. tab. 7. f. 2.*  
*In India ♂.*  
*Simil. in spicis P. glauco, sed dimidio minoribus: pistill. sanguineis. Culm. inferne radicans, ramosus, 1-6. pedal. Fol. pilosa, superne fere opposita. Involuc. purpurascens.*
2. *verticillatum*. P. spica verticillata; racemul. quaternis; involucl. 1-fl. bifetis: culm. diffuso. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Gramen &c. Bauh. Theat. tab. 139.*  
*In Europa Austr. & Oriente, ad vias, & limites agrorum ☉.*  
*Simil. P. viridi, sed spica racemis longioribus, 3-4 deorsum secundis. Fl. virid. pistill. purpurascens. Culmi læves, 2-pedal. Fol. nuda.*  
*Var. maior panicula magis diffusa, longiore, & crassiore.*
3. *helvolum*. P. spica tereti: involucl. 1-fl. fasciculato-setosis: seminibus nervosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In India Or. ☉.*  
*Simil. P. glauco, sed reapse diversum. Culm. 6. ped. ramosi, ramis sterilibus brevioribus. Fol. ad basin supra pilis albis, fere pollicaribus, patentiss. Spica spitham. simplex, floscul. absque ordine. Involucl. helvola, multifera, fl. multo longiora. Gluma striis longitudinalibus (nec transversis undulatis) distinctis, viridibus.*

4. *glaucum*. P. spica tereti; involucl. 2-floris, fasciculato-pilosis: feminibus undulato-rugosis. *Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 2. f. 2.* \* *chreb. gram. tab. 25. Lob. ic. 13.*  
*In Indiis, Italia, Germania; frequens in arvis* ☉.  
 Culm. recti. Fol. lanceol. lubrus tomentosa, vaginis oris pilosis. Pedunc. valde fulcatus. Spica simplex, magnitudine varia, oblonga, crassa, ut in P. vulg. Involucl. in spica matura semper lutea, vel fulva. Fl. cœrul.  
 P. viride, glaucum, & verticillat. ex datis characteribus vix distinguuntur. Quærendi sunt alii, si adsint.
5. *viride*. P. spica tereti, involucl. 2-fl. fasciculato-pilosis: feminibus nervosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab 852. monente Vahl. Leerf. herb. tab. 2. f. 2.* \* *Morif. hist. 3. f. 3 tab. 4. f. 10.*  
*In Europa australi, ad limites agrorum* ☉.  
 Simil. P. verticillato, sed molle, nec asperum. Culm. ped. & ultra, erectus. Fol. lata, in origine sua etiam tomentosa. Spica subovata, flosculis solitar. sessilibus. Involuc. f. ræceum, flavum, setis longioribus fl. superantibus.
6. *italicum*. P. spica composita, spicul. glomeratis, setis immixtis; pedunc. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. tab. 75. f. 2.*  
*In Indiis* ☉.  
 Culm. 2-pedal. Spica ovata, varians col. & magnitudine. Sem. Milio exiliora, & rotundiora.
7. *crus corvi*. P. spicis alternis, secundis; spicul. subdivisis; glum. subarist., hispidis; rachi trigona. *Syst. veg. ed. 14. In Indiis* ☉.  
 Habetur pro varietate sequentis, sed minus, tenerius. Panicula magis nutans; rachi trigona, nec pentagona. Spicæ secundæ, nec undique rachi incumbentes.
8. *crus galli*. P. spicis alternis, coniugatisq. spicul. subdivisis; glumis (sæpe) aristatis, hispidis, rachi 5-angulari. *Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 2. f. 3. Gramen &c. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 4. f. 15. b. Morif. l. c. f. 16.*  
*In Europæ, & Virginia arvis ubique* ☉.  
 Culm. 2-pedal. Paniculæ axillar. spicul. alternæ, paniculatæ, pedunc. ramosis. Cal. non est 3-valv. nec 1-fl. rachis quonque sæpe 3-gona.

*Variat aristis longiss. aut breviss. sicuti var. b. aristis decies glumis longioribus, manifeste a communi planta, cui vix sesquialongiores aristæ, differt.*

9. *cololum*. P. spicul. alternis, secundis, muticis, ovatis, scabris; rachi teretiuscula. *Syst. veg. ed. 14. Gramen &c. Pluk. alm. tab. 187. f. 5. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 64. f. 3. Ehret. pict. tab. 3. f. 3. Rumph. amb. 6. tab. 5. f. 3.*

*In Indiæ cultis* ☉.

Culmi adscendent. spitham. teretes. Fol. lævia, sæpe ferrugineo-maculata, fauce purpurasc. absq. ligula. Spica simpl. secunda. Spicul. gluminae, subsessil. absq. fascicul. pilous. Pistill. alba, mox purpurasc.

10. *brizoides*. P. spicis alternis, sessilibus, secundis, adpressis, oblong. *Syst. veg. ed. 14.*

*Gramen &c. Pluk. alm. tab. 191. f. 1.*

*In India.*

Culm. erect. ped. articul. lævis. Fol. alterna, remota, 5-6. longitudine culmi, lævia, basi vaginantia, collo cartilagineo. Rachis terminal. palmar. simpl. Spicæ sæpe 5.

11. *hirtellum*. P. spica composita; spicul. adpressis, alternis, calycibus geminis; valvul. omnibus aristatis, extrema longissima. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 12. f. 1.*

*P. undulatifolium. Ard. sp. 2. tab. 4.*

*Gramen &c. Bocc. mus. 2. tab. 55.*

*In Indiis, & in Italia ad radices collium. & montium locis umbrosis* 24.

Culm. repent. aut erectiusculi. Fol. brevia, ovat-lanceol. undulata, vaginis longis. Spicæ secundæ, subsessil. Pl. aristæ filiform. obtusæ, sanguineæ, glutinosæ, demum uncinatæ. Stam. pistillaq. alba.

12. *conglomeratum*. P. spica subovata, secunda; floscul. obtusis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India Orient.*

Culmi prostrati, radicans. ramosiss. filiform. Fol. lanceol. lævia, vaginis articulo dimidio brevioribus. Spica parva, sæpe 8-fl. absq. pilis. Pistill. plumosa, magnitudine totius fl.

13. *sanguinale*. P. spicis digitaris, basi interiore nodosis; floscul. geminis muticis; vaginis fol. punctatis. *Syst.*

veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 388. Schreb. gram. tab. 16. Burm. Ind. tab. 10. f. 1. Loersf. herb. tab. 2. f. 6.

Græmen &c. Buxb. cent. 5. tab. 65. Scheuchz. gram. tab. 2. f. 2. Morisf. hist. 3. f. 8. tab. 3. f. 5. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 170. f. 2.

In America, Mediæ, & Europæ arvis ubique ☉.

Culm. basi procumb. unc-semiped. Fol. longa, margine obscure rubro, vaginis pilosis. Spicæ plurimæ, longæ, lineares; primæ verticill. ultimæ alternæ. Fl. pedunculati pedunculo uno longiore.

14. *dactylon*. P. spicis digitat. patentibus, basi interiore villosis: fl. foliar. sarmentis repentibus. Syst. veg. ed. 14. Monti ic. 99. bona. Scheuchz. gr. tab. 2. f. 11.

Græmen &c. Morisf. hist. 3. f. 8. tab. 3. f. 4.

In pascuis, & agris passim 24.

Stolones repentes, crassii, solidi, squamosi. Culm. pedal. rigidi. Fol. ima superioribus breviora, villosa, scabra, glauca. Spicæ terminal. linear. rigidæ, fusco-rubræ. Fl. unilateral.

Jure merito Cl. Hall. ex hac planta, sicuti ex consimilib. spicis digitatis, *Digitaria* genus constituit, propt. defectum tertiæ glumæ calycinae.

15. *filiforme*. P. spicis subdigitat. adproximatis, erectis, linearibus, rachi flexuosa, dentibus 2-fl. altero celsili. Syst. veg. ed. 14. Jacq. obs. 3. tab. 70.

In Amer. Septentr.

Culm. pedal. subaphyl. filiform. superne erecti, nudi. Fol. lanceol. Spica rara. Spicæ tenues, primum valde adproximatæ quasi in unum, quamvis alternæ.

16. *lineare*. P. spicis digitat. subquaternis, linearibus; floscul. solitar. secundis, muticis. Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 10. f. 2.

Græmen &c. Sloan. hist. 1. tab. 70. f. 3.

In Indiis.

Culmi prostrati, ramosi, læves. Spicul. rectæ, angustæ.

17. *distachyon*. P. spicis geminis, secundis, lævibus. Syst. veg. ed. 14.

In India Orient.

Culm. pedal. angustiores, subramosi. Fol. brev. via, graminea, margine scabra. Spicæ subæ-

qual. Fl. gemino ordine longitudine ad rachin, sessil. mutici, ovati, læves. Anth. fl. vae. Pistil. plumosa, purpur. *Facies Paspali distichi, sed fol. lanceol. plana; nec setacea, involuta, Fl. acutiusc. nec mucronati.*

18. *compositum*. P. spica composita: spicul. linearibus, secundis: flosc. geminis remotis; calycib. aristatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Zeylona.*

Culm. renens, folios. affurgit filiform. tener, simpl. Fol. lanceol. reliquis latiora, breviora. Spicul. 4-5. alternæ, remotæ, rachi appressæ.

19. *elatus*. P. spica composita, spicul. oblong. sparsis, adpressis: floscul. confertis; calycibusque mucronato-aristat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*In Malabarica ☉.*

*Simile priori.* Culm. 6-ped. erectus, rigens, Fol. longa, graminea. Spica incurva, composita spicis pl. 12. & ultra, remotis, alternis, raro oppositis, in omni latere racheos.

**\*\* Paniculata.**

20. *dichotomum*. P. panicul. simplicibus: culmo ramofo, dichotomo. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

*Statura refert arbusculam inferne simplicem, superne fasciculatam.* Culm. vix pedal. Fol. linear. plana, glabra. Panicula minima.

21. *ramosum*. P. panicula ramis simplicibus; fl. subternis; inferiore subseffili: culmo ramofo. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Indiis.*

Culmi pedal. erecti, læves, articulis basi crassiuscul. geniculat. Fol. vaginis lævibus striatis, margine, fauceq. ciliata. Panicula ramis triquetris.

22. *coloratum*. P. panicula patente; staminib. pistillisq. coloratis: culmo ramofo. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cairi 24.*

Culm. 2-pedal. valde ramofo, læves, vaginis fol. pilosis, demum scabris. Panicula laxiuscula, ramis filiformibus. Anth. crocæ & pistil. sature violac. quibus a P. capillari, reliquisque mox distinguitur. Fol. breviora, linear. laxa.

23. *repens*. P. panicula virgata; fol. divaricatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania? 24.*

*Simil. priori.* Culmi repentes, adscendent. ped. al.  
Fol. inferne latiora, vaginantia, patentiss. mucronata, vaginis subpubescentibus: super. fol. longiora, angustiora, erecta. Panicula constans 6-8. racemis erectis, quibus fl. alterni, remotiusc. ovati.

24. *miliaceum*. P. panicula laxa, flaccida: fol. vaginis hirtis: glumis mucronatis, nervosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
b. P. sem. nigro. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 5. f. 2.*  
*In India.*

Culm. radicans, ramosus. Fol. graminea, vaginis pubescentibus. Panicula nutans. Sem. luteum, album, vel nigrum.

25. *capillare*. P. panicula capillari, erecta, patente; fol. vaginis hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 72. f. 3.*

*In Virginia, Jamaica* ☉.

*Simil. Poæ capillari, sed totum hirsutum.* Culm. 3-ped. geniculis barbatis, sed barba sursum versa. Pili in ipsis foliis, etiam e punctis elevatis proficiscuntur. Panicula plusquam ped. pedunc. pedicellisq. strictis.

26. *grossarium*. P. panicula ramis simplicibus: fl. geminis; pedicello altero breviss. altero longitudine floris. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 11. f. 1.*

*In Jamaica.*

Culm. 2-pedal. compressus, quandoque ramosus. Fol. lato-lanceol. Graminibus europæis latiora. Racemi erecti, alterni.

27. *latifolium*. P. panicula racemis lateralibus simplicibus: fol. ovat-lanceol. collo pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
Gramen &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 5. f. 4.*  
*Sloan. Jam. hist. 1. tab. 71. f. 3.*

*In America.*

Fol. latitudine Commelinæ, ad fauces amplexicaulia, basi pilosa. Panic. valde mediocris. Fl. maiusc. mutici.

28. *elandestinum*. P. racemis occultatis intra fol. vaginas. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 80.*

*In Jamaica, Pennsylvania* 24.

Culmi dichotomi, ramosi. Fol. ovat-lanc. vaginis punctatis pilosis. *Ad fine priori.*

29. *arboreus*. P. paniculatum, ramosiss. fol. ovat-obl. acuminat. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India* 24.



Altitudine certat cum altissimis arborib. Culm. vix penna anserina latior. Panicula laxa, sparsa. Sem. alba.

30. *curvatum*. P. panicula racemosa, glumis curvatis, obtusis, nervosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India Orient.*

Culm. filiform. læves. Fol. lanceol. lævia, subtus 5-nervia, margine scabra, vaginis profunde striatis. Panic. erecta, angusta. Calyc. fructescens, triplo maius purpureo. Cor. calyce dimidio brevior, membranac.

31. *virgatum*. P. panicula virgata; glumis acuminatis, lævibus, extima dehiscente. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

Græmen altissim. panicula maxima, diffusa. Fol. Arundinacea. Spicul. capillaceæ, virides. Glumæ stramineo-fuscæ, acutæ, sed muticæ.

32. *patens*. P. panicula oblonga flexuosa, capillari, patente; calycibus 2-fl. fol. lineari-lanceol. culmo radicante. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 10. f. 3. Hippogræstis &c. Rumph. amb. 6. tab. 5. f. 3.*

*In India, Lusitania.*

Culm. geniculati, glabri. Spicæ complanatæ, virides; vetustiores fusco-purpure.

33. *brevifolium*. P. paniculatum, fol. vaginis longitudinaliter ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Sloan. Jam. 1. tab. 72. f. 3. Pluk. alm. tab. 189. f. 4.*

*In India.*

Fructificatio simil. P. patenti. Var. fol. angustis, & lanceol. Culmi 1-2-pedal. repentes, interne sæpe ramosi. Fol. amplexicaul. ovato-acuminata, lævia. Panicula tenuiss. e pedunculo capillaribus confata.

34. *divaricatum*. P. paniculis brevibus, muticis: culmo ramosiss. divaricatis. pedicel. 2-fl. altero brevior. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Jamaica.*

Culm. altus, filiform. rigidus. Fol. lineari-lanceol. Panicula subimpl. depauperata.

- Oryzoides*. P. spica composita nutante: spicul. secundis, aristatis, rachi 3-gona. *Arduin. Spec. 2. tab. 5. Non est var. P. crus galli.* Radix annua. Culm. sesqui-2. pedal. geniculati, ferruginei, inferne vaginis fol. spitham. vestiti. Fol. glabra, mar-

- gine aspero, lævissime striata, dilute viridia.  
Spica 3-unc. subpurpur. spiculæ subfessil. uncial. aristatæ. Sem. cinereum, lucidum.
- fulcatum.* P. latifolium, fol. lyratis. *Aubl. Guian. Plum. MSS. tab. 105.*  
*In Guiana.*
- maculatum.* P. scandens; caule arundinaceo. *Aubl. Guian. Plum. MSS. tab. 82.*  
*In Guiana.*
- compressum.* P. spicis digitatis, secundis, compressis; spicul. solitar. bifariam imbricatis. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*  
Culm. diffus. vix pedal. ramosus, compressus. Fol. vaginæ compressæ, glabræ. Fol. linear-lanceol. plana, unargine ciliato-scabro, basi pilosa. Spicæ ternæ, sesquipollic. Spiculæ lanceol. valde compressæ.
- geminatum.* P. spicis linearibus, alternis. adpressis: spicul. bifariam imbricatis, muticis. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*  
Culm. pedal. teres. Spicæ, & spicul. fessil: quæ alternæ, remotæ. Fol. plana, nuda, striata, barbata ad basin.
- turgidum.* P. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*  
Frutex facie Junci. Fol. sesquipollic. plana, involuta: vaginæ longæ, ad dichotomias ventricosæ, membranæ albæ. Spicul. obesæ.
- tetraspichon.* P. spicis alternis, secundis, 4-fariam imbricatis; floscul. secundis, hinc planis, inde gibbosis, villosis, muticis. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*  
Culm. pedal. compressus, ramosus, striatus. Fol. plana, glabra. Spicæ fessil. dum florent patentes; cæterum adpressæ, lineares.
- adpressum.* P. caul. ramofo; antheris purpurasc. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*  
Culm. longe repens in arenæ superficie.
- muticum.* P. spicis alternis, secundis; spicul. remotis, geminatis, muticis, altera pedicellata: rachi 3-gona, flexuosa. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*  
*Simil. P. coloni.*
- adherens.* P. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*

Involuc. setacea, retrorsum aculeata. Fl. aculei-  
arcte vestibus adhærent.

*Caffrorum.* P. panicula verticillatim ramosa: cor. nullis: ne-  
ctariis villosis-laceris. Retz. Obs. fasc. 2.

*Facies Holci.* Cal. Panicæ inversus. Radix an-  
nua, fibrosa. Culm. erect. 3-4-ped. fæctus,  
tectus vaginis fol. geniculis tumidis. Folia se-  
squipedal. patentia, sesqui-pollic. lata, subse-  
cunda, glabra, margine scabra. Vaginæ non  
raro farina alba contersæ. Panicula ramis pa-  
tentibus, multifi. Cal. ex albido-hyalinus, car-  
tilagin. hirsutus, rigidus, triglumis.

*Ægyptiacum.* P. Retz. Obs. fasc. 3.

In Ægypto ☉.

Simile P. filiformi, at distinctum a Cl. Jussieu.

Culm. 1-2-ped. vaginis longe, & dense pilosis.

Fol. 5-7. longa, linearia, utrimq. pilosa. Spi-  
cæ subdigitatæ, longæ, lineares, 4-5. Rachis  
plana, membranacea, flexuosa: huic ab uno  
latere alterni adsident flosculi bini, pedicellat.  
altero pedicello triplo longiore. Fior. lanceol.  
striati, valvula accessoria minuta.

*suittana.* P. spicis alternis, sessilibus, secundis. Retz. Obs.  
fasc. 3. Pluk. phyt. tab. 417. f. 7.

Gramen pulcherrimum, læve, glabrum. Culm.  
compressus, foliosus. Fol. linearia. Rachis  
extus plana, intus, vel. a latere spicularum  
carinata, marginata. Spicul. erectiusc. decre-  
scentes. Fl. alterni, sessil. imbricati, secundi.  
Cal. ovat-acuteus, valvula accessoria parva, ro-  
tundata.

Nisi in P. brizolæ monuisset Lin. spicas intersti-  
tiorum longitudinem habere, & flosc. triplici or-  
dine sessiles esse, esset illud ipsum.

*indicum.* P. spica simpl. nuda; pedicell. geminis: culmo  
adscendente, basi ramoso. Retz. Obs. fasc. 3.

P. indicum. Lin. mant. non conglomeratum  
mant. in nostro nec spica secunda, nec flosc.  
obtus.

Gramen semiped. filiform. Spica vix semipoll. in-  
volucellis nullis. Valvul. cal. inter or. subæ-  
qual. cymbiform. acutæ, leviter hispidæ; ac-  
cessoria obtusa, minuta.

*trigonum.* P. panicula erecta; pedunc. 2-fl. calycibus ob-  
tusis, hispidis, 1-fl. seminibus, trigonis. Retz.  
Obs. fasc. 3.

*P. patens* (non Linn.) *Burm. Ind. tab. 10. f. 2.*  
Culmi prostrati, radicales, spitham. foliosi. Fol.  
angusta, glabra. Panícula parva, stricta, pe-  
dunculis rarius parum flexuosis. Glumæ caly-  
cinæ inæquales.

*flexuosum.* *P. panicula capillari, patente; peduncul. flexuo-  
sis; calicibus ovatis, geniculorum barba reflexa.* *Retz. Obs. fasc. 3.*

*Cum P. capillari confunditur.* Gramen subped.  
Culm. decumbent, ramosi, leviter pilosi. Fol.  
2-pollic. angusta, pilosa, sicuti vaginæ, sed  
nulla puncta callosa. Panic. vix 3-pollic. ova-  
ta. *Var. glabra.*

*setigerum.* *P. spicis remotis: flosculis secundis; racheos  
dentibus setigeris.* *Retz. Obs. fasc. 4.*

*P. repens* *Burm. Ind. tab. 11. f. 1.*

*In China.*

Culmi filiform, ramosi, foliosi. Fol. 2-pollic.  
subcordata, marginibus vaginarum ciliatis.  
Spicæ infer. remotæ; superior. sæpe verticil-  
latæ, breves. Fl. geminati. Cal. ovatus, acu-  
tus, valvula accessoria brevi, lata.

*flavidum.* *P. culmo folioso: spiculis remotis, sessilibus,  
appressis, secundis, paucifl.* *Retz. Obs. fasc. 4.*  
*In Zeylona.*

Culm. 2-pollic-semiped. pl. erecti. Rachis elon-  
gata. Spicul. 3-7 breves. Fl. globosi, alter-  
ni, secundi, flavi. Cal. glumæ omnes apice  
violac.

*squarrosus.* *P. spicis geminis, horizontalibus: involucr. fl.  
squarrosis: culm. decumbentibus.* *Retz. Obs.  
fasc. 4.*

*In arenosis Malabaræ.*

*Structura adeo singulari, ut proprium videatur  
constituere genus.* Culm. radicales, ramosi,  
foliosi. Fol. conferta, brevia, cum vaginis  
tomentosa. Pedunc. erectus, elongatus, nu-  
dus. Spicæ divergentes, secundæ, squarrosæ.  
Ad articulos fl. fasciculati, bracteis difformi-  
bus. Fl. terminales steriles. *Facies nonnulli  
Cenchri.*

*umbrosus.* *P. spicis subquaternis, remotis; floscul. geminis,  
inæqualiter pedicellatis: culmo repente, flac-  
cido.* *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In umbrosis Indiæ Orient.*

Caul. ped. filiform. radicanter, foliosi. Fol. brevia, lineari-lanceol. nuda. Flosculi secundi, subbinati, ovati, acuti. Cal. viridi-striatus, hinc convexus, inde planus, valvul. accessoria brevi, albida. Sem. album, a latere planiori marginatum.

*ciliare.* P. spicis subdigitaris, adproximatis, erectis, linearibus: rachi flexuata: dentibus 2-fl. calycibus ciliatis. Retz. Obs. fasc. 4.

*In China.*

*Sinullum.* P. filiformi, ut facile confundantur. Gramen telquiped. basi ramosum. Gramen hoc = Panic. Ægyptium Fasc. 3. = P. filiforme = P. sanguinale videntur tot variet.

*ischamoides.* P. panicula erecta, contracta; calycibus 2-fl. polygamis, acutis: culmo simplici: fol. distichis, rigidis. Retz. Obs. fasc. 4.

*In Malabarica udis ad margines stagnorum.*

*Proceritate reliqua Panic. excedit.* Gramen totum exalbidum. Culm. erecti, foliosi. Fol. patentia, vaginis tomentosis. Fl. plerumque binati, altero pedicellato. Sem. ovatum, planiuscul.

*antidotale.* P. panicula nutante; calycibus bifloris, polygamis, acutis: culmo erecto, ramosiss. Retz. Obs. fasc. 4.

*In hortis Malabarorum 24.*

Rad. stolonifera. Culm. 8-ped. & ultra. Fol. margine, & nervis maioribus aspera, vaginis barbatis. Panicul. ped. ramosiss. Flosculi copiosi, virides.

*Nigri hoc utuntur præcipue ad ulcera Nasi; etiam ut discutiens in aliis casibus vel tritum, vel in cataplasmate.*

*remotum.* P. paniculæ ramis triquetris: floscul. subgeminatis; altero pedicellato: culmo ramoso, tetragono-compresso. Retz. Obs. fasc. 4.

*In Tranquebaria.*

Culmi 2-ped. & ultra. Fol. linear. 4-6-pollic. nuda. Paniculæ rami suboctoni, capillar. remoti, solitar. Floscul. remoti. Cal. albidus. Sem. ovatum, planiuscul. album.

*aristatum.* P. culmo repente, radicante: paniculæ ramis indivisis: floscul. plerumq. binis, sessilibus, aristatis. Retz. Obs. fasc. 4.

*In China.*

## TRIANDRIA DIGYNIA.

Culm. ramosus. Fol. brevia, lanceol. nuda, vaginis ciliatis. Panicula stricta. Involucra setacea, alba, numero variantia.

*muricatum.* P. panicula patente: fl. solitar. muricatis: culmo radicante, adscendente. Retz. Obs. fasc. 4.

*Habitat.* . . .

Culm. sesquiped. filiformis. Fol. brevia, perfecte lanceol. pilis albis, sparsis. Panicula ramis brevibus. Fl. parvi, obliqui. Cor. obliqua, glaberrima.

*notatum.* P. panicula patente: axillis notatis: fol. lanceol. ciliatis. Retz. Obs. fasc. 4.

*In Sumatra.*

Culm. altus, tenuis, geniculis nigris. Fol. 5 pollic. longa, &  $\frac{1}{4}$  lata, levissime pilosa, margine ciliata; vaginis ore barbatis. Panicula fere pedal. in axillis nigro-notata. Cal. glumæ 2 interior. purpurascens; accessoria albidæ.

*radicans.* P. paniculatum: culm. ramoso, radicante: folior. basi, vaginisq. longitudinaliter ciliatis. Retz. Obs. fasc. 4.

*Ad Canton lectum.*

*Simil. P. trigono* Fasc. 3. *Vix sub var. angustifolia P. brevifolii intellexit Lin.*

Gramen pedal. tenue, glabrum. Culm. usq. ad paniculam foliosus. Fol. lineari-lanceol. sesquipollic. Panicul. 2-pollic. erecta, tenuis. Fl. parvi, pedunculat. obliqui, purpur. nudi.

94. PHLEUM. Calyc. glumæ cuspidatæ, & intus truncatæ. Cor. inclusa.

1. *pratense.* P. spica cylindrica, longiss. ciliata: culmo erecto. Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 14. Leerf. herb. tab. 3. f. 1.

Gramen &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 4. f. 1.

*In Europæ versuris, & pratis* 24.

Culm. 1-2-pedal. 4-7 nodis. Radix bulbosæ similis. Spica densiss. mollis, virescens; matura albicans. Spiculæ compressæ. P. *pratense*, *nodosum*, & *alpinum* sunt valde simil.

2. *alpinum.* P. spica ovato-cylindracea. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 213. Scheuchz. gram. tab. 3.

*In alpibus Lapponicis, Helveticis &c.* 24.

*Differt a congeneribus spica nigricante.* Culm. pedal. Fol. glabra. Spica 1-2-unc. junior bre-

vissima; adulta longior. Glumæ villosæ, aristatæ.

3. *nodosum*. P. spica cylindrica: culmo adscendente: fol. obliquis: rad. bulbosa. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 380. Leerf. herb. tab. 3. f. 2.*

Gramen &c. *Barr. ic. 53. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 4. f. 3. Petiv. gram. tab. 3. f. 1.*

*In Europa, in pascuis, & ad vias in montanis &c.*

Simil. P. pratense, sed radix bulbosa. Culm. non rectus, sed adscendens. Fol. bifaria, obliqua, lævia, exceptis marginib. scabris. Spica glabra, modo brevis, modo longior; antheræ albæ.

*In solo pingui plantatum subsequenti anno in P. pratense transit. Leerf.*

4. *arenarium*. P. spica ovata, ciliata: culmo ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 33. f. 8.*

*In Europæ locis arenosis ☉.*

Culm. digital. Spica uncial. turgida, vix e vagina fol. exiens.

5. *schoenoides*. P. spicis ovatis, obvolutis; fol. breviss. amplexicaulibus, mucronatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Italia, Hispania, Smyrnæ ☉.*

*Habitus Schoeni aculeati.*

- alopesuroides*. P. *Piller. It. Sclavon. tab. 16.*

*In Sclavonia,*

Rad. fibrosa. Culm. pl. conferti, adscendentes, petal. Fol. brevia, acumin. tenuia. Spic. cylindricæ, tenues, cœrulescent. Calyc. glumæ acut. mucicæ, subvillosæ. Cor. 2-valv. Anth. fordide albæ.

*Gramen habitu Alopecurum refert, totumque e viridi-purpureo.*

- viride*. P. spica cylindrica, lævi: culmo erecto. *All. Fl. Ped.*

*Ad sepes agrorum locis sterilibus ☉.*

*Differt a P. pratense spica viridi, dimidio brevior, lævi, constanter non ciliata. A P. nodoso rad. non bulbosa, fol. non obliquis.*

- Gerardi*. P. spica subrotunda; glumis ciliatis: caule simplic: folior. vaginis ventricosiss. *Ger. Gall. prov. All. Fl. Ped.*

*P. capitatum. Scop. Fl. Carn.*

*In summis alpiis pratibus &c.*

- Michellii*. P. spicis paniculatis, hirsutis; calycibus lanceo-  
lat. Hall. helv. n. 1532. All. Fl. Ped.  
Gramen &c. Barr. ic. 21. f. 2.  
In pascuis montanis, & locis siccis 24.  
Spica longa, cylindrica, flavescent, locustis pi-  
lofis.
- geniculatum*. P. culmo geniculato; spica subovata; glumis ci-  
liatis. Bellardi in liter.  
In Pedemontio 24.  
Culm. palmar. 3-4-nodis.
- capitatum*. P. Scop. Fl. Carn.  
In montibus.  
Cespitosa planta. Culm. digito vix longior, nu-  
dus. Spica subrotunda, 3. lineas vix longa.
- autumnale*. P. Scop. Fl. Carn.  
In Carniola.  
Simil. P. caeruleo Scheuchz. sed differt cal. 3-fl.  
& folliculorum fabrica diversa.
95. ALOPECURUS. Gluma corollae, five folliculi 1-valvis.
1. *indicus*. A. spica tereti; involucl. setaceis, fasciculatis,  
2-fl. peduncul. villosis. Syst. veg. ed. 14.  
Gramen &c. Pluk. alm. tab. 92. f. 3.  
In India Orient.  
Scatura Panicis Italici, totus villosus. Fol. lati-  
tudine digiti, utrimq. pilosa, etiam vaginis.  
Spica magnitudine digiti, compressa. Sem.  
nigro-splendentia.
2. *bulbosus*. A. culmo erecto; spica cylindrica: rad. bulbosa.  
Syst. veg. ed. 14.  
Gramen &c. Raii Angl. tab. 20. f. 2. Barr. ic.  
699. f. 1. & 680. f. 1. 2.  
In Gallia, & Anglia &c. pratis 24.  
Bulbi 3-4. Culm. sesquiped. Fol. angusta, plana.  
Variat magnitudine culmi, & crassitie spicae.
3. *pratensis*. A. culmo spicato, erecto: glumis villosis: cor-  
muticis. Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab.  
19. f. 1. Stillingfl. misc. tab. 2. Leerf. herb.  
tab. 2. f. 4.  
Gramen &c. Barr. ic. 123. Moris. hist. 3. f. 8.  
tab. 4. f. 8.  
In Europa pratis 24.  
Simil. sequenti, sed differt spica brevior; & ari-  
sta cor. valvulis subaequali. Culm. cubital. to-  
tus cum fol. hirsutus, & mollis. Fol. lata,  
glauca. Panic. in densam ovalem spicam col-  
lecta.



lecta. Pedunc. breves, ramosi. Cal. glabri.  
Locustæ compressæ, villosæ, ex viridi-albæ;  
aristæ recurvæ.

4. *agrestis*. A. culmo erecto, spicato: glumis lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 697. Leers. herb. tab. 2. f. 3. Schreb. gram. tab. 19. f. 2.*  
Gramen &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 4. f. 12. Barr. ic. 699. f. 2.*

Phleum flavum. *Scop. Fl. Carn.*

In Europa australi, ad limites agrorum ☉.

Differt a priore spica longiore, tenuiore, spicul. laxioribus, glabris; fol. angustioribus, & radice annua. Culm. erect. cubital. Fol. glabra, retroverfu aspera. Spica 3-unc. laxa, viridis, atro-purpurea, aut incana.

5. *geniculatus*. A. culmo spicato, infracto: cor. muticis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 564. Leers. herb. tab. 2. f. 7.*

Gramen &c. *Lob. ic. 13. Morif. hist. 3. tab. 4. f. 15.*

In lacubus natans est.

In Europæ uliginosis, secus flumina, & fossas. 24.

Structura prioris: an varietas? Culm. 1-fesquip. inferne procumb. geniculatus. Fol. glabra. Spica 1-2-unc. cylindrica, densa, gracilis, glabra. Pedunc. ramosi.

6. *hordeiformis*. A. racemo simpl. floscul. aristis circumvallatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 9.*

Panicum &c. *Pluk. alm. tab. 119. f. 1.*

Speñat ad Panici genus. *Thumb. Jap.*

Habitus omnino Hordei murini. Culm. pedal. Fol. linear. culmo sæpius longiora, plano-canalicul. nervosa. Spica longa, spitham. racemosa, disticha, vel subsecunda. Fl. numerosi, pedicellis breviss. simplicibus.

7. *monspeliensis*. A. panicula subspicata; calyc. scabris, cor. aristatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Phleum crinitum. *Schreb. gram. tab. 20. f. 3. cum A. paniceo coniungit.*

Gramen &c. *Barr. ic. 115. f. 2. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 4. f. 3.*

In locis humentibus ☉.

Simil. sequenti, sed triplo ma. Culm. 1-2-cubital. geniculat. rigidus, sicuti & fol. Panic. 5-unc. habitior, spicata, caudata, sericea. Spi-

cul. arctæ. Sub cal. est tuberculum. Cor. brevissima.

8. *paniceus*, A. panicula subspicata: glumis villosis: cor. aristat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 801. Gramen &c. Barr. ic. 113. f. 1. In cultis aridis, & pascuis declivibus* ☉. *Simil. priori, sed palmar. mollis.*

*typhoides*, A. racemo simpl. floscul. muticis. *Burm. Ind. Gramen &c. Pluk. alm. tab. 32. f. 4. In Indis utrisque.*

*ciliatus*, A. culmo spicato, erecto; glumis ciliatis. *Ger. Galla-prov. Fl. Fed. In pratis elatioribus* ☉.

*litoreus*, A. *Fl. P d. An Gramen typhinum &c. Barr. ic. 717. Ad litora maris* ☉.

96. MILIUM, Cal. 2-valv. 1-fl. valvul. subæqualibus. Cor. breviss. Stigmata penicilliform.

1. *capense*, M. panicula capillari: calycibus acuminatis: cor. aristâ terminali curva. *Syst. veg. ed. 14. Ad cap. b. Spei.*

Culmi palm. teneriores, læves. Fol. angusta, subtus sparse pilosa, fauce barbata. Panic. undique dispersa.

2. *punctatum*, M. paniculæ ramis simpliciss. fl. alternis, geminis, secundis, *Syst. veg. ed. 14. In Jamaica.*

Panicul. rami erecti, subvillosi. Pedicel. breviss. basi anulo sulco cincti, altero breviss. Cal. pubesc. Sem. glaberrima.

3. *lindigerum*, M. panicula subspicata: fl. aristatis, *Syst. veg. ed. 14 Schreb. gram. tab. 23. f. 3.*

*Agrostis &c. Gouan. hort. tab. 1.*

*Gramen &c. Moris. 3. f. 8. tab. 3. f. 12. Pluk. alm. tab. 33. f. 6.*

*Montpelii &c.* ☉.

Radix fibrosa. Culm. aciculæ mæ: crassitiem adæquans, pedal. & ultra, erectus. Fol. angusta, subulata. Articuli vix pollic. a se invicem distantes, excepto supremo. Panicul. coarctata, virescens, vel argentea, vel matura rufescens, sesquipollic. longa: calyc. inferne ventricosi; valvul. una brevis, altera longior, acuminat. Sem. minimum villosum, in intima parte cal. latens.

4. *cimicinum*. M. racemis digitatis; calycum valvula exter. ciliata. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Malabar.*  
 Culm. ped. erecti, seu adscendent. læves. Fol. lanceol. ciliata, lævia, vaginis adspersis raris pilis, culmum inferne includentibus. Pedunc. longus, racemis quaternis, simplicibus, laxis, secundis. Fl. alterni.  
*Flos totus decidit cum semine, quod mediantibus ciliis refert veluti cimicem.*
5. *effusum*. M. fl. paniculatis, dispersis, muticis. *Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 8. f. 7.*  
 Gramen &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 5. f. 10. bene.*  
*In Europæ nemoribus umbrosis 24.*  
 Odor foliorum Melissæ. Culm. 3-pedal. Fol. margine denticulata. Panicula ramoso-diffusa, laxa. Rami verticill. flexuosi, longe nudi. Sem. longiusc. e viridi-albicant. lucida.
6. *confertum*. M. fl. paniculatis, confertis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Helvetiæ sylvis 24.*  
 Prioris varietas.
7. *paradoxum*. M. fl. paniculat. aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 23. f. 2. Scop. Fl. Carn. tab. 1.*  
 Gramen &c. *Pluk. atm. tab. 32. f. 2.*  
*In Gallia, Carniola, & agro Nicaensi, ad rupes muri proximas ♂.*  
 Gramen sesquiped. Fol. semiped. lineas 4-5. lata, basi rubella. Panic. spitham. laxa, alba. Cal. laxis. Sem. nudum, ovatum, apice aristata caduca, nigrum, nitidum.
8. *globosum*. M. panicula diffusa; glumis muticis; pedicellis cingulo luteo. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. In Japonia.*  
 Culm. ped. & ultra, erect. simplex. Fol. vix digital. vaginis, fauce, & marginibus ciliatis, lanceol. patula, marginata, striata, glabra. Panic. subovata.
97. **AGROS-TIS.** Glumæ calycis, & folliculi acuminatæ, aut etiam aristatæ; sed glumæ folliculi calycinis glumis longiores. *Flores distantes.*

\* *Aristatæ.*

1. *spica venti*. A petalo exteriori arista recta, stricta, longissi. panicula patula. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. 853. Leers. herb. tab. 4. f. 1. M ij*

Gramen &c. *Sheuchz. gram. tab. 3. f. 10.*

*Monti gram. tab. 63.*

*In Europa inter segetes* ☉.

Culm. cubital. genicul. atro-purpur. Panic. magna, pedal. deflorata patentiss. virefscens, aut rubens.

2. *interrupta*. A. petalo exter. aristato, panicula attenuata, coarctata, interrupta. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Vaill. tab. 71. f. 4.*

*In Europa* ☉.

Var. *Agrostid. Spica venti*. Hall. Culm. 3. pedal. Fol. lata, retroversa aspera. Panic. maxima, etiam pedal. multiflora, sæpe nutans; junior viridis, matura violac. Cal. splendens.

3. *miliacea*. A. petalo exteriore arista terminali, recta, striata, mediocri. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania, Monspelii* &c. 24.

Simil. A. *Spica venti*, sed arista floscul. longitudine tantum æqualis. Culm. pl. 3-ped. Fol. 1-fesquiped. 3. lineas lata. Panic. minus ampla, ramis semiverticillatis.

Cultura etiam diversissima persistit.

4. *bromoides*. A. panicula simpl. angustata; cor. pubescente; arista recta calyce longiore. *Syst. veg. ed. 14.*

*Gouan. Illustr. 3. tab. 1. f. 3.*

*Monspelii*. 24.

Culm. fesquiped. erecti, rigidi, læves. Fol. angustiss. subuliform. canalicul. lævia. Cor. semen vestiens.

5. *australis*. A. panicula subspicata: seminibus ovat. pubescentibus, arista longitudine calyc. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Lusitania*.

Culm. 3-ped. articulati, foliosi, læves. Simil. sequenti, sed panicula magis spicata; sem. non basi hirsuta, sed undique pubescent. Cal. apice fere setacei. Fol. latiora, planiora. Culm. pl. geniculati.

6. *arundinacea*. A. panicula oblonga; petalo exter. basi villoso; aristaq. toria cal. longiore. *Syst. veg. ed. 14.*

Arundo agrostis. *Scop. Fl. Carn. Atl. Fl. Ped.*

*In Europæ montibus silvestis* &c. 24.

Culm. 4-ped. Fol. Arundinac. lata, dura. Panic. plerumque spicæform. contracta, quandoq. laxa, ultra semipedem longa, flavicans.

*Pertinet ad Arundinis genus. Scopoli.*

7. *calamagrostis*. A. panicula incrassata; petalo exter. toto lanato, apice aristato: culm. ramosi. Syst. v.g. ed. 14.

*Scheuchz. gram. tab. 3. f. 11. optima.*

*In ulpibus Helvetiæ, Veronæ, & in Germania 24.*

*Simil. priori, sed cor. tota valde hirsuta: aristâ recta non e busti, sed apice petuli.*

*Culm. 2-pedal. ramosi. Panicula semiped. densa, e viridi argentea, splendens.*

8. *serotina*. A. panicula flosculis oblong: mucronat. culm. obrecto fol. brevissim. Syst. veg. ed. 14.

*Gramen &c. Segu. ver. 3. tab. 3. f. 2.*

*In Veronæ, Pedemontii pascuis, & collibus 24.*

*Culm. ped. adscendent. Fol. vix articulis longiora, patentia. Paniculæ rami alterni, subramosissimi. Fl. pleriq. fefil. Gluma petaloidea lanceol. arundinacea. Pistil. purpur.*

9. *rubra*. A. paniculæ parte florente patentiss. petalo exter. glabro; aristâ terminali tortili, recurva. Syst. veg. ed. 14.

*In Angliâ, Sveciâ, Pedemontio. 24.*

*Culm. pl. 6-7. dodrant. raro pedal. Fol. brevia, latiuscula, pallide virentia, tactu aspera. Panic. 3-4 unc. verticil. nondum florentibus contractis quasi in spicam: deflorata tota rubescit.*

10. *spiciformis*. A. panic. spiciformi; flosculis 2-aristat: aristâ altera receptaculo inserta, geniculata, longior: altera infra apicem cor. recta; cor. latis. Syst. v.g. ed. 14. Lin. Suppl.

*In Teneriffa.*

*Gamen dodrant. erect. glaberrim. culmis simplicibus. Panicul. coarctata. Calyc. magni, ovati, compressi, glaberrimi, margine membranac. Gluma exterior. ma. Nectarium intra cor. breve, genitalia amplectens.*

11. *hirsuta*. A. panicula subspicata: caul. foliisq. hirsutis: corollinis glumis dorso aristatis, apice 2-fidis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

*In Teneriffa.*

*Hirsutis sua facile distinguitur. Panicula refert Alopecurum paniceum.*

12. *Matrella*. A. fl. racemosis; cal. valvula exteriore incurva, corinæ apice tantum dehiscente. Syst. veg. ed. 14.

*In Malabarâ arenosis.*

TRIANDRIA DIGYNIA.

Radix repens, squam. s. Culmi ramosi, inferne decumbent.; dein erecti, palmar. vaginis genicula obtegentibus. Fol. distantia, subulata, bifaria, involuta, patentia, vaginis intra proximas receptis. Racemus simpliciss. fere spicatus, erectus, flexuosus. Fl. sæpe 10 subtetral: erecti, glaberrimi.

13. *canina*. A. calycibus elongatis, petalorum arista dorsali recurva; culm. prostratis, subramosis. *Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 4. f. 2. Fl. Dan. tab. 161.*

Gramen &c. *Scheuchz. gram. tab. 3. f. 9.*

*In Europæ pascuis humidiusculis* 24.

Culm. f. s. qui 2-ped. Foliorum cespes angustissim. & veluti capillaceorum, e viridi-glaucorum. Panic. sæpius elongata, ramulis coarctata, purpurea. Arista setacea, alba, flosculo duplo longiore, recta, medio notata, geniculo fusco.

14. *cruciata*. A. spicis quaternis, cruciatis, basi glabris: valvul. petaloideis, aristatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Sloan. Jam. 1. tab. 69. f. 1.*

*In Jamaica.*

15. *radiata*. A. spicis subquinis cruciatis, basi villosis; valvul. petaloideis, aristatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Sloan. Jam. 1. tab. 68. f. 3.*

Simil. priori, sed triplo maior.

\*\* *Mutica*.

16. *stolonifera*. A. paniculae ramis patentibus, muticis; culmo repente; calycibus æqualibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 364.*

*In Europa, ad vias locis sterilibus & sabulosis* 24.

Culm. cubital primum. prostrati; dein erecti. Fol. glabra. Panic. junior contracta, dein expansa, plerumq. spadicea, quandoq. spadiceo-virid. aut rubens.

17. *capillaris*. A. panicula capillari, patente; calycibus subulatis, æqualibus, hispidiusc. coloratis; floscul. muticis. *Syst. veg. ed. 14. Stillin. fl. misc. tab. 3. Fl. Dan. tab. 162. Leerf. herb. tab. 4. f. 3.*

Gramen &c. *Scheuchz. gram. tab. 3. f. 5. B. Monti ic. 64.*

*In Europæ pratis humidis montanis* 24.

Culmi 1-3-ped. Fol. linearia. Panicula vere capillaris, pedicellis tenuissimis, mutica; junior

contracta, matura expansa, pedicellis ramosis, ut in priore, per intervalla verticillaris. Calyc. glumæ per ætatem non hispida, spadiceæ, marginibus albis.

Convenit cum *A. alba*, Plantæ color primum viridis, dein purpur. tandem pallens.

18. *sylvatica*. A panicula coarctata, mutica, calycibus, æqualibus, virgineis cor. brevioribus, fecundatis du lo longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Angliæ sylvæ humosis &c.

Convenit cum *A. stolonifera*, & *capillari*. Panicula patens spadicea.

19. *alba*. A panicula laxa; calycibus muticis, æqualibus: culmo repente. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europæ nemoribus montanis &c.

Var. prioris maior. Culm. 1-3-ped. quandoq. erecti. Panic. modo spicata, modo divergens, e viridi-purpureasc. Cal. glumæ virid. anth. violac.

20. *pumila*. A. panicula secunda, mutica: culm. erectis, fascicular. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europæ &c.

Radix multiplex. Culm. 2-pollic. læves. Fol. vagina fistula, disco subinvoluta. Panic. per ætatem patentiss. Fl. colorati. Sem. maiusc.

Differt ab *A. stolonifera*, cum qua promiscue crescit, quod dimissio min., panicul. minus erecta, parumq. secunda; magis cespitosa: pedicel. minus undulati, horum versum rament flexi.

21. *minima*. A. panicula filiformi. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Morif. hist. 3. l. 8. tab. 2. f. 10.*

In Germania, Gallia, & agro Niezenfi ☉.

Planta vernalis vix pollic. purpureasc. Culmi in cespitem filiform. dispositi. Fol. canalicul. Spica unilat-ral. purpur. quand q. viridis.

22. *tenacissima*. A. panicula contracta, filiform. fl. muticis, linearibus; valvul. paralell. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lin. Suppl.*

In India Or. &c.

Radix cespitosa, dura. Culm. pl. semipedal. angustiss. tenaciss. articulati, glaberr. Fol. graminea, Fl. adpressi. Cal. 2-valv. valvul. linearibus, distantibus, longitudine fl. Cor. 2-valv. linear. Germ. ovatum, cor. dicendum, sed valde clausum.

23. *virginica*. A. panicula contracta, mutica: fol. involuto-  
 subulat. rigidis exstantibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia.*  
*Agrostis Virgin.* Forsk. *Æg. & A. pungens.* Schreb.  
 gram. tab. 28. f. 1. quæ, monente Cl. Vahl,  
 est eadem planta, differt panic. spicata, unde  
 specie differt.
24. *mexicana*. A. panicula oblong. congesta, calyc. corollisque  
 acuminat. subæqualib. muticis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Amer. calidior. &.*  
*Habitus Cinna.* Difficillime hoc Gramen determi-  
 natur. Altero anno fleret.  
 Culm. pl. pedal. erecti, læves; ramis indivisis.  
 Fol. leviusc. ligula truncata. Panic. viridis.  
 Fl. scabri. Stam. alba. Stigmata atro-purpur.
25. *indica*. A. panicula contracta, mutica; racemis latera-  
 libus, erectis, alternis. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Gramen. *Pluk. alm. tab. 191. f. 5. Sloan. Jam.*  
*1. tab. 73. f. 1.*  
*In India.*  
 Culm. erect. Fol. angusta, plana. Panic. oblonga.
26. *ciliata*. A. panicula mutica; gluma calycina angulata,  
 ciliata, *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*In Japonia.*  
 Culm. erect. 2-ped. simpl. glaber. Fol. culmo  
 breviora, vaginis, fauce, margineque pun-  
 ctatis, ciliatisque; attenuata, striata, scabra.  
 Panic. pedal. congesta, pedunculis filiform.  
 virgatis, angulatis, ciliatis.
- 
- vinealis*. A. calycibus coloratis: petali arista dorsali lon-  
 gitudine fere calyc. culm. adscendentibus.  
*Schreb. Fl. Lips.*  
*Avena monantha &c. Hall. hist. 1481.*  
*In locis ficcis.*  
 Differt ab A. canina, spicul. duplo ma. Occurrit  
 etiam floscul. plerisque muticis. Variat culmi  
 altitudine; fol. latitudine; & paniculæ forma.  
*Accedit ad A. capillarem, cum qua non confun-*  
*datur.*
- arenaria*. A. panicula spicata, æquali, mutica: fol. fasci-  
 culat. radice repente. *Gouan. Illust.*  
*A. Stolonifera. Lin. b.*  
 Radix stolonifera, geniculis crebrioribus. Culm.  
 pl. Fol. uncial. rigida: involuc. acuminat. va-



ginis latioribus, rubescentibus. Panic. obscure viridis.

*alpina*. A. petalo uno truncato, aut 2-fid. *Scop. Fl. Carn.*  
Gramen &c. *Scheuchz. Prodr. tab. 4. f. 1.*

*In pascuis summorum alpinum* ☉.

*Differt ab A. canina, quæ prostrata, crebro geniculata, & fol. setaceorum fasciculis instructa.*

Cespitosa. Culm. vix semiped. rigidi. Fol. linearia. Panicula contracta, uncial. & paulo longior, glumis viridib. spadiceis, aut violac.

*stricta*. A. (*Poa*) caul. erecto; panicula stricta, paucifl.  
*Hall. helv. n. 1476.*

*In Helvetia.*

*Diversa ab A. capillari, facie, & culmo prostrato.*  
Panic. parva, rara, albo-virid.

*rupestris*. A. (*Avena*) monantha, paniculata: fol. setaceis;  
gluma calycina exasperata; arista fl. duplo longiore. *Hall. helv. n. 1478. All. Fl. Ped.*

*In rupibus montanis, apricis* ☉.

*pungens*. A. panicula coarctata, mutica; fol. involutis,  
rigidis, pungentibus: superioribus oblique appo-  
sitis. *Schreb. gram. tab. 27.*

A. Virginica. *Forsk. Æg.*

*In locis aridis mari proximis* ☿.

*linearis*. A. spicis subquaternis, digitatis: floscul. unila-  
teralibus, alternis, adpressis, muticis. *Retz.*  
*Obs. fasc. 4.*

*Habitat. . . .*

Gramen canescens, semiped. Simile *Panico li-*  
*neari*. Culmi, præsertim basi, foliosi. Fol.  
brevia, angusta, disticha, patentia. Spicæ vix  
pollic. Rachis linearis, flexuosa. Anth. ratio-  
ne plantæ grandes.

*procera*. A. paniculæ peduncul. racemosis, erectiuscul. fl.  
lanceol. muticis, hirsutis. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In subhumidis Malabaræ.*

Caul. 4-ped. & ultra, ascendentes, ramosi,  
foliosi, geniculis fuscis, villo tenui, albo ob-  
ductis. Fol. semiped. angusta, nuda. Panicula  
spitham. Cal. gluma altera fusco purpurasc.  
altera viridi. Anth. flavæ. Stigm. purpuro-  
nigricant. Sem. ovatum, planiusc. album.

*coromande-*  
*liana*. A. panicul. ovata, patente: peduncul. simplici-  
bus: fl. secundis, muticis; calycibus æquali-  
bus, acutis, nitidis. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In aridis Malabaræ.*

*Gramen semi-ed. canescens, rigidum, a pecoribus non tangitur.*

Radic. numerosæ, flexuosæ. Culm. adscendent, filiform. basi foliati, sulcati, vagina longa demum vestiti. Fol. radical. pollicar. latuscul. lanceol. rigida. Panicula rara, Fl. minuti, breviter pedicellati, viridi. Cal. valvul. nigricantibus. Sem. flavescens, pellucidum.

98. AIRA. Cal. 2-valv. 2-florus. Flosc. absque interiecto rudimento.

\* *Mutica.*

1. *arundinacea.* A. panicula oblong. secunda, mutica, imbricata: fol. planis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente.*

2. *minuta.* A. panicula subfastigiata, ramosissima, laxa; flosc. muticis. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 21. f. 2.*

*Gramen &c. Buxb. cent. 5. tab. 67. mala.*

*In Hispania ☉.*

Culm. 2-unc-digital. tribus geniculis, ultimo longiss. Fol. acuta, plana; vagina sursum latior, paulo ventricosa, ibiq. angulosa. Panicula ubiq. patentiss. spadicea.

3. *aquatica.* A. panicula patente: fl. muticis, lævibus, calyce longioribus: fol. planis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 381.*

*Gramen &c. Vaill. parif. tab. 17. f. 7.*

*In Europæ pascuis aquosis 24.*

Culm. sub-ped. basi repens, binodis. Fol. latuscula, glabra, vaginis ad basin rubris. Panicul. palmar. verticillata, laxa. Racemi pl. ex uno puncto capillacei, sæpe flexuosi. Spicul. spadiceo-virid.

*Var. in loco sicco, flosc. valde remotis.*

4. *capensis.* A. culm. ramoso: fl. racemosis: cor. pilosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Culm. sesquiped. sæpe repentes, læves. Fol. graminea, angustiora, levia. Cal. oblong obtususc. Cor. oblong. longitudine cal. obtusæ.

\*\* *Aristata.*

5. *subspicata.* A. fol. planis: panicula subspicata; floscul. medio aristatis, arista reflexa, laxiore. *Syst. veg.*

ed. 14. *Fl. Dan. tab. 228. Hall. app. 1. ad Scheuchz. gram. tab. 6.*

*In Helvetiæ, Lapponiæ &c. alpinis* 24.

Bulbilli radical. Culm. trient-semiped-dodrant, subpaniculat. villosus. Fol. glabra, mollia. Panicula densa, paucifl.

6. *cespitosa*. A. fol. planis: panicula patente; petal. basi villosis, aristatisq.; arista recta brevi. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 240. Leerf. herb. tab. 4. f. 8.*

Gramen &c. *Scheuchz. gram. tab. 2. f. 2. 3. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 5. f. 17.*

*In Europæ pratis cultis, & fertilibus* 24.

Culm. 2-ped. & ultra. Fol. deorsum aspera, lineari-subulata: caulina pauca, min. Panic. magna, ramosiss. patula; florens spadiceo-alba, aut viridi-alba; senescens paleacea: locustæ minimæ, dianthæ.

7. *flexuosa*. A. fol. setaceis: culm. subnudis: panicula divaricata; pedunc. flexuosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. 157. Leerf. tab. 5. f. 1. Hall. hist. n.º 1486. var. b.*

Gramen &c. *Scheuchz. gram. tab. 6. f. 1. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 7. f. 9. Schreb. gram. tab. 50.*

*In Europæ petris, rupibus &c.* 24.

*Var. certe A. montana*. Culm. cespitosi, 2-ped. & ultra. Fol. 2-3-uncial. spicul. fusco-argenteæ.

8. *montana*. A. fol. setaceis: panicula angustata; flosc. basi pilosis, aristatis; arista tortili, longiore. *Syst. veg. ed. 14. Stillingfl. gram. tab. 4. Leerf. herb. tab. 5.*

Gramen. *Scheuchz. gram. tab. 4. f. 16. Mont. ic. 74.*

*In Europæ alpinis* 24.

*Differt a priore glumis basi pilosis. Rami longiores, & locustæ duplo majores sunt.* Culm. cubital. Fol. ad terram plura; caulina pauca. Panic. erecta, pedicell. flexuosis; post efflorescentiam laxior: locustæ subevatae.

9. *alpina*. A. fol. subulatis: panicula densa; floscul. basi pilosis, aristatis, arista brevi. *Syst. veg. ed. 14.*

*In alpinis Lapponicis &c.* 24.

Culmi subped. ramosi, geniculis fuscis, nigri-

canibus. Fol. veluti iuncea, vaginis subfuscis.  
Panicul. sub 3-uncial.

10. *villosa*. A. fol. subulatis: panicula elongata, angustata, flosculi: sesqui-alteris, hirtis, aristatis; arista brevi, recta. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Radix squamis villosis. Culm. glaber. Fol. remotiora, plana, vaginis sæpe villosa. Panic. terminal. pedal. ramificatione Melicæ. Fl. magni, ferruginei; alter longior, crassior, hermaphroditus; alter angustior, substerilis. Cor. hirsuta.

11. *canescens*. A. fol. setaceis; summo spathaceo, paniculam inferne obvolvante. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 3. f. 10.*

*In Europæ australis arvis arenosis* ☉.

Dignoscitur colore pallido. Culm. subpedal: Panicula erecta, lanceol. contracta, florescens patens; deflorata longius e vagina exit. Spicul. glauco-virid. albæ, aut rubellæ.

12. *præcox*. A. fol. setaceis; vaginis angulatis; fl. paniculato-spicat.; flosc. basi aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 383.*

Gramen &c. *Ray. Angl. tab. 22. f. 2. Pluk. alm. tab. 33. f. 9.*

*In Europæ australis campis montanis arenosis, inundatis* ☉.

Adfinis priori, sed pusilla. Culm. 3-pollic-palmar. filiform. Fol. brevia, lineari-setacea. Panic. 2-3-digital. viridula, dein subciner. aut purpureo-canesc.

13. *caryophyll- lca*. A. fol. setaceis; panicula divaricata; fl. distantibus, aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Stillingf. miscel. tab. 3. Fl. Dan. tab. 382. Lectf. herb. tab. 5. f. 7.*

Gramen. &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 5. f. 11. Scheuchz. gram. tab. 4. f. 15. Barr. ic. 444. f. 1.*

*In locis glareosis* ☉.

Culm. palm-cubital. subcespitosi, filiform. subnudi, articul. 2. tantum ad radicem. Fol. conferta, brevia, lineari-setacea. Panicula expansa, laxa. Spicul. exiguæ, conicæ, acutæ, graciles. Glumæ albedo-purpur. *Planta vetustia alba.*

- media*. A. fol. fetaceis: culmis nudis: panicula laxa; floscul. basi pilosis; arista subterminali, brevior. *Gouan. Illustr.*  
*Differt ab A. montana, & capillari, arista glumis brevior.*
- chinesis*. A. fol. fetaceis: panicula erecta, flosc. aristatis: *Retz. Obs. fasc. 3.*  
*In China.*  
*Facies omnino Airæ; sed potius Holci sp. cum in altero fl. vel solæ anth., vel plane nihil inveniuntur.*  
 Culm. pedal. basi ramosus. Fol. brevia, glabra. Panic. parva. Cal. valvul. lanceol. subæqualibus, striatis, glabris. Cor. glumæ villosæ; exterior convexa, aristata; interior longior, planior, acuminata, in fundo cucullato genitalia continens.
99. MELICA. Corpusculum pedunculatum inter flosculos (rudimentum floris) characterem essentialem præbet. Cal. 2-valv. 2-fl. glumis ovatis, muticis, æqualibus. Folliculi glumæ muticæ, inæquales.
- Icones Clusii Melicarum sunt malæ.*
1. *ciliata*. M. flosculi inferior. petalo exteriori ciliato. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. sibir. 1. tab. 19. f. 1.*  
*b. Gramen &c. Scheuchz. gram. tab. 4. f. 11. 12. Barr. ic. 3. n. 2.*  
*In Europæ collibus sterilibus, saxosis &c.*  
 Culm. cespitosi, cubital. Fol. glabra. Panic. spicata, densa. Glumæ candicantes, seu flavescent. Semen oblong. tenuissime striatum, nitens.
- b. Radix arundinacea. Culm. 2.-cubital. Fol. Arundinacea, 2-pedal. Panic. sesquipedal. laxa, ramis patentibus, glumis cœrul.*
2. *nutans*. M. petal. imberbibus: panicula nutante, simpl. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 6. f. 2. Lærf. herb. tab. 3. f. 4.*  
*Gramen &c. Scheuchz. gram. fig. 16. D. E. F. Monti ic. 73.*  
*In Europæ rupibus frigidioribus &c.*  
 Culm. pedal. inferne atro-purpur. Stipula ad oras vaginæ fol. tubulata, colorata. Panic. rara, etiam mere spicata, pedunc. longis. Spicul.

pendulæ, secundæ, imberb. Sem. lanceol. compressa, fusco-ferruginea.

*M. 1-flora* Retz. fasc. 1. tab. 10. quæ pro varietate huius habita fuit, differt panicula, seu racemo ad basin ramoso, nec cal. fl. binis perfectis.

3. *minuta*. *M.* culmo ramoso; fol. fetaceis: petal. imberbibus. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 20. f. 2. In Italia ad colles* 24.

Culmi semiped. filiform. angustiss. ramossiss. obrecti fol. vaginis. Fol. angustiss. filiform. involuta, basi parula. Racemi terminal. simpl. capillar. pauciss. Floscul. oblong. mutici, intermedio pedicellato, truncato, sterili.

4. *cærulea*. *M.* panicula coarctata; fl. cylindricis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 239. Leerf. herb. tab. 4. f. 7. Gramen &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 5. f. 22. In Europæ pascuis aquosis* 24.

Culm. sub 2-cubital. articulis orbatus. Fol. subpilosa. Spiculæ pedicellatæ, acuminatæ, muticæ. Genital. purpur.

5. *papilionacea*. *M.* calyc. valvula infer. maxima, colorata; petalo exter. subciliato. *Syst. veg. ed. 14.*

*M. brasiliæna* Ard. *foec. 2. tab. 6. f. 1. 2.*

Gramen &c. *Sloan. hist. 1. tab. 64. f. 1.*

*In Brasilia.*

Ætatura sequentis. Panic. virgata; pedunc. tenuib. flore longioribus, in primis inferne ramosis.

6. *altissima*. *M.* petal. imberbibus; panicula ramosiss. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 1. tab. 20.*

Gramen &c. *Moris. hist. 3. f. 8. tab. 7. f. 51.*

*In Sibiria, Canada* 24.

Culm. 2-3. ped. rectus. Panic. dodrant. pedicul. paucis, distantibus.

7. *falx*. *M.* spica secunda, compressa, imbricata. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Fol. graminea, alterna. Culm. sesquiped. durus, lævis, geniculis 2. Spica digital. (Cynofuri) ex foliol. lateralibus lanceol. acuminat. trinerviis, singulis pro singulo flore, margine albo. Fl. pubescent.

- nodosa*. *M. Piller. It. Sclayon. tab. XIV. In Sclayonia.*

Adfinis *M. caruleæ*: differt culmo denis nodis geniculato. Panic. primum coarctata, dein divaricata. Cal. 4-fl. infimo setifili, reliquis pedicellatis. Fol. brevina, acumin. rigidiufcula. Gramen totum viridi-purpureum, & cærul. 2-ped. & ultra.

100. POA. Cal. 2-valv. multiflorus. Spicula ovata, valvul. margine fœrictis, acutiufculis. Sem. folliculo arcte involutum.

1. *aquatica*. P. panicula difufa: fpicul. lanceolat. 6-floris. *Syft. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 5. f. 5.*  
Gramen &c. *Scheuchz. gram. tab. 4. f. 1. Morif. hijt. 3. f. 8. tab. 6. f. 25. Monti gram. ic. 38.*  
*In Europæ ad ripas 24.*

Culm. 6-ped. Fol. in aquis latiffima; in ficcis anguftiora. Panic. grandis, pedul. erecti, rigida, per ætatem fpadicea. Pedicelli flexuofi. Spiculæ diftichæ.

2. *alpina*. P. panicula difufa, ramosiff. fpicis 6-fl. cordatis. *Syft. veg. ed. 14. Hall. app. 1. ad Scheuch. gr. tab. 3.*

b. *P. vivipara*.

Gramen &c. *Scheuchz. gram. tab. 4. f. 14. Fl. Dan. tab. 807.*

*In alpihus Lapponicis, Helveticis 24.*

Culm. vix pedul. totus vaginofus. Fol. lata, mollia, glabra, quandoque longiora, incurva. Panic. denfa, multifi. imbricata. Spicul. magnæ, ex violac-luteo-albo variz.

3. *trivialis*. P. panicula difufa; fpicul. 3-fl. bafi pubefcentibus; culm. erecto, tereti. *Syft. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 6. f. 2.*

*In Europæ pascuis 24.*

Differt a *P. pratensis* bonæ præfentia, quæ reperitur ad bafin petali exterioris. Panic. e viridi-purpur. Culmi adgregati.

Cum *P. anguftifolia* hanc coniungit *Scop. Fl. Carn.*

4. *anguftifolia*. P. panicula difufa; fpicul. 4-fl. pubefcentibus; culm. erecto, tereti. *Syft. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 6. f. 3.*

Gramen &c. *Scheuchz. gram. tab. 3.*

*Ad agrorum verfuras 24.*

Hanc a priore diftinguit habitus proprius; panicula valde difufa; rami pl. e fcapo prodeuntes; fol. longiora; locus natalis quodammodo,

5. *pratensis*. P. panicula diffusa; spicul. 3-fl. glabris: culmo erecto, tereti. *Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 6. f. 4.*  
 Gramen. &c. *Scheuchz. gram. tab. 3. f. 17. A.*  
*In Europæ pratis fertilissimis.*  
 Culmi sesqui-2-ped. Fol. vaginantia, 2-3-unc. longa.  
*Differt a priore præcipue scabritie; spiculisque minor.: A P. trivial. magnitudine, ramis pl. e scapo prodeuntibus; panicula diffusa; parvitate spicularum, & asperitate discrepat. Defectu lanæ floscul. non vero num. floscul. a P. triviali differt.*
6. *annua*. P. panicula diffusa, angulis rectis; spicul. obtusis: culm. obliquo, compresso. *Syst. veg. ed. 14. Stillingf. nusc. tab. 7. Leerf. herb. tab. 6. f. 1.*  
*In Europa ad vias ☉.*  
*Differt a P. triviali panic. diffusa; culm. decumbentibus, compressiuscul., maiori mollitie, & teretitate; habitu præ primis. A P. pratensi, & angustifolia, ramis binis e scapo prodeuntibus, magnitudine &c. discrepat.*
7. *flava*. P. panicula diffusa; spicul. ovato-oblong. nitidis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia.*  
 Culm. altus. Fol. pauca. Spica ampla, longa. Glumæ pendentes, tremulæ.
8. *pilosa*. P. panicula patente, stricta; ramificationib. primariis pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Italia.*  
 Culm. pedal. & ultra. Fol. mucronata, striata, glabra, margine aspero. Panic. semi-palm.
9. *palustris*. P. panicula diffusa; spicul. sub 3-fl. pubescentibus: fol. subtus scabris. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 750.*  
 Gramen &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 27.*  
*In Helvetia, Italia &c.*  
 Culm. 3-pedal. Fol. retroversu aspera. Panic. semiped. valde multiflora. Spicul. exiguae, acuminatae.
10. *amabilis*. P. panicula patente; spicul. octodecim-floris, ovato-linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In India.*  
*Maxime adfinis P. Eragrostidi fl. purpur., glumis trinerviis, quarum inferiores sensim cadunt.*  
 Fol.



Fol. stricta, ad angulum acutum exeuntia. Panic. sparsa, undulata.

11. *hirta*. P. panicula patula, vaginis fol. punctato-ciliat. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Culm. erect. 3-ped. simplex, glaber. Fol. longe vaginantia, striata. Panic. ped. virgata. Pedunc. angulati, angulis ciliato-scabris.

12. *ferruginea*. P. panicula patula, capillari; spicul. 5-fl. oblong. glumis glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Culm. erectus, ped. simpl. Fol. vaginis fauce barbaris, erecta, convoluta, striata, glabra. Panic. spitham. virgata. Pedunc. & pedicelli capill. flexuosi.

13. *barbata*. P. panicula capillari, patula; spicul. 6-fl. oblong. glumis carinatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 10.*

*In Japonia* ☉.

Radix fasciculata. Culm. erectus, spitham. simpl. glaber. Fol. culmo longiora, angusta, linear. apice attenuata, setacea, convoluta, glabra. Genicul. barbata.

14. *japonica*. P. panicula patula capillari, spicul. sub 7-fl. foliisque glabris; culmo ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Japon.*

*In Japonia.*

*Differt a P. capillari spicul. 3-9 fl. fol. omnibus glabris, nec basi pilosis: culm. erecto, altiore.*

Culm. erect. 2-ped. & ultra, striatus, glaber. Fol. culmo breviora, spitham. longe vaginantia, angusta, striata. Panic. erecto-patens, ped. ramosiss. Pedicelli capillar. ramulosi, flexuosi.

15. *abyssinica*. P. panicula patula; spicul. oblong. sub 5-fl. culm. geniculato, inferne procumb. ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ic. rar. tab. 43.*

*In Abyssinia* ☉.

Culm. inferne procumb. & ad nodos inflexus, compressus, gracilis. Fol. vaginantia, sublinear. acumin. margine subtiliter denticulato. Panic. terminalis, laxa, rachibus capillaribus, compressis, & patulis. Spicul. obtusæ. Tota planta glaberrima.

16. *punctata*. P. panicula diffusa, spicul. sub 12-fl. fl. diapha-  
Tom. I. N

nis, lævibus, puncto intus fusco. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*In Malabarica.*

Culm. sesquiped. adscendentes, læves; genicul. tumidioribus, sæpe 3. Fol. graminea, scabriuscula, subtus lævia, margine scabra, versus basin pilis raris, erectis. Vaginæ læves. Panicula (Milii effusi). Pedunc. deflorati in racemum coarctati. Glumæ corollinæ ovatae, acutiusc. calycinis similinæ.

17. *Eragrostis*. P. panicula patente, pedicel flexuosis; spicul. ferratis, sub 10-fl., glumis trinerviis. *Syst. veg. ed. 14.*

Græmen &c. *Scheuch. gram. tab. 2. f. 2. Barr. ic. tab. 44. f. 2. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 47.*

b. Græmen &c. *Scheuchz. gram. tab. 4. f. 13. planta iunior.*

*In Helvetia, Italia, Sibiria &c. ☉.*

*Adfinis Brizæ Eragrosti, & P. amabili; an solo loco natali diversa?*

Culm. ad radicem bulbosi, debiles; in maiori var. cubital. erecti. Fol. glabra. Panic. ramosissima, undulata. Spicul. erectæ, tenellæ, subviolac. el. ganter imbricatæ, & distichæ.

18. *capillaris*. P. panicula capillari, laxa, patentissima: fol. pilosis: culm. ramosiss. *Syst. veg. ed. 14.*

Græmen &c. *Moris. hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 33.*

*In Virginia, Canada.*

Panicula strictissima. Fol. ad basin pilis longis raris. Spicul. ex floscul. 4 & 6. minimæ.

19. *aspera*. P. panicula ramosiss. potentiss. pedunc. speris; spicul. 10-fl. vaginis fol. antice hiscutis. *Syst. veg. ed. 14. J. ff. in demonstr. H. R. P. Jacq. H. Vol. 3. tab. 36.*

*In India Orient.*

Culm. pl. 2 3-pedal. simpl. erecti, ab exortu adscendente foliosi, nitidi. Fol. vaginæ apice barbatae. Fol. longa, acuta, supra pilosa, subtus glabra. Panic. pedal. Pedunc. laterales ex primario centrali egressi. Spicul. parvæ, compressæ, viridi-rubent.

20. *malabarica*. P. paniculæ ramis simpliciss. fl. sessilibus: sem. distantibus: culmo repente. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 11. f. 2.*

*In Indiæ arenosis.*

Fol. ovat-lanceol. Panic. laxa. Fl. alterni. Sem. alba.

21. *chinensis*. P. paniculæ ramis simpliciss. fl. sessilibus: seminibus imbricatis: culm. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 11. f. 3.*

*In India.*

Culm. ped. Racemi per intervalla distantes, sæpius 6-linear. stricti. Flosc. alterni, 4.

22. *tenella*. P. panicula oblonga, capillari, subverticillata; fl. 6-fl. minutiss. nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Gramen &c. Pluk. alm. tab. 300. f. 2. Burm. Zeyl. tab. 47. f. 3. Rumph. amb. 6. tab. 4. f. 3. Teph. Zuccagni.*

*In India.*

Culm. prostrati, inferne ramosi, læves. Fol. lævia, margine scabra, fauce pilosa. Panicula patentiss. Fl. oblong. obtusi, purpurasc. linea utrimq. viridi, margine oculo armato ciliati.

23. *rigida*. P. panicula lanceol. subramosa, secunda; ramul. alternis, secundis. *Syst. veg. ed. 14. Gramen &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 2. f. 9. Barr. ic. 49.*

*In Europæ siccis ☉.*

Culm. breviss. rigidus. Panic. rigida. Spicul. linear. acutæ, sub 8-fl. Cal. carinatus.

24. *compressa*. P. panicula coarctata, secunda; culm. obliquo, compresso. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 742. Leerf. herb. tab. 5. f. 4.*

*Gramen &c. Vaill. parif. tab. 18. f. 5. Mont. ic. 10.*

*In Europæ, & Amer. septentr. siccis ☿.*

Culm. semiped. durus, purpurasc. Fol. angusta, glabra, longitudine paniculæ. Panic. erecta, angusta, rigida, virid. dein purpur. tandem nigricans. Spicul. lanceol. secundæ, 6-8-fl.

25. *amboinensis*. P. panic. coarctata, secunda; culmo tereti. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India.*

Similis priori, sed culm. teres. Fl. paniculati, verticillati, 5-fl. Anth. rubræ. Pistil. alba.

26. *nemoralis*. P. panicula attenuata; spicul. sub 2-fl. mucronatis, scabris: culm. incurvo. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 749. Leerf. herb. tab. 5. f. 3.*

*Gramen &c. Scheuch. gram. tab. 2. Monti. gram. io. 12.*

## TRIANDRIA DIGYNIA.

*b. Gramen &c. Bocc. musf. 2. tab. 59.*

*In Europa ad rad. montium umbrosas 24.*

Gramen procerum, tenerum. Fol. linear. glabra. Panic. palmar. laxa. Spicul. pauciss. acumin. non scabræ.

27. *bulbosa.* P. panicula fecunda, patentiusc: spicul. 4-fl. Syst. veg. ed. 14.

*b. Gramen &c. Barr. ic. 703.*

*y. Gramen &c. Vaill. parif. tab. 17. f. 8.*

*In Europa ad vias, & limites agrorum 24.*

Culm. & fol. radicalium bases tuberosæ. Culm. pedal. teretes. Fol. angusta. Panic. diffusa, glauca. Glumæ cal. aristatæ. Folliculi 3-4 aristati, ora alba.

28. *spicata.* P. panicula spicata: fl. subulatis; floscul. remotis. Syst. veg. ed. 14.

*In Lusitania.*

Culm. pl. e basi ascendent. palmar. vestiti undiq. fol. vaginis. Fol. linear. angusta, lævia, vaginis crassiusc. Panic. longitudine fere culmi, inæqualis.

*Habitus Festucæ.*

29. *diffans.* P. panicula ramis subdivisis; fl. 3-fl. floscul. distantibus, obtusis. Syst. veg. ed. 14.

*In Austria.*

Culm. ascendent. læves, uti fol. Panic. scabriusc. Flosc. ab apice ad medium cor. albi, distantes, ut *Agrostidis* sp. videretur.

30. *cristata.* P. panicula spicata: calycibus, subpilosis, sub 4-fl. pedunc. longioribus: petal. aristatis. Syst. veg. ed. 14. *Leerf. herb. tab. 5. f. 6.*

*Aira cristata. Jacq. Auf'r. tab. 14.*

*Gramen &c. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 4. f. 7. Scheuchz. gram. tab. 3. f. 15.*

*In Europæ siccioribus 24.*

Culm. cubital. Fol. aspera, plerumq. hirsuta. Panic. e viridi-argentea, digitum longa, pyramidal. angusta, contracta, imbricata, rigidula, efflorescentiæ tempore sese expandens. Pedicel. spiculis breviores.

*Per ætatem diversam induit faciem; magnitudine, & paniculæ colore varians.*

31. *ciliaris.* P. panicula contracta; glumarum valvulis interioribus piloso-ciliatis. Syst. veg. ed. 14.

Gramen &c. *Pluk. phyt.* 190. f. 5. *Sloan. Jam.* 1. tab. 73. f. 1.

*In Jamaica.*

Culm. fil form. ramosus. Fol. linearia. Panic. rubra. Spiculæ ovatæ, glumarum ciliis albis.

32. *brizoides*. P. panicula racemosa; spicul. ovatis, compressis, 8-9-fl. culmo compresso. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*

*In Africa.*

Fol. ad radicem. Spicul. magnitudine Brizæ mediæ. Glumæ luteæ, apicibus cœrulescentibus.

33. *disticha*. P. spica terminali, disticha, hinc convexula, inde plana. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. misc.* 2. p. 74 ic. rar.

P. Seflerioides. *All. Fl. Ped.* tab. 91. f. 1.

*In pratis elatioribus Italix &c.* 24.

Culmi pl. palmar. erecti, 3-nod. non glabri, ramosi. Fol. linear. erecta, glabra, vagina striata, internodii longitudine. Culm. dimidiatus, & floriger nudus. Spica sæpius paulum inflexa. Locustæ congestæ, distichæ, primo intuitu serleriam referentes. Pedunc. breves: glumæ calyc. glabræ, ex argenteo, & cœrul. nitentes, ovat. breviter mucronatæ. Glumæ follic. similes. Anth. col. obscuri.

- montana*. P. panicula stricta; locustis 2-fl: folliculis basi villosis. *Hall. helv.* n. 1468. *All. Fl. Ped.*

*In locis montanis ad oras Sylvarum &c.* 24.

- Gerardi*. P. culmo recto; locustis 3-fl. glaberrimis, calycibus aristatis. *Hall. helv.* n. 1463. *Ger. tab.* 2.

*In pratis, & pascuis alpium* 24.

*Differt a P. pratensi, glabritie, panicula diversa; fl. ma. calyc. striato &c.* Omnia viridia, mucronibus spadiceis.

- Sabauda*. P. panicula laxa, locustis 2-fl. fl. calyce duplo longioribus, glaberrimis. *Hall. helv.* n. 1470. *Fl. Ped.*

*In Sabaudia &c.*

Culm. erectus, 3-ped. Fol. ad 3. lin. lata. Panicula ped. non valde sparsa, valde rara, pedunculis ramosis, longe nudis. Fl. bini, duplo calyc. longiores. Locustæ multo, quam

tori huic generi maiores. Omnia viridia, glabra, mutica. *Facies Avenæ, sed absque omni arista.*

*cilianensis.* P. panicula longissima, ramesa, ramis erectis, flexuosis; spiculis distichis, 4-fl. *All. Fl. Ped. tab. 91. f. 2.*

*In agro Ciliani* ☉.

Culmi pedal. & ultra, sulcati, glabri, nodo fusco. Fol. 2-3. lin. lata, lineata, obscure viridia, glabra, circa vaginam ciliata. Fol. paniculæ subiectum, longum. Panicula terminalis, ramis ex eodem puncto 3-4. raro solitar. Locustæ veluti in raram spicam dispositæ, ovato-oblong.

*sylvatica.* P. panic. diffusa; spicul. sub 5-fl. glumis acutissim. *Pullich, Fl. Palatin.*

*In Palatinatu.*

Cul. cespitosi, erecti, 2-3-ped. glabri, glauco-virid. Panic. virid. & alba, primum contracta, & densa, florescentiæ tempore maxime divergens. Spicul. parvæ, ovato-oblong. compressæ, ex albido læte virides.

*A. P. alpina differt culm. longiore; fol. valde latioribus; spicul. parvis; glumis folliculat.; & calycibus, angustis, acutissimis.*

*divaricata.* *A. Bromo giganteo spicul. parvis, non aristatis.* P. paniculæ ramis geminatis, divaricatis; spicul. sub 4-fl. *Gouan. Illust. tab. 2. f. 1.*

Grænen &c. *Barr. ic. 44. licet Scheuchz. hoc synon. Airæ caryophyllæ imponat.*

*In pratis.*

Culm. pl. palmar. a'bi, aut subrubri. Fol. 2-3-uncial. vaginis amplis. Panic. subdichotoma. Rami inferior. trichotomi; summi bistratidi.

*multiflora.* P. culmis simplicibus, erectis; spicul. linearibus, multifloris. *Forsk. Ægyp.*

*In Arabia.*

Communiter gerit fl. 13. verum 15. usq. 24. in una spicula. *Variat spicul. fuscescentibus, 9-fl.*

*Phanix.* P. spicul. teretibus, compressis, pendulis, 8-fl. *Scop. Fl. Carn.*

Panicum Lolaceum &c. *I. R. H. & Scheuchz.*

Culm. 2-pedal. & ultra. Panicul. etiam semiped. laxa, racemis binatis, nutantibus. Spiculæ ut

in Bromo pinnato, sed breviores. *Variet panic. erectiore, magisq. contracta.*

*panicæ.*

*P. paniculæ ramis tubbinatis, remotis, filiformibus, calycibus, 2-fl. vaginis punctato-pilosis. Retz. Obs. fasc. 3.*

*In China.*

Grænen altum, tenue. Fol. lævia, nuda. Panic. ped. rara, spicul. 3-4 pollic. Fl. alterni, pedicellati, secundi.

*Paniculæ forma refert P. Chinens. Burm. Ind. tab. 11. f. 3. sed multo maior, & tenerior. Cul. 4-fl. præterea esse ait Linn.*

*contractæ.*

*P. panicula contracta, fil. scul. lanceol. 3-fl. sessilibus, nudis; fol. filiformibus. Retz. Obs. fasc. 3.*

Grænen 2-pedal. & ultra, glaberrimum, culm. crasso. Pedunc. longi, stricti.

*P. (Festuca) locustis 2-fl. spicatis: calycibus globris, fl. villosis, Hall. herb. n.º 1445.*

Grænen ValeSanum &c. Scheuchz.

*Ad margines agrorum Vaiesiæ.*

*Simil. P. cristatæ. Differt fol. vix semilineam lato, convoluto, quasi iuncea; spica unciul. conica, magis contracta; locustis multo obestioribus, g'uma florali exteriore villosa.*

*P. caul. recto; panicula rara; locustis 3-fl. basi, dorsoq. villosis. Hall. Hist. 1457. Scheuchz. Prodr. tab. 4. It. 6. T. 6. f. 16.*

*Simil. P. alpinæ magnitudine locustæ, sed differt paucitate florum.*

*P. panicula sparsa; locustis 4-fl. follicul. villosis. Hall. Hist. n.º 1458.*

Non potest esse *P. trivialis* ob culm. erectum; & locusta 5-fl.

*Poa iuncea, culmo recto; locustis 4-fl. floralium dorso sericeo. Hall. Hist. n.º 1459.*

*Simil. P. compressæ, sed discrimen ex definitionibus. Color violac. in flore.*

*mutans.*

*P. panicula contracta, apice nutante: spicul. 10-fl. valvul. revertis. Retz. Obs. fasc. 4.*

*In Tranquebaria.*

Culm. 2-3-ped. erecti, simpl. teretes. Fol. brevica, angusta. Panicul. ramis semiverticill. Spicul. subrubent. vel viridi-albicant. linear.

*synosuroides. P. panicul. stricta, pyramidalis; peduncul. pa-*

tentiff. spiculis dependentibus, distichis. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In India Or.*

Culm. solitar. 2-ped: erecti, basi fol. distichis, reflexis. Fol. caulina 2-3. convoluta. Panicul. sæpe culmo longior, sub florescentia col. sanguineo. Pedunc. terno-verticill. horizontal. spicul. numerosæ.

*plumosa.*

*P.* panicula diffusa; calycibus 6-fl. valvul. corollar. interioribus, linearibus, recurvis, dorso ciliatis. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In Tranquebaria.*

Culm. pl. conferti, 1-ped. filiform. foliosi. Fol. 1-2-pollic. linear. lævia, vaginis oris longe pilosis. Panicul. peduncul. ramosis, flexuosis. *Differt a P. ciliari forma paniculæ; fl. & ciliis minoribus.*

*viscosa.*

*P.* panicula oblonga, patente; spicul. inferior. 3-fl. superioribus 12-fl. culmis rigidis, demum viscosis. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In Malabar.*

Radic. stoloniferæ. Culm. spitham. teretes, rigidi. Fol. brevia, filiform. disticha, convoluta, rigidula. Panicul. peduncul. ramossissim. spicul. lineari-lanceol. Color paniculæ sæpius viridescens, alias incanus, aut sanguineus. *Odor terebinthiniacus.*

**101. BRIZA.** Locusta multiflora, mutica. Calyc. glumæ cordato-concavæ, æquales, obtusæ. Fl. in spicam cordatam, disticham collecti. Folliculi valva inferior ventricosa, maior, glumis calycinis similis: superior minor, plana. Sem. ex folliculo secedens.

**1. minor.** *B.* spicul. triangulis; calyce flosculis longiore. *Syst. veg. ed. 14.*

*Gramen &c. Scheuchz. gram. tab. 4. f. 9.*

*In Helvetia, Italia, Germania* ☉.

Culm. dodrant. Fol. linearia. Panicul. diffusa, trichotoma. Spicul. compressæ, 6-7-fl. subviolac.

**2. virens.** *B.* spicul. ovatis; calyce flosculis æquali. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente, Hispania &c.* ☉.

Planta vix palmar. *Simil. B. media, sed fol. duplo lasiora, planiora, decurrentia per ligulam*



*acutam. Panic. simillima, copiosior, virid. nec purpurefc. ramulis magis ramosis, divaricatisf. Fl. paulo min. dum comprimuntur facile decidui.*

3. *media.* B. spicul. ovat. calyce flosculis 7-9. brevior. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 258.*  
Gramen &c. *Morif. Hist. 3. tab. 6. f. 45. Barr. ic. 16. Scheuchz. gram. tab. 4. f. 8. Mont. gram. ic. 39.*

*In Europæ pratis ficcioribus 24.*

Culm. pedal-cubital. nodis 5-3. ad radicem. Panic. latet in vagina, dein prodit rara, triangular. Flosc. imbricati.

4. *maxima.* B. spicul. ovatis: floscul. septendecim. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. obs. 3. tab. 60.*  
Gramen &c. *Scheuchz. gram. tab. 4. f. 7.*

*In Italia, Lusitania ☉.*

Culm. palm-pedal. Racemus simpl. magnus. Peduncul. alterni, simpl. raro 2-fid. Spicul. candidantes, striis virentibus. Glumæ purpur. rufæ, ferrugin.

5. *cragrostis.* B. spicul. lanceol-floscul. plerumque viginti. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. 2. tab. 39.*  
Gramen &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 52. Scheuchz. gram. tab. 4. f. 4. Barr. ic. tab. 4. f. 4.*  
*Ad agrorum versuras ☉.*

Culm. decumbent. ramosi, rigidi, geniculis rubris; ora folio opposita barbata. Panic. rigida, racemis oppositis, & alternis. Spiculæ fuscæ.

*Maxime adfinis P. Eragrostidi; an solo loco diversa?*

- Cynosuroides.* B. spiculis lanceolat. multifi. culmo erecto, simplici, albo-striato. *Scop. Delic. Insul. Fasc. 2. tab. 11.*

*Habitat. . . . ☉.*

Culmi rigidi, ultra supremum fol. rubelli, læves, vix spitham. Fol. 2. circiter lin. lata, superne striata, nervo medio albo, vaginis amplexantibus, biauriculatis. Spicæ alternæ, rigida, subfissil. compressæ, ut in B. *Eragrostide*, flosculis imbricatis, distinctis. Sem. 3. Cum per ætatem cespitosi, ramosi.

*monspessu-  
lana.*

B. spica nutante, simplici: spiculis alternis, pedunculatis, subfoliariis, ovatis; calyc. 5-fl.  
*Gouan. hort. All. Fl. Ped.*

*Monspeltii, & in agro Nicæensi* ☉.

102. UNIOLA. Cal. multivalv. spicula ovata, carinata.

1. *paniculata*. U. paniculata; spicul. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Gramen &c. Pluk. alm. tab. 36. f. 6. Catesbæ  
car. 1. tab. 32.*

*In Carolina.*

Spicul. compressæ, undiq. acie acuta cinctæ, in paniculam inordinatam dispositæ.

2. *bipinnata*. U. panicula subspicata, racemis pinnatis, subtus imbricatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Ægypto.*

*Gramen omnium speciosissimum.* Culm. magnitudine Tritici, simpl. Racem. ped. simpl. e pedunc. alternis, simpliciss. æqualibus. Fl. sessil. adproximati, compressi, æqual. complanati more Cyperi. Glum. compressæ, carinatæ, ovatæ, acutiusculæ.

3. *mucronata*. U. spica disticha; spicul. ovat. calycibus subaristatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India.*

Culm. ped. lævis. Fol. angusta, glabra, vaginis striatis. Fl. 11-12. alterni, subsessil. distichi, ovati, glabri.

4. *spicata*. U. subspicata: fol. involutis, rigidis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Amer. boreal. maritimis.*

Culm. spitham. Panic. minima, coarctata, ut vix signum pedicellorum, secunda. Cal. & glumæ carinatæ floscul. 4.

103. DACTYLIS. Cal. 2-valv. compressus; altera valvula macarinata (*Cor. compressa*).

1. *cynosuroides*. D. spicis sparsis, secundis, scabris, numerosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. fusc. 1. tab. 9.*

*In Virginia, Canada; nunc in Lusitania, Anglia* 24.

Culm. 2-ped. arundinaceus, superne foliosus. Fol. in culm. 6. lata, culmo longiora, læviss. margine scabra, incurva, subtus glauciora. Spicæ divergentes, pileacæ.

2. *glomerata*. D. panicula glomerata, secunda. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 8. f. 2. Leers. herb. tab. 3. Fl. Dan. 743.*

Gramen &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 38.*

*Loef. ic. 23.*

*In Europæ pratis 24.*

*Gramen durum.* Culm. 3-ped. 5-nodis: in montosis altitudo humana. Fol. glauca, subhirsuta, vaginis ancipitibus. Panic. subspicata, variegata, crassia, albida, vel rubra. Racemi solitarii rigidi, ad angulum acutum diffusi cum culmo. Spicul. 4 fl. glomeratæ, asperæ. *Ad Festuæ genus pertinet.*

3. *ciliaris.* D. spica capitata, secunda; calycibus trifloris: caul. repente. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spec.*

Culm. palm. simpliciss. articulo unico. Fol. radical. longitudine culm. filiform. involuta, lævia, caulinum 1. læve, longitudine capituli, vagina subventricosa. Capitul. ovatum. Fl. pl. sessil.

4. *lagopoides.* D. spicis subrotund. pubescentibus, culm. prostrato, ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 12. f. 2.*

*In Malabaræ arvis 24.*

Culm. pl. palm. undique testis vaginis fol. Fol. patentia, subulata instar spinarum, basi angustiora. Fl. sessil. multifi. subsecundi.

5. *capitata.* D. spicis capitatis, lævibus: culmo prostrato, ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*Ad cap. b. Spec.*

Fol. Graminea, lævia, in culm. 3. Culm. sesquiped. læves. Panic. spiciform. quasi conglomerata, palmar. superne angustior, color. paleacei. Fl. gemini, depressi. Cal. sub 5-fl. valvul. exter. valde attenuata. Cor. oblong. mutica.

- geniculatus.* D. culm. geniculato; spic. ternis, distichis: fol. linearibus, plicatis, mucronatis. *Burm. Ind. tab. 12. f. 3.*

*In Java.*

Culm. ramosi, vaginati. Fol. alterna, vaginantia. Spicæ terminal. erectæ; fl. alternis.

104. CYNO-SURUS. Cal. 2-valv. multiflorus. Receptac. proprium unilater. foliaceum.

*Differt a Phleo folliculis integerrim.*

1. *cristatus.* C. bracteis pinnatifidis. *Syst. veg. ed. 14. Schreb.*

- gram. tab. 8. f. 2. Stillingfl. misc. tab. 11. Fl. Dan. tab. 238. Leerf. herb. tab. 7. f. 4.*  
*Gramen &c. Monti. gram. ic. 23. Barr. ic. 27. Scheuchz. agr. tab. 2. f. 8. A. C.*  
*In Europæ pratis 24.*  
 Culm. cubital. subnud. alterne flexuos. Fol. glabra. Spica sesquiunc. & ultra, gracilis, quasi disticha. Spicul. unilateral.
2. *echinatus*. C. bract. pinnato-paleaceis, aristatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Gramen &c. Scheuchz. gram. tab. 2. f. 3. D. Barr. rar. tab. 123. f. 2.*  
*In Europa australi, & Oriente, ad agros secalinos montanos ☉.*  
 Culm. 3-ped. & ultra, 4-nodis. Fol. glaberrima. Bract. una cum fl. secundæ. Spica uncial. ramis ramosis, sed densa, ad alterum sæpe latius conversa.
3. *Lima*. C. spica secunda; cal. gluma interiore spicul. subiecta. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Hispania ☉.*  
*Gramen vix spitham. Fol. vagina tumidiuscula, fol. ipso parvo. Spica oblonga, arcte imbricata, ex fl. secundis, sessilibus, duplici serie, compresso-carinatis. Singuli fl. constant floscul. 5.*
4. *durus*. C. spicul. secundis, alternis, sessilibus, rigidis, obtusis, adpressis. *Syst. veg. ed. 14. Pollich. pal. tab. 1. f. 1.*  
*Gramen &c. Barr. ic. 1213. tab. 50.*  
*In Europa australi ☉.*  
 Culm. pauci, vix palm. procumbent. Fol. lævia. Spica secunda. Spicul. duorum ordinum, absque involucre. Flosc. compressi, mutici.  
*Ad Poæ genus pertinet.*
5. *sphærocephalus*. C. bract. integris: spicis globos. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. p. 71.*
6. *cæruleus*. C. bracteis integris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Sesleria cærul. Arduin. sp. 2. tab. 6. f. 3. 4. 5.*  
*Gramen &c. Scheuchz. gram. tab. 2. f. 9. A. B.*  
*In Europæ pascuis, & pratis montanis, & subalpinis 24.*  
*Habitus Anihoxanti. Culm. dodrant-ped. inferne vaginosus, durus. Fol. firma, glaucocærulescen. radical. lata. Panic. spicatu, o-*

# TRIANDRIA DIGYNIA.

203

vata, congesta, per ætatem cœrulesc. *Var. spica alba.*

*Non pertinet ad hoc genus.*

7. *Uniolæ*. C. ebracte-*t.* spica secunda; spicul. bifariis alternantibus, adpressis, ovatis. carinatis, obliquis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Gramen glaberrimum. Facies *Uniolæ*, sed cal. 2. valv. non multivalv. Spica linearis.

8. *coracanus*. C. spicis digitatis, incurvatis; culm. erecto, compresso; fol. suboppositis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Pluk. tab. 91. f. 2.*

Panicum &c. *Rumph. Amb. 5. tab. 76. f. 2.*

*Vesl. Ægypt. tab. 53.*

Titti-pullu. *H. Mal. 12. tab. 78.*

*In India ☉.*

Culm. 4-ped. fol. petiolis obtekti. Fol. longiora, bifaria, pilis longis, raris villosa; vaginis amplexicaulibus, compressis. Spicæ 4-6. terminal. raro unica infer. erectiusc. striatæ, digiti longitudine, maturæ latiores, & sæpe incurvæ. Spicularum raches depressæ. Sem. magna, subglobosa, quadruplici serie, nuda, tumentia.

9. *ægyptius*. C. spicis digitatis, quaternis (cruciatis) obrusis, patentissim. mucronatis; calyc. mucronatis: caul. repente; fol. oppositis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 300. f. 8. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 3. f. 7.*

*In Africa, Asia, Amer.*

Caul. palm. lævis, in genua procumbens. Spicul. 4-5. horizontal. rachi mucronata, ultra fl. protensa. Fl. alterni, distichi. Cal. 2-fl. mutici.

10. *indicus*. C. spicis digitat. linearibus: culmo declinato, compresso, basi nodoso; fol. alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Burm. Zeyl. tab. 47. f. 1. Rumph. amb. 6. tab. 4. f. 2. Pluk. phyt. tab. 189. f. 7.*

*Kauara-pullu. H. Mal. 12. tab. 69.*

*In Indiis ☉.*

Culm. sesquiped. striatus, lævis. Fol. striata, lævia, ad marginem scabra. Spicæ digital. rectæ, vel subincurvæ, secundæ; maturæ in-trorsum convolvuntur. Involuc. integerr. Cal. sub 4-fl.

- 11. *virgatus*.** C. panicula ramis simplicibus; fl. sessilibus 6-fl. ultimo sterili, inanis subaristat. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Gramen &c. *Sloan. Jam. 1. tab. 70. f. 2.*  
*In Jamaica.*  
 Panic. longa, subfastigiata, verticillata; pedunc. simplicibus.
- 12. *domingensis*.** C. panicula ramis simplicibus; spicul. subsessilib. 6-fl. fl. omnibus aristatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Jacq. misc. 2. p. 363.*  
*Habitat in Domingo.*  
 Culmi pl. herbac. 2-3-ped. teretes, nodosi, folioli, glabri, ramum sæpe ex infer. nodo emittentes, cæterum simplic. Fol. ensiformi-linear. acuta, plana, margine retrorsum aculeat-aspera, vagina amplexicaul. hirsuta. Panicul. terminal. erecta, filiform. consistat racemose ex rachibus alternis, vel oppositis pl. patentissimisque, ad ortum, fasciculo piloso munitis; quarum alternantibus denticulis spiculæ insident exiguae, bifariae, compressæ. Arista purpur. & aspera. Sem. minutum.
- 13. *aureus*.** C. paniculae spiculis sterilibus, ternatis, pendulis; fl. aristatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Gramen &c. *Shaw. Afric. tab. 232. Barr. rar. 1180. tab. 4.*  
*In Europe australis faxis, & rupibus ☉.*
- 
- Lagopoides*.** C. culmo folioso: spicis conicis; pedunc. solitar. villosis. *Burm. Ind.*  
 Amaranthoides &c. *Pluk. amalt. tab. 357. f. 4.*  
*Coromandeli.*  
 Radix alba. Culm. erectiusc. teres, ramis sparsis, sæpe solitariis. Fol. lanceol. magnitudine unguis. Pedunc. terminal. Spica compressa.  
*Color totius plantæ cinereus.*
- ficulus*.** C. spica densa, compresso-plana; spicul. alternis, sessilibus, acutis. *Jacq. obs. Bot. tab. 43.*  
 Gramen panicul. elegantiss. &c. *Turn. inst.*  
*In Sicilia.*  
 Calyce præprimis a Lima differt.
- ternatus*.** C. spicul. ternatis, quaternisve, lanceol. patentissim. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*  
 Culm. sæpe simpl. filiform. foliosi, glabri. Fol.

c. nalicul. vagina fol. triplo longiore. Spicæ terminal. horizontal. pollicar. pallide rubentes. Spicul. 4-fl. glumis carinatis, muticis.

*floccifolius*. C. spicis linearibus, inferioribus alternis, superioribus geminis: fol. alternis, margine alterne flocciferis. *Forsk. Æg. p.*

*In Arabia.*

Culm. ped. sæpe simpl. reticulatus, fol. vaginis tectus, necnisi superius nudus. Fol. pedal. linearia, flocculis parvis, densis, subglobosis, albis. Spicæ 3-pollic. erectæ, secundæ, basi pilosæ.

Cynosurus (Sesleria) locustis 5-fl. distichis; fl. 2 dent. *Halt. Hist. n. 1447.*

*An Sesleria Ard. tab. 2.?*

Subrotundus, sed evidenter distichus.

105. FESTUCA. Locusta tenuis, multiss. Cal. inæqualv. 2-glumis, glumis acuminatis, muticis. Follicul. 2-valv. valvula infer. maiore, acumin. aut etiam ex dorso aristata.

*Primæ 4-spec. sunt valde adfines.*

\* *Panicula secunda.*

1. *bromoides*. F. panic. secunda: spicul. erectis; calyc. valvula altera integra; altera acumin. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 33. f. 10. Scheuchz. gram. tab. 6. f. 14.*

*In Anglia, Gallia.*

*Differt a F. myuro panic. subspicata, glumis non ciliatis. Simul. F. ovina, sed fol. latioribus.*

Culmi semi-1-ped sp. ham. Fol. vaginantia, glabra. Panic. 2-3. unc. angusta.

2. *ovina*. F. panicula secunda, coarctata, aristata: culm. 4-gono, nudiusc. fol. setaceis. *Syst. veg. ed. 14. Stillingfl. misc. tab. 8. Leerf. herb. tab. 8. f. 3. 4.*

Gramen &c. *Loeffl. pruss. tab. 24.*

b. *F. vivipara.*

Gramen &c. *Scheuchz. gram. tab. 1. Rati Angl. tab. 22. f. 1.*

*In alpibus Lapponiæ, Helvetiæ &c.*

Culm. cespitosi, ped-cubital. erecti, tenues, geniculis nigris. fol. tenuia, hirsuta. Panicula parum sparsa, raro heteromalla, erecta (ra-

## TRIANDRIA DIGYNIA,

cemis solitariis ) viridis , glauca , spadicea .  
Locustæ violac. per ætatem distichæ .

*Non pertinet ad hoc genus . Scop.*

## 3. rubra .

*F. panicula secunda , scabra , spicul. 6-fl. aristatis ; flosculo ultimo mutico : culmo semitereti . Syst. veg. ed. 14. Stillingfl. misc. tab. 9. Leerf. herb. tab. 8. f. 1.*

*In Europæ sterilibus siccis , & pratis alpium 24 . Magnitudine , colore maturitatis rubro ; fol. latioribus ; culm. semitereti , differt a F. ovina .*

*A F. duriuscula fol. caulinis latioribus , planis ; spicul. paulo ma: panic. præterea latiore .*

*A F. myuro , fol. radicalibus setaceis ; aristis insuper valde brevibus differt .*

## 4. amethystina .

*F. panicula flexuosa ; spicul. secundis , inclinatis , submuticis : fol. setaceis . Syst. veg. ed. 14.*

*In Europæ pratis , & pascuis montanis 24 .*

*Culm. cubital. & ultra . Folliculi Amethystino-virid-argenteo col. varii ; calyc. brevi argenteo .*

*Variat panic. min. col. stramineo .*

*Var. fol. ovina . Hall. Helv. n. 1442. y.*

## 5. reptatrix .

*F. paniculæ ramis simplicibus , spicul. subseffilibus . Syst. veg. ed. 14.*

*In Arabia , Palæstina 24 .*

*Radix longe reptans sub terra , vestita latis fol. rudimentis . Culm. fere 2-ped. Fol. involucriform. Panic. oblon. ramis alternis , secundis . Spicul. lanceol. acuminatæ , muticæ , 6-fl.*

## 6. duriuscula .

*F. panicula oblong. secunda ; spicul. oblong. lævibus : fol. setaceis . Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 8. f. 2. Fl. Dan. tab. 848.*

*Gramen &c. Raii Angl. 3. tab. 19. f. 1.*

*In Europæ pratis siccis 24 .*

*Convenit cum F. dumetorum , fol. radicalibus filiformibus , canaliculatis : caulinis planis , gramineis ; differt vero glumis lævibus .*

*A. F. rubra differt fol. radicalibus , & caulinis setaceis ; panicul. contradiore ; spicul. parvis , ovatis . A. F. ovina culm. tereti , & quod spiculæ continuo in arisiam brevissimam terminentur .*

## 7. dumetorum .

*F. panicula spiciformi , pubescente : fol. filiformibus . Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 700.*

*In Hispania , Dania 24 .*

*Culm. 1-sequiped. filiform. teretes , genicul. duobus ,*



bus tumidi. Fol. radical. pedal. teretia, vix ancipitia: caulina breviora, canaliculata. Panic. parva, spicul. 10-12. canescentes; inferior. geminæ, pedicellatæ; superior. solitaria, sessil. *Adfinis valde F. duriuscula.*

8. *elator.* F. panicula erecta, secunda, spicul. subaristatis; exterioribus teretibus. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 2. Lærf. herb. tab. 8. f. 6.*

Gramen &c. *Morif. hist. 3. f. 8. T. 2. f. 15. Barr. ic. 1154. tab. 25. Scheuchz. gram. tab. 4. f. 6.*

Phoenix &c. *Park. theat. f. 1164.*

b. Gramen &c. *Buxb. cent. 5. tab. 16.*

In Europæ pratis fertilibus, prope fossas aquarum 24.

Culm. 2-4-ped. Fol. sulcata, retroverfu aspera. Panic. magna, laxa, semper viridis, sæpe ad alterum latus flexa. Spicul. teretes, acumin. per ætatem distichæ, glabræ. Glumæ florales ex pallido, & violac. col. variz, oris albis, siccis. *Var. humilior. Hall. helv. n.º 1452.*

9. *myurus.* F. panicula spicata; calycibus minutiss. muticis: fl. scabris, aristis longis. *Syst. veg. ed. 14. Lærf. herb. tab. 3. f. 5.*

Gramen. *Barr. tab. 99. f. 1. Scheuchz. gram. tab. 6. f. 12. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 7. f. 43.*

In Europa, Barbaria, locis sterilibus ☉.

Culm. cespitosi, semiped-cubital. subnudi, sæpe violac. Fol. linearia, se convolventia, & arefcentia. Panic. longa, etiam semiped. strictiss. subincurva, secunda, ad angulos peracutos ramosa. Locustæ teretes, adultæ distichæ. Aristæ purpurasc.

10. *spadiosa.* F. panicula secunda, calyc. 5-fl., floscul. ultimo sterili: fol. lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Monspelii, in Helvetia.*

Altitudo 4-pedal. Fl. magni F. elatioris, floscul. magis distantibus, acutis, basi subnodosis, rufescentibus. Panic. contracta. Stam. violac.

11. *phanicoides.* F. racemo indiviso; spicul. alternis, subsessilibus, teretibus: fol. involutis, mucronato-pungentibus: *Syst. veg. ed. 14. Ger. prov. tab. 2. f. 2.*

Gramen &c. *Pluk. tab. 33. f. 4.*

In Gallo-provincia &c. maritimis arenosis 24.

Tem. I,

O

## TRIANDRIA DIGYNIA:

Culm. ped-cubit. Fol. glauca. Spica 2-unc-pedal; & ultra. Glumæ mucronatæ.

\*\* *Panicula æquali.*

12. *fusca*, F. panicula erecta, ramosa; spicul. sessilibus, carinatis, muticis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Palaestina.*

Culm. altus, ramosus. Fol. e vaginis latiuscul. subulata, angusta, involuta. Spicul. pollic. erectæ, obscuræ, multiss.

13. *decumbens*, F. panicula erecta; spicul. subovatis, muticis; calyce flosc. maiore, culm. decumben. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 162. Leerf. herb. tab. 7. f. 5.*

Gramen &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 1. f. 6. Pluk. alm. tab. 34. f. 1. Monti. prodr. tab. 2. f. 1.*

*In Europæ pascuis sterilibus 24.*

Culm. ascendens, pedal. infarctus, articulis 3. Fol. vaginæ pilosæ. Panic. uncial. simplex. Spicul. 3-4-fl. Locustæ turgidæ. Sem. ovat. flavescent.

*Ad Melicas pertinet. Hall.*

14. *pauciflora*, F. panicula pitula; spicul. sub 4-fl. aristat. scabris; fol. villosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Culm. erect. 2-ped. striatus. Fol. linearia. Panic. ampla, patentiss. Pedunc. capillar. flexuosi, scabri. Pedicell. minus patuli.

15. *fluitans*, F. panic. erecta, (sæpius) ramosa, spicul. subsessilibus, teretibus, muticis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 237. Stillingf. misc. tab. 10. Schreb. gram. tab. 3. Leerf. herb. tab. 8. f. 5.*

Gramen &c. *Loefel. prus. ic. 21. mala. Morif. Hist. 3. f. 8. tab. 3. f. 16. Scheuchz. gram. tab. 4. f. 5. Barr. ic. 7.*

*Vivipara varietas. Leerf. l. c.*

*In Europæ suffis, & paludibus 24.*

Culm. 1-3. ped. basi repens, & ramosus. Fol. glabra, mollia, nervo, & oris asperis. Panic. longa, sparsa, inclinata, quandoque subspicata. Spicul. uncial. Flosc. 9-12. Sem. olivaceum, nitidum.

16. *cristata*. F. panicula spicata, lobata; spicul. ovat. latis, 6-fl. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Lusitaniæ collibus sterilibus.*  
 Culm. pl. vix digital. Panic. fere ovata. Diversa ab *Aira cristata*, flosc. pl. hirsutis, culm. brevior, sed facie accedit.
17. *calycina*. F. panicula contracta; spicul. linearibus, calyce floscul. longiore; fol. basi barbatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Hispania.*  
 Fol. radical. in cespitem collecta. Culm. filiform. digital. Panicul. attenuata. Cal. spiculæ longitudine.
18. *misera*. F. panicula contracta; glumis aristatis, scabris: culm. geniculato. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*In Japonia.*  
 Culm. decumb. apice erectus, sesquipedal. Fol. digitalia, glabra. Panic. digital. subspicata, subsecunda, glabra. Glumæ paucifl. aristatæ, scabræ.
19. *spinosa*. F. frutescens, ramis, ramulisq. spinosis; pedicell. aculeatis. *Syst. veg. ed. 14. Lit. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Culm. solidi, proliferi, ramis confertis, erectis. Fol. vaginis dilatatis. Folium subulat. breviss. pungens. Rami teretes, aphylli; ramul. alternis, horizontalibus, pollic. simpliciss. mucronato-spinos. Fl. distichi. Spicæ oblongiusc. 7-10. flosc. minus dense adproximatis.
- 
- dichotoma*. F. panicula dichotoma, spicul. sessilibus, patentibus, linearibus, 3-fl. muticis. *Forsk. Æg.*  
*In Ægypto.*
- mucronata*. F. panicula glomerata; spicul. multiss. flore glandulifero. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*  
 Culm. repent, ramis rectis, cubitalibus, ramosis. Fol. subdisticha, patentiss. vagina fissa, margine ciliato. Panic. terminal. pollic. ovata, spicul. oblanceol.
- lanceolata*. F. panicula æquali: caul. decumb. spicul. 7-fl. muticis, lanceolat. *Forsk. Æg.*  
*In Arabia.*
- fasciculata*. F. panicula fasciculata, secunda; spicul. 4-fl.

## TRIANDRIA DIGYNIA.

longe aristatis; calyc. valvula exter. aristata; altera minuta, mutica. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

*Festuca* fol. radicalibus, setaceis; caulinis latioribus, locusta 7-fl. *Hall. Hist. n.° 1438.*

*Gramen nemorosum* &c. *Scheuchz. gram.*

*In Helvetia.*

Culm. 3-ped. genicul. nigris. Panic. laxa, virid.

Calyc. glumæ inæqual: graciles; arista ex gluma exter. lineam longa. Omnis glabra.

*Festuca* panicula stricta; locustis teretibus, 4-fl. *Hall. Hist. n.° 1439.*

*In Helvetia.*

Simil. *F. rubra* b. sed locustæ non distichæ, magis parvifl. violac. cum splendore aureo mixto. Fol. glauca, dura. Panic. rara.

*Halleri.*

*F.* fol. perangustis; panicul. stricta; locust. teretibus, hirsutis, longius aristatis. *All. Fl. Ped. Hall. Hist. 1441.*

*In Helvetiæ &c. montibus* &c.

Fol. glauca, retrorsum aspera. Panic. minima, secunda. Locustæ 6-fl. longiores quam in *F. rubra*; aristæ triplo longiores. In locusta vilus manifestus.

*indica.*

*F.* panicula contracta, erecta: spicul. compressis, subaristatis, subscariolis. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*Thama pullu. H. Mul. T. XII. tab. 45.*

*In Tranquebaria.*

*Facies* omnino *Poa*. Culm. 3-ped. & ultra, striati, foliosi. Fol. linearia, vaginis basi tumidis. Panicula semiped. Spicul. parvæ, alternæ, breviter pedicellatæ.

*Dignoscitur col. carulescens-viridi. Panicul. dimidia pars simul floret, & patet; dein contrahitur florente altera parte.*

106. BRO-  
MUS.

Cal. glumæ acuminatæ, muticæ, infer. minore. Folliculi gluma infer. maior, concava, apice 2-fido, aristam rectam infra apicem emittens. Super. minor est, & mutica. Sem. folliculo arcte inclusum.

3. *secalinus.*

*B.* panicula patente, (*œdæ*); spicul. compresso-ovatis, arstis erectis; seminibus distinctis.

*Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 11. f. 2.*

*B. vitiosus. Weigel. obs. bot. tab. 1 f. 2.*

*B. multiflorus. Weigel. l. c. tab. 7. f. 1.*

*Festuca* &c. *Scheuchz. gram. tab. 3. f. 9.*

*Gramen* &c. *Morif. Hist. 3. c. 8. tab. 7. f. 17.*

*In Europæ agris fœcalinis arenosis* ☉.

Culm. 3-ped. Fol. lævis, oris, & nervo asperis. Spicul. coloratæ, prius hirsutæ, dein glabræ. Locustæ per maturitatem nutantes, & distichæ.

2. *japonicus*. B. panicula patens, ramosa: spicul. oblong. glabris; aristis divaricatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Japon. tab. II.*

*In Japonia* ☉.

Culm. erect. subdecumb. spitham-pedal. simpl. basi geniculat. Fol. culmo breviora, linear. striata, villosa. Pedunc. & pedicel. capillar: apice incrassati, flexuosi, inæqual. glabri. Spicul. 5-6-7-fl. unguicul. Glumæ imbric. margine parum membranac. striatæ, infra apicem aristatæ.

*Differt a B. arvensi, spicul. oblong. & aristis divaricatis. A B. fœcalino spicul. oblong. glumis imbricatis, nec distantibus, & aristis divaricatis, A B. squarroso, spicul. duplo angustioribus, & glabris, nec non panic. ramosa.*

3. *mollis*. B. panicula erectiuscul. spicis ovatis, pubescentibus, aristis rectis: fol. mollissime villosis. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 6. f. 1. Leerf. herb. tab. II. f. 1. Weig. obs. tab. 1. f. 4.*

*Gramen* &c. *Morif. Hist. 3. f. 8. tab. 7. f. 18. Scheuchz. gram. tab. 5. f. 10.*

*In Europæ australioris fœcis* ♂.

*Simil. B. fœcalino. sed albido-pubescent. Genicula crassiora, cylindrica, subtus in primis valde hirsuta. Fol. utrimq. mollissima, vaginis striatis. Panic. brevius pedicellata.*

Planta vulgariss. Culm. 1-3-ped. Panicula ovata, angustata.

4. *squarrosus*. B. panicula (patula) nutante; spicul. ovatis; aristis divaricatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Festuca* &c. *Scheuchz. gram. tab. 5. f. 11.*

*Gramen* &c. *Barr. ic. 24. f. 1. 2. mont. ic. 32.*

b. *Gramen* &c. *Buxb. cent. 5. tab. 38. f. 1.*

*In Gallia, Helvetia, Sibiria, Pademontio* ☉.

Culm. pedal-cubital. inferne cum mollibus fol. hirsutus. Spicæ glabræ.

5. *purgans*. B. panicula nutante, crispa: fol. utrimq. au-

- dis, vaginis pilosis; glumis villosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Gramen &c. *Few. peruv. T. 1. ?*  
*In Canada 24.*  
 Culm. sesquiped. firmus. Fol. latitudine Arundinis, carinata, viridia. Panic. flexuosa. Spicul. oblong.  
*Differt nostra a Few. radicibus fibrosis, nec squamosis; spicul. angustioribus.*
6. *inermis.* B. panic. erecta; spicul. subteretibus, subulat. nudis, submuticis. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 13.*  
 Gramen &c. *Barr. ic. 25.*  
*In Germania, Helvetia &c. 24.*  
 Rad. maxime reptans. Culm. erectus, 1-3-ped. geniculat. purpurasc. Fol. plana, mucronata, subrus nervo albicante. Ligula breviss. obrufa, alba. Panic. ped. subnutans ad apicem, primum contracta, dein patens. Spicul. reliquis longior, flosculis sub 9.
7. *bifidus.* B. panic. erecta, ramosa; spicul. ovatis, sub 3-fl. glumis bifido-setaceis, arista divaricata. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*In Japonia.*  
*Differt a B. squarroso, panic. ramosa, spicul. multoties min. pauciss. glabris, gluma 2-fid. 2-feta, nec tantum emarginata.*  
 Culm. erect. 2-ped. simpl. striatus. Fol. brevina, digital. & pollic. linear. striata, pubescent. Panic. palmar. & ultra, parum patens. Pedunc. & pedicel. capillar. flexuosi. Spicul. vix lineam longæ, alternæ, glumis patulis.  
*Habitus potius Avenæ, quam Bromi.*
8. *asper.* B. panicula nutante, scabra; spicul. aristat. villosis: fol. scabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Festuca &c. *Morif. 3. f. 8. tab. 7. f. 27.*  
*In Germania, Helvetia, Anglia 24.*  
*Differt a B. Secalino panic. pedali; ramis semiped. Spicul. sunt angustæ, teretes, glabræ, ex viridi, alboq. col. purpurasc. Fol. utrimq. hirsuta. Vaginæ villosæ, ac molles.*
9. *ciliatus.* B. panicula nutante: fol. utrimq. vaginisq. subpilos. glumis ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Canada.*  
 Culm. tenues. Spicul. oblon. compressæ, petä-

lorum. marginibus valde pilosis; qua nota facile distinguitur.

10. *sterilis*. B. panic. parva; spicul. oblong. distichis; glumis subulato-aristatis: *Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 11. f. 4.*

B. grandifl. *Weig. obs. tab. 1. f. 1. sub qua denominatione B. sterilem, & tectorum coniungit.*  
Gramen &c. *Mont. ic. 1. Scheuchz. gram. tab. 5. f. 14.*

*Festuca. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 7. f. 11.*

*In Europæ australis agris &c. ♂.*

*Differt a B. tectorum, magnitudine; pedunc. scabris, non pilosis.*

Culm. cubital. Fol. longa; superne villosula. Panic. magna; fol. caulinis longior; fere unilateral. multifariam divisa; post entiorescentiam nutans; Pedunc. longi. Spicul. 2-unc. subcompressæ, apice divergentes.

*Var. hirsuta. Hall. Hist. n. 1507.*

11. *arvensis*. B. panicula nutante; spicul. oval-oblong. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 293. Leerf. herb. tab. 11. f. 3. Weig. obs. tab. 1. f. 3.*

Gramen &c. *Vaill. tab. 18. f. 3.*

*Festuca &c. Scheuchz. gram. tab. 5. f. 15. Rudb. clys. f. 7. optima.*

*In Europa ad versuras agrorum ☉.*

Culm. 4-ped. Fol. magna; iuniora hirsuta; adulta glabra. Panicul. longa, semiped. diffusæ; pedunc. longis, sparsis, ramotis. Locustæ densæ.

12. *geniculatus*. B. panic. erecta; floscul. distantibus; pedunc. angular. culmo genu procumbent. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Lusitania.*

Culm. vix palm. Fol. graminea, lævia; vaginis culmum vestientibus. Fl. oblong. 4-fl.

13. *tectorum*. B. panic. nutante; spicul. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 10. f. 2.*

*Festuca. Pluk. alm. tab. 299. f. 2. Moris. Hist. 3. f. 8. tab. 7. f. 13.*

*In Europæ tectis terrestribus & collibus siccis ♂.*

Tota planta sæpe purpurasc. Culm. spitham. gracilis. Fol. margine ciliata. Panic. secunda. Aristæ breves, vel longæ.

14. *giganteus*. B. panic. nutante; spicul. 4 fl. aristis breviorib. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 11. Leerf.*

TRIANDRIA DIGYNIA.

- herbarn. tab. 10. f. 1. Weig. obs. tab. 1. f. 5.*  
 Gramen &c. *Vaill. Paris. tab. 11. f. 3. Scheuchz. gram. tab. 3. f. 14.*  
 b. B. glaber &c. *Hal. Hist. a. 1506. Gramen &c. Scheuch. agrofl. tab. 3. f. 16.*  
*In Europæ humidis, umbrosis collibus, sylvis &c.*  
 Culm. 3-4-pedal. Fol. spitham. lata, glabra. Panic. palm. ampla, ad florescentiam sparsa, primum erectiusc. dein nutans. Racemi binati.  
 15. *rubens.* B. panic. fasciculata; spicul. subfessilibus, villosis, aristis erectis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Hispania, & agro Nicæensi ☉.*  
 Spicul. multæ, oblong. longe aristatæ, in fasciculum ovatum congestæ.  
 16. *scoparius.* B. panic. fasciculata; spicul. subfessilibus, glabris; aristis patulis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Hispania.*  
 Panicula ovata ex spicis subfessilibus, ovato-obl. Aristæ extrorsum versæ.  
 17. *rigens.* B. panic. spicata; spicul. erectis, subfessilib. pubescent. sub 4-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Lusitania.*  
 Culm. spitham. fol. vestiti. Fol. nervosa, supra leviter pilosa, vaginis totum culmum vestientibus. Spica erecta, breviter peduncul. spicul. sparsis, subfessilibus, erectis. Arista longitudine spiculæ.  
 18. *racemosus.* B. racemo simpliciss. pedunc. 1-fl. fl. 6-fl. lævibus, aristatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Anglia.*  
 Racemus nutans. Fol. subrus villosa. Fl. ovati, acuminati.  
 19. *triflorus.* B. panicula patente; fl. sub. 3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 440. ?*  
*In nemoribus Germaniæ &c.*  
 Culm. digit-palm. geniculi purpurasc. Ligula obtusiusc. alba. Panic. digit-palm. Spicul. parvæ, lanceol. e glauco-viridi-albicantes.  
 20. *madritensis.* B. panic. rariore, patulo-erecta; spicul. linearibus, intermediis geminis, pedicellatis, superne incrassatis. *Syst. veg. ed. 14. Barr. ic. 76. f. 1.*  
*In Hispania, Anglia, Comitatu Nicæensi ☉.*  
 Culm. 2-pedal. genicul. turgidis. Fol. latiusc. mollia. Aristæ longæ, erectæ.



21. *ramosus*. B. culm. ramulosi. fol. involuto-subulatis: spicul. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Oriente* 24.  
 Culm. procumbent. filiform. Fol. setacea. Spicæ sæpe 3. alternæ, facie omnino B. *pinnati*.
22. *pinnatus*. B. culm. indiviso; spicul. alternis, subsessilibus, teretibus, subaristatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 164. Leerf. herb. tab. 10. f. 3. Weig. obs. tab. 1. f. 10.*  
 Gramen &c. *Petiv. gram. tab. 3. f. 1. Mont. tab. 16. Scheuchz. gram. tab. 1. f. 7.*  
*In Europa sylvis montosis asperis* 24.  
 Culm. 1-2-ped. una cum fol. & vaginis villosus. Fol. plana. Spica stricta, disticha. Spicul. oblong. Cal. & fl. glumæ pilis longis, lutescentibus, & pubescentibus præditæ. Cor. subaristata. Scicularum latus planum culmo obvertitur. Dum floret, spicæ a culmo horizontaliter discedunt: post efflorescentiam culmo adproximantur.
23. *cristatus*. B. spicul. distiche imbricatis, sessilibus, depressis. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Triticum &c. *Schreb. gram. tab. 23. f. 2.*  
 Festuca &c. *Gmel. Sib. 1. tab. 23.*  
 Gramen &c. *Buxb. cens. 1. tab. 50. f. 3. mala.*  
*In Sibiria, Tartaria* 24.  
 Culm. ped-cubital. Fol. glauco-viridia. Spica unci-sesquiunc. plerumq. subhirsuta. Spicul. longæ, teretes.
24. *distachyos*. B. spicis sub duabus erectis, alternis. *Syst. veg. ed. 14. Ger. prov. tab. 3. f. 1. Weig. obs. tab. 1. f. 8.*  
 Gramen &c. *Barr. ic. 99. f. 2. Pluk. alm. tab. 33. f. 1.*  
*In Europa australi, Oriente* ☉.  
*Differt a reliquis præcipue spicis sæpe duabus, quarum inferior sessilis, nam in cultis 3. spicæ aristatæ.*  
 Culm. 1-2-ped. indivisus, erectus, glaber. Spicæ sub 10-fl. spicul. sessil. planæ, obversæ scapo, ut in *Triticis*.
25. *stipoides*. B. panicula erectiusc., pedunc. ensiformib. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Maioren* ☉.  
 Gramen spitham. Culm. pl. erecti, læves, fol. culmo breviorib. Panic. oblonga, fuscescens.

Pedunculi ad dentes terni, intermedio 1-fl. lateralibus 2-3-fl.

*Diversus a stipa membranacea & genere, & habitu, pedunc. licet conveniat; cum stipæ aristæ semine quadruplo longiores; huic vix feminis longitudine.*

- sylvaticus*. B. spicul. sessilibus: culm. indiviso; aristis folliculi glumas longitudine æquantibus. Pollich. Palat. Fl. Dan. tab. 164.  
In Palatinatu.  
Differt revera a B. pinnato, cui similis. Culm. 2-ped. & ultra, villosus. Fol. utrimq. pilis mollibus villosa. Spicul. villosæ, ac leviter striatæ.
- gracilis*. B. spica terminali, debili: spicul. alternis, remotis, teretibus subularis, glabris; aristis longioribus. Weig. obs. Bot.  
In Palatinatu.  
Differt a B. pinnato, culmo graciliore; fol. longioribus; spica e vagina summi folii; & spicul. remotis, angustioribus, longius aristatis.
- montanus*. B. panicula nutante; spicul. sub 6-fl. aristis longioribus. Pollich. Palat.  
In Palatinatu.  
Culm. 4-5-pedal. erectus, teres. Fol. plana: ligula brevis, alba; vaginæ, præcipue infer. scabræ, & villosæ. Spicul. lanceol. aristis uncial. tereti-compressiusc.
- striatus*. B. Scop. Fl. Carn.  
In Carniola.  
Culm. 2-pedal. diffusi. Fol. vix 2-unc. refracta. Panic. 2-3-unc. laxa, rigida. Racemi plerumq. simpl. paucifl. Spicul. 2-3-fl. axi adpressæ. Petalum exterius 2-fid. e medio aristatum; interius muticum, 2-part.
- villosus*. B. Scop. Fl. Carn.  
Triticum rad. repente vaginos. Hall. Hist. n. 1423.  
In Carniola, Helvetia.  
Statura Triticæ, nodis 6. Fol. semipedal. Spica 4-unc. Flosc. aristati. Cal. muticus. Receptac. villosum. Variat. culm. nodis, vaginisq. pilosis.
- villosus*. B. panicula fasciculata; spicul. linearibus, 6-fl., pedicell. glabris. Forsk. Æg.  
In Ægypto.

Culm. ped. villosus, & rachis paniculæ. Fol. 2-pollic. lanceol. villosa. Vaginæ longiss. glabræ, ad apicem villosæ, terminatæ intra folium membrana amplexic. hyalina. Spicul. pollic. erectæ.

*polystachios.* B. paniculis patentibus, ramis spicatis; spicul. alternis, adpressis, linearibus, aristis breviss. Forsk. *Æg.*

*In Ægypti jessis.*

Culm. cubitalis.

*Poiformis.* B. panicula spicata, ovato-oblon. spicul. horizontalibus, compressis, 5-fl. Forsk. *Æg.*

*In Ægypto.*

Bromus (*Triticum*) locustis remotis, lissutis, teretibus, exiguis: culmis floriferis gracilioribus. Hall. *Hist. n.* 1432.

*In Helvetia.*

Simile B. pinnato.

*ligusticus.* B. All. *Fl. Ped.*

Gramen &c. Barr. *ic.* 76. f. 2. Scheuchz. *gram.* tab. 6. f. 13.

*In Liguria ad litora maris* ☉.

*agrestis.* B. hirsutus, angustifolius; locustis 5-fl. aristis folliculo brevioribus. Hall. *helv. n.* 1507. All. *Fl. Ped.*

Gramen &c. Scheuchz. *gram.* tab. 5. f. 13.

Festuca &c. Vaill. *tab.* 18. f. 2.

*In pascuis sterilibus* ☿.

*Dertonensis.* B. All. *Fl. Ped.*

Gramen &c. Scheuchz. *gram.* tab. 6. f. 10.

*Ad agrorum margines* ☉.

*Plukenetii.* B. fol. convolutis, pungentibus: locustis binis terminalibus. All. *Fl. Ped.*

Gramen &c. Fluk. *phyt. tab.* 33. f. 1.

*In locis eridis saxosis, calidioribus* ☿.

Rad. repens. Culmi pl. ad basin ramosi, rigidi. Fol. linearia, glauca. Culm. spithama longior, subnudus, excepta parte inferiori. In culmo erecto ad basin nodus fuscus, ex quo vagina fol. caulini erumpit. Locustæ distichæ, teretes, sed tamen utrinque compressæ, glabræ.

*ramosus.* B. panicula ramosa, nutante, scabra; spicul. linearibus, 10-fl. arista longioribus, fol. scabris. Hudf. *Fl. Angl.* All. *Fl. Ped.*

Allion.

*In sylvis collium* ☿.

107. STIPA. Cal. 2-valv. 1-fl. Cor. valvula exteriori aristâ terminali; basi articulata. *Dignoscitur glumæ corollinæ aristâ longissima.*
1. pennata. S. aristis lanatis. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. p. 221.*  
*In Europa, e rupium fissuris solet prodire 24.*  
 Radices cespitosæ. Fol. in iunceam tenuitatem convoluta. Panic. ped. latior, & disiecta ex vagina fol. latiusc. Arista quandoque semiped. undique emittens pilos albos, tenuissimos, patulos.
2. iuncea. S. aristis nudis, rectis: calycibus femine longioribus, fol. intus lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Helvetia, Gallia &.*  
 Culm. 3-ped. Panic. longa, ped. angustiss. exiens e fol. convoluto, tamquam ex spatha. Arista non pilosa.  
*Haller. cum sequenti coniungit, a qua tamen certe distincta.*
3. capillata. S. aristis nudis, curvatis; calyc. femine longioribus: fol. intus pubescentib. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Germania, Gallia, Pedemontii vallibus & montibus 24.*  
 Simil. priori, sed fol. non teretia, su'co longitudinali; sed breviora, rigidiora, minus scabra, latere super. magis explanata, & subpubescent. Cal. non albus, sed spadiceus. Aristæ breviores, & adultiores varie curvatæ.
4. Aristella. S. aristis nudis, rectis, calyce vix duplo longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Monspelii 24.*  
 Culm. 2-ped. Fol. angusta. Panic. subspicata, pedunc. 2-3-fl. Cal. longitudine feminis. Sem. teres, raris villis pubescens.
5. tenacissima. S. aristis basi pilosis: panicul. spicata: fol. filiformibus (tenaciss.). *Syst. veg. ed. 14.*  
*Spartum &c. Clus. 2. p. 220.*  
*In Hispania collibus arenosis 24.*  
 Culm. pl. 2-3-ped. erecti, rigidi. Fol. radical. multa, glabra; caulina breviora; vaginæ longæ. Panic. spithama longior, erecta, contracta.
6. avenacea. S. aristis nudis; calycibus semen æquantibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia.*  
 Culmi tenues. Fol. summum ventricosum, lon-

gitudine panicul. Panicula pedunc. coniugatis, 1-fl.

*Gramen hoc Avena sativa minus est.*

7. *membranacea*. S. pedicell. dilatatis membranac. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania, ad cap. b. Spei.*

Culm. lævis. Racemus pedunc. 1-fl. Arista sem. flexuosa, semine paulo longior. Flos penultimus sessilis.

8. *arguens*. S. aristis nudis; bracteis basi barbatis, floscul. sessili-fusculatis. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. Amb. 6. tab. 6. f. 1.*

*In India.*

Culm. 6-7-pedal. ex purpur-fusci. Fl. in fascicul. congesti, ut glumæ vix a bracteis distinguantur. Bract. longiores. Sem. basi hirsuta, aristis terminalibus nigris, contortis.

9. *spicata*. S. fl. spicat. aristis feminudis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Radix repens. Culm. pl. sesquiped. læves. Fol. graminea, lævia, in summo culm. brevia. Spica vix digiti longitudine, angusta. Fl. sessiles, vix pubescent. basi villosi. Arista terminal. vix digitalis, torta, pilosiuscula.

108. AVENA. Cal. 2-glumis, multifl. glumis ventricosis, non aristatis. Arista e dorso cor. articulata, contorta. Germina pappus sericeus sæpe circumdat.

1. *sibirica*. A. paniculata; calyc. 1-fl. seminibus hirsutis; aristis cal. triplo longiorib. *Syst. veg. ed. 14. Festuca &c. Gmel. Sibir. 1. tab. 22.*

*In Sibiria.*

Culm. 1-2-cubital. Fol. fere iuncea, pedal. & ultra, in se quasi convoluta. Panic. dodrant. spicata, sæpe heteromalla, viridis, purpureo-violac. aut versicolor.

2. *elatiior*. A. paniculata; calyc. 2-fl. floscul. hermaphrodito submutico, masculo aristato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 165. Schreb. gram. tab. 1. Leerf. herb. tab. 10. f. 4.*

*Gramen &c. Moris. Hist. 3. f. 8. tab. 7. f. 37. b. f. 38. Scheuchz. gram. tab. 4. f. 7. Mont. gram. tab. 76. Lob. ic. 23.*

*Holcus avenaciuss. Scop. Fl. Carn. All. Fl. Ped. In Europæ montanis, & apricis 24.*

Radix ex tuberibus compressis. Culm. 2-3-pedal.

## TRIANDRIA DIGYNIA.

Fol. etiam subhirsuta. Panicula longa, angusta, multifl. constans ex locustis Avenacearum æmulis. Aristæ incurvæ, purpurascens.

*Ad Holci genus pertinet cum hac definitione =*  
*H. fl. masculo aristato; arista dorsali, tortili, refracta.*

3. *stipiformis*. A. paniculata; calycibus 2-fl. aristis sem. duplo longioribus; culm. ramoso. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ad cap. b. Spei.*

Culm. ped. sæpe reclinati, læves, geniculis fuscis. Ramus brevis, etiam florifer, ex singulis fol. alis. Panic. parva, avenacea.

4. *pensylvanica*. A. panicul. attenuata; calyc. 2-fl. sem. villosis; aristis calyce duplo longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Pennsylvania.*

Fol. pollic. rigida, basi barbata.

5. *loeflingiana*. A. panicula contracta; floscul. binis hirsutis; altero peduncul. apice biaristato; arista intermedia longiore. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Hispania, ad cap. b. Spei.*

Gramen vix digiti longitudine. Culm. pl. ex radice. Fol. planiusc. summum ventricosum, latius. Panicul. crassa. Cal. floscul. longior. Aristæ terminales, setaceæ, longitudine corol. dorsalis duplo longior, torta.

6. *sativa*. A. paniculata, calycibus dispermis; sem. lævibus; altero aristato. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 422. Hall. in nov. comm. Gottin. VI. tab. 4.*  
*b. A. alba.*

*In Insula Ivan Fernandez versus Chilli ☉.*

Caul. 2-pedal. articulatus. Fol. Tritico angustiora. Panicul. varia, semper laxa. Locustæ longæ, peduncul. pendulæ.

7. *nuda*. A. paniculata, cal. 3-fl. receptaculo calyc. excedente; petalis dorso aristatis; tertio flosculo mutico. *Syst. veg. ed. 14. Hall. comm. nov. Gottin. VI. tab. 2. 4. Lob. ic. 32. Morisf. Hist. 3. f. 8. tab. 7. f. 4.*

*Adfinis Sativæ, sed sem. decorticata decidunt.*

8. *fatua*. A. paniculata; calycibus 3-fl. floscul. omnibus aristatis, basiq. pilosis. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 15. Leerf. herb. tab. 9. f. 4.*  
 Gramen &c. *Barr. ic. 75. tab. 5. f. 1. Scheuchz. gram. tab. 5. 7.*

*In Europæ agris montanis inter segetes ☉.*

Culm. 4-pedal. Fol. glabra, retroverſu aſpera.  
Panicul. ampla, palmar. pyramidal. patens;  
matura valde nigras. Locuſtæ flaveſcentes.

9. *ſeſquiter-*  
*ua.* A. paniculata; calyc. ſub 3-fl. floſcul. omnibus  
ariſtatis; receptacul. barbatiſ. *Syſt. veg. ed. 14.*  
Gramen &c. *Scheuchz. gram. tab. 4. f. 17. A. B.*  
*In Helvetiâ, Auriâ, Pedemontii pratis montaniſ.*  
Panicul. oblonga. *Var. A. flaveſcentiſ Hall. Hiſt.*  
*n. 1497.*

10. *pubeſcens.* A. ſubſpicata, calycibus ſub 3-fl. baſi pilofiſ:  
fol. planiſ, pubeſcentibuſ. *Syſt. veg. ed. 14.*  
*Leerſ. herb. tab. 9. f. 2.*  
Gramen &c. *Raii. Angl. 3. tab. 21. f. 2. Scheuchz.*  
*gram. tab. 4. f. 20. Mont. ic. 65.*  
*In Europæ pratiſ 24.*

*Nimiſ adſiniſ A. pratendi, ſed fol. non involuta.*

Culm. 2-3-pedal. erectuſ, geniculiſ 3. purpu-  
raſc. Ligula mucronata, alba. Panicul. 4-6-  
pollic. laxa, molliuſcula, in floreſcentia ſolum  
patenſ. Spicul. maiuſcul. ſpecioliſ, ex viridi-  
albo-purpureoſ ſplendenteſ.

11. *ſteriliſ.* A. paniculata; calyc. 5-fl. exterioribuſ floſcul.  
ariſtiſq. baſi pilofiſ; interioribuſ muticiſ. *Syſt.*  
*veg. ed. 14.*  
*Ægyllopſ &c. Pet. gar. tab. 38. f. 7.*

*In Hiſpania.*

*Similiſ A. fatuæ, ut forte ſola var. ſed triplo*  
*omnibuſ partibuſ ma. Culmi 2-cubital. Fol.*  
*anguiſta. Utriculi longe peduncul. Ariſtæ lon-*  
*giſſ. ſeſquipalmar. ſiccæ, in modum ſpiræ con-*  
*volutæ.*

12. *flaveſcens.* A. panicula laxa; calyc. 3-fl. brevibuſ floſcul.  
omnibuſ ariſtatiſ. *Syſt. veg. ed. 14. Schreb.*  
*gram. tab. 9. Leerſ. herb. tab. 10. f. 5.*  
b. Gramen &c. *Monti. gram. tab. 79. Morif.*  
*Hiſt. 3. f. 8. tab. 7. f. 42.*

*In Europæ pratiſ, & paſcuſ montaniſ 24.*

Culm. 2-3-pedal. vaginiſ ſubvilloſiſ. Fol. gla-  
bra, vel hiriſuta. Panicul. ſemipedal. anguiſta,  
pallide viridiſ, ad deflorationem patula. Spi-  
cul. compreſſæ, molleſ; maturæ diſtichæ,  
nitenteſ.

13. *hiſpida.* A. paniculata; calycibuſ 3-fl. pilofiſ. *Syſt. veg.*  
*ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Speci.*

## TRIANDRIA DIGYNIA.

Fol. graminea, vaginis pilosis. Culm. pedal. erecti, læves. Panic. seu racemus pedicell. indivisus, 3-4. Glumæ pollic. oblong. acumin. erectæ, pilosæ. Cor. subulata. Aristæ tortæ.

14. *capensis*. A. panicul. coarctata; calyc. 3-fl. subulatis; cor. pubescente, arista intermedia tortili, curva. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Radix repens. Fol. graminea, pauciora, lævia, margine scabra. Culm. pedal. lævis. Panicul. quasi spicata, ovat-oblong. purpurasc. Cor. 2-valv. valv. interiore brevi.

15. *purpurea*. A. panicul. coarctata; calyc. 2-fl. ovatis; cor. villosis; gluma exterior 2-fida; arista terminali inflexa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Martinica.*

Gramen parvum, geniculat. glaberrimum. Fol. breviora ut in *Festuca ovina*, cespitosa, setacea, glabra. Panicul. parva. Glumæ calyc. purpur. Fl. omnes aristati, lanugine alba obliti.

16. *lutea*. A. panicul. patente; calyc. 2-fl. subulat. cor. nudis triaristatis; arista intermedia flexuosa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Martinica.*

Habitus, & color Airæ flexuosæ.

17. *lupulina*. A. panicul. ovata, coarctata; calyc. 3-fl. lanceol. cor. villosis, gluma exter. bisubulata; arista intermedia reflexa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Difficillime distinguitur cum sufficienti discrimine ab *A. purpurea*, eisi differens. Hæc maior, vaginis fol. tomentosis, albis. Panicul. huius lutea, nec purpur. arctæ coarctata in fig. conl. *Lupulini*. Fl. longiores; cor. hirsutioribus 2-fid., laciniis subulato-aristat. nec obtusis, ut in *A. purpurea*.

18. *fragilis*. A. spicata; calycibus 4-fl. flosculo longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 24. f. 3.* Culm. pl. spitham. 3-articul. læves, florentes adscendentes. Fol. pollic. plana, nudiusc. margine ciliata, vaginis pilosis. Spica longitud. culmi, disticha: rachis compressa. Fl. adpressi, alterni.

Dignoscitur a spica, quod singulare in *Avena* genere.

19. *pra-*



19. *pratensis*. A. spicata, calycibus 5-floris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lærsk. herb. tab. 9. f. 1.*  
 Gramen &c. *Morif. Hist. 3. f. 8. tab. 7. f. 1.*  
*Vuill. parif. tab. 18. f. 1. Raj. Syn. 3. tab. 21.*  
 f. 1.  
*In Europæ pratis, & pascuis collinis, & montanis 24.*  
 Culm. ped-cubit. & ultra, fere nudus. Radix instar bulbi albidi. Fol. angusta, glabra, retroversu aspera. Panic. 2-unc. & ultra, angusta, purpureo-argentea. Aristæ longæ, nigræ.
20. *spicata*. A. spicata, calyc. 6-fl. longioribus; petalo exter. apice aristato, furcatoq. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Pensylvania.*  
 Gramen angustum. Fol. linearia. Spicul. 3-4. remotæ, erectæ subpedunc. *Facies Festucæ decumbentis.*
21. *bromoides*. A. subspicata; spicul. binatis; altera peduncul. aristis divaricatis, calyc. 8-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Gramen &c. *Scheuchz. gram. tab. 4. f. 21. 22.*  
*In Helvetia, Monspeli.*  
*Habitus Bromi squarrosi, Hallero Var. est A. pratensis.* Culm. 2-pedal. Spicul. erectæ, teretes, veluti argenteæ.
- 
- frigosa*. A. panicul. oblong. secunda, subnutante; floucul. geminis, apice 2-aristat., dorso arista geniculata. *Schreb. spicil.*  
*Inter Avenam sativam, & Hordeum, raro Secali immixta.*  
 Culm. & fol. nuda. Gluma corollina maturo sem. nigra. Sem. mediæ magnitudinis, altero apice barbatum.
- rupestris*. A. *Allion. Fl. Ped. Hall. helv. n. 1478.*  
*In alpium apricis.*  
*Facies lirta, inconcinna.*  
 Fol. angusta, caulina etiam semilin. lata. Locustæ ma. lividæ, arista recurva.
- aurata*. A. *Allion. Fl. Pedem. Hall. helv. n. 1488.*  
*In alpihus.*  
 Pulchra planta. Culmi dodrant. Fol. setacea, tenuissima. Panicula sparsa, erecta, stricta. Locustæ longæ, mucronatæ. Fl. elliptici, aurati, basi villosi. Sem. oblongum, acutum. Planta adulta tota col. aureo.

**A.** diantha, fol. planis, patulis: petiol. floralibus villosis. *Hall. helv. n. 1489.*

*In alpinis.*

**Rad.** reptans, multicaul. Caul. semi-1. ped. ad terram foliosi, superne nudi. Fol. glauca, lineam lata. Panic. angusta, pene spicata, sub 20-fl. e viridi-purpur. & albo varia. Adulta planta dulchica est, tuncque fl. ex argenteo, & violac. varii.

**Scheuchzeri.** **A.** petiolis ramosis; locustis teretibus, 5-fl. basi pubescentibus. *Hall. helv. n. 1500 All. Fl. Ped.*

**Festuca** &c. *Scheuchz. it. 6. tab. 19.*

**Gramen** &c. *Scheuchz. gram. tab. 3.*

*In pascuis editioribus 24.*

**Culm.** suprad. Fol. 2 lineas lata, carinata, glabra. Panicul. longa, angusta, spicata, pedunc. 3-5-fl. Cal. splendens, purpur. apice curvo. Folliculi gluma exterior ex viridi-spaldico-aureo varia, mucronata; interior membranacea, ex aureo, & argenteo col. varia. Arista longa, tortilis, fusca; pedunc. brevibus villosis.

**109. ANTHISTIRIA.** Cal. æqualiter ad basin fissus in lacin. 4. æquales.

**1. ciliata.** **A.** *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In India.*

**imberbis,** **A.** fol. involucriisque nudis. *Retz. Obs. fasc. 3. Ad cap. b. Sprei.*

Omnia teneriora **A. ciliatæ.** Culm. compressus. Cal. simil. priori. Pedunc. solitar. capillar. 2-fl. e vaginis 2. supremis.

**110. LAGURUS.** Calycis glumæ aristatæ, arista villosa. Folliculus biglumis, valvula maiori, terminata duplici arista, cum tertia dorsali retorta, valvula altera minori acuminata. Sem. oblongum, folliculo arcte inclusum, aristatum.

**1. ovatus,** **L.** spica ovata, aristata. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. f. 3. Burr. ic. tab. 116. f. 1. 2. In Italia, Sicilia, Lusitania &c.*

**Culm.** 1. ped. Fol. flexilia, lanugine quadam. vaginis membrana alba. Spica monantha. Arillæ lutescent., aut dilutofus.

**2. cylindricus.** **L.** fol. cylindrica, mutica. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Barr. ic.* 11.

*Montpelii*, in *Creta*, *Smyrnæ*, agro *Nicaensi* 24.

Culm. pl. 2-pedal. recti, simpl. glabri. Fol. radical. longiora, nervo eminente, glabra: caulina internodiis breviora; quo superiora magis vaginantia. Spica dodrant. nuda.

III. ARUNDO. Cal. 2-valv. Flosc. vagi, congesti, lanu-  
cincti. Sem. lanuginoso foliiculo arcte inclusum.

1. *Bambos*. A. calycibus multif. spicis ternis, sessilibus. *Syst.*  
*veg. ed.* 14.

*Ily. H. Mul.* 1. tab. 16.

Altitudo 2-3. hñs. Culm. articulatus. Fol. spitham.  
digitum lata, sensim angustiora, breviter petiol.  
venis in longum striata. Palmæ instar e  
summitate ramos undiq. dispergit. Spicæ fl.  
squamosæ nodulis caulium proveniunt. Panicul.  
laxa, purpurasc. vel nigræ.

Elicuiur Saccharum. Chineses ex hac conficiunt  
Papyrus.

2. *Donax*. A. calyc. plerumq. 3-fl. panicula diffusa: culm.  
fruticoso. *Syst. veg. ed.* 14. *Monti. ic.* 1.

b. *Aruno* &c. *Morif. Hist.* 3. f. 8. tab. 8. f. 9.  
*In Europæ collibus* &c. 24.

Culm. 6-pedal. & ultra, articulatus, durus, fi-  
stulosus. Fol. 2-pedal. vaginantia, lata, su-  
bulata, integerr. patula. Panic. sesquiped. e-  
recta, lanuginosa.

3. *phragmites*. A. calyc. (sub) 3-fl. panicul. laxa. *Syst. veg.*  
*ed.* 14. *Leerf. herb. tab.* 7. f. 1. *Morif. Hist.*  
3. f. 8. tab. 8. f. 2. *Scheuchz. gram. tab.* 3.  
f. 14.

*In Europæ lacubus, fluviiis* 24.

Culm. 6-pedal. simpl. Fol. unc. lata, lineata,  
oris secantibus. Panicul. ped. per ætatem  
nutans. Pappus copiosiss. sericeus.

4. *epigejos*. A. calyc. 1-fl. panicul. erecta: fol. subtus gla-  
bris. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Europæ collibus aridis, subulosis* 24.

Radix geniculata. Culm. cubital. & ultra, simpl.  
ad terram vaginosi. Panicul. 2-unc. subspicata,  
angusta, spadicea. Petal. 1. convolutum, ca-  
lyce longius. Cor. aristatæ. *Hæc spec. est val-*  
*de confusa.*

5. *Calamagro-* A. calycibus 1-fl. lævibus: cor. lanuginos. culm.  
*sis.* ramoso. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 280.

## TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen &c. Scheuchz. *gram. tab. 5. e 3. F. B. C. D.*  
*In Europa paluibus grominosi 24.*

Culm. cespitosi, 2-cubital. Fol. cubital. subulata,  
 lata, oris, nervitque asperis. Panic. pedal.  
 densa, alterne laxior, & contracta.

6. *arenaria*. A. calyc. 1-fl. fol. involutis, mucronato-pun-  
 gentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europa, & Amer. ad maris litora arenosa 24.*

Planta glaberrima. Culm. sesquiped. erectus,  
 geniculat. atro-purpur. Fol. 3-4. pollic. Pa-  
 nicul. 3-pollic. in spicam coarctata, obscure  
 viol.-c.

*farcta*. A. tenuis, altissimeq. scandens. *Aubl. Guian.*  
*Plum. MSS. tab. 92.*

*In Guiana.*

*Plinii*. A. calyc. 1-fl. fol. utrimq. glabris, margine in-  
 trorsum scabris. *Turre. Animad. Bot. Zann.*  
*H fl. tab. 19. f. 2.*

*In Bononia fluvio 24.*

*Non confundenda cum Andropogone Ravenna.*

Altitudo hñ. Calami graciles, viminum instar  
 flexibiles, geniculati, medullesi. Fol. angu-  
 stiora, 2. dodrantas longa, aspera. Panicul.  
 ex spicul. plum.atis, viridi-cœrul.-purpur. varia.

*maxima*. A. fol. margine ciliatis, basi albis, hirsutis ci-  
 liatis, striatis, planis, totis viridibus. *Forsk.*  
*Æg.*

*In Arabia.*

Fol. marginis scabrities ætate evanescit.

*bifaria*. A. culmo erecto, folioso: fol. bifariis: pani-  
 cula coarctata; calycibus 3-fl. *Retz. Obs.*  
*fasc. 4.*

*In India Orient.*

Fol. conferta, spitham. pollicem lata, patentis-  
 sima, plana. Panic. erecta. Cor. gluma ex-  
 terior longa, subaristata, ventricosa, exrus  
 lanata: interior duplo brevior, hyalina, e-  
 marginata. Anth. flavæ. Stigm. barbata, vi-  
 ridi-cœrul.

*Karka*. A. calycibus 1-fl. nudis, flore subulato, intus  
 lanato multo brevioribus: panicula secunda,  
 nutante. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*Habitat in India Orient.*

Culmus altus, priori angustior, inanis. Fol.

longa, digitum tranversum lata, scabra. Panic. 2-spitham. contracta. Pedunc. longi, semiverticill. inæqualiter divisi. Fl. sparsi, longe pedicellati, solitar. subulati.

112. ARISTIDA. Cal. 2-valv. Cor. 1-valv. aristis 3. terminalibus.

1. *adscensionis*. A. panicul. ramosa, spicis sparsis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. Sloan. *Jum. 1. tab. 2. f. 36. Pluk. alm. tab. 191. f. 3 ?*

In *Insula Ascensionis* 24.

Habitu *fluca ovinae*, sed paulo ma. Radix cespitem constituens. Culm. inferne ramosi. Fol. e basi latiore sensim angustata, plano-canaliculata, subulata. Panicul. oblonga.

2. *americana*. A. paniculæ ramis simpliciss. spicis alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

In *America*.

*Differt a priore, quod radii paniculæ sint indivisi: spicul. alternæ et floscul. sessilibus, quorum valvula calycina purpureis.*

3. *plumosa*. A. paniculata; arista intermedia longiore, lanata: culm. villosus. *Syst. veg. ed. 14.*

A. lanata. Forsk. *Æg. monente Vahl.*

In *America*.

Paniculæ aristis lanatis refert *Stipam pinnatam*, sed panic. magis composita, & omnes partes mi. & culm. villosus. Arista sem. itidem lanata, sed ad basin nuda.

4. *arundinacea*. A. paniculata, arista intermedia longiore, lævi. *Syst. veg. ed. 14.*

In *India Orient.*

Facies Graminis communis. Culm. 4-ped. angusti, læves, farchi. Fol. angusta, involuta, striata, lævia. Panicul. oblong. erecta, pedicell. capillaribus. Fl. oblong. canescent. pilis albis immixtis.

5. *gigantea*. A. panicul. elongata, effusa, secunda; calycibus 1-st: aristis corollinis subæqualibus, rectis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In *Teneriffa*.

Gramen altiss. ramosum, glaberrim. Panicul. terminal. dodrantal. non coarctata, ut in A. *adscensionis*; calyc. glaberr. inæqual. cœrulescentes.

6. *Hystrix*. A. panicul. divaricata, patentiss. floscul. simpliciss. glabris; aristis rectis, divaricatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Malabar.*

Gramen repens, stoloniferum, glaberr. Culm. breves, tenaciss. foliati. Fol. graminea, convoluta. Panicul. terminal. magna, pedunculis, pedicellisq. binatis. Flosc. longi, filiform.

- paniculata*. A. spicul. linearibus, oblong. arista cuiusvis flosculi triplici, glabra. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

- setacea*. A. culmo erecto; aristis scabriusculis. *Retz. Obs. fusc. 4.*

*In Malabar.*

Culmi stricti. Panicula contracta. Cor. basi lanata. *Inter utilissima Indorum gramina.*

- depressa*. A. culmis trifido-ramosis, decumbentibus, aristis scabriusculis. *Retz. Obs. fusc. 4.*

*In Malabar.*

Culmi sesquiped. filiform. Fol. angustissima, vix convoluta. Panicula subsecunda. Cal. 1-fl. valvulis albis, dorso viridi. Cor. basi tantum lanata.

*Similis priori: differt culmo; glumarum calycinarum longitudine relativa, & forma. Fl. ut etiam arstæ min. breviores, minus divaricatæ.*

113. *LOLIUM*. Fl. spicati, distichi, locustis multiss. ad flexuosum scapum sessilibus. Fovea nimirum in scapo est loco valvæ calycinæ, atque ex altera parte gluma una, longa, calycina, sive foliolum, in cuius ala sedet spicula. Follicul. quilibet 2-glumis, ex valvis inæqualibus. Sem. nudum.

1. *perenne*. L. spica mutica; spicul. compressis, multiss. (contiguis). *Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 12. f. 1. Schreb. gr. tab. 37.*

b. *Var. aristata. Vaill. tab. 17. f. 3.*

y. *Gramen &c. Scheuchz. gram. tab. 2.*

*Var. spica ramosa.*

*Var. fol. radicalibus, angustis; & spica tota disticha, lata. Scheuchz. gram. tab. 1. f. 7. Moris. Hist. 3. l. 8. tab. 2. f. 2.*

*Var. spicis angustioribus. Mon. ic. 19.*

*Var. spicis teretibus, & longioribus quàm in vulgari.*

*In Europa ad agrorum versurus solo fertili 24.*

Culm. cespitosus, pedalis, facile decumbens. Fol. retroverfu aspera. Spica longius. sæpe pedalis, rara, & interrupta, virid. alba, & subpurpur.

2. *tenuis.* L. spica mutica, lævi; spicul. 3-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Gallia, Germania, & Pedemontio ☉.*

*An var. prioris? Diverfum a Tritico tenello.*

3. *temulentum.* L. annuum, locustis dillicibus. *Hall. helv. n.° 1420.*

L. spica aristata &c. *Syst. veg. 14. Schreb. gram. tab. 36. Fl. Dan. tab. 160. Leerf. herb. tab. 12. f. 2.*

*In Europæ agris inter Hordeum, Linum &c. ☉.*

Culm. cubital. Fol. graminea, glabra. Fl. spicati. Spica pedalis, locustis raris, id. Sem. ovale, utrinq. compressum minus quàm in genuinis Cerealibus. *Var. spicis muticis, sed differt a L. perenni spicul. teretioribus.*

4. *distachion.* L. spica binata; calycibus 1-fl. cor. lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Malabaria.*

Culm. decumbens, basi ramosi; floriferi adscurgent. pedalis, filiform. læves. Fol. graminea. Spicæ terminal. æqual. sessil. lineares, extrorsum secundæ, fl. alternis, albo-hirsutis.

114. **ROTTBOELLA.** Rachis articulata, teretiuscula, in pluribus filiformis. Cal. ovat-lanceol. planus, simpl. seu 2-part. Floscul. alterni in rachi flexuosa.

1. *incurvata.* R. spica tereti, subulata; gluma calyc. subulata, adpressa, 2-part. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ægyptops incurvata. Syst. veg. ed. 13. Bocc. mus. tab. 59.*

*In Europæ maritimis ☉.*

Culm. ramosus. Articuli sub 14. singulo articulo addidet spicula filiform. Cal. 2-valv. exterius. Cor. valvul. calyci contrariæ.

2. *compressa.* R. spica compressa, subulata; gluma calycina lanceol. plana, indivisa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In India.*

3. *dimidiata*. R. spica dimidiata, compressa, lineari; latere exteriori aggregato flosculoso; interiori lævi, nudo. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Panicum dimidiatum. Syst. veg. ed. 13. Burm. Ind. tab. 8. f. 3. Pluk. ph. tol. f. 6.*  
*In India.*  
 Rachis membranacea, dilatata, alternatim ad spiculas dente excisa, ac si folium esset adglutinatum. Spicul. floscul. 3.
4. *exaltata*. R. spica tereti-filiform. undiq. flosculosa, glumis ovatis, obtusis, vaginis punctato-hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In Indiis.*  
 Gramen altum, culmo solido, fæcto. Spicæ solitar. laterales, palmar. & ultra.  
 1. *corymbosa*. R. spicis aggregatis, lateralibus, filiformibus: floscul. bifariis patentibus, fol. basi ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ægilops exaltata. Syst. veg. ed. 13.*  
*In Malabar ad fossas agrorum.*  
 Culm. orgyal. erecti; simpl. striati, glabri, tenaces, geniculati, inanes, fol. 2-3. obsiti. Fol. subped. angusta, lævia. Spicæ subulatæ R. incurvatae similes, longitudine fere digiti, rectæ, angustæ.
- 
- lævis*. R. pedunc. longiss: spica floscul. binatis, lateralibus: calycibus ovatis, impunctatis, lævibus. *Retz. Obs. fasc. 3.*  
*In Tranquebaria.*  
 Culmi adscendent. vaginantes, foliosi. Pedunc. e vagina 3-4. plusquam ped. monostachii. Fol. brev. carinata, oris barbatis. Spica strictiss.
- sanguinea*. R. paniculae spicis aristatis, simplicibus, alternis, pedunculat. fl. bractea laterali ciliata. *Retz. Obs. fasc. 3.*  
*In China.*  
*Facies omnino Andropogonis.* Culm. semiteres, articul. foliosus. Superiores articulos vaginae vestiunt superne dilatatae, & fere cucullatae. E qualibet harum spica exit filiformis, pedunculo intra vaginam latente. Fl. sessil. alterni in rachi excavata. Cal. 2-valv. oblique lateralis, gluma exterior semitereti, subulata,



cartilaginea; interiore æquali, tenuissima, alba, striis sanguineis. Cor. gluma exterior sanguinea; interior ad basin usque fissa. Ad huius basin arista torta.

115. ELYMUS. Fl. dentibus flexuosi scapi insidentes. Locustæ geminæ, multifi.: quælibet spicula duabus non glumis, sed rigidis setis excipitur. Follicul. quilibet 2-valv. valvula exter. aristata; inter. plana.

1. *arenarius*. E. spica erecta, arcta; calycibus tomentosis, flosculo longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Triticum* &c. *Gmel. Sib. 1. tab. 25.*

*Ad Europæ litora* 24.

Culm. sub 2-cubital. Fol. Arundinacea, modice lata, glauca. Spica longa, tomentosa. Spicul. 2. rectæ, 2-fl. muticæ.

2. *sibiricus*. E. spica pendula, arcta; spicul. binatis, cal. longioribus. *Sist. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 21. f. 1.*

*Triticum* &c. *Gmel. Sib. 1. tab. 28.*

*In Sibiria* 24.

Planta glabra, aut hirsuta. Culm. 2 ped. admodum fragiles. Fol. glauca. Spica palmar-femiped. viridis, æmerhyssina, spadice, aut his coloribus variegata. Sem. oblong. fusca.

3. *philadelphicus*. E. spica pendula, patula; spicul. 6-fl. inferioribus ternatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Philadelphia* 24.

Simil. sequenti, sed spica nutans ultra basin; Spicul. & præcipue intermedium latus planum, ut *Triticum*, culmo obvertit. A. aristæ flexuosæ.

4. *canadensis*. E. spica nutante, patula; spicul. inferioribus ternatis; superior. binatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Gramen* &c. *Morif. Hist. 3. f. 8. tab. 10. f. 2.*

*In Canada* 24.

Convenit in pl. cum E. *sibirico*. Differt spicul. villosis, nec nudis; involuc. arista magis subulata; spicis inferne 3. &c.

5. *saninus*. E. spica nutante, arcta; spicul. rectis, involuc. destitutis; infimis geminis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Leerf. herb. tab. 12. f. 4.*

*Triticum* &c. *Gmel. Sib. 1. tab. 27.*

*Gramen* &c. *Morif. Hist. 3. f. 8. tab. 1. f. 2.*

*Buxb. cent. 4. tab. 50.*

*In Europæ dumetis, & sylvis* 24.

*Simil. Tritico repenti, sed radix fibrosa, nec repens vaginosa, ut in illo. Planta viridis, non glauca. Culm. 2-ped. & ultra. Fol. breviter pilosa, retroversu aspera. Spica brevis, 3-unc. rara. Aristæ spica sua multo longiores.*

*Ad Tritici genus spectat.*

6. *tener.* E. spica pendula; flosculis geminis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Sibiria.*

Culm. 2-pedal: lævis, geniculis rubris. Fol. subscabra, vaginis lævis. Spica E. *Sibir.* simil. sed multo tenuior. Involuc. alterna, 4-phyll. flosculis (præter aristam) breviora, subulata, 3-fl. Floscul. sessil. intermedio pedicellato. Aristæ terminal. flosculi fere longiores, sæpe flexuosæ.

7. *virginicus.* E. spica erecta; spicul. 3-fl: involuc. striato. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia 24.*

Spica 9. pollic. longa. Involuc. 4-phyll. Aristæ spicula longiores.

8. *europæus.* E. spica erecta; spicul. 2-fl. involucre æqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Gramen &c. Scheuchz. prodr. tab. 1. f. 1. Hall. app. ad Scheuchz. agrost. tab. 1.*

*In Germaniæ, Helvetiæ &c. Sylvis 24.*

*Ad Hordei genus spectat.*

9. *caput medusæ.* E. spicul. 2-fl: involuc. setac. patentiss. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gr. tab. 23. f. 2.*

*In Lusitan. & Hispan. maritimis.*

Culm. ped. spica oblong. *Videtur novum genus posse constitui.*

10. *Hystrix.* E. spica erecta; spicul. involucre destitutis, patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Altitudo humana. Spica longissima, constans ex spiculis 2. Spicul. 4-fl. aristis longis.

- subulatus.* E. spicul. uniflor. distichis, alternis, adpressis, spicam subulatam formantibus. *Forak. Æg.*

*In Ægypto.*

Cal. corolla maior, unilateralis.

116. SECALE. Cal. oppositus, 2-valv. 2-fl. solitarius.

1. *cereale.* S. glumarum ciliis scabris. *Syst. veg. ed. 14.*

S. hybernum. *Black. tab. 424.*

*In Creta ☉.*

Cerealium nostrarum altissimum. Fol. retroverfu aspera. Spica Tritico longior, & compressior; conferta, subdivisa. Glumæ inferior. arista longissima. *Var. spicis ramosis.*

2. *villosum*. S. glumarum ciliis villosis; squamis calycinis cuneiformibus. *Syst. veg. ed. 14.*

b. Gramen &c. *Buxb. cent. 3. tab. 41.*

*In Europa australi, & in Oriente.*

Glumæ villosæ in aristas longiss. desinentes.

3. *orientale*. S. glumis hirsutis; squamis calycinis subulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad Arcipelagum.*

Spica brevis, & lata.

4. *creticum*. S. glumis extrosum ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Creta.*

Cum. 2 cubital. Fol. linearia, vaginis hirsutis.

Spica 3-unc. usque palm.r. 3-4. lineas lata.

Locustæ 5-6. lineares.

117. HOR-  
DEUM. Scapus alterre flexuosus, & scrobibus excisus.

Locusta 3 fl. sive ex tribus distinctis fl. compo-

sita. Cal. comm. 6. angustis foliol. constar,

duobus nempe glumarum instar singulo folli-

culo subiectis, & aristis. Follicul. 2-valv.

valvula exteriore ventricosa, in aristam lon-

gam delinente; interiore plana. Sem. folli-

culo arcte involutum.

1. *vulgare*. H. floscul. omnibus hermaphrodit. aristatis: ordinibus duobus erectioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Black. tab. 423.*

H. polystichon. *Hall. in nov. Comm. Gottin. VI.*

*tab. 2. Moris. Hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 3.*

b. H. caeleste. Sem. decorticatum.

*In Sicilia, & Russia ☉.*

Fol. Tritico angustiora. Spica quasi disticha, et si

plurium ordinum, ad basin turgida, aristis

longis asperis.

2. *hexastichon*. H. floscul. omnibus hermaphroditis, aristatis: feminibus 6-fariam æqualiter positus. *Syst. veg. ed. 14.*

Spica crassior, & torosior.

3. *distichon*. H. floscul. lateralibus masculis, muticis: femin. imbricatis, angularibus. *Syst. veg. ed. 14. Moris.*

*Hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 1. Lob. ic. 29.*

b. H. nudum. Sem. decorticata.

*Ad Samaram Tartariæ fluvium ☉.*

Culm. plerumq. sesquicubir. Spica disliche imbricata, compressiusc. aristis longis, & asperis.

4. *Zeocriton*. H. floscul. lateralibus masculis muticis: femin. angularibus patentibus, corticatis. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 17.*

H. dictum *Oryza germanica*. *Bauh. Hist. 2. p. 429. cum ic. bona.*

Culm. priore brevior. Spica brevior, & latior, granis magis confertis; aristis nonnihil brevioribus.

5. *bulbosum*. H. floscul. omnibus ternis, fertilibus aristatis; involucris setaceis, ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Gramen &c. Barr. ic. 112. f. 2. Moris. Hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 7.*

*In Italia, Oriente &c.*

Radix bulbosa, globosa. Culm. 3-pedal. vagina summi fol. ventricosa. Spica H. *murini*.

6. *nodosum*. H. floscul. lateralibus mascul. muticis; involuc. setaceis, lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Gramen &c. Raii Sinop. Stirp. Brit. tab. 20. f. 2.*

*In India, Anglia.*

Radix bulbosa, copiosa. Fol. angusta, glabra. Spica uncial. gracilis.

7. *murinum*. H. floscul. lateralibus, mascul. aristatis; involuc. intermediis ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 629.*

*Gramen &c. Moris. Hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 4.*

*In Europæ locis siccis ad vias, & limites agrorum ☉.*

Culm. ped-cubital. Spica ovata, crassa, polyslich, aristis longis.

8. *iubatum*. H. aristis, involucrisq. setaceis, longiss. *Syst. veg. ed. 14.*

*Elymus crinitus. Schreb. gram. tab. 24. f. 1.*

*Gramen &c. Buxb. cent. 1. tab. 52. f. 1.*

*Smyrnæ.*

*Habitus H. murini, sed involucria, & aristæ setaceæ quadruplo longiores quam tota spica; unde singularis facies Graminis.*

- secalinum*. H. floscul. lateralibus, masculis, aristatis; involuc. setaceis, scabris. *Schreb. spicil. Fl. Lipsiens. All. Fl. Ped.*

H. *murinum*. *Lin. b.*

*In locis siccis ☉.*

Alius, duplo angustius, & magis fuscum *H. murino*. Fol. mollia, pilosa. Spica min. & tenerior quam in *H. murino*. Involuc. min. nullibi ciliata. *Var. spica amœne purpur.*

*geniculatum*. *H. culmo decumbente*, fol. obtecto; summo spathaceo spicæ subiecto, supremo nodo incurvato. *All. Fl. Ped. tab. 91. f. 3.*

Gramen &c. *Pluk. phyt. tab. 33. f. 2.*

*Ad litora maris* ☉.

*Non est H. iubatam*. Culm. pl. palmar. nodosi. Fol. molliter pubescentia; radical. linearia; caulina culmum involvunt usque ad nodum, inde larescunt gradatim; ut ovato-lanceol. sunt. Spica subunc. subovata, obscure disticha. Pedunc. 3-fl. oppositè nascuntur. Sem. oblong. fuscum, intus sulcatum. *Planta culta tota maior evadit.*

118. TRITICUM. Cal. 2-valv. solitar. sub 3-fl. Flos obtusiusc. acutus. Scapus alterne flexuosus, & scrobibus excisus. *Solus suis spicularum distinguit Triticum a Bromis.*

\* *Annuu.*

1. *aristatum*. T. calyc. 4-fl. ventricosus, glabris, imbricatis, aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Nov. com. Gottin. V. tab. 1. f. 1. Black. tab. 40. f. 4. 3.*

*Apud Bafchiros in campis* ☉.

*Fl. juveniles sæpe subhirsuti corpusculo terminantur, quale Melicæ est pro charactere.*

Culm. 3-ped. cespitosus. Fol. glabra, 3. lineas lata. Spica densa, ponderosa, aliquot unc. locustis imbricatis.

2. *muticum*. T. calycibus 4-fl. ventricosus, lævibus, imbricatis, submuticis. *Syst. veg. ed. 14. Nov. comm. Gottin. V. tab. 1. f. 2. Blak. tab. 40. f. 1. 2. 3.*

♂.

Culm. cespitosus, 3-pedal. geniculati. Fol. glabra. Spica densa, ponderosa, imberb. locustis imbricatis. Sem. congenerum maximum, villosum.

3. *compositum*. T. spicula composita; spicul. confertis, aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Moris. Hist. 3. f. 8. tab. 1. f. 7.*

*In Ægypto. Scritur Neapoli.*

Simil. T. *aristato*, sed spica palma. quadruplo ma.

ex spicul. bitariis, alternis, adproximatis, 9-12. summa solitaria.

4. *turgidum*. T. calyc. 4-fl. ventricos. villosis, imbricatis, obtulis. *Syst. veg. ed. 14. Nov. comm. Götting. V. tab. 1. Moris. Hist. 3. f. 8. tab. 1. f. 14.*

♂.

Var. *calycibus aristatis, & muticis*. Maius, & elatius T. *mutico*. Spicæ ina. cineræ, aristis longis. Glumæ cineræ, hirsutæ.

5. *polonicum*. T. calyc. 6-floris, nudis, floscul. longiss. aristatis; racheos dentibus barbatis. *Syst. veg. ed. 14. Nov. comm. Götting. V. tab. 1. 16. Pluk. phyt. 231. f. 6. Moris. Hist. 3. f. 8. tab. 1. f. 8.* Simil. prioribus sed spica maior, cinerea: glumæ duplo longiores, bifloræ &c.

6. *spelta*. T. calyc. 4-fl. truncatis; floscul. aristat. hermaphroditis; intermedio neutro. *Syst. veg. ed. 14. Zea &c. Moris. Hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 1. 3.*

♂.

Flores magis conici; & semen villo tectum, magis quam T. vulg.

7. *monococcum*. T. calyc. sub 3-fl. primo aristato, intermedio sterili. *Syst. veg. ed. 14. Nov. comm. Götting. V. tab. 1. f. 17.*

*Zea &c. Moris. Hist. 3. f. 8. tab. 6. f. 2.*

*Briza. Lob. ic. 31.*

⊙.

*Culm. & spicæ breviores, & angustiores, ac depressæ quam in priore. Spica disticha, longa. Aristæ subasperæ. Sem. min. Secale corniculatum Halleri ob morbum, cui subiacet.*

8. *prostratum*. T. calyc. multifi. spica ovata, disticha; floscul. imbricatis, aristato-mucronatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

*Secale prostratum Pallas. It. Vol. I. Jacq. Hort. 3. tab. 44.*

*In Dauuria.*

*Culm. pl. subped. procumbent. simpl. geniculati. Fol. sublinear. acuta, integerrima, læviter pubescentia: caulina longe vaginantia: summa latiora. Spica ovata-subrot. dense disticha, compresso-plana: spicul. lanceol. imbricatæ. Matura spica integra cadit, & germinat tot caulibus quot spiculæ. Ipsa spica radice vices gerit.*

9. *pumilum*. T. spica ovata, glumis subaristat. calycinis bifurcatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In Sibiria.*  
 Gramen digiti longitudine; vagina suprema ventricola. Spica dura, compressa.  
 \*\* *Perennia.*
10. *iunceum*. T. calycibus 3-fl. truncatis: fol. involutis.  
*Syst. veg. ed. 14.*  
 Gramen &c. *Bauh. Prod. tab. 17. Morif. Hist. 3. f. 8. tab. 1. f. 5.*  
*In Europa australi, Oriente, ad vias, & loca sicca 24.*  
 Gramen glaberrimum. Radix geniculata, longa. Culm. cum tota planta glaucus, 3-ped. & ultra. Vaginæ fol. tomentosæ. Fol. angustiss. supra glauca. Spicul. culmo adpressæ; calycibus, corollisq. aristatis, aur muticis.
11. *repens*. T. calyc. 4-fl. subulatis, acuminat. fol. planis.  
*Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. 743. Leerf. herb. tab. 12. f. 3. Schreb. gram. tab. 26.*  
 Gramen &c. *Morif. Hist. 3. f. 8. tab. 1. f. 8. Monti. ic. 25.*  
 b. Gramen &c. *Vaill. paris. tab. 17. f. 2.*  
*In Europæ cultis 24.*  
 Radix longe repens, flavescent. Culm. spitham. sesquiped. erecti. Fol. vaginant. angusta, acumin. obscure virid. subtus nervo albicante; ligula minima, alba. Spica lanceol-obtusa, contracta, compressa, disticha, 4-pollic.
12. *maritimum*. T. spica ramosa; calyc. 6-fl. floscul. secundis, apice aristatis.  
 T. calycibus &c. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Gramen &c. *Pluk. ph. t. 32, f. 7. Bocc. mus. 2. tab. 95. Morif. Hist. 3. f. 8. tab. 2. f. 6.*  
*In Galliæ, Angliæ maritimis.*  
 Culm. spitham. Fol. longitudine culmi, vaginis purpurasc. Spica fere paniculata, ramis angulatis.
13. *tenellum*. T. calyc. sub 4-fl. floscul. acutis, muticis: fol. setaceis. *Syst. veg. ed. 14.*  
 Gramen &c. *Morif. Hist. 3. f. 8. tab. 2. f. 3.*  
*In Helvetia, Pedemontio, ad pascua declivia ☉.*  
 Culm. spitham. filiform. tener. Fol. involuta, Fl. omnino spicati. Spica tenuissima.

14. *unilaterale*. T. calyc. unilateralibus, alternis, muticis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Pluk. phyt. 32. f. 7. Bocc. mus. 2. tab. 57.*

*In maritimis Italia, Gallia* ☉.

Culm. fœsqui-2 ped. Fol. angusta. Fl. facie Poæ, in spica unilaterali, 2-unc.

*bicorne*.

T. calyc. striatis, bicornibus, 3-fl. floscul. lateralibus, fertilibus, aristatis; medio sterili. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

*Triticum læviss. glaucum, locustis 4-fl. duobus fl. aristatis, 2. mucronatis. Hall. Hist. n.º 1423. Colitur in Thuringia, & Helvetia.*

Spica irregular. non disticha, longiss. Granum maximum, dimidio vulg. Tritici semine longius.

## TRIGYNIA.

119. *ERIO-CAULON*. **C**al. communis, capitulum imbricatum. Petal. 3. æqualia. Stam. supra germen.

1. *triangulare*. E. culm. triangul. fol. ensiformibus: capitulo ovato. *Syst. veg. ed. 14.*

*Plantaginella &c. Brevn. cent. tab. 50. Moris. Hist. 3. f. 8. tab. 16. f. 17.*

*In Brasilia.*

Cauliculi pl. 3-unc. Fol. in orbem posita, parva, angusta, glabra. Capitul. lanuginosum, col. leucoph. Flosc. flavi.

2. *quinqueangulare*. E. culm. 5-angul. fol. ensiformibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Scabiosa &c. Pluk. alm. tab. 221. f. 7.*

*In India* 24.

Non confundatur cum E. *decemangul.* Caul. nudus. Capitul. argentea. Cal. comm. 5-pyll.

3. *sexangulare*. F. culm. sexangul. fol. ensiformibus. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 9. f. 4.*

*In India* 24.

Caul. ped. Fol. latiora. Capitul. rotundum, tomen-



TRIANDRIA TRIGYNIA. 241

tomentosum. Foliola capitulum, loco calyc. universalis, cingentia, orbiculata sunt, nec angusta, ut in priore.

4. *setaceum*. E. culm. sexangul. fol. setaceis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Randalia &c. Petiv. gaz. tab. 33. f. 10. H. Mal.*  
*12. tab. 63.*

*In India.*

Radices in aquis dispersæ sunt. Vagina membranac. instar spathæ, ad basin culmum includit.

5. *decangulare*. E. culm. decangul. fol. ensiformibus. *Syst. veg.*  
*ed. 14. Pluk. amalt. tab. 409. f. 5.*  
*Randalia &c. Petiv. gaz. tab. 6. f. 2.*

*In Amer. septent. paludibus.*

Fol. 2. humifusa, subulata, canalicul. articulata. Capitul. parva, globosa, albicantia. Petala puncto nigra intra apicem.

120. MON- Cal. 2-3. phyll. Cor. 1-petal. irregular. parva,  
 TIA. 5-part. laciniis 3. alternis minoribus. Caps.  
 1-locul. 3-valv.

1. *fontana*. M. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 131. Mich.*  
*gen. tab. 13. f. 2.*

*Alfineformis &c. Pluk. alm. tab. 7. f. 5.*

*Alfine &c. Pet. herb. tab. 10. f. 12.*

*b. Montia &c. Mich. gen. tab. 13. f. 1.*

*Alfinoides &c. Vaill. parif. tab. 3. f. 4.*

*Ad Europæ scaturigines ☉.*

Caul. procumb. ramosus, articulatus, in pratis riguis semiped. in glareosis subunc. Fol. petiolat. ovata, vel oblonga, aut obverse-ovata. Fl. racemosi, penduli, exigui, albi, raro sese aperientes.

121. PROSER- Cal. 3-part, superus. Cor. o. Sem. 1. tri-  
 PINACA. locul.

1. *palustris*. P. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia paludibus.*

122. TRIPLARIS. Cal. maximus, 3-part. Cor. o. Antheræ lineares. Nux triquetra, intra calyc. basin ovatam—Cal. in fructu non patet, sed semen arcte ambit, & includit, dein in tria foliol. longiss. & erectiusc. abit: potius ergo calyx foliaceus, longiss. dicendus.

1. *americana*. T. spicis erectis, terminalibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Jacq. Am. tab. 173. f. 3. Aubl. Guian. tab. 347.*  
*In Amer. meridionali h.*

*Tom. 1.*

Q

Arb. altudin. hñæ. Coma e paucis ramis horizontalibus in pyramidem efformata. Fol. spitham. ovata, acumin. integra, petiolat. Spicæ pilosæ, bracteis ovatis, acuminat. parvis, pilosis. Cal. fuscus. Nux nitidissima.

*Ad Diœciam dodecandram spectat. Aubl. Ad Triandrium trigyntum. Jacq.*

2. *ramiflora*, T. racemis lateralibus, adgregatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Amer. ed. 2. picta tab. 259. f. 3. quoad fructum.*

*In Amer. meridion. h.*

Arbor ramola, diffusa. Fol. ovata, vel subrotundo-ovata. Racemi densi, subpollic. multifi. villosi. Nux fusca.

123. *HOLOSTEUM*. Cal. 5-phyll. Pet. 5. æqualia, emarcida. Caps. subcylindrac. 1-locul. apice dehiscens, polysper.

1. *cordatum*, H. fol. subcordatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Alfene &c. Herm. parad. tab. 11.*

*In Jamaica, Surinama.*

Caul. decumbent. repent. inferne rigiduli. Fol. opposita, subsessil. orbiculato-cordata, lævia. Stipul. utrimq. 4. membranac. Pedunc. lateral. elongati, adscendent. 7-fl. primo intermedio, reliquis utrimq. 3. e pedunc. ulterius ramoso. Cal. oblong. acutus, concavus. Petal. erecta, lanceol. calyc. min. alba.

2. *succulentum*. H. fol. elliptic. carnosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Noveboraco.*

Caul. repens. Fol. integra, glabra, succulenta. Pet. subtrifida, calyce min. alba.

3. *hirsutum*, H. fol. orbiculatis, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Molabaria.*

4. *umbellatum*. H. fl. umbellatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnis &c. Moris. 3. f. 5. tab. 22. f. 46.*

*In Europæ australis arvis ☉.*

Caul. suberect. usque spithamæus, ad radicem ramulosus. Fol. radical. multa; caulina basi connata, omnia glauca; ima ovata, dein amplexicaul. ovato-lanceol. super. elliptica. Bract. subumbellatæ, Fl. 4-8. Petal. fere conniventia, extus subrubra, intus alba.

124. *KÆNIGIA*. Cal. 3 phyll. Cor. 0. Sem. 1. ovatum, nudum.

1. *islandica*, K. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 418.*

*In Islandia.*

Facies Polycarpi. Caul. digital. succulentus, ramis pauciss. oppositifoliis, patentiss. Fol. alterna, subpetiol. obovata, obtusa, integerr. subfucculenta, longitudine internodiorum caulis. Stipul. solitar. vaginal. (more Persicariæ) intrafoliac. campanul. persistentes. Fol. terminalia, quaterna. Fl. terminal. plurimi, subfasciculati, subpeduncul. bracteis membranaceis distincti. *Variat flaminibus 2-3.*

125. POLYCARPON. Cal. 3-5-phyll. Petala 5. minima, persistentia, ovata (emarginata). Caps. 1-locul. 3-valv.

1. *tetraphyllum*. P. caul. prostrato, ramoso: fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 259. f. 1.*

*Anthyllis &c. Barr. rar. tab. 534.*

*In Italia, Gallia &c. ☉.*

Caul. semipalm. glaber. Fol. elliptica, obtusa, integerr. bina in caule, ad originem ramorum quaterna. Floscul. albi.

2. *magellanicum*. P. caulibus simpliciss. fol. sparsis, imbricat. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Donatia fascicularis. Forst. Gen. tab. 5.*

*In terra del Fuego.*

Planta digital. simpl. recta fol. glaberrimis.

126. MOLLUGO. Cal. 5-phyll. Cor. 0. Caps. 3 locul. 3-valv.

1. *oppositifolia*. M. fol. oppositis, lanceol. ramis alternis; pedunc. lateralibus, confertis, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*Alfine &c. Pluk. alm. tab. 75. f. 6.*

*In Zeylona.*

Fol. petiol. glabra. Rami longi, diffusi, glabri.

2. *strida*. M. fol. subquaternis, lanceol. fl. paniculat. nutantibus: caul. angulato. *Syst. veg. ed. 14.*

*Alfine &c. Pluk. phyt. tab. 256. f. 2. Burm. Zeyl. tab. 5. f. 3.*

*In Africa ☉.*

Radix fibrosa. Caul. 3-4-palmar. dichotomi, laeves, erecti; vel interdum diffusi, ramis erectis, divaricatis. Fol. verticillata, inæqual. 2. plerumq. ma. sessil. unguicul. stricta, acuminata. Panic. axill. fol. longiores, primo; secundoq. dichotomæ, dein racemosæ. Pedunc. & pedicel. capillar. Fl. nutantes, albi, similes *M. verticillata*.

3. *pentaphylla*. M. fol. quinis, obovat. æqualibus fl. paniculat. *Syst. veg. ed. 14.*

Fol. opposita, subulata, pubescent. basi connata, longitudine ramorum. Fl. glomeres laterales, sessil. inter fol. longiora.

128. **QUE-RIA.** Cal. 5-phyll. Cor. o. Caps. 1-locul. 3-valv. Sem. 1. Similis Minuartiæ, sed differt sem. numero.

1. *hispanica*. Q. fl. confertis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Hispania* ☉.

Planta unguem vix excedens. Capitulum fl. obsoletius tetragonum, facillime a caule discedens. Bract. erect., setaceæ, hamatæ. Color plantæ albidus. *Habitus Minuartiæ montanæ.*

2. *canadensis*. Q. fl. solitar: caule dichotomo. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Canada, Virginia* ☿.

Rad. fibrosa. Caul. spitham. erectus, filifor. Fol. opposita, lanceol-ovata, integerr. adspersa utrimq. punctis fuscis. Stipul. 2. membranac. Fl. parvi, virid: ex singula dichotomia.

129. **LECHEA.** Cal. 3-phyll. Peral. 3. linearia. Caps. 3-locul. 3-valv. valvul. totidem interioribus. Sem. 1.

1. *minor*. L. fol. lineari-lanceol. fl. paniculatis. *Syst. veg. ed. 14. Amæn. Acad. 3. tab. 1. f. 4.*

*In Canadæ Sylvis glareosis* ☿.

Caul. erectus, vix semiped. teres, simpl. superne paniculat. Fol. sparsa, breviter petiol. erecta, acuta, integerr. supra glabra, nitida, subtus subpubescent. margine reflexo. Panic. pedunculata. Ad radicem rami oppositi, vel terni. Fol. sæpe quaterna, ovata.

2. *maior*. L. fol. ovat-lanceolat. fl. lateralibus, vagis. *Syst. veg. ed. 14. Amæn. Acad. 3. tab. 1. f. 4.*

*In Canadæ aridis*.

Caul. teretes, purpurasc. Rami simpl. alterni, remoti. Fol. alterna, subpetiol. supra scabra, subtus tomentosa, margine reflexo. *Stam. 4. horum 2. super. adproximata.*

## NOVA GENERA

## MONOGYNIA.

## VOUAPA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. subrotun. concavum, 4-dent: bract. 2. oppositæ, oblong. latæ, ad basin calyc.

*Cor.* Petal. 1. erectum, expansum, unguicul. margine super. undulato, calyc. fundo insertum.

*Stam.* Filam. 3. calyc. inserta, peralo opposita. Anth. exiguæ, 2-locul.

*Pistil.* Germ. subrotun. pedicell. Styl. longus. Stigma obtusum.

*Peric.* Legum. coriaceum, oblong. obtusum, latum, 1-locul. 2-valv.

*Sem.* 1. amplum, subrotud. compressum.

*bifolia.*

*V. Aubl. Guian. tab. 7.*

*In Caienna, & Guiana h.*

*Arb.* 60-ped. superne ramosiss. ramis, & ramulis sparsis. Fol. alterna, pinnata. Foliol. 2. eidem petiol. adnexa, ovat-obl. acuta, uno latere latiora, integer. glabra. Stipul. 2. minimæ, deciduæ, ad basin petiol. comm. Fl. axill-terminal. corymbosi, violac. Legum. sublateum.

*Simira.*

*V. Aubl. Guian. tab. 8.*

*In Caribæis h.*

*Arb.* 80-ped. crassissim. superne ramosiss. ramis, & ramul. sparsis. Lignum violaceum. Fol. alterna; foliol. 2. petiolat. & eidem petiol. adnexa, integerr. Stipul. 2. oblong. deciduæ, ad basin petiol. comm. Fl. axill-terminal. racemosi. Legum. crassum, ferrugineum.

## OUTEA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dent. involuc. 2-phyll. cinctum.

*Cor.* Per. 5. super. erect. oblong. obtusum, undulatum, magnum: 4. infer. parva, subrot. patula, calyc. fauci inserta.

# TRIANDRIA TRIGYNIA.

247

*Stam.* Filam. 4. unum sterile, breve, sub petal. infer. ipsius bali suppositum: 3. longiss. tenuia, calyci sub petal. min. inserta. Anth. oblong. 4-gonæ, 2-locul. nutantes.

*Pist.* Germ. oblong. ovat. petiolo longo, e fundo calyc. emergente, sublentatum. Styl. longus. Stigm. subrotund. concavum.

*Peric.* . . . . .

*Sem.* . . . . .

*Guianensis.* O. *Aubl. Guian. tab. 9.*

*In Guiana h.*

Arb. 50-ped. superne ramosiss. ramis super. erectis; infer. reflexis. Fol. alterna, pinnata: foliol. opposita, biugata, ovata: stipulæ 2 parvæ, acutæ, deciduæ, ad basin petioli. Fl. axillar. spicati, bracteati. Petal. violac.

## TONTALEA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. 5-dentat. laciniis acutis.

*Pet.* 5. ovata, disco uiceol. ad basin inserta.

*Stam.* Filam. 3. extus reflexa, disci parieti interno inserta. Anth. subrot. 2-locul.

*Pist.* Germ. subrot. disco circumdatum. Styl. oblong. Stigma obtusum.

*Peric.* Bacca sphaerica, 1-locul.

*Sem.* 4.

*scandens.* T. *Aubl. Guian. tab. 10.*

*In Sylvis Sinemariensibus.*

Caul. sarmentosi, scandentes, longiss. ramosi.

Fol. opposita, subsessil. ovat-obl. acuta, integerr. glabra. Fl. axill. & terminal. racemosi, pedunc. oppositis, ad basin squamatis.

Cor. parva, viridis.

## XIPHIDIUM.

*Cal.* nullus.

*Cor.* Pet. 6. tria exter. ovata, acuta; 3. inter. min. tenuiora.

*Stam.* Filam. 3. receptac. germin. inserta. Anth. oblong. sulcatæ, 2-locul.

*Pist.* Germ. subrot. trifidum. Styl. longus, triangul. Stigma crassiusc. trigonum.

Q iv

## TRIANDRIA TRIGYNIA.

*Peric.* Caps. ovata, trifurcata, hirsuta, 3-locul.

*Sem.* numerosa, subrot. nigra.

1. *cœruleum*. X. fl. paniculat. fol. & fl. pilosis. *Aubl. Guian. tab. 11.*

*In Guiana 24.*

*Radix* obliqua, geniculata, fibrosa. *Caul.* ped. & ultra, simpl: cylindric, hirsutus. *Fol.* remota, alterna, amplexicaul. longa, acuta, plana, striata, serrulata. *Fl.* terminal. paniculati. *Pet.* 3. exter. inferne viridia, superne cœrul. 3. inter. cœrul.

## CIPURA.

*Cal.* Perian. spatha membranac. oblong. acuta, concava, fl. involvens.

*Cor.* *Pet.* 6: tria exter. erecta, ovata; inter. minima, concava; omnia basi in tubulum connata.

*Stam.* *Filam.* 3. breviss. tubo cor. inserta. *Anth.* oblong. 2-locul.

*Pistil.* *Germ.* inferum. *Styl.* crassus, 3-gonus. *Stigm.* 3-lob. lobis evat. acutis.

*Peric.* Caps. oblong. angulata, 3-locul.

*Sem.* plura, angulata.

*paludosa.*

*C. Aubl. Guian. tab. 13.*

*In pratis humidis Guiana 24.*

*Rad.* tuberosa, orbiculata, tunicata. *Fol.* radical. sæpe 4. ped. & ultra, angusta, acuminata, striata. *Scap.* semiped. subnudus, rigidus, superne 2. fol. longis, & aliis minoribus terminatus. *Intra hæc folia fl. pl.* peduncul. *Cor.* alba, vel cœrul.

## MAYACA.

*Cal.* Perian. 3-phyll. fol. oblong. acutis, persistentibus.

*Cor.* *Pet.* 3. subrot. concava, receptaculo pistilli inserta.

*Stam.* *Filam.* 3. *Anth.* oblong. 2-locul.

*Pistil.* *Germ.* subrotund. *Styl.* oblong. *Stigma* 3-fid.

*Peric.* Caps. subglobosa, stylo coronata, 1-loc. 3-valv.

# TRIANDRIA TRIGYNIA.

249

*Sem.* 6. ovata, striata, nigra: duo singulæ valvæ placentæ adfixa; superne unum, inferne alterum.

*fluvialis.* *M. Aubl. Guian. tab. 15.*

*In Guiana.*

*Herba:* ramulis decumbentibus, musco similibus;  
*Fol.* capillacea, crebra, minuta, acuta. *Fl.*  
axill. solitar. peduncul. albi.

## REMIREA.

*Cal.* Glum. 2-valv. valvul. acutis, concavis, altera min.

*Cor.* 2-valv. calyce min. valvul. tenuioribus, oblong. acutis, concavis, inæqualibus,

*Stam.* Filam. 3. longiss. receptac. germinis inserta, & ipsi opposita. *Anth.* oblong. acutæ, 2-locul.

*Pistil.* Germ. oblong. 3-gonum. *Styl.* longus. *Stigm.* 3. filiform. acuta.

*Peric.* Cor. sem. obvestiens.

*Sem.* 1. 3-gonum, cor. inclusum.

*maritima.* *R. Aubl. Guian. tab. 16.*

*In arenosis Caiennæ, & Guianæ 24.*

*Rad.* longa, nodosa, aromatica. *Culm.* semiped. apice ramosi, inferne squamis caulem amplexantibus. *Fol.* ramorum oblong. angusta, acuta, striata, rigida, margine aspero, basi vaginante. *Fl.* panicula terminal. brevis, subsessil. densa.

## MAPANIA.

*Involuc.* 1-phyll. trifoliatum, foliol. ampliss. ovat. acut. glabris, integerr. striatis, nervis longitudinalibus.

*Cal.* Perian. 6-phyll. fol. oblong. ovat. acutis, dentatis, concavis, imbricatis.

*Cor.* nulla.

*Stam.* Filam. 3. receptaculo germinis inserta. *Anth.* oblong. 4-gon. 2-locul.

*Pist.* Germ. ovatum. *Styl.* longus. *Stigm.* 3. filiform.

*Peric.* . . . . .  
*Sem.* . . . . .



*Sylvatica.**M. Aubl. Guian. tab. 17.**In Guiana 24.*

Radix lignosa. Scap. pl. 2-ped. triangul. ad basin squamulis, seu foliol. oblong. acutis, imbricat. rufescentibus præditi. Fl. terminal. numerosi, congesti, sessil. in fundo involuc. amplissimi.

## DIGYNIA.

## TRISETARIA.

*Cal.* **G**Luma 2-valv. 2-flora, valvul. lineari-acuminat. muticis, glabris, cor. longioribus, altera brevior.

*Cor.* 2-valv. lineari-acuta; valvul. interior planiusc. hyalina, brevior, mutica: exter. convexo-compressa, margine membranac. arista ex apice 2-part. duplo longiore: alia ex dorso intra apicem simpl. triplo longiore.

*Stam.* Filam. 3. filiform. Anth. incumbentes.

*Pist.* Germ. parvum. Styli 2. nudi. Stigm. simplicia.

*Peric.* nullum.

*Sem.* 1.

*Forskal.*

*T. Forsk. Æg.*

*In Ægypto ☉.*

Culm. erect. pedal. basi ramosus, teres. Fol. 3-pollic. linear. plana, villosa, sicuti vaginæ.

Panic. spitham. contracta.

## VIEUSSEUXIA.

*Cal.* spath. 2-valv. fl. distinguentes, persistentes.

*Cor.* 6-pet. Petal. 3. exter. patentia, ovata, unguibus latiuscul. erectis, basi semicylindricis.

Petal. 3. inter. multo min. patentiusc.

*Stam.* Filam. 3. basi coalita in cylindrum, stylum includentem. Anth. oblong.

*Pist.* Germ. inferum, clavatum. Styl. simpl. longitudine filamen. Stigm. 3-part. lacin. petaloid. erectis, apicibus 2-fid. inflexis.

# TRIANDRIA DIGYNIA.

251

*Peric.* Capf. oblong. triquetra, 3-locul. 3-valv. Sem.

*spiralis.*

V. fol. radicali unico, caulis longitudine. *De la Roche nov. pl. tab. 5.*

Bulbus subcylindric. incurvus. Scap. rectus, ped. divisus, articulatus. Fol. radicale ensiforme, flaccidum: caulina vaginant. stricta. Fl. terminal. peduncul. Cor. luteola, cum maculis purpur. Petal. 3. exter. ma.

*fugax.*

V. fol. radicali unico, caule duplo longiore. *De la Roche nov. pl.*

*Simil. priori, sed duplo maior.* Scap. sesquiped. & ultra, simpl. articulatus. Fol. radicale Gramineum, molle, striatum, carinosum: caulina ad singulos articulos vaginantia, stricta. Cor. candida.

*aristata.*

V. fol. singulari, scapum vaginante, longiss. *De la Roche nov. pl.*

Bulbus sphaerico-compressus. Scap. erect. 4-5-pollic. Fol. lineare. Spadix a fol. caulino, tamquam e spatha proveniens, ramosus. Fl. lutei, fugaces. Pet. 3. exter. ovata, deflexa; interior. lanceol. obtusa, patentia.

## LOMENIA.

*Media inter Ixiam, & Gladiolum.*

Cor. monopet. tubulosa, tubo subincurvo, limbo campanul. 6-fid. æquali. Stam. emarginata.

1. *Borbonica.* L. scapo altissimo, ramoso: fol. ensiformibus, nervosis, duris, margine cartilagineis: fl. sessilibus: petal. mucronatis. *Pourret. Mém. de l'Acad. de Toulouse. T. 3. tab. 5.*

*In Insula Borbonica 24.*

Rad. bulbosa. Fol. radicalia, nervis paralellis, & adproximatis. Scapus 3-4-ped. bracteatus, fl. alternis ex spatha squamosa, & pellucida exeuntibus. Petala fere Liliæ, violaceo-purpur. albo col. mixta. Stam. & stylus satore purpur. anth. flavis.

## LAPEIROUSIA.

Cor. monopet. infundibulif. tubo longissimo; limbo 6-fid. æquali. *Ixiæ* genus proximum, sed

## TRIANDRIA DIGYNIA.

cor. lacin. alternatim inæquales in nostra; anth. non simpl. sed 2-fid. Stigm. non filiform. sed emarginata; ovarium non glabrum, sed tomentosum.

*compressa*. L. scapis ramosis, compressis, margine strigosis; fol. ensiformibus, nervosis, subfalcatis, dorso ferrulatis; spathis exterioribus plicatis, crispis; fl. alternis, solitariis. *Pourret. Mem. de l'Acad. de Toulouse. T. 3. tab. 6.*

*In Insula Gallie 24.*

Rad. bulbosa. Fol. radicalia 2-3. 2. pollic. longa, 4-5. lin. lata. Scap. 6-7-pollic. a basi ramosus, ramis alternis, alatis; fol. caulina similia, fere margine spinosa, alterna; rami axillares, distantes, alterni. Fl. spatha duplex: exterior 3-4-longior interiore, sessilis, horizontal. ovali-obtusa, margine rubra, dorso subspinoso; interior lanceol. membranacea. Fl. albo, & purpur. variegati; tubo longitudine spathæ exterioris.



# CLASSIS IV.

## TETRANDRIA.



### MONOGYNIA.

*Fl. monopetali, monospermi, inferi.*

130. *Protea*. **C**Or. 4-pet. 4-fid. seu 4-part. petal. subinde vel basi, vel apice cohærentibus. Anth. linear. vel oblongæ, insertæ petalis infra apicem. Cal. proprius o. Sem. 1, superum, nudum. Caul. arboreescens, vel frutesc. Rami sæpius verticillati, proliferi. Fol. alterna, sempervirent.
131. *Globularia*. Cal. comm. imbricat. planus: proprius tubulat. inferus. Corollulæ lab. superius 2-part. infer. 3-part. Receptacul. paleac.
- Fl. monopet. monospermi, superi. Aggregatæ.*
132. *Cephalanthus*. Cal. comm. o. proprius infundibuliform. superus. Receptac. globosum, nudum. Sem. 1. lanuginosum.
132. *Dipsacus*. Cal. comm. polyphyll. fol. angustis, spinosis: proprius superus. Receptac. conicum, paleaceum. Sem. columnaria.
133. *Scabiosa*. Cal. comm. polyphyll: proprius dupl. superus. Receptac. elevatum, paleac. seu nudum. Sem. ovato-oblong. coronata, involuta.
134. *Knautia*. Cal. comm. oblong. simplex, 5-fl. proprius simpl. superus. Corollul. irregul. Receptac. planum, nudum. Sem. apice villosa. Differt a *Scabiosa* cal. tubuloso; & simplici flosculo-rum orbita.
135. *Alliunia*. Cal. comm. simpl. oblong. 3-phyll. 3-fl: proprius obsoletus, superus. Corollul. irregul. Receptac. nudum.

\* *Valeriana sibirica*.

*Fl. monopet. monocarpi, inferi.*

134. *Aquartia*. Cal. campanul. sub 4-fid. Cor. rotata, laciniis linearibus. Bacca globosa, polysper.

# 254 TETRANDRIA MONOGYNIA.

153. *Callicarpa*. Cal. campanul. 4 fid. Cor. tubulosa, 4-fid. Bac-  
ca globosa, 4-sper.  
157. *Ægiphila*. Cal. brevissim. campanif. 4-dent. Cor. tubulo-  
sa, 4-fid. Styl. semibind. Bacca subrotun. 4-  
sperm.  
161. *Scoparia*. Cal. 4-part. Cor. rotata, 4-part. concava. Caps.  
oblong. 1-locul. 2 valv. polysperm.  
166. *Centunculus*. Cal. patens, 4-fid. Cor. rotata, 4-fid. Stam.  
brevia. Caps. rotunda, 1-locul. circumscissa.  
160. *Plantago*. Cal. 4-fid. Cor. 4 fid. limbo reflexo. Stam.  
longiss. Caps. ovata, 2-locul. circumscissa.  
Appendices parvæ, membranaceæ, ovario-lan-  
ceol. in apice plerumq. 2-fid. unicuiq. anth.  
subiectæ.  
155. *Polypremum*. Cal. 4-phyll. Cor. rotata, 4-fid. lobis obcorda-  
tis. Caps. compressa, emarginata, 2-locul.  
158. *Buddleja*. Cal. 4-fid. Cor. campanulata, 4-fid. Stam. ex  
incisuris. Caps. oblonga, bifurca, 2-locul.  
polysperm.  
159. *Exacum*. Cal. 4-phyll. Cor. subcampanulata, 4-fid. Caps.  
subrotun. compressa, bifurca, 2-locul. apice  
dehiscens, polysperm.  
156. *Penæa*. Cal. 2-phyll. Cor. campanulata, 4-fid. Styl. 4-  
angular. Caps. 4-gon. 4-locul. 8-sperm.  
157. *Blaria*. Cal. patens. 4-part. Cor. subcampanul. Stam.  
receptac. inserta. Caps. 4-gon. 4-locul. po-  
lysperm.

\* *Swertia corniculata*; *dichotoma*.

\* *Gentianæ 4-fidæ*.

*Fl. monopet. monocarpi, superi.*

150. *Pavetta*. Cal. 4-dent. Cor. monopet. infundibulif. su-  
pera. Stigma curvum. Bacca 2-sper.  
149. *Ixora*. Cal. 4-part. Cor. 1-pet. infundibulif. tubo tenui,  
longissimo, supera. Stam. intra faucem. Bac-  
ca subrotun. 2-locul. 4-sperm.  
151. *Petefia*. Cal. 4-dent. Cor. monopet. infundibulif. Stigm.  
2-fid. Bacca globosa, 2-locul. polysperm.  
148. *Catesbæa*. Cal. 4-dent. Cor. monopet. infundibulif. longiss.  
supera. Stam. intra faucem. Bacca oval. po-  
lysperm.  
152. *Mitchella*. Cal. 4-dent. Cor. binæ eidem germini, monopet.  
tubulosæ, superæ. Stigmat. 4. Bacca biflora,  
bitid. 4-sper.

# TETRANDRIA MONOGYNIA: 259

175. *Hydrophyllax*. Cal. 4-part. Cor. infundibul. Fruct. anceps, 1-sper.
136. *Hedysia*. Cal. 4-part. Cor. monopet. infundibulif. Caps. didyma, polysper. apice dehiscentis,
179. *Oldenlandia*. Cal. 4-part. luperus. Cor. 4 pet. tubulosa. Caps. subglobosa, coriacea, didyma, polysper. dehis. scens inter dentes.
190. *Munetia*. Cal. 8-phyll. Cor. tubulosa, 4-fid. Caps. infera; 2-valv. 1-locul. turbinata, compressa. Sem. imbricata, orbiculata; seminulo centrali.
167. *Sanguisorba*. Cal. brevis, 2-phyll. Cor. 4-part. plana. Germ. inter calyc. & cor. Fruct. 2-locul. Fol. imparipinn. Fl. spicati.

\* *Coffea occidentalis*.

\* *Peplis tetrandra*.

*Fl. monopet. dicocci, inferi.*

143. *Houstonia*. Cal. 4-dent. Cor. monopet. infundibulif. Caps. 2-locul. 2-valv. 2-sper.
137. *Scabrita*. Cal. tubulos. truncatus. Cor. monopet. hypocraterif. Sem. 2, compressa, emarginata.  
*Fl. monopet. dicocci, superi. Stellata.*
146. *Rubia*. Cor. monopet. campanulata. Baccæ 2, coalitæ, monosper. glabræ.
144. *Galium*. Cor. monopet. plana, 4-fid. Fruct. bini, subglobosi.
140. *Asperula*. Cor. monopet. infundibulif. Sem. 2, subrotunda. Differt a Galio tubo cor. longiore.
139. *Scherardia*. Cor. monopet. infundibulif. Sem. 2, trident. oblonga.
138. *Spermacoce*. Cor. monopet. infundibulif. Sem. 2, bident.
142. *Knoxia*. Cor. monopet. infundibulif. Fruct. bipartibilis, sulcatus. Calyc. unicum folium ma. Habitus Plumbaginis.
141. *Diodia*. Cor. monopet. infundibulif. Fruct. 4-gon. coronatus, 2-valv. 2-locul. 2-sperm.
145. *Crucianella*. Cor. monopet. infundibulif. tubo filifor. limbo unguicul. 4-fid. Cal. 2-phyll. Sem. 2, linearia.  
*Fl. monopet. tetraocci, inferi.*
147. *Siphonanthus*. Cal. 5-part. Cor. monopet. infundibulif. tubo longiss. infera. Baccæ 4, subrotun. 1-sperm.  
*Fl. tetrapetali, inferi.*
169. *Epimedium*. Cal. 4-phyll. caducus. Nect. 4. cyathiform. petalis incumbentia. Cor. 4-pet. Caps. acumin. 1-locul. 2-valv. polysperm.

216 TETRANDRIA MONOGYNIA.

162. *Skimmia*. Cal. 4-part. Pet. 4, concava. Bacca 4-sperm.  
 163. *Rhaetia*. Cal. 4-part. Cor. 4-part. fimbriata. Caps. subrotund. 1-locul. 1-sperm.  
 164. *Othera*. Cal. 4-part. Pet. 4, ovata, plana. Stigm. sessile. Capsula?  
 165. *Orixa*. Cal. 4-part. Pet. 4, lanceol. plana. Stigm. capitatum. Capsula?  
 174. *Ptelea*. Cal. parvus, 4-part. inferus. Pet. sæpe 4, raro 5, plana, coriacea. Fruct. compressus, membrana subrotunda, centro monospermus.  
 171. *Samara*. Cal. minimus, 4-part. Pet. 4, ovata, basi lacuna longitudinali. Stam. basi petali immersa. Stigm. infundibulif. Drupa subrot.  
 172. *Fagara*. Cal. parvus, 4-fid. Petal. 4, oblong. patens. Stam. petalis longiora. Caps. 2-valv. 1-sperm.  
 180. *Amman-  
nia*. Cal. 1-phyll. tubulosus, plicatus, 4-8. dent. inferus. Cor. 0, vel 4-pet. calyci inserta. Caps. subrotund. 4-locul.  
 178. *Bankia*. Amentum squamatum. Cor. 4-pet. Anth. in cavitate laminarum sessiles. Caps. 2-valv. Sem. 2-partibile.  
 192. *Hartogia*. Cal. 5-fid. Cor. 4-petala, patens. Drupa ovata, 2-sper.

\* *Cardamine hirsuta*.

\* *Evonymus europæus*.

*Fl. tetrapetali, superi.*

182. *Trapa*. Cal. 4-part. Cor. 4-pet. Nux ovata. cincta spinis 4, oppositis, quæ calyc. fol. fuere.  
 168. *Cissus*. Bacca rotund. 1-sperm. cincta calyce, corollaq. 4-part. Sem. osseum.  
 170. *Cornus*. Involuc. 4-phyll. sæpius. Cal. minimus, 4-dent. deciduus. Petal. 4. Drupa umbilicata, nucleo 2-loc.  
 177. *Ludwigia*. Cal. 4-part. superus. Cor. 4-pet. Caps. 4-gon. 4-locul. infera, polysper.  
 183. *Santalum*. Cal. 4-dent. Cor. 4-pet. calyci innata, præter glandulas 4. Bacca infera, 1-sperm.  
*Fl. incompleti, inferi.*  
 189. *Struthiola*. Cal. 2-phyll. tubulosus, lacin. acutis, compressis, carinatis. Nectar. 8, antheriform. singulo basi corona setarum circumdato, fauc. margini imposita. Cor. 4-fid. Bacca exsucca, 1-sperm.

191. *Krame- Cal. o. Cor. 4-pet. Pet. oblonga, patentia.*  
*ria. Nectar. super. 3-part. inferius 2-phyll. Bacca*  
*globosa, echinata, sicca, 1-sperm.*
194. *Rivina. Cal. o. Cor. 4-pet. persistens. Bacca globosa,*  
*1-sperm. Sem. lentiforme, scabrum.*
195. *Emboth- Cor. 4-pet. Anth. sessiles, apicibus petalorum*  
*rium. infidentes. Folliculus teres.*
186. *Nigrina. Cal. o. Cor. 4-pet. Capsula?*
196. *Salvadu- Cal. 4-fid. laciniis revolutis. Cor. o. Bacca 1-*  
*ra. sperm. Sem. rotundum, arillatum.*
197. *Campho- Cal. urceolat. 4-dent. dentibus 2. oppositis,*  
*rosma. alternisque minimis, reflexis. Cor. o. Caps.*  
*1-sperm. calyce obvoluta.*
198. *Alchemilla. Cal. 8-fid. Cor. o. Sem. 1. calyc. tectum.*
183. *Dorste- Receptac. comm. 1-phyllum, carnosum, in quo*  
*nia. sem. solitaria nidulantur. Fl. aggregati. In-*  
*voluc. magnum, angulatum. Flos monopetal.*  
*anomalus, carnosus, pedem anserinum refe-*  
*rens. Fruct. eiusdem formæ.*
184. *Cometes. Involut. 4-phyll. 3-fl. Cal. 4-phyll. Caps. 3-*  
*cocca.*

\* *Corchorus coreta.*

\* *Ammannia.*

\* *Convallaria bifolia.*

*Fl. incompleti, superi.*

176. *Sirium. Cal. campanulat. semi 4-fid. Cor. o. Nectar. 4-*  
*phyllum, claudens calycem. Germ. inferum.*  
*Stigm. 3-fid. Bacca 3-locul.*
193. *Acana. Cal. 4-phyll. Cor. 4-pet. Bacca obovata, sicca,*  
*infera, 1-sperm. retrorsum echinata.*
181. *Isnardia. Cal. campanulat. 4-fid. persistens. Cor. o. Caps.*  
*cincta calyce, 4-locul. polysper.*
186. *Elæagnus. Cal. campanulat. 4-fid. interne coloratus, de-*  
*ciduus. Cor. o. Drupa intra calycem, ovata,*  
*glabra, 1-locul. 1-sperm.*
187. *Gonocar- Cal. o. Cor. 4-fid. Drupa subglobosa, 8-gon.*  
*pus. 1-sperm.*

\* *Thesium alpinum.*



## DIGYNIA.

202. *Bufonia*. Cal. 4-phyll. persistens, foliol. alternis minoribus. Petal. 4. calyce breviora, angusta. Caps. 1-locul. 2-valv. 2-sper.
205. *Hype-*  
*cour.* Cal. 2-phyll. Pet. 4; exterioribus 2 latioribus, 3-fid. Siliqua.
203. *Hamamelis*. Involuc. 3-phyll. Cal. proprius 4-phyll. Petal. 4, longiss. linearia. Nux 2-cornis, 2-locul.
204. *Cuscuta*. Cal. & cor. 4-5-fid. Squamæ nectariteræ fl. segmentis interpositæ. Stam. 4-5. Caps. subrotund. carnosa, 2-locul. 3-4-sper.
206. *Gomoria*. Cal. o. Cor. campanul. 4-fid. Bacca 2-locul.
199. *Galopina*. Cal. o. Cor. 4-fid. Sem. 2, nuda.
200. *Aphanes*. Cal. 8-fid. Cor. o. Sem. 2, calyce testâ.
201. *Cruzita*. Cal. 4-phyll. exter. 3-phyll. Cor. o. Sem. 1 in calyce conniventi.

\* *Herniaria fruticosa*.

\* *Gentiana*.

\* *Swertia*.

## TETRAGYNIA.

207. *Ilex*. Cal. 4-dent. Cor. monopet. rotata, 4-fid. Styl. o. Stigm. 4. Bacca 4-sperm.
208. *Coldenia*. Cal. 4-phyll. Cor. 1-pet. infundibulif. 4-fid. lacin. obtusis. Styl. 4. Sem. 2, bilocular. angulato-scabra, stylis rostrata.
211. *Sagina*. Cal. 4-phyll. Pet. 4, patentia, calyce breviora. Caps. ovata, 4-valv. 4-locul. polysper.
212. *Tillæa*. Cal. 3-4 part. Pet. 3-4, æqualia, acuta, plana, calyce fere minora. Caps. 3-4, oblong-acumin. polysper.
213. *Myginda*. Cal. minimus, 4-part. Pet. 4, subrotunda, patentiss. Drupa globosa, 1-sper.
209. *Potamo-*  
*geton*. Cal. o. Pet. 4, ovata, decidua. Styl. o. Germ. 4. Sem. 4, nuda, sessilia.
- Ruppia*. In summis ramulis prodeunt spicæ ferentes anth. 8, reniform. sessil. Inter has nascuntur pedunc. 8, tenues, singuli subnantes germen parvo stigmate instructum. Caps. acumin. aspera, 1-sperma.

## M O N O G Y N I A .

130. PRO-  
TEA.

**C**Or. 4-pet. 4-fida, seu 4-part. petalis subinde vel bali, vel apice cohærentibus. Anth. linear. vel oblong. insertæ petal. infra apicem. Cal. propr. o. Sem. 1. superum, nudum. Caul. arboresc. vel frutesc. Rami sæpius verticill. proliferi. Fol. alterna, sempervirentia.

\* *Pinnatæ; fol. pinnatis, filiformibus.*

1. *decumbens*. P. fol. trifid. filiform. caul. decumbente. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. de Protea tab. 1. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 1.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. pedat. filifor. parum ramosus, sanguineus. Rami in apice caul. Fol. digital. re-ota, erecta, secunda, glabra. Pinnæ in medio fol. oppositæ. Capitul. terminal. magnitudine Pisi: Cor. sericea.

2. *florida*. P. fol. trifid. filiform. caul. erecto: capitulo solitar. bract. obvallatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 1. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 1.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota planta, excepto cal. glabra. Caul. ped. & ultra, erectus, teres, purpur. Fol. palm. sparsa, erecta; infer. pinnata, super. 3-fid. pinnæ oppositæ, sub 3-iugæ, pollic. sensim breviores. Capitul. terminal. peduncularum. Pedunc. palm. inæqual. 1 fl. Bract. inferne sparsæ, superne aggregatæ. Cal. squamæ ciliis flavescens.

3. *cyanoïdes*. P. fol. trifido-pinnat. filiformibus, caul. erecto: capitul. solitar. nudis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 3. Pluk. mant. tab. 345. f. 6.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. simpl. vel ramosus, erectus, teres, glaber: rami subverticill. inæqual. Fol. frequentia, pollic. & ultra, erecta, rarius 2-trifida, acuta, glabra. Pinnæ oppositæ, consimil. Capitul. terminale, solitar. magnitudine Nucis Avellanæ. Calyc. squamæ ciliis albis. Cor. intus purpurasc. extus tota lanata, pilis longis, albis.

4. *patula*. P. fol. trifido-pinnat. filiform. caul. erecto: capitul. aggregatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 4.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Caul. pedál. ramosus, glaber, ruber. Rami umbellati, patent. inæqual. Fol. frequentia, pollic. raro 2-pinn. glabra. Capitul. terminale, subsessile, magnitudine Pisi. Calyc. squamæ glabræ. Cor. niveo-tomentosa.
5. *sphærocephala*. P. fol. 2-pinnat. filiformibus; pedunculis capitulis brevioribus; squamis calycin. ovatis, basi villosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 5.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Caul. pedál. proliferus, flexuosus, glaber, fusco-purpur. Fol. frequentia, pollic. erecta, flexuosa, glabra: pinnæ circiter 4. oppositæ: pinnulæ alternæ, subsæligiatae, apice acutæ, rufescent. glandulosæ. Capitula terminalia, peduncul. aggregata, magnitudine fere Nucis Avellanæ. Calyc. squamæ rufescent. Cor. argentea, pilis longis, imbricatis.
6. *ferraria*. P. fol. bipinnat. filiform. hirtis: pedunc. capitulis longioribus; squamis calyc. ovat-lanceol. hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 6. Pluk. mant. tab. 329. f. 1. Burm. Afric. tab. 99. f. 1.*  
*b. Seb. Thes. 2. tab. 69. f. 6.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Caul. 2-ped. & ultra, ramosus, flexuosus, proliferus, ramis pubescentibus pilis helvolis. Fol. frequentia, pollic. erecto-patula: pinnæ circiter 3. oppositæ; pinnulæ alternæ. Capitula sæstigiata, aggregata, pedunculata, magnitudinis Pisi. Cor. extus hirta. *Var. fol. hirtis, & hirsutissim.*
7. *triternata*. P. fol. 2 pinnat. filiform. glabris: pedunc. capitulis longioribus: squamis calyc. lanceol. hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 7.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Caul. sesquiped. & ultra, simpl. superne flexuosus. Fol. spitham. versus caulis apicem frequentia, erecta: pinnæ oppositæ, acutæ; pinnulæ alternæ. Capitula terminalia, aggregata, magnitudine Pisi ma. Cor. lanata, pilis argenteis.

8. *glomerata*. P. fol. 2-pinnat. filiform. pedunc. comm. elongato, nudo; pedicellis capitulis longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.° 8. Burm. Afric. tab. 99. f. 2.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, subprolif. glaber, purpur: rami nudi. Fol. sesquidigit. glabra. Pinnæ circiter 4. alternæ, confamil. pinnul. circiter binæ, alternæ. Corymb. terminal. e spica factus; bracteis distinguendis, lanceol. ferrugineis. Cor. extus hirsuta.

9. *phylicoides*. P. fol. 2-pinnat. filiform. capitul. terminal. solitar. lanatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.° 9.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. ped. & ultra, erectus, superne ramosus, fusus: rami subumbellati. Fol. frequentia, pollic. erecta: pinnæ circiter 3. oppositæ; pinnulæ alternæ, subulatæ, apice rufescent. Capitul. ovatum, Nuce Avellanæ maius. Cor. lanata, pilis densis, griseis.

10. *lagopus*. P. fol. 2-pinnat. filiformibus: capitul. spicat. aggregatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.° 10.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, superne ramosus, glaber, cinereus: rami subverticill. erecti. Fol. pollic. pinnæ tres, oppositæ; pinnul. alternæ, acutæ, fastigiatae, apice rufescent. Spicæ digital. villosæ, albæ.

*Diversa a seq. capitul. aggregatis; & spica conica, sessili, hirsutiss.*

11. *spicata*. P. fol. 2-pinnat. filiform. capitul. spicatis, distinctis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.° 11.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, 2-ped. & ultra, prolif. purpur. Rami verticill. quaterni; iuniores incani. Fol. frequentia, 2-pollic. glabra; suprema sericea: pinnul. alternæ, acutæ. Capitula remota, sparsa, 4-fl. peduncul. Spicæ sparsæ, pollic. tomentosæ. Cor. extus hirsuta, limbo breviss. ovato.

12. *septrum*. P. fol. inferioribus 2-pinnat. superioribus 3-fid. integrisq. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.° 12.*

*Ad. Stock. 1777. tab. 1.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, 2-ped. & ultra, glaber: rami

subverticill. erecti. Fol. 3-pollic. infer. filiform. media obovat-oblong. 3-fida, 2-pollic. summa pollic. petiolat. obovat-oblong. Capitula spicata. Spicæ tres, pollic. argenteo-albæ. Cal. tomentosus. Cor. fere pollic. argentea.

\*\* *Dentata*: fol. *dentatis*, *callis*.

13. *crinita*. P. fol. plerumq. 5-dent. glabris: caul. erecto: capitul. terminalibus subternis. *Syst. veg. ed.*

14. *Thumb. l. c. n.º 13.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. 2-ped. & ultra, villosus. Fol. pollic. vel paulo ultra, sessil. ovata, obtusiss., rarius indivisa, & 3-dent. basi villosa. Capitula adgregata, magnitudine fere Juglandis. Cal. squamæ apice barbaræ. Cor. cylind. villosa, unguicul. purpurasc. *Differt a seq. fl. capitul. pl. & min. cor. brevior.*

14. *conocarpa*. P. fol. sæpe 5-dent. glabris: caul. erecto: capitul. terminali. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 14. Boer. Lugd. 2. tab. 196. Pluk. alm. tab. 200. f. 2.*

*In Æthiopia h.*

Caul. 3-ped. & ultra: rami pauci, alterni. Fol. 2-pollic. erecto-parent. sessil. oblong. obtusa, integra, apice dentata, basi villosa. Capitul. solitar. magnitudine Pyri. Calyc. squamæ ciliatæ. Cor. pollic. filiform. hirsuta, pilis longis, flavis.

15. *elliptica*. P. fol. elliptic. sæpe 3-dent. glabris: caul. erecto: capitul. terminali. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 15.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. flexuosus, villosus. Fol. digital. erecto-parentula. Capitul. solitar. magnitudine Pyri. Cal. tomentosus. Cor. longa, hirsuta.

16. *hypophylla*. P. fol. tridentat. glabris, secundis: caul. decumbente: capitul. terminali. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 16. Boer. Lugd. 2. tab. 198.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. ped. & ultra, glaber, purpur. Fol. palmar. erecta, elliptico-lanc. obtusa cum acumine, calloso-3. dent. rarius 5-dent. inferne integra; recentiora subpubescent. Capitul. solitar. magnitudine Juglandis, pedunc. tomentoso. Cal.

imbricat. squamis ovar. tomentosis. Cor. pollic. filifor. semi-2-fid. extus villosa. *Differt a cæteris caul. decumbente; & fol. secundis.*

17. *cucullata*. P. fol. 3-dent. glabris: capitul. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 17. Boer. Lugd. 2. tab. 206. Pluk. alm. tab. 304. f. 6.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. prolif. nodulosus, tomentosus. Fol. frequentia, sesquipollic. sparsa, imbricata, fessil. infra medium latiora, ovata. Capitula fessil. 5-fl. Cal. paucifol. imbricat. subvillosus. Cor. pollic. filiform. inferne pubescens, supra dense villosa. *Facile dignoscitur capitul. lateralibus angustis.*

18. *tomentosa*. P. fol. sæpe 3-dent. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 18.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota planta incano-tomentosa. Caul. erect. 2-ped. & ultra, simpl. Fol. frequent. pollic. & ultra, linearia. Capitul. terminal. solitar. vel duo, magnitudine fere Juglandis. Cor. unguicul. tenuissime pubescens.

19. *heterophylla*. P. fol. 3-dent. integrisque: caul. decumbente. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 19.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. ped. apice ramosus, glaber, fuscus: rami divaricati. Fol. frequent. unguicul. incumbencia, oblong. acuta, inferne attenuata. Capitul. terminalia, magnitudine Nacis Avellanæ. Cal. tomentosus. Cor. unguicul. villosa.

\*\*\* *Acerosa; fol. filiformibus, subulatis.*

20. *pinifolia*. P. fol. filiformibus: fl. racemosis, ecalycul. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 20. Burm. Afric. tab. 70. f. 3.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota planta glabra. Caul. erectus, 2-ped. & ultra, ramosus. Rami verticillati, flexuosi, subdichot. apice foliosi, floriferi; rubro-fusci. Fol. conferta, 2-pollic. sparsa, erecto-incurva, longa, subcanalicul. Racemi terminal. erecti, fascicul. fessil. ovati. Bract. subulatæ. Pet. 4. lineari-lanc. cruciatim patentia.

21. *racemosa*. P. fol. filiformibus: fl. racemosis, calyculat. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 21.*

*Ad cap. b. Spei h.*

R iv

Caul. erectus, 3-ped. ramosus, ferrugineus. Fol. frequen. pollic. infer. glabra, suprema sericea. Fl. in ramis terminal. Racemi digital. Cal 4-phyll. villosus. Cor. tota hirsuta, lana densa. *Simil. 2. seq. fol. habet unicum fl. intra calyc.*

22. *incurva*. P. fol. filiform. incurvis, glabris: capitul. racemoso-spicatis, tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 22. tab. 3. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 3.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, 2-ped. & ultra, superne ramosus, rufescens: rami verticill. Fol. sparsa, pollic. glabra.

23. *caudata*. P. fol. filiform. hirtis: capitulis subsessil. spicatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 23. tab. 2. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 2.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erect. sub 3-ped. superne ramosus, rufescens. Fol. unguicul. erecta, infer. hirta, super. hirsuta. Spicæ digital. cylindricæ. Cal. sæpe 2-fl. Cor. hirsuta.

24. *bracteata*. P. fol. filiformi-canalicul. capitulo terminali; bracteis multifid. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 24. tab. 1. Boer. Lugd. 2. tab. 193. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 1.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota glabra. Caul. erectus, pedal. simpl. raro 2-fid. rugosus, fuscus. Fol. frequent. 3-pollic. subsecunda. Capitul. solitar. magnitudine Juglandis. Cor. sub 4-gona, apice 4-fida, limbo intus pappo denso. *Convenit cum P. Pinifolia, & aulacea calyc. nullo: cum umbellata bract. multifid.*

25. *comosa*. P. fol. infer. filiformibus: super. lanceol. capitulo terminali. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 25. Ad cap. b. Spei h.*

Tota glabra. Caul. erectus, pedal. & ultra, ramosus, fuscus. Rami fastigiati, verticillato-quaterni. Fol. frequentia, sesquipollic. super. comosa. Conus fl. solitar. magnitudine Juglandis.

26. *purpurea*. P. fol. linearibus, recurvis: capitul. linearibus, cernuis: caul. decumbent. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 26.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. 2-ped. subfiliform. prolif. ramosiss. purpur. ramuli subvillosi. Fol. frequentia, sparsa, semiunguicul. imbricata, mutica, integra, patentirecurva. Capitula magnitudine Pisi. Cal. tomentosus, foliol. filiformibus. Cor. minuta, villosa, limbo glabro, purpur.

27. *prolifera*. P. fol. adpressis, subularis: caul. prolifero. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.° 27. tab. 4. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 4.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, 2-ped. glaber: rami erecti. Fol. frequentia, subimbricata, unguicul. glabra. Capitula in divaricatione ramorum, magnitudine Pisi.

28. *corymbosa*. P. fol. lineari-subulat. adpressis: ramulis subfastigiatis, verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.° 28. tab. 2. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 2.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota glabra. Caul. erectus, 4-ped. & ultra, ramosus: rami plurimi, digital. Fol. frequent. imbricata, unguicul. Capitula terminalia, magnitudine Pisi min. Cal. corolla brevior. Cor. minuta, lutea. *Var. cal. tomentoso.*

29. *nana*. P. fol. lineari-subulat. capitul. terminali; cal. colorato. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.° 29. Pet. gaz. tab. 27. f. 7.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, 2-ped. ramosus, cicatricibus scaber. rami subterni, cernui. Fol. frequentia, subimbricata (Pini sylv.) semipollic. patentia, patula. Capitulum cernuum, magnitudine Pruni. Cal. squamis laxis, sensim ma. Cor. unguicul. lana aurea extus tecta. Calycin. radius purpur. discus flavus. *Dignoscitur fl. Rosam referentibus. Tota planta, excepta cor. glabra.*

30. *lanata*. P. fol. adpressis, triquetris: capitulo terminal. lanato. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.° 30. tab. 3. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 3.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, 2-ped. filiform. debilis, ramosus, fol. tectus: rami bini. Fol. imbricati, unguicul. linear. Capitul. sericeum, magnitudine fere Juglandis. Cor. unguicul. extus pilis argenteis.



\*\*\*\* *Lineares: fol. linearibus.*

31. *torta*. P. fol. linearibus, obliquis, callosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 31.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota planta, excepta cor. glabra. Caul. suberect. 2-ped. & ultra, ramosus. Rami verticillato-  
quaterni, incurvari: ramuli in apice breviss. verticillati. Fol. frequentia, semipollic. integra. Capitula terminal. magnitudine Pisi. Cal. breviss. tomentosus. Cor. argentea.

32. *alba*. P. fol. linearibus sericeo-tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 32.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota argenteo-tomentosa. Caul. erectus, ramosus: rami sub 6-umbellati. Fol. erecto-imbricata, pollic. Capitula in divaricatione ramorum, fol. obvallata, magnitudine Pisi.

\*\*\*\*\* *Lanceolata; fol. ellipticis, & lanceol.*

33. *aulacea*. P. fol. ellipticis: fl. racemosis, ecalyculat. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 33. tab. 2. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 2.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota glabra. Caul. erectus, 3-4-ped., prolif. parum ramosus: rami subverticillati, erecto-patentes. Fol. approximata, sessil. erecta, digital. caulem tegentia. Racemi terminal. subumbellati, pollic. oblong. cernui. Bract. sub singulo pedunc. lanceol. albæ. Cal. o. Pet. unguic. erecta, linear. alba.

34. *umbellata*. P. fol. elliptic. capitul. terminalibus; bracteis multifid. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 34.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Planta glabra. Caul. erectus, 2-ped. & ultra, ramosus. Fol. ut in priore. Capitul. solitarium, magnitudine Nucis Avellanæ ma. Cal. o. Cor. ut in *P. brachiata*.

35. *linearis*. P. fol. ellipticis: capitul. terminali, tomentoso. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 35. tab. 4. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 4.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, 4-ped. ramosus, purpur. rami longi. Fol. frequentia, digital. & ultra, sessil. linear. subtus concava. Capitul. conicum,

magnitudine Pomi mediocris . Cal. squamæ  
extus tomentosæ .

36. *Scolymus* . P. fol. lanceol. acutis , capituloq. terminali rotundo , glabris . *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 36. Boer. Lugd. tab. 192.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Frutex totus glaber . Caul. erectus , 3-ped. ramosus : rami erecti , subverticill. Fol. frequentia , digital. erecto-patula , integra . Capitul. solitar. ovat. fol. obvallarum , magnitudine Pruni . Cor. purpurasc. Receptac. ferrugineo-tomentosum .

37. *mellifera* . P. fol. lanceol-elliptic. capituloq. terminali oblongo , glabris . *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 37.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Arbasc. tota glabra . Caul. erectus , orgyal. & ultra , ramosus . Rami sparsi , erecti , ramulosi . Fol. frequent. digital. integra , patula , avenia . Capit. viscosum , ferrugineum , magnitudine Ovi Anserini . *Differt a sequenti caul. arbor. ramoso , multifloro : fol. planis ; cono oblong. bituminoso , plano , nitido .*

38. *repens* . P. fol. lanceol-elliptic. capituloq. ovato , glabris : caul. decumb. breviss. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 38.*

*Leucadendron repens b. sp. pl.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota glabra , excepta cor. Caul. vix palm. flexuosus , subramosus . Fol. in apice caul. & ramorum conferta , spitham. sessil. erecta , margine cartilagineo . Capitul. terminal. solitar. fol. obvallarum , magnitudine Pruni . Cor. villo albo .

39. *obliqua* . P. fol. elliptic. glabris , callosis , obliquis : capitulo caulino terminali . *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 39.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus , 2-ped. & ultra , glaber . Rami sparsi , erecti , fist. form. Fol. frequent. semipollic. sessil. erecto-patula . Capitul. magnitudine Pruni .

40. *parviflora* . P. fol. elliptic. obtusis , obliquis , callosis : capitulis terminalibus , ramulorum glabris . *Syst.*

veg. ed. 14. Thumb. l. c. n.º 40. tab. 4. *Ad.  
Medic. Svec. T. 1. tab. 4.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, 3-8. ped. ramosiss. fusco-cinereus: rami sparsi, flexuosi, ramulosi. Fol. sparsa, unguicul. magnitudine fere *Vitis idææ*, erecta, obtusa. Capitula sub 4-gona: fl. paniculati, copiosi, lutei, magnitudine *Piperis*. Cal. ovatus, imbricatus, scariosus. *Var. caul. & fol. glabris, vel incano-subtoment.*

41. *pallens*. P. fol. elliptic. acutis, glabris, callosis: capitul. terminali, involucrato; involuc. longo, acuto, pallido. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 41.*  
*P. conifera b. y. sp. pl. Boer. Lugd. tab. 97.*  
*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. fructicos. erectiusc. ped. ramosus, subangulat. glaber: rami sparsi, divaricati. Fol. pollic. & ultra; caulina, & ramea sparsa, sessil. subdecurent. inflexa. Bract. conum obvallantes, concavæ, albidæ, cono triplo longiores. Conus sessil. ovatus. Pet. linear. obtusa: ungues albæ, villosæ; lamina patens, flavescent.

42. *conifera*. P. fol. elliptic. acutis, glabris, callosis: capitul. terminal. involucrato; involuc. longo, acuto, concol. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 42.*  
*Breyn. cent. tab. 9.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Adfinis priori. Caul. erectus, 3-ped. & ultra: rami verticillati, foliosi, ramulosi. Fol. frequent. pollic. erecta, integra, concava. Conus ovatus, tomentosus, magnitudine *Pisi*.

43. *Levisanus*. P. fol. elliptic. obtusis, glabris: capitul. terminal. involucrato; involuc. brevi, obtuso. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 43. Burm. Afrie. tab. 100. f. 2. Boer. Lugd. tab. 202. Pet. Gaz. tab. 3. f. 7.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota planta, excepta cor. glabra. Caul. erectus, ped. prolifer, lævis: ramulis subpubescent. Fol. sparsa, parva, unguicul. spatulata, obtusa cum acumine, erecto-patula. Capitul. axill. & terminal. lanata, magnitudine *Pisi*. Cal. comm. tomentosus.

44. *strobilina*. P. fol. elliptico-oblong. retuso-callosis: capitul.

loq. terminal. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb.*

*l. c. n. 44.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, prolif. ferrugineus, pubescens.

Fol. sparsa, sesquipollic. sessil. spatulata, patent. reflexa, integra, concaviuscul. Conus magnitudine Pruni.

45. *imbricata*. P. fol. imbricat. lanceol. striatis, glabris: capitulo terminali. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 45. tab. 5. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 5.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota planta, exceptis ramis, & cor. glabra.

Caul. erect. 3-ped. & ultra, ramosus: rami bini-terni, erecti. Fol. ramos tegentia, semiunguicul. sessil. integra, rugosa. Capitul. raro 2. oblong. magnitudine Juglandis min. Cor. extus lana flavesc. tecta.

46. *sericea*. P. fol. lanceol. sericeis: ramis filiformibus: caul. decumb. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 46.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. ramosus, glaber. Fol. unguicul. erecta.

Capitul. in ramis terminalibus, solitar. raro adgregata, subcernua, magnitudine Pisi min. Cor. vix unguicul. luteo-tomentosa.

47. *saligna*. P. fol. lanceol. sericeis: caul. fruticoso: capitul. oblong. involucrat. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 47. Pluk. mant. tab. 229. f. 4.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, 4-ped. superne ramosus, inferne nudus, striatus, purpurasc: rami conferti, breves, virgati. Fol. vix pollic. erecta. Capitul. in ramis terminal. oblong. fol. obvallata, magnitudine Pisi.

48. *argentea*. P. fol. lanceol. argenteo-tomentosis, ciliatis: caul. arbor. capitulis globosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 48. Com. H. 2. tab. 26. Boer. Lugd. tab. 195. Zanon. Hist. 24.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Fol. omnium nitidiss. argentea. Arb. orgyal. & ultra, ramosiss. rami, & ramuli erecto-patentes, tuberculosi. Fol. frequent. digital. sessil. integra, nitentia. Conus rotundus, magnitudine Pruni, dein Pomi ma. Cal. squamæ tomentosæ. Cor. vix unguicul. argenteo-tomentosa.

\*\*\*\*\* *Oblonga: fol. oblong. ovatis.*

49. *acaulis*. P. fol. oblong. capituloq. globoso glabris: caul. decumbent. breviss. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 49. Boer. Lugd. 2. tab. 119.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota planta glabra. Caul. 2-poll. raro ramosus, fuscus. Fol. sparsa, pollic-palmaria, terminalia, inæqualia, integra, marginata, venosa, decidua. Capitul. terminale, solitar. magnitudine Juglandis. Cor. hirsuta.

50. *myrtifolia*. P. fol. oblong. glabris: capitul. terminalibus, aggregatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 50.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota planta, excepta cor. glabra. Caul. erectus, 3-ped. ramosus, purpur. Rami alierni, filiformes, ramosi, purpurasc. Fol. unguicul. sessil. obtusa, basi obliqua, integra, patula. Capitul. in ramis, & ramul. terminalia, solitaria, magnitudine Pisi. Cor. extus albo-hirsuta.

51. *grandiflora*. P. fol. oblong. venosis, capituloq. hemisphærico, glabris: caul. arboreo. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 51. Boer. Lugd. 2. tab. 183.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota arbor glabra. Caul. orgyal. & ultra, ramosus. Fol. digital. sessil. obtusa, integra, venosa, patentia. Capitul. fastigiatum, solitar. magnitudine pugni. Cor. albo-tomentosa. *Hæc, & P. Cyanoides speciosa sunt capitul. maximis.*

52. *glabra*. P. fol. oblong. aveniis, capituloq. hemisphærico, glabris: caul. frutic. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 52.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. glaber. Fol. pollic. erecta, sessil. crassa. Capitul. terminal: solitar. magnitudine Pomi.

53. *speciosa*. P. fol. oblong. glabris: capitul. oblong. squamis calycin. apice barbatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 53. Boer. Lugd. 2. tab. 145.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. arbor. orgyal. ramosus, villosus. Fol. palmar. subpetiolat. marginata, coriacea, nervosa, patula, apice fulco. Capitul. terminal.

ovat. magnitudine Ovi Anserini. Cor. filifor. hirsuta. *Var. fol. angustior. & latioribus: calyc. apice barba ferruginea, & nigra.*

54. *totta.* P. fol. ovatis, glabris, callofis: capitul. ovat: cor. cylindric. hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 34.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. villosus, purpurasc. Fol. pollic. sessil. obtusa, raro 3-dentata, glabra. Capitul. terminal. solitar. magnitudine Pyri. Cor. pollicar. filifor. villosa.

55. *hirta.* P. fol. ovat. glabris: fl. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 55. Boer. Lugd. 2. tab. 194. 205.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, ped. & ultra, villosus. Fol. pollic. sessil. imbricata, raro ciliata. Capitul. solitar. sub-8-fl. Calyc. squamæ luteo-sanguin. splendentes. Cor. filiform. villosa. Pistil. cor. duplo longiora, curva. *Simil. P. cucullata, sed differt fol. subpubesc. villositate fl. helvola, nec alba &c.*

56. *pubera.* P. fol. ovatis: capitulisq. terminalibus, tomentof. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 56. Boer. Lugd. 2. tab. 201.?*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. frutic. 3-6-ped. ramosus, villosus. Rami versus apicem subverticill. Fol. unguicul. imbricata, sessil. elliptica, pubescent. incana. Capitul. raro solitar. sæpe plura, magnitudine Cerasi. Cal. hirsutus. Cor. unguicul. villis lanata. *Variat fol. ovat. & oblongis.*

57. *divaricata.* P. fol. ovat. hirtis: capitul. terminalibus, ramis divaricatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 57.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. diffusus, fruticulosus, procumb. ped. & ultra; prolifer, purpurasc. subpilof. rami divaricati. Fol. sparsa, imbricata, sessil. lineam longa, ovat-subrot. integra, villosa, rugosa. Capitul. in ramis terminalibus solitar. laxum, cernuum, magnitudine Pisi. Cor. extus tomentosa.

\*\*\*\*\* *Rotundata: fol. subrotund.*

58. *spathulata.* P. fol. spathulat. subcucullat. glabris. *Syst. veg.*

ed. 14. *Thumb. l. c. n. 58. tab. 5. Að. Medic. Svec. T. 1. tab. 5.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. erectus, 2-ped. & ultra, ramosus, glaber. Rami bini, terni, purpurasc. Fol. unguicul. petiolat. imbricata, integra, marginata. Capitul. in apice ramorum adgregata. Cal. com. sub 4-phyll. 4-fl. tomentosus. Cor. vix unguicul. lanata.

59. *cynaroides*. P. fol. subrotund. petiolatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. n. 59. Boer. Lugd. 2. tab. 184.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. vix ped. simpl. rugosus. Fol. digital. integra, marginata, patentia. Capitul. fastigiatum, ovatum, magnitudine calyc. *Cynara*. Cal. imbricat. squamis extus cinereis. Cor. albo-toment.

60. *cordata*. P. fol. cordatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 5. Að. Medic. Svec. T. 1. tab. 5.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Tota planta glabra. Caul. decumb. spitham. simpl. Fol. alterna, sessil. erecta, integra, marginata, 9-nervia; infer. ma: palmaria; sup. r. sentim breviora. Capitul. subradical. ovat. truncatum. Pappus semen obvallans, purpurasc.

61. *bruniades*. P. fol. subulatis: capitul. terminalibus, globosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei h.*

An P. lanata? Frutex determinate ramosus, fuscescens. Fol. conferta, glabra; recentia pilosa. Capitul. folior. magnitudine nuclei Coryli. Flosculi pilosi, apicibus flavis.

131. **GLOBULARIA.** Cal. com. imbricat. (planus): proprius tubulatus, inferus. Corollulæ lab. super. 2-part. infer. 3-part: Receptac. paleac.

1. *Alypum*. G. caul. frutic: fol. lanceol. 3-dent. integrisq. *Syst. veg. ed. 14.*

*Alypum Niff. Að. 1712. tab. 18. Garid. Aix. tab. 43.*

*In Sylvis Italiae &c. ad rupes, & saxosa h.*

Caul. 2-ped. Fol. sessil. dura, sempervirent. Fl. cœrul-purpurasc.

2. *bisna-*

TETRANDRIA MONOGYNIA. 273

2. *bisnagarica*. G. caul. frutic. fol. radicalibus cuneiformibus, retusis: caulinis lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*  
Scabiosa &c. *Pluk. alm. tab. 53. f. 3.*  
*In Bisnagarie sylvis 24.*
3. *vulgaris*. G. caul. herbac. fol. radicalibus 3-dentat. caulinis lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Aphyllanthos. Cam. hort. 18. tab. 7. Lob. ic. p. 478.*  
*In Europæ apricis 24.*  
Caul. 6-uncial. ramosus, foliosus, rubescens.  
Fol. nervosa, glabra: radical. petiolat. ovata, sæpe emarginata; caulina oblongo-lanceol. Cor. cœrul. vel alba. *Var. non foliosa.*
4. *spinosa*. G. fol. radical. crenato-aculeat.; caulinis mucronat. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Granadæ montibus 24.*  
Flos globosus, cœrul. Reliqua ex definitione.
5. *cordifolia*. G. caul. subnudo: fol. cuneiformibus, tricuspidat: intermedio minimo. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Jacq. Austr. tab. 245.*  
Scabiosa &c. *Morif. Hist. 3. f. 6. tab. 15. f. ultim.*  
*In Austria, Helvetia &c. 24.*  
Planta cespitosa, suffrutescens. Caulic. pl. fusci.  
Scap. 2-5-unc. purpur. nitidus. Fol. aggregata, petiolat. lucida. Capitul. subrotund. Cor. 3-4. fid. cœrul.
6. *nudicaulis*. G. caul. nudo: fol. ovato-oblong. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 230.*  
Scabiosa &c. *Morif. 3. f. 6. tab. 15. f. 4.*  
*In Austria, Helvetia &c. montibus 24.*  
Caul. sub-ped. superne purpurasc: fructifer uno, alterove foliolo. Fol. plura, obrusa, crassiusc. glabra, nitida, supra saturo, subtus pallidius virent. Sripul. lanceol-acum. Capitul. subrotund. Coroll. ex purpur-ærulefc: 3. super. longiori: 2. infer. breviores.
7. *orientalis*. G. caul. subnudo: capitul. alternis, sessilibus: fol. lanceol-ovatis, integris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Natolia 24.*  
Fol. obverse ovata, in petiol. desinentia, plurima, integra, nuda. Caul. ped. herbac. simpl. fol. remotis, minimis, alternis, lanceol. Capitul. in apice caul. 7-10. alterna, sessil.  
*Tom. I. S*



274 TETRANDRIA MONOGYNIA.

132. CEPHA- Cal. comm. o. proprius superus, infundibul. Re-  
LANTHUS. cept. globosum, nudum. Sem. 1. lanuginosum.

1. occidenta- C. fol. oppositis, ternisque. *Syst. veg. ed. 14.*  
lis. *Duham. arb. 1. tab. 34.*

Scabiola &c. *Pluk. alm. tab. 77. f. 4.*

*In Amer. Septentr. h.*

Squamæ capitulum efformantes. Capf. nullæ. Sem.  
longa, pyramidata, bali attenuata, angulata,  
1-locul.

132. DIPSA- Cal. comm. polyphyll. (foliis angustis, spinosis):  
CUS. proprius superus. Receptac. paleaceum.

1. fullonum. D. fol. sessilibus, ferratis; paleis recurvatis. *Syst.*  
*veg. ed. 14.*

*In Europa ♂.*

Squamæ multo duriores, & apice reflexæ. Cal.  
foliola capitulo duplo longiora.

2. sylvestris, D. fol. integris; paleis rectis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Jacq. Austr. 5. tab. 402. Black. tab. 50.*

Dipsaco, o labbro di Venere altro. *Matth.*

*In Europa ♂.*

Fol. omnino connata. Cal. foliola capitulo bre-  
viora, subineruia.

3. laciniatus, D. fol. connatis, sinuatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.*

*Austr. 5. tab. 403. Moris. Hist. 3. f. 7. tab. 36. f. 4.*

*In Europa ♂.*

Lacinia lateral. obtusæ, dentatæ; terminal. acu-  
minatæ.

4. pilosus, D. fol. petiolat. appendiculat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Jacq. Austr. tab. 248. Blak. tab. 124.*

Virga di pastore, *Matth.*

*In Europa ♂.*

Caul. orgyal. ramosus. Fol. pallide virent. sca-  
briusc. ad basin caulis connata, ovar-lanceol-  
ferrata; suprema lanceol. integerr. Capitul. ro-  
tundatum, subviresc. Cor. albida.

133. SCABIOSA. Cal. comm. polyphyll. proprius duplex, su-  
perus. Receptac. paleac. seu nudum. Sem.  
ovato-oblonga.

*Corollul. 4-fidis.*

1. alpina, S. cor. quadrifid. æqualibus calyc. imbricat. fl.  
cernuis: fol. pinnat. foliol. lanceol. ferratis.  
*Syst. veg. ed. 14. Besl. Eyst. æst. 122. Lob.*  
*adv. ic. p. 537.*

*In alpihus helveticis, italicis 24.*

Inter congeneres omnium ampla, valde hirsuta. Caul. 4-ped. ramosus, fistulosus. Fol. ad terram elliptica, ferrata; caulina pinnata, nervo foliac. lato: foliola utrimq. 6-7. impari maximo. Fol. terminal. ad basin uniuntur. Capitula congesta, pene sphaerica. Cal. squamæ extus villosæ, subfusæ. Cor. ochroleuc.

2. *rigida*. S. cor. quadrifid. subradiantibus: calyc. imbricat. obtusis: fol. (superior.) lanceol. ferratis, auriculat. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 1. tab. 93. In Æthiopia b.*

Caul. suffrutic. scaber. Fol. ad basin 2-dent. infer. ovata, in petiolum desinentia; reliqua sessilia. Pedunc. terminal. longiss. Cor. albicans.

3. *transylvanica*. S. cor. quadrifid. æqualibus, cal. paleisque aristatis: fol. radical. lyratis; caulin. pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. H. 2. tab. 111. All. Fl. Ped. tab. 48. Moris. Hist. 3. f. 6. tab. 13. f. 13.*

*In Transylvania, Pedemontii collibus ☉.*

Planta tota pilis hispida, sed magis inferius. Caul. 3-cubital. ab imo ad summum ramosus, brachiatus, obscure 4-gonus, superius evidentius, sulcatus, & striatus. Fol. opposita, amplexicaulia, coalita, pinnata, pinnis per nervum decurrentibus 5-6. Pinnæ plerumque resectæ, & veluti corniculatæ, extremum autem par exhibet duo foliola lanceolato-linearia, quorum interior pars amplior est. Impar foliorum longe elliptico-lanceolat. est, & toto folio longius. Folior. lacinia variant modo parcius resectæ, modo integræ. Primæ & profundius, & pluries resectæ esse solent. Pinnarum numerus in superioribus minor est. Rami oppositi, patuli, divisi. Pedunc. floriferi terminales, subpalm. nudi, fere glabri. Extremi rami 2-3-fl. Cal. ex 5-foliol. viridibus, ovatis, pilosis, dein longe aristatis, qua parte non virent, pellucidis, & albicantibus. Capitul. ovatum. Cor. dilute purpureo-cœrulea.

4. *scabra*. S. cor. 4-fid. æqualibus: calyc. imbricat. obtusis: fol. sub 2-pinnat. scabris, rigidiusc. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Ad cap. b. Spel.*

Planta herbacea, flatura, caul. floribusque *S. rigidula*. Caul. simpl. teretes, scabri. Fol. sessil. linear. acuta, cum rudimentis ramorum folios. axillar. Fl. terminal. solitar. longe peduncul. Flosc. albi.

5. *syriaca*. S. cor. quadrifid. æqualibus, calyc. imbricat. paleisq. aristat. caul. dichot. fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 6. tab. 14. f. 14.*

*In Siria.*

Caul. pilosus. Fol. ferrata. Fl. in dichotom. subsessil. Cal. vix ullus, sed paleæ in conum ovatum imbricatæ. Cor. albæ.

6. *leucantha*. S. cor. quadrifid. subæqual. squam. calyc. imbricat. ovatis: fol. pinnatif. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. part. 2. p. 8.*

*In Narbona, Carniola &c. 24.*

Caul. fruticosus. Fol. villosa, linear. uno, aliove dente superne instructa; foliol. decurrent. infima scabra. Fl. subglobosi, albi. Cal. hemisph. Corollulæ lacinia inferior deflexa, paulo longior. Sem. 3-gona.

7. *succisa*. S. cor. 4-fid. æqual. caul. simpl. ramis adproximatis: fol. lanceol-ovat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 279. Black. tab. 142. Ludw. ed. tab. 19. Knor. hort. 1. tab. 7.*

*Succisa Matth.*

*In Europæ pascuis humidiusculis 24.*

Radix truncata, seu in centro demorsa. Caul. apice ramosus, sub 3-fl. Fol. firma, glabra, subvillosa, subdent. obscure virent. margine purpureo-nigra; infer. petiolat. super. sessil. radical. ovalia, subintegra; caulina pauca, longa, lanceol. Cor. cærul. purpur. alba. *Var. prolifera: fol. incis: cor. 5-fidis: coroli. albis: hirsuta.*

8. *integrifolia*. S. cor. 4-fid. radiantibus: fol. plerumq. divisis; radicalibus ovatis, (plerumque) ferratis; rameis lanceol. caul. herbac. *Syst. veg. ed. 14.*

*Monspeli, in Helvetia &c. 24.*

Caul. subhirsut. aut glaber; ramis patulis. Fol. radical. Bellidis, petiol. ovata, obtusiusc. scabra, acutius ferrata: caulina pauca: ramea amplexicaul. basi ciliata, longiss. culta dentata, seu pinnatifida. Cal. 10-phyll. flore brevior. Cor. cærul-purpureasc. Sem. tericea, denticulata.

9. *amplexicaulis*. S. cor. 4-fid. radiantibus: fol. amplexicaul. lanceol. integerr. radical. 3-fid. crenatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Habitas. . . . .* ☉.  
 Caul. ped. brachiatus, scaber. Fol. radical. oblong. scabriuscula. Panicula dichotoma. Pedunc. longiss. Cor. cœrulesc.  
*Differt a priore fol. radicalibus non indivisis: caulinis basi luteis: calyce non cor. dimidio brevior.*
10. *attenuata*. S. cor. 4-fid. æqualibus: fol. linearibus, integris, 3-fidisque. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Planta lævis.
11. *tatarica*. S. cor. 4-fid. radiantibus: fol. lanceol. pinnatif. lobis subimbric. caul. hispido. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Upf. 1744. tab. 1.*  
*In Tataria ♂.*  
 Caul. altus, 12-ped. brachiatus, fistulosus. Rami oppositi, e geniculis a radice usq. ad apicem sæpe bis dichotomi. Pili rari, parvi, albi. Fol. amplexic. opposita, pinnis ovat-lanceol. floralia indivisa. Fl. pallide lutei. Paleæ lineares, seminibus longiores, deciduæ.
12. *uralensis*. S. cor. 4-fid. radiantibus: fol. radical. simplicibus: caulinis decursive pinnat. paleis aridis, apice reflexis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gutting. 1782. tab. 4.*
13. *arvensis*. S. cor. 4-fid. radiantibus: fol. (superioribus) pinnatif. incisif, (lobis distantibus) caul. hispido. S. &c. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 447. Ludw. ed. tab. 11. Black. tab. 185. Bauh. hist. 3. part. 1. p. 2.*  
*In Europæ pratis ♀.*  
 Caul. erectus, cubital. brachiatus, maculatus. Fol. pallidiusc. hirsuta, firma, scabra: radical. petiolat. ovat-lanc. subserrata. Cap. oblong. Corollul. rubellæ, cœrul. Fructus simil. S. *tataricæ*, sed absque paleis. *Var. fol. omnibus integris: fl. albo. Lob. ic. p. 53. Altera var. glabra.*
14. *sylvatica*. S. cor. 4-fid. radiantibus: fol. omnibus indivisis, ovat-oblong. ferrat. caul. hispido. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 362. Obs. 1. tab. 72.*  
*In Europæ sylvaticis ♀.*

Caul. superne adpersus punctis purpur. inferne glaber, 1-4-ped. Fol. magna; infer. petiolat. profunde ferrata, ut sinuata videantur: proxima fessil. summa angusta, integerr. Pedunc. longiss. Flos pro plantæ portione parvus. Cor. purpur.

*Priore viror obscurior: facies hispidior: fol. semper indivisa: bases cordatae, & amplexicaul. bulbilli rubelli ad basin caul. corollul. obscure radiantes: anth. cœrul.*

*\*\* Corollul. quinquesidis.*

15. *gramuntia*. S. cor. 5-fid. calyc. breviss: fol. caulin. 2-pinnat. filiformibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Monspeliæ &c. secus vias ♂.*

Capitulum globosum.

16. *columbaria*. S. cor. 5-fid. radiantibus: fol. radicalibus ovat. crenat: caulinis pinnat. setaceis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 314. Herm. par. tab. 221. Knorr. del. hort. 2. tab. f. 13.*

*b. prolifera. Bauh. 3. part. 1. pag. 5.*

*In Europæ montosis, ficcioribus.*

Caul. pedat-cubital. brachiat. maxima ex parte nudus. Fol. pallide virent. radical. in orbem posita, petiolat. caulina connato-fessil. 2-pinn. apice rubello. Rami longi. Involuc. laxum membranac. inverse conicum. Capitul. globosum. Cor. purpureo-cœrul. vel dilute rubella, raro alba. *Variat glabritie, & hirsutie.*

*Planta polymorpha. Mire variat fol. figura; & quidem*

*P.<sup>a</sup> fol. imis oblong. undique dentat: superior. pinnatif. lacin. linearibus, & plerisq. indivisis: quæ communior est.*

*2. fol. imis oblong. undiq. dentat: superior. pinnatif. lacinii lanceol. incis.*

*Planta alpina, spitham. Caul. simpl. 3. fol. paribus: horum primum indivisum, cætera pinnatif. Aristæ e cal. proprio nigræ.*

*3. fol. imis oblong. apice dentat: supremis pinnatifid; lacinia terminal. oblong. dentata; cæteris linearibus, & indivisis. Simil. var. secundæ.*

*4. fol. omnibus, oblong. & undique dentat: superior. basi pinnatifid.*

Essentia specifica sita est in cor. radiante: ger-  
mine villosa, coronato: receptaculi paleis bre-  
vibus, foliac. lanceol.

17. *ficula*. S. cor. 5-fid. æqualibus, calyc. brevioribus:  
fol. lyrato-pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14.*

S. divaricata. *Jacq. hort. 1. tab. 15.*

In Sicilia ☉.

Caul. herbac. ped. dichot. divaricatus, debilis,  
ruber. Fol. petiolata, nudiusc. subpilosa; in-  
fer. lyrata; super. subpinn. linear. Pedunc.  
longi, dichotomi, vix pubesc. purpur. Cal. 8-  
phyll. Cor. rubicunda. *Differt præcipue a S.*  
*maritima fl. non radiatis.*

18. *maritima*. S. cor. 5-fid. radiantibus, calyc. brevioribus:  
fol. caulinis pinnat.; summis linearibus, (æ-  
pe) integerr. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. Hist.*  
*3. p. 7.*

In Sicilia, *Monfretii* ☉.

Habitus *S. papposa*. Caul. 2-ped. ramosus, vil-  
losus. Fol. dentata, venosa; radical. palma-  
ria, lanceol. obtusa, tandem pinnatif. *Scro-*  
*phulariæ caninæ* similia. Pedunc. longiss. Cal.  
imbricat. hemisphær. squamis ovatis, obtusis;  
intimis foliol. lanceol. cor. longioribus. Cor.  
albo-purpureo. Fruct. S. *atro-purpur.*

19. *stellata*. S. cor. 5-fid. radiantibus: fol. dissectis: recep-  
tac. fl. subrotundis. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist.*  
*2. p. 1.*

In Hispania &c. ☉.

Fol. infer. obovat-oblong. inciso-ferrata; super.  
lyrata. Cor. albido-cærulesc. Fructus capitul.  
globosum. *Var. fl. vim radiatis. fol. lineari-*  
*bus, pinnatis,*

20. *prolifera*. S. cor. 5-fid. radiantibus: fl. subsessilibus: fol.  
indivisis: caul. prolifero. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Herm. parad. tab. 125.*

In Ægypto ☉.

Caul. herbac. dichotomus. Fol. lanceol. subpu-  
besc. basi connata; infer. subferrata. Fl. axill.  
Cal. latus, longitudine cor. Cor. flava.

21. *atropurpu-* S. cor. 5-fid. radiantibus: fol. dissectis: recep-  
*rea.* tac. fl. subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist.*

*2. pag. 3.*

In India? ☉.

Cal. 12-phyll. linearis, recurvatus, longitudine  
S iv

283

TETRANDRIA MONOGYNIA, 283

fil. radicalibus lyratis; caul. pinnat. incitis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei 24.*

Planta spinham. tota hirsutissima.

27. *cretica*. S. cor. 5-fid: fol. lanceol. subintegerr. caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. l. 6. tab. 15. f. 31.*

*In Creta, & adiacentibus h.*

Caul. 2-cubital. ramosus. Fol. in caule confertiss. ut fere imbricata, 2. unc. longa, lato-elliptica, incana. Fl. ampli. Cal. obtusus. Cor. subcœrul.

28. *graminifolia*. S. cor. 5-fid. radiantibus: fol. lineari-lanceol. integerr. caule herbac. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. prodr. tab. 127.*

*In alpinis Helvetiæ, Baldi, Pedemontii, Tridentini 24.*

Tota planta albida. Caul. cubital. 1-fl. Fol. graminea, basi connata, aut amplexicaul. longa, nudiusc. Involuc. in cavum infundibul. abit. Cor. argentea. Sem. argenteo-nitida. *Var. glabra.*

29. *palæstina*. S. cor. 5-fid. radiantibus: lacin. omnibus 3-fid: fol. indivisis, subferratis; summis basi pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 96.*

*In Palæstina 24.*

Caul. ped. teres. Fol. latius lanceol. aliquot incisuris donata, pubescent. Pedunc. longiss. Fl. albi, aut citrini, longitudine cal. Fruct. omnino *S. Stellata*.

30. *isetenfis*. S. cor. 5-fid. radiantibus, calyce longioribus: fol. 2-pinnat. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 2. tab. 88. f. 1.*

*In Sibiria Isetensis rupibus.*

Caul. adscendent. ped. subtramentosi. Fol. piliis rigidulis adspersa; summa simpliciter pinnata. Rami sæpe nulli. Flos albus, calyce non brevior. Cal. polyphyll. patens. Sem. ut in *S. stellata*.

31. *ucranica*. S. cor. 5-fid. radiantibus: fol. radicalibus pinnatifid: caulinis linearibus, basi sæpe ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 2. tab. 87.*

*In Ucraina, Pedemontio 24.*

Caul. sesquicubit. ramosi, quandoque hirsuti, superne rubent. Fol. carnosæ. Involuc. capitulo

- valde longius. Cor. ochroleuca. *Var. flatura*;  
fol. & glabritie.
32. *ochroleuca*. S. cor. 3-fid. radiantibus: fol. radical. 2-pinnat.  
linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab.*  
*439. Obs. 3. tab. 73. 74. Moris. hist. 3. f. 9.*  
*tab. 13. f. 23. Barr. ic. 770. f. 2.*  
*In Sibiria, & Germaniæ pratis ficcis ♂.*  
Adfinis *S. columbariæ*. Fol. caulina pinnata,  
pinnis linearibus. Petiol. bases latæ. Pedunc.  
longi. Cor. flavescenti-albida. Fructus ova-  
tus. Caul. genicula purpurasc.
33. *papposa*. S. cor. 3-fid. inæqualibus: caul erecto, herbac.  
fol. pinnatifid: seminibus aristat. plumosoq-  
pappolis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Creta ☉.*  
Caul. 1-2-ped. filiform. brachiatus, paniculat.  
subdichotom. Fol. petiol. mollia, albescent.  
hirsutula. Pinnæ paucæ, longæ, angustæ.  
Pedunc. axill. longi, filiform. Cal. polyphyll.  
foliol. ovaris, longe acuminat. Cor. ex violac-  
albescent. Peduncul. & calyc. subtomentosi.
34. *pterocephala*. S. cor. 3-fid. caule fruticoso, procumbente:  
fol. laciniat. hirsutis: pappo plumoso. *Syst.*  
*veg. ed. 14.*  
*In Græcia? ♂*  
Planta incana. Caul. vix e terra prominens. Scap.  
breviss. 1-fl.
- 
- lyrata*. S. fol. radicalibus ovatis; caulina pinnatis. *Forsk.*  
*Suppl. Æg.*  
*Ad Dardanellos.*  
Habitus *S. argentiæ*. Caul. subtomentosus. Pe-  
dunc. longi, glabri. Dichotomia simpl. Cor.  
3-fid. radiant. violac.
- Trenta*. S. *Hacquet. pl. alp. Carn. tab. 4. f. 1.*  
*In Carniolæ scopulorum fissuris.*  
Simil. *S. Transylvanicæ*. Caul. 6-pollic. simpl.  
teres, substriat. Fol. infer. amplexicaul. pin-  
natifida: lobi infer. liberi, valde crenati, &  
runcinati; exter. maiores. Ex ultimo lobo-  
rum pari alter lobus perpendiculariter exurgit.  
Superior. fol. linear. integerr. Flos unicus,  
globosus. Calyc. squamæ membranac. mucro-  
nato-aristatæ, albidæ. Cor. 4-fid. radiant.  
albæ.



TETRANDRIA MONOGYNIA. 285

*tomentosa*. S. caul. 1-fl. fol. tomentosis, imis pinnatis, pinnis dentatis, & semipinnatis: caulinis pinnatis. *Haller. Hist. n. 207. All. Ped. tab. 25. f. 2. Bocc. Mus. tab. 6.*

*In Helvetia &c.*

Caul. præter par fol. pinnatorum, nudus, semiped-dodrant. Fol. omnia tomentosa, prima Bellidis, ovata, habitu ab omnibus nostratibus diverso. Flos unicus, radiatus, purpur. *An differt a S. columbaria?*

*grandiflora*. S. corollul. 5-fid. radiantibus: fol. radicalibus oblong: crenatis: caulinis pinnatis; pinnis lanceolat-linearibus, parulis. *Scop. Delic. Insub. tab. 14.*

*In regno Tunetano 24.*

Caul. sub 3-ped. tenax, villosulus, in senio rubescens, ramosus, in adulta planta furculos e basi proferens. Fol. furculor. longe petiolata: caulina pinna terminali longiore, & latiore. Pedunc. terminal. longi, nudi. Capitula magna. Cal. comm. 8-10-fid. segmentis inæqualibus, linearibus. Fl. limbis albis; tubis rubellis. Capitul. fructiferum magnum, oblongum. *Habitus fl. ut in S. atropurpur.*

*alba*. S. corollul. 5-fid. radiantibus: fol. rameis simplicibus, linearibus, albo-punctulatis: caul. suffruticoso. *Scop. Delic. Insub. fasc. 3. tab. 16.*

*Circa Ticinum 24.*

Rad. crassa. Caul. erecti, 3-ped. & ultra, teretes, læves, ramosi, albi, in senio basi rubentes. Fol. inferiora pinnata, pinnis linearibus. Pedunc. axillar. longi, nudi, tenues. Cal. comm. ex foliol. 7-8. linearibus, parulis, inæqualibus. Cor. alba. Capitula seminfera rotunda, foliol. calycinis, iisque reflexis, minora. *Differt a S. maritima, rad. perenni; caul. suffruticoso; statura multo maiore; fl. albo, & non rubro &c.*

134. KNAU- Cal. comm. oblongus, simpl. 5-fl. proprius simpl. superus. Corollul. irregul. Receptac. nudum. *Differt a scabiosa cal. tubuloso; & simplici floscul. orbita.*

1. *orientalis*. K. fol. incis: cor. 5. calyce longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente ☉.*

Caul. pedál. Fol. opposita, sessilia, villosa, in medio caule pinnatifida; reliqua tantum serrata. Pedunc. axill. longi. Cal. foliol. linearibus. Sem. compressa, pilosa, apice multident.

2. *propontica*. K. fol. superior. lanceol: integerr: corollul. dens cal. æqualibus. *Syst. veg. ed. 14. Tilli Pis. tab. 48.*

*In Oriente ♂.*

Caul. 2-ped. villosus. Fol. subpiloso-scabra, serrata, spitham. Cal. fol. apice subulatis. Cor. 4-fid. purpurasc. Filam. & pistil. alba. Anth. purpur. *Differt a priore fol. indivisis: corollul. decem, nec quinis &c.*

3. *palæstina*. K. fol. integris: calyc. 6-phyll. feminibus papposis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Palæstina ☉.*

Caul. erectus, vix ped. teres, brachiatus, subpilosus. Fol. opposita, subpetiol. lanceol. pilosa. Pedunc. solitar. longiss. erecti, aphylli.

4. *plumosa*. K. fol. super. pinnatis: calyc. 10-phyll: sem. papposis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente ☉.*

Caul. erectus, sesquiped. teres, brachiatus, pubesc. Fol. opposita, sublanc. subtomentosa, venosa, patentia; infer. lato-lanc. indivisa, profunde serrata, basi tomentosa. Pedunc. solitar. longiss. recti, aphylli. Cal. foliol. 10. lineari-lanc. Flosc. 15. Cor. pallide cœrulesc.

135. ALLIONIA. Cal. comm. simpl. oblong. triflor: proprius obfoletus, superus. Corollul. irregular. Receptac. nudum.

1. *violacea*. A. fol. cordatis: calycibus 5-fid. *Syst. veg. ed. 14. Læst. it. 101.*

*In Cumana Americes.*

Caul. erectus, herbac. ramosus, debilis. Fol. opposita, acuta, integerrima, glabra; infer. longe petiolat. Panic. terminal. ramosa, bracteolis brevibus. Calyx comm. laxus. Corollul. mascul. purpureo-cœrul.

2. *incarnata*. A. fol. oblique cordatis: calycibus triphyll. *Syst. veg. ed. 14. Herit. Stirp. nov. fasc. 4. tab. 31.*

*Wedelia. Læst. it. 180.*

*In Cumana arenosis, & in Perua, rupibus arenosis ☉.*

Planta glauca, habitu *Boerhaavix hirsuta*. Rad. ramosa, subfibrosa. Coryled. petiolat. subrotundæ. Caul. prostratus, basi sæpe 3-part. subramosus, teres, villosus, subviscidus. Ramuli alterni e folior. altero minore, axillar. villosiores. Fol. opposita, altero minore, primordialia terna, petiolata, ovalia, basi inæqual. obtusiuscula, seu vix acumin. repanda, laxissime nervosa, crassiuscula, villosa, vix scabriuscula, pallida, subtus glauca, margine purpur-sc. patentia, concava, 18-20. lin. longa, 10-12. lin. lata. Pedunc. solitarii e latere supino coniugationis foliorum, filiformes, villosi, 2-fl. primum breves; floriferi longi, fructiferi triplo longiores, apice nutantes. Fl. terminales, solitarii, incarnati, 3. lin. longi, & lati.

136. HEDYOTIS. Cor. 1. pet. infundibul. Caps. 2-locul. polysperma, inæra.

1. *maritima*. H. fol. ovalibus, obtusis: fl. oppositis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In India Orient. ☉.*

Caul. prostrati, herbacei, palmar. læves. Fol. opposita, subpetiol. patentia, subcarnosa. Fl. lateral. sessiles. Fruct. magnitudine Coriandri.

2. *pumila*. H. fol. ovat. acutis: fl. alternis, pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Tranquebaria ☉.*

Facies *Anagallidis arvensis*. Caul. palm. parum ramosi, læves. Fol. vix petiol. lævia. Fl. axill. Caps. subrotunda.

3. *fruticosa*. H. fol. lanceol. petiolat. corymbis terminalibus involucrentis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Valerianella &c. Burm. Zeyl. tab. 107.*

*In Zeylona ☿.*

Habitus *Phyllinidis*. Caul. 4-gon. Fol. opposita, integerr. nervosa, glabra. Stip. breves, latæ, ovato-rhombeæ. Corymbi 3-fidi.

4. *Auricularia*. H. fol. lanceol-ovat. fl. verticillat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Valerianella &c. Burm. Zeyl. tab. 108. f. 1.*

*In Zeylona ☿.*

Caul. longi, glabri. Fol. opposita, subsessil. pendula, integerr. nervosa, glabra. Stipul. dentat. Rami longi, alterni, articulati. Fl. multi.

288 TETRANDRIA MONOGYNIA.

5. *herbacea*. H. fol. lineari-lanceol. caul. herbac. dichotomo : pedunc. geminis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Zeylona.*

Caul. semiped. Fol. opposita, subpetiol. avenia, raro repanda. Pedunc. ad singulam caulis ramificationem, 1-fl.

6. *graminifolia*. H. caul. decumbente : fol. linearibus : panicul. racemosa ; secunda ; pedunc. solisequiis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In India Orient. 24.*

Caul. ped. filiform. debiles, ut *Stellariæ gramineæ*. Fol. remote opposita. Cor. cœrul. limbo 4-fido ; laciniis ante meridiem patentiss. temp. vespertino 2. erectis, 2. reflexis. Caps. compressa, retusa.

*americana*. H. fol. linearibus : fl. axillar. solitariis. *Jacq. Amer. ed. 2. picta tab. 18.*

*In litoribus rupestribus Havanae h.*

Frutex raro 3. ped. excedens. Rami diffusi, basi procumb. cæterum erecti. Fol. numerosa, 4-linear. opposita, petiol. lineari-acumin. integerr. crassa, carnosæ, nitida, subtus sulcata, lateribus convexis, supra planiusc. Petioli utrimq. oriuntur, membrana ramulos anplexante, & cum acumine obtusa. Fl. sessil. lutei, inodori.

*hispida*. H. fol. lineari-lanceolat. fl. verticillatis. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In China.*

Caul. decumbent. semiped. 4-goni, hispidi, ramo uno, alterove. Fol. petiolat. integra, utrimq. hispida. Petiol. valde hispidi, cum stipul. filiformi-laceris connati, vaginam brevem constituunt. Styl. clavatus. Stigm. incrassatum. Caps. semibilocul.

137. SCABRITA. S. cor. 1-pet. hypocrater. Cal. truncatus. Sem. 2. emarginata, supera.

1. *scabra*. S. triflora. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India h.*

Frutex ramis tetragonis, scabris. Fol. opposita, petiolat. ovata, oblong. integerr. articulis ramis longiora, utrimq. scabra. Pedunc. axill. oppositi, solitar. 4-gon. fol. dimidio breviores, apice 2-phylli. Involuc. partial. 4-phyll. foliol. obovat. obtusis.

**TETRANDRIA MONOGYNIA. 289**

**138. SPERMACOCE.** Cor. 1-pet, infundib. (4-fida). Sem.  
2. bident.

**1. tenuior.** S. glabra: fol. linearibus: fl. verticillat. staminib.  
inclusis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 277.*  
f. 359. *Sabb. hort. Rom. 2. tab. 99.*

*Anonymos &c. Pluk. alm. tab. 136. f. 4.*

*In Carolina* ☉.

Caul. 2-3--ped. acute 4-gon. Fl. minimi, sessil.  
purpureo-albi. Sem. hirta.

**2. verticilla-  
ta.** S. glabra: fol. lanceol. verticill. globosis. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 277. f. 358.*

*Scabiosa &c. Pluk. alm. tab. 58. f. 6.*

*In Jamaica, Africa.*

Caulic. dodran-ped. 4-goni. Fol. opposita, Hyf-  
sopifor. 9-nervia, scabra; axillaribus min. fa-  
sciculat. Caul. & fol. hirsuta. Fl. parvi. Cor.  
revoluta, alba. *Variat verticill. globosis, am-  
plexicaulibus & pedunculat.*

**3. hirta.** S. scabra; fol. oblong. summis quaternis: fl. ver-  
ticillat. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 20.*  
f. 3.

*In Jamaica* ☉.

Caul. 4-gon. angul. acutiss. deorsum pilosis; cæ-  
terum glaber, ramosiss. rigidus. Fol. elliptica,  
lineata, utrimq. scabra, non villosa, subpetiol.  
petiolis connexis membrana multifeta. Fl. la-  
teral. tubulosi, albi. Stam. fauce longiora.  
Anth. violac.

**4. articularis.** S. fol. elliptic. obtusiusc. subscabris. *Syst. veg.*  
*ed. 14. Lin. Suppl. Rumph. Amb. 6. tab. 10.*

*In India Orient.* ☉.

Caul. herbac. ramosus, teres, utrimque canali-  
culat. ruber. Rami procumb. virgati. Genicula  
crassa. Fol. opposita, subpetiolat. alternatim,  
in primis subtus, lineata. Membrana tran-  
sversa stipulæ loco, multi-aristata, fol. com-  
binans. Fl. angusti, albi.

**5. stricta.** S. fol. lineari-lanceol. lineatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Linn. Suppl.*

*In India Orient.* ☉.

Planta semiped. erecta, stricta, angulis scabra.  
Rami breviores, alterni. Fol. opposita, sub-  
petiolat. scabriusc. connata membrana ciliata.  
Verticilli angusti. Cor. alba.

6. *hispida*. S. *hispida*: fol. cbovatis, obliquatis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gutt. 1772. tab. 5.*

*In Zeylona* ☉.

Caul. erectus, herbac. obsolete 4-gonus, pilosohispidus. Rami inferi oppositi. Fol. opposita, subpetiolat. crassiusc. utrimq. scabra, flexuosa, mucrone minuto, reflexo. Stipula connectens utrimq. fol. paria, scariosa, truncata, fetis 5. distantibus. Fl. axill. sessil. 2-3. Cor. turbinate-campanul. cæteris spec. ma. erecta, semidid. violac. Stam. longitudine cor. purpurasc.

7. *procumbens*. S. *procumb.* fol. linearibus: corymbis lateralibus, pedunculat. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India.*

Caul. diffusi, herbac. debiles, angulati. Fol. reflexa. Fl. fascicul. involucro polyphyl. umbella longiore. Stam. cor. longiora.

8. *spinosa*. S. *suffrutic.* fol. linearibus; spinul. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Loeft. ii. 201.*

*In America.*

Caul. 2-5. ped. diffusi, ad basin ramosi. Fol. Rosmarini. Verticil. paucifl. Cor. alba.

- scymoiotes*. S. *glabra*: fol. ovatis, acumin. *Burm. Ind. tab. 13. f. 1.*

*In India.*

Media inter S. tenuior. & hispidam: differt præcipue caul. glabro, 4-gon. fol. ovat-acum. tomentosof. verticil. confertis, sessilibus.

- latifolia*. S. *caul. erecto*, 4-gon. fl. axillar. *Aubl. Guian. tab. 19. f. 1.*

*In Caienna, & Guiana.*

Planta herbacea. Caul. pl. 2-3. ped. ramosi, nodosi. Fol. opposita, petiolis stipulæ amplexic. ciliatæ adnexis, ovata, acut. integerr. aspera, inferne pallide virentia. Fl. axillar. cespitosi, sessil. albi.

- cærulescens*. S. *fol. ovatis*: fl. axillaribus numerosis, verticillatis: caul. erecto, simpl. *Aubl. Guian. tab. 19. f. 2.*

*Isidem in locis.*

Differt a priore caulibus humilioribus, simplicibus: fol. minor. virescentibus; stipul. breviora, minus ciliata: fl. parvis, cærul. & fructu exiguo.

*pres-*

- prostrata*. S. fol. parvis, ovatis, lævibus. *Aubl. Guian. tab. 20. f. 3.*  
*Ad ripas fluviorum in Guiana.*  
 Differt a prioribus caulibus decumbent. ramis oppositis: fol. minor. viridibus, mollibus, subsessilibus, integerr.
- radicans*. S. fol. lanceol. acutis: fl. parvis. *Aubl. Guian. tab. 20. f. 4.*  
*Ad ripam fluvii Orapu 24.*  
 Caul. pl. ramosi, nodiferi. Fol. oblong-angusta, integerr. glabra. Fl. cespitosi, axillar.
- longifolia*. S. caul. flexuoso: fol. ovat-obl. acutis: fl. minimis. *Aubl. Guian. tab. 21.*  
*In Guiana.*  
 Caul. pl. sarmentosi, ramosi, nodosi, 4-goni. Fol. subpetiol. lata, integerr. glabra. Fl. axill. congesti, numerosi, sessil. albi.
- aspera*. S. fol. oblong. angustis: fl. verticillatis. *Aubl. Guian. tab. 22. f. 6.*  
*In Guiana, & Caienna.*  
 Caul. pl. 1-2-ped. nodosi, 4-goni, asperi. Fol. sessil. acuta, aspera. Fl. axillar. multi, sessil. albi.
- alata*. S. caulibus, & ramulis radicantibus: fol. subsessilibus, ovatis: fl. terminalibus, cæcul. *Aubl. Guian. tab. 22. f. 7.*  
*In Guiana.*
- hexangularis*. S. caul. flexuoso: fol. petiolat. ovat-acut: fl. terminalibus. *Aubl. Guian. tab. 22. f. 8.*  
*Iisdem in locis.*  
 Differt a priore caul. 6-gon. supra vicinas plantas sparsis: fol. min. petiolat. ovatis.
- scandens*. S. fol. subrotund-acumin. Phyllitidi scandenti affinis, minoribus oppositis. *Stoun. Jam. hist. 1. tab. 28. f. 4.*  
*In Guiana.*  
 Super Arbores scandit. *Omnes hæ species ab Aublet relatæ valent in gonorrhæu.*
- havanensis*. S. fruticosa, ramis spinosis. *Jacq. Amer. ed. 2. picta.*  
*In Havana 5.*  
 Frutex nanus, diffusus, ramosiss. rigidus, nitidus. Spinæ axillar. in foliis: terminal. in ramuscul. junioribus, brachiatis, subulatæ. Fol. semipollic. opposita, petiolata, obverse ovata.

ta, integerr. nitida. Panicul. terminal. Fl. numerosi, exigui, candidi, inodori, germinibus rubellis.

*sumatrensis*. S. hispida; fol. lanceol. corymbis terminalibus, dichotomis. Retz. *Obs. fasc.* 4.

*In Sumatra*.

Caul. herbaceus, 4-gon. tomentosus, articulis longior. Rami oppositi. Fol. petiolat. integerr. hispida, nervis subtus tomentosis. Cal. minutus, 4 dent. Fl. 2-sperm. 4-dentat.

139. SCHE-  
-RARDIA. Cor. 1-petal. infundibul. Sem. 2. trident. oblonga. Fol. verticillata.

1. *arvensis*. S. fol. senis, lanceol.-linearibus: fl. terminalibus, sessilibus, umbellatis. Hall. *helv.*

S. fol. omnibus, verticill. &c. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 439. *Hort. rom. 1. tab.* 80.

*In Europæ arvis* ☉.

Caul. cespitosi, humiles, decumbent. triental. ramosi. Fol. elliptico-lanceol. argute mucronata, aspera, dilute virentia; infer. 4-6. margine ciliato. Fl. inter fol. in summa planta congesti. Petala purpur. non cœrulea.

2. *muralis*. S. fol. floralibus, binis, oppositis: binis fl. *Syst. veg. ed.* 14.

*Asperula* &c. *Colum. ecphr. tab.* 300.

*Galium* &c. *Buxb. cent. 2. tab.* 30. f. 2. *All. Fl. Ped. tab.* 77. f. 1.

*In Italia, & Constantin. muris vetustis* ☉.

Caul. decumbent. Fol. ovat-lanceol. infer. sena; media quaterna; summa bina. Flores peduncul. plani, pallidi. Fruct. oblong. hispidi. Sem. subarcuata.

3. *fruticosa*. S. fol. quaternis, æqualibus: caul. fruticoso. *Syst. veg. ed.* 14.

*In insula Adscensionis* ☿.

Frutex inæqual. torosus, scaber. Rami obruse 4-goni. Fol. angusto-lanceol. integerr. glabra, margine revoluta. Stipul. breviss. subulata. Fl. axillar. oppositi, sessiles. Cor. alba.

*fœtidissima*. S. caulibus lignosis, procumbentibus: fl. corymbos. 4-ld. *Cyrill.: app. ad plant. charact. T. 3. f.* 7.

*In Calabria*.

Odor stercoraceus. Caul. cespit. spitham. Fol.



fasciculata, fere verticillata, lineari-lanceol. subhirsuta, 2. semper in singulo verticillo, reliquis duplo longioribus. Fl. terminal. ut plurimum 8. purpur. Cor. laciniis acuminat. incurvis. Videtur *Asperula calabrica*.

140. ASPE-  
RULA. Cor. 1-petal. infundibulif. Sem. 2. subrotunda. *Differt a Galto tubo cor. longiore. Fol. verticillata.*

1. *odorata*. A. fol. octonis, elliptico-lanceol: fl. fasciculat. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 562. Black. tab. 60. Kniph. cent. 1. tab. 9. Ludw. ed. tab. 146.*

*In Europa umbrosis* 24.

Caul. erectus, pedal. simpl. vix ramosus. Fol. glabra, atro-virent. nervo, orisq. subhirsutis; ima oblonga, super. ma: acuminata: Fl. magni, albi, odori. Fruct. reniform. villis uncinatis hirti. *Var. angustior, & humilior.*

2. *arvensis*. A. fol. senis-octonis: fl. terminalibus, adgregatis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Rubeola &c. Bauh. hist. 3. p. 719.*

*In Europa* ☉.

Caul. erectus, pedal. ramosus. Fol. glabra, lanceol-linear. obtusiusc. floralia sæpe ad basin ciliata, supra hispida. Cor. cœrul. Fructus glabri.

3. *taurina*. A. fol. quaternis, ovat-lanceol: fl. terminalibus, fasciculatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Rubia &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 21. f. 1.*

*In alpinis Helvetiæ, & collibus: sylvis umbrosis Italiæ* 24.

Caul. erecti, pedal. ramosi, 4-gon. Fol. villosula. Rami alterni. Pedunc. alterni, 1-2. Bract. ciliatæ. Cor. alba. *Fol. latiora, & cor. multo longiores, quam in priore.*

4. *crassifolia*. A. fol. quaternis, oblong. lateralibus, revolutis, obtusiusc. pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Creta, Oriente* h.

Caul. diffusus, alterne ramosus, subpubescens. Fol. ovalia, supra gibba, uti *Sedum*; rameæ remotiora, angusto-lanceol. inæqualia. Rami floriferi erecti, alterne ramosi. Fol. ultima bina. Fl. terminal. fascicul. pauci. Cor. extus pubesc.

5. *calabrica*. A. fol. quaternis, oblong. obtusis, lævibus: (caule fruticoso). *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl. pl. Heris. Stirp. nov. fusc. 4. tab. 32.*  
*Leandro di Candia &c. Zan. hist. tab. 47.*  
*Thymelæa &c. Zan. hist. tab. 166.*  
*Sherardia foetidissima. Cyr. Char. tab. 3. f. 7.?*  
*In Calabria, & Syria montibus h.*  
 Similis priori, sed lævis, prostrata, odore stercoreo. Caules teres, duriusc. vix pubesc. Fol. subpetiol. nuda, crassiuscula, subtusul. 12-15. lin. long. 3-4. lata.  
 Rami floriferi terminal. terni, fol. oppositis. Fasciculi fl. floresq. sessil: rubri. Bractea 2-phyll. acuta, patula, sub germinibus.
6. *tinctoria*. A. fol. linearibus: infer. senis; intermediis quaternis: caul. flaccido: fl. plerisq. 3-fid. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Galium &c. Tabern. hist. tab. 733. f. 1. bona.*  
*In Europæ aridis saxosis H.*  
 Planta, nisi sustentetur, procumbens. Caul. 3-ped. ramosi, sub vertice tumentes. Fol. tenuiter, & acute dentata, etiam quina; summa opposita; sub fl. ovat-lanceol. Fl. umbellati, albi, triandri.
7. *pyrenaica*. A. fol. quaternis, lanceol-linearibus: caul. erecto: fl. sæpius trifid. *Syst. veg. ed. 13.*  
*In Pyrenæis, & Helvetia H.*  
 Caul. spitham. 4-goni, valde ramosi, ramis umbellatis. Fol. acuta, carinata, lævia; infer. breviora, lanceol. obtusiora: fol. summa, & floral. opposita, latiora, lanceol. acuta. Fl. rubri. *Statura Sherardiæ arvensis.*
8. *eynanchica*. A. fol. quaternis, linearibus; super. sæpe binis: caul. erecto: fl. 4-fid: *Syst. veg. ed. 14.*  
*Galium &c. Tabern. hist. 433. f. 2. Col. cephrr. 1. tab. 297. f. 1.*  
*In prutis aridis, saxosis, cretaceis collium, & alpium H.*  
 Caul. palm. scaber. Fl. extus subrugoso-scabri, rubri. Germina rubra.
9. *aristata*. A. fol. linearibus, subcarnosis; infer. quaternis: fl. subternis, aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In Europa australi.*  
 Caul. erectus. Fl. parallele positi, pallide flavesc. lacin. obtuse aristatis.

TETRANDRIA MONOGYNIA. 295

10. *lavigata*. A. fol. quaternis, elliptic. enerviis, læviusc: peduncul. divaricatis, trichotomis: sem. scabris.  
*Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 94.*  
*Rubia &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 21. f. 4-5.*  
*Bocc. Sicul. tab. 11. f. 5.*  
*In alpinis Helvetiæ &c.*  
 Caul. simpl. læves, patuli, 4-goni: Fol. subpetiol. obrufa, patentia, vix ciliata. Rami florentes horizontal. 2-fidi; bract. 2. parvis, lanceol. Fl. sæpius terni, peduncul. albi. Anth. flavæ.

- hexaphylla*. A. fol. senis, linearibus: fl. terminalibus, umbellatis, sessilibus. *All. Fl. Ped. tab. 77. f. 3.*  
*Ad rupes &c.*  
 E rupium fissuris prodit, caulicul. semipalm. 4-gonis, ad basin interdum ramosis, cæterum simplicibus. Fol. erecta, plana, internodiis folio paulo longioribus. Umbella foliacea. Fl. tubo longo, 4-fidi, segmentis subrevolutis, purpur. intus albi. Sem. compressa. Tota planta glabra.

141. DIODIA. Cor. 1-petal. infundibul. Capf. 2-locul. 2-sperma.

1. *virginica*. D. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginie aquosis.*  
 Caul. procumb. ped. rubent. ramis alternis. Fol. opposita, sessil. lanceol. acumin. erecta, glabra, integerr. ad basin sæpe denticul. ciliata, longitudine internodiorum caulis. Fl. axill. oppositi, sessil. folitarii, albi.

142. KNOXIA. Cor. 1-petal. infundibul. Sem. 2. fulcata. Calycis unicum fol. majus. Habitus Plumbaginis.

1. *zeylanica*. K. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 14. f. 2.*  
*Veronicæ &c. Pluk. alm. tab. 114. f. 2.*  
*In Zeylona supra truncos arborum puridarum.*  
 Caul. erectus, ped. articular. glaber. Fol. opposita, sessil. lanceol. avenia, glabra. Spicæ longæ, angustæ. Fl. sparsi, minimi, sessil. nivei.

143. HOUSTONIA. Cor. 1-petal. infundibul. Capf. 2-locul. 2-sperma.

1. *carula*. H. fol. radicalibus, ovatis: caul. composito: pedunc. primis 2-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

296 TETRANDRIA MONOGYNIA.

*Paronychia* &c. *Morif. hist.* 3. f. 15. tab. 4. f. 1.  
*b. Chamæiasme* &c. *Pluk. alm. tab.* 97. f. 9.  
*In Virginia.*

*Planta verna.* Caul. palmar. ramosus. Fol. radical. in orbem posita, exigua, *Paronychia* vulg. similia: caulina 2-3. Cor. cœrul.

2. *purpurea.* H. fol. ovat-lanceol. corymbis terminalibus: fl. superis. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Virginia.*

Fol. pauca, parva, opposita. Fl. purpureo-rubent.

*An diversif generis?*

144. *GALIUM.* Cor. 1-pet. plana, 4-fida. Sem. 2. subrotunda. Fol. verticillata.

\* *Fructu glabro.*

1. *rubroides.* G. fol. quaternis, lanceol-ovat. æqualibus, subtus scabris: caul. erecto: fructibus glabris. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Europa australi.*

Habitus *G. borealis*, sed fol. duplo latiora. Caul. erectus, ped. & ultra, firmus. Fol. marginibus reflexis, nervo spinulis adsperso. Panic. brevis, conglomerata. Cor. alba.

2. *palustre.* G. fol. (sæpe) quaternis, obovatis, inæqualibus: caul. diffusis. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 423.

*In Europæ rivulis limosis* 24.

Caul. 2-ped. reclinati, ramosi, fragiles, asperi, angulosi, ramis longis. Fol. margine rarius dentata, glabra, læte virent. super. aspera. Pedunc. florigeri, breves, ramosi, divaricati. Fl. multi, parvuli, albi. *Var. statura.*

3. *trifidum.* G. fol. quaternis, linearibus: caul. procumb. scabro; cor. 3-fid. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 48.

*In Dania, Canada.*

Caul. ramosiss. ramis ternis-quaternis, divaricatis. Fol. obtusa, latiusc. glabra, subtus parum scabra. Pedunc. sæpe terni, tenuiss. 1-fl. Fl. minimi, albi. Stam. 3.

4. *montanum.* G. fol. (6-8.) linearibus, lævibus: caul. debili, scabro: sem. glabris. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Germania, Helvetia* 24.

*Statura inter G. Molluginum, & glaucum media.*

Fol. caulina quina, reflexa; ramea quaterna.  
Corymb. 3-fid. Cor. reliquis ma: alba, ante  
explicationem extus purpurasc. Anth. fuscae.

5. *tindorum*. G. fol. linearibus: caulinis senis; ramorum quaternis: caul. flaccido; pedunc. sub 2-fl. fructibus glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Amer. Septentr.*

6. *uliginosum*. G. fol. sæpe senis, (plerumq.) lanceol. retrorsum serrato-aculeat. mucronat. rigidis: cor. fructu maioribus. *Syst. veg. ed. 14. Pet. herb. f. 6. Barr. ic. 82.*

*In Europæ pascuis aquosis, sterilibus 24.*

Caul. sesquiped. ramosus, flaccidus, striatus.  
Fol. unguicul. subtus glauco-virid. Corymb.  
3-fid. Fl. maiusc. albi. *Var. ramis longioribus; foliisq. lanceol: ramis brevioribus: foliisque ovatis.*

7. *spurium*. G. fol. senis, lanceol. carinatis, scabris, retrorsum aculeat. genicul. simplicibus, fructibus (sæpe) glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Aparine &c. Vaill. paris. tab. 4. f. 4. nisi sem. hirsut. pingat.*

*In Europæ cultis ☉.*

Adfine G. *Aparines*, sed minus. Caul. sesquiped. debilis, diffusus, ramosus. Fol. læte virentia. Pedunc. divaricati, 2-fidi. Fl. maiusculi, albi.

8. *saxatile*. G. fol. senis, elliptic. petiol. breviss. 1-fl. *Hall. helv. n. 718.*

*Galium &c. Syst. veg. ed. 14. Juss. A3. Paris. 1714. tab. 15.*

*In Hispaniæ, Helvetiæ alpinis.*

Habitus valde foliosus. Caul. angulati, 6-unc. Fol. longiora, cis originem latefcentia, absque spinulis.

*b. G. Hircynium. Hall. helv. n. 717.*

Vix ped. multicaul. & ramosum. Caul. 4-gon. Fol. peculiaris figuræ, rotunda, & argute lanceola terminata. Pedunc. axill. 1-2-fl. fascicul. umbellatis. Sem. pro plantæ parvitate grandia.

9. *pyrenaicum*. G. fol. senis: fl. lateralibus, oppositis, solitar. subsessilibus: fructibus, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Gouan. Illus. tab. 1. f. 4.*

*In Pyrenæis.*

Caul. exigui, vix uncial. ramosiss. debiles, glaberrimi; geniculis tumidiusc. Fol. glaberrima, nitida, mucrone infirmo. Fl. oppoliti, albi, aut citrini: quandoq. flos unus, aut alter.

10. *minutum*. G. fol. octonis, lanceol. mucronat. ferrato-aculeat. glabris, incurvis: fructibus reflexis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Imperio Ruthenico 24.*

Simile G. vero, sed palmo brevius, decumbens. Caul. lævis, nec margine scaber. Fol. utrimq. parum convexa, nec margine reflexa. Fructus magni, carnosii, pedunc. reflexis, unde conglomerati.

11. *pusillum*. G. fol. (sæpe) octonis, linearibus acuminat. subimbricat. hispidis; peduncul. dichotom. *Syst. veg. ed. 14.*

Rubeola &c. *Burf. XIX. 17.*

*In montibus Gallo-provinciæ 24.*

Caul. numerosi, digital. angulati. Foliol. 8-6. lanc-linear. Rami rariores, alterni. Fl. verticilli conferti. Panícula rarior.

12. *verum*. G. fol. (sæpe) octonis, linearibus, sulcatis: ramis florifer. brevibus. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 435. Hort. rom. 1. tab. 1. 81. Ludw. ed. tab. 39.*

*In Europa frequens 24.*

Caul. anceps. Fol. fragilia, nigro-virent. florente planta reflexa. Rami floriferi foliosi. Fl. numerosi, flavicant. Anth. defloratæ fiunt fuscæ. *Var. 1. monstrosa, = 2. fol. fena; & sem. hirsuta.*

13. *Mollugo*. G. fol. octonis, ovat-linearibus, mucronat. subferrat. patentiss. caul. flaccido; ramis patentibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 455. Black. tab. 168.*

*Mollugo &c. Lob. ic. 802.*

*In Europa mediterranea 24.*

Caul. 3-ped. 4-gonus, subverticillis tumescens. Fol. duriuscula, fordide viresc. glabra, superne acutiora. Rami axill. florigeri in summa planta spicatam efformant paniculam. Fl. multi, parvi, albidii.

14. *sylvaticum*. G. fol. octonis, lævibus, subtrus scabris; floralibus binis: pedunc. capillaribus: caule lævi. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europæ austral. montibus sylvestris.*

TETRANDRIA MONOGYNIA. 299

Planta subglauca. Caul. alti, ramosiss. debiles.  
Fol. lato-lanceol. Pedunc. elongati. Fl. parvi,  
albi, odori, ante florescent. nutantes.

15. *aristatum*. G. fol. (sæpe) octonis, lanceol. lævibus: panicul.  
capillari: petal. aristatis: seminibus glabris.  
*Syst. veg. ed. 14.*

Rubia &c. *Bocc. Mus. tab. 75. Barr. ic. 356. 583.*  
*In Baldo &c.*

Planta lævis. Caul. decumbent. pedal. 4-goni,  
hispidi, præcipue ad basin. Panicul. divaricata  
ex ramis axillar. alternis, internodia plerum-  
que superantibus. Rami panicul. geminati;  
ramusc. ter-quater ternati. Cor. purpurasc.  
apice seta alba. Anth. flavæ.

16. *scabrum*. G. fol. suboctonis, scabris, mucronatis: ramis  
florifer. subtrichot. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr.*  
*5. tab. 422.*

*In locis sylvaticis.*

Caulic. erecti, inferne pilis brevibus albis obfiti,  
superne glabri, nitidi, & per ramos panicu-  
lati. Fol. 7-8. in ramis pauciora, linear. pa-  
tentiss. villosa, super. minus. Pedunc. sub 2-  
fl. Cor. alba, patentiss. odora. Anth. flavæ.  
Fruct. parvi, glabri.

17. *hyerosoli-* G. fol. denis, lanceol-linearibus: umbellis fasti-  
*musanum*. giatis: fructibus glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Palestina.*

Statura proxime accedit ad *G. rubrum*.

18. *glaucum*. G. fol. verticillat-linearibus: pedunc. dichotom.  
caul. lævi. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab.*  
*81. Fl. Dan. tab. 609. Bocc. Mus. 2. tab. 116.*  
*In Austria, Helvetia &c. 24.*

Caul. debil. prostrati. Fol. sena, sed ad ramorum  
ortum etiam septena, serrata, glauca; infer.  
reflexa. Umbellæ parvæ. Cor. alba. Anth.  
luteo-virentes.

19. *purpu-* G. fol. verticillat. lineari-setac. peduncul. capil-  
*reum*. laribus fol. longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Italia, Helvetia.*

Caul. erectus, ramosiss. totus foliosus. Fol. ple-  
rumq. octona. Caul. & fl. atro-purpur. qui  
terminales, potius paniculati, purpurei, non  
fusco-rubri, ut in *G. rubro*.

20. *rubrum*. G. fol. verticillatis, linearibus, patulis: peduncul.  
breviss. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. pag. 175.*  
*In Italia &c.*

Planta pallide virescens. Caul. decumbent. palmar. ramosi, angulis subulatis, scabri. Fol. margine spinulosa; caulina octona; ramea 3-6. Pedunc. 2-fl. Fl. minimi, fusco-rubri. *Differt a G. purpureo fol. non ellipticis, neque expansis; brevitate peduncul. ac modo florendi.*

*\*\* Fructu hispido.*

21. *boreale*. G. fol. quaternis, lanceol. trinerviis, glabris: caul. erecto: feminibus hispidis. *Syst. veg. ed. 14.*

Rubia &c. *Burf. XIX. 15.*

*In Europæ pratis 24.*

Planta subaspera. Caul. ped. vix ramosus, tumescens. Fol. margine reflexo, atro-virent. nitida. Paniculæ rami 2-phylli. Fl. parvuli, albi.

22. *maritimum*. G. fol. (inferior. sæpe octonis) hispidis: pedunc. plerumq. 1-fl. fructibus villosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Aparine. Tourn. ic. 4.*

*In Oriente, Monspeli &c.*

Caul. brachiat. ramosiss. hirtus: rami ultimi dichotomi. Fol. in medio caul. 4-raro-5. floral. sæpius 2. omnia lanceol-ovata, summa subpetiolata. Fl. parvi, purpur.

23. *bermudianum*. G. fol. quaternis, linearibus obtusis: ramis ramosiss. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

Cor. & sem. atropurp. quæ hispida.

24. *græcum*. G. hirtum, fol. subsenis, linearibus, lanceol. caulibus lignosis. *Syst. veg. ed. 14. Alp. exot. tab. 166.*

*In Cretæ rupibus h.*

Caul. tortuosi. Rami recti, herbac. villis albis hirti, uti fol. pedunculi, & germina. Fol. sessil. erecta, stricta, parcius villosa. Pedunc. fol. longior. capillar. subumbell. pauciss.

25. *Aparine*. G. fol. suboctonis, lanceol. carinis scabris, retrorsum aculeat. genicul. villosis: fructibus hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 495. Black. tab. 39. hort. rom. 1. tab. 78.*

*In Europa ☉.*

Caul. ramosiss. 4. angulis retrorsum aculeatis. Fol. supra scabra, subtus glabra. Rami oppositi. Fl. parvuli, albi, vel purpur.



26. *pariense*. G. fol. verticillatis, linearibus: pedunc. 2-3-fl. fructibus hispidis. *Syl. veg. ed. 14.*

*Aparine* &c. *Rau Angl. tab. 9. f. 1.*

*In Anglia, Gallia* ☉.

Caul. debiles, pedali: 4-goni, retrorsum scabri. Fol. septena, mucronata, flavida, scabra, præsertim margine. Rami floriferi oppositi, breviores. Pedunc. nudi. Cor. parvæ, flavæ, aut atro-purpureæ. Sem. hispida.

*austriacum*. G. *Jacq. Austr. tab. 80.*

*In Austria.*

*Differt a G. glauco statura min. & caulibus 4-gonis. A G. uliginis fo potissimum fol. neutiquam retrorsum jerrat-aculeat. Simil. G. Halleri n. 751.*

Caul. basi procumb. glaberr. nitidi. Fol. num. varia 5-10. linear. aut paulo magis latefcent. cum brevi arista; plana, nitida, glabra. Fl. ultimis ramis insident, exigui, nivei. Fruct. parvi, glabri, nigricant.

*asperum*. G. fol. subseptenis, cauleq; inferne pubescentibus: paniculæ ramis strictis, dichotomis. *Schreb. Lips. Hall. Helv. 2715.*

*In locis aridis.*

Caul. debiles, basi tantum ramosi, angulati. Fol. 6-9. plerumq; 7. linear. apice paulo latiore; infer. 6. infima 5. spathulata; omnia carinata, mucrone rigido terminata. Paniculæ rami elongati, divergentes. Fl. parvi, albi.

*Paschale*. G. fol. lineari-lanceol. mucronat. glabris. *Forsk. Suppl. Æg.*

*Ad Constantinopolim.*

Fol. 4-8ra, margine retrorsum scabro. Caul. 4-gon. Pedunc. dichotom. Fruct. glabri.

*Ova paschalia Græci radic. decocto, rubro tingunt col.*

*Aparinoides*. G. fol. subsenis, cuneiformibus, obtusis cum acumine retrorsum aculeati; genicul. æqualibus. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

Facies G. *Aparines*. Fol. 4-6. non octona, glabra. Genicula non villosa. Anth. propendentes. Fruct. hispidi.

*lucidum*. G. fol. senis, rigidis, obscure virentibus: fl. e summo caule prodeuntibus. *All. Misc. Taur. Fl. Ped. T. 77. f. 2.*

*In collibus ficcis.*

Tota planta splendide viret. Ad radicem valde ramosum, sed rami eriguntur, plerumque simplices. Fol. sena, dein quina-quaterna, semiteretia. subulata, sursum incurva. Caul. herbacei, acute 4-goni. Panicula terminalis. Flos quandoque albus, fructu maior. Fructus oblongo-ovati, incurvi, rugosi, nigri.

*cinereum*. G. caul. sublignoso: fol. senis, longe ellipticis, rigidis, ferrato-aculeatis: fructibus ovatis, lævibus, albescentibus. *All. Misc. Taur. & Fl. Pedem. tab. 77. f. 4.*

*In vineis 24.*

Planta rore glauco obducta, quo deterfo lucide viret. Caul. obscure 4-goni. Fol. in fine ampliora, alba spina prædita. Rami ad angulum rectum ex caule discedunt. Panicula terminalis, ultimis pedunculis sæpe 3-fl. Sem. magna, matura rugosa. *Differt revera a G. glauco Lin.*

*tenuifolium*. G. fol. senis, subrigidis; diffuse ramosum: fl. albis e summo caule prodeuntibus. *All. Misc. Taur. Fl. Ped.*

*In collium Nicænsium dumetis 24.*

Fol. linear. nitida, sed non splendentia, leviter serrulata, cum spinula, ad ramos sæpe octona. Caul. acute 4-goni. Rami oppositi, quorum unus longior. Pedunc. 2-3-fl. Petal. magna, aristata. Sem. subrugosa, nec hispida, nigra.

*Boccone*. G. caul. anguloso: fol. senis, subasperis, aristatis. *Hall. helv. Fl. Pedem. Barr. ic. 57. bene.*

*Rubeola Bocc. mus. tab. 107.*

*In Alpium apricis saxosis 24.*

*megalospermum*. G. nanum, cauliculis erectis, ramosis: fol. quinis, ellipticis: fructibus rugosis, flore maioribus. *All. Fl. Ped. T. 39. f. 4.*

*In monte Ceniso 24.*

Cespes caulicorum, etiam digitul. longitudinis, alterne ramosorum. Fol. acuminata, serrulata, viridia. Rami ex ultimo verticillo, pe-

duncul. 2-fl. Cor. pallide lutea. Fruct. magni  
fordide albicantes.

*saccharatum*. G. *All. Fl. Ped.*

Aparine sem. coriandri &c. *Park. Theat.* 567.

*In collibus* ☉.

*Variet. Valantiæ Aparines* Lin.

145. CRUCIA-Cor. 1 petal. infundib. tubo filifor. limb. un-  
NELLA. guicul. (4 fid.) Cal. 2-phyll. Sem. 2. linear.  
Fol. verticillata.

1. *angustifolia*. C. erecta, fol. subsenis, linearibus: fl. spica-  
tis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 2. tab. 12.*

*Monspeli &c. in collibus* ☉.

Planta e viridi-ciner. Caul. erectus, dodrant.  
4-gon. Fol. acuta, erecta. Spica erecta, brac-  
teis lanceol. brevior, sed crassior sequenti.

2. *latifolia*. C. procumb. fol. (sæpe) quaternis, lanceol. fl.  
lpicatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Creta, Monspeli &c. locis arenosis* ☉.

Caul. pl. asperiusc. obsolete 4 goni. Fol. bre-  
via, patentia, obtusa, aspera, cinerea, quan-  
doq. 5 6. Spica longa, semipalm. subnutans.  
Cor. subvirescens.

3. *Ægyptiata*. C. fol. quaternis; super. sublinearibus: fl. spi-  
catis, 5-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

C. herbacea. *Forsk. Æg. monente Vahl.*

*In Ægypto* ☉.

Caul. erecto-patuli, ad radicem diffusi. Fol.  
lateribus revoluta, superne, & margine sca-  
bra: infima ovata; inter: lanceol. reliqua li-  
nearia. Spicæ latiores. Bract. lanceol. non  
carinatæ. Fl. parvuli, flavesce-albidi, aristati,  
ut in *C. maritima*.

4. *patula*. C. diffusa; fol. senis: fl. sparsis. *Syst. veg. ed.*  
*14. Læfl. it. 68.*

*In Hispania* ☉.

Rami, & fol. patentiss. Fol. linear. scabra. Fl.  
axill. Cor. lutea.

5. *maritima*. C. procumb. suffruticosa: fol. quaternis, mu-  
cronat: fl. oppositis, 5-fid. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Sabb. hort. 2. tab. 13.*

*In Creta, & Monspeli* b.

Caul. provoluti. Fol. lanceol. rigida. Bract.  
ovatæ. Cor. aristatæ, tristes, lutescent. An-  
theræ nigræ. Fl. die clausi, nocte patentes,  
ambrosiaci.

6. *monspeliaca*. C. procumb: fol. acutis; caulinis quaternis, ovatis; rameis subquinat. linearibus: fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Monspeli*, & in *Palæstina* &c. *secus arva collium*.  
 Caul. crassiusc. Rami alterni, recti, simplicior.  
 Fol. rigida. Pedunc. nudi. Spicæ simil. C. *angustifolia*.
146. RUBIA. Cor. 1-petal. campanul. Baccæ 2. coalitæ, 1-sperm. glabræ. Fol. verticillata.
1. *tinctorum*. R. caul. aculeato: fol. annuis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Sabb. hort. 1. tab. 77. Black. tab. 26.*  
*In Italia, Helvetia* &c. 24.  
 Radix magna, rubra. Caul. 2-cubital. ramossiff: angulis aculeol. recurvis; adultus subtomentos. etiam foliis. Fol. 4-5-6. lanceol. ciliata, margine, & carina aculeol. recurvis. Fl. 4-5-6-fid. luteo-virid. apice unguiculati. Bacca nigra. *Var. folior. magnitudine.*
2. *peregrina*. R. fol. perennantibus, linearibus, supra lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Europa* 24.  
 Fol. quaterna, ex nigro-virole lucentia. Cor. alba. Bacca nigra.
3. *lucida*. R. fol. perennantibus, senis, ellipticis, lucidis: caul. lævi. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Maiorca* 24.  
 Simil. priori, sed fol. margine tantum retrorsum scabra, non vero carina. Fl. paniculati, mucronati, 5-fid. albi.
4. *angustifolia*. R. fol. perennantibus, linearibus, supra scabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Minorca* 24.  
 Caul. diffusi, 4-goni, scaberr. Fol. 4-6. carina, & margine ciliata. Fl. plani, 5-fid. lutei.
5. *cordifolia*. R. fol. perennantibus, (plerumque) quaternis, cordatis. *Syst. veg. ed. 14. Ann. Ruth. 19.*  
*Pallas. it. 3. tab. L. f. 1.*  
*In Maiorca, Sibiria, China* 24.  
 Planta diffusa, scandens, tota glabra. Caul. laxi, 4-goni, angulis retrorsum scabris. Fol. unguicul. petiolat. 5-nerv. patentia, margine reflexo, supra scabra. Panicula patentiss. verticillato-subtrichotoma. Fl. subcampanul. apice unguic. pauci, patuli, albo-pallidi. Bacca rubra.

147. SIPHO- Cor. 1-petal. infundibul. tubo longiff. infera.  
NANTHUS. Baccæ 4. monosperm. (subrot.).  
1. *indica*. S. salicis fol: fl. flavescente. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ad. Petrop. 1736. tab. 13.*  
*In Amer. meridion.*  
Caul. herbac. simpl. Fol. terna, sessil. lanceol.  
Racemus terminal. erectus.
148. CATES- C. 1-petal. infundibul. longiff. supera. Stam.  
BÆA. intra faucem. Bacca (oval.) polysperma.  
1. *spinosa*. C. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. carol. 2. tab. 100.*  
*In Provincia h.*  
Arb. 12-14-ped. Fol. fasciculata, Buxi min.  
Spinæ axill. Fl. 6-pollic. penduli, lutei, 4-  
fid. Bacca ovi Gallinac. magnitudine, lutea.
149. IXORA. Cor. 1-petal. infundibulif. (tubo tenui, longiff.)  
supera. Stam. intra faucem. Bacca (subrot.)  
4-sper.  
1. *coccinea*. I. fol. semiamplexicaul. ovalibus: fl. fasciculat. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 59. f. 2. mant.*  
*tab. 364. f. 1. Hort. mal. 2. tab. 13.*  
Jasminum &c. *Burm. Zeyl. tab. 57.*  
*In India h.*  
Altitudo humana. Frutex parum ramosus, caul.  
rubro. Fol. opposita, glabra, integerr. supra  
intense virid. subtus dilutiora. Stipul. inter  
fol. solitariae, acumin. ut in Coffea. Fl. longe  
peduncul. holosericeae, coccineae. Baccæ  
Cerasis proximæ.
2. *alba*. I. fol. ovat-lanceol. fl. fasciculatis. *Syst. veg. ed.*  
*14. Pluk. alm. tab. 109. f. 2. Hort. mal. 2.*  
*tab. 14.*  
*In India h.*  
Differt fol. latioribus obtusis, & acuminat. Fl.  
albidi.
3. *americana*. I. fol. ternis, lanceol-ovat. fl. thyrsoides. *Syst.*  
*veg. ed. 14.*  
Pavetta &c. *Brown. Jam. tab. 6. f. 2.*  
*In Jamaica h.*  
Planta fruticosa, ramis subnodosis. Fol. longe  
petiol. integerr. venosa. Stipul. axill. solitar.  
Fl. laxi, patent. Cor. 4-fida.
- alternifolia*. I. fol. alternis. *Jacq. Amer. tab. 177. f. 8. ed.*  
*picla tab. 16. Plum. sp. ic. 137. f. 1.*  
*In Martinicæ sylvaticis h.*

Arbuse. 12-20-ped. erecta, ramosa. Fol. petiol. ovat-lanc. acuta, integerr. nitida. Pedunc. axill. breviss. multiss. Cor. alba.

150. PAVET-TA. Cor. 1-petal. infundibul. supera. Stigm. curvum. Bacca 2-sperma.

1. *indica*. P. fol. elliptic. umbell. terminalibus, fasciculatis; cal. brevi, acuto. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 13. f. 3. Pluk. alm. tab. 147. f. 1. Rumph. amb. 4. tab. 47. Hort. mal. 5. tab. 10. In India h.*

Frutex 3-8-ped. ramulis in orbem diffusis. Fol. opposita, petiolat. crassa, mollia, viridia, supra nitida, odore gravi. Corymb. fastigiati, trichotomi, peduncul. longo, hliform. infidentes. Fl. parvi, candidi, 4-fidi, odori. Stigm. oblongum, 2-fid. Baccæ e viridi-fusæ.

2. *cuffra*. P. fol. ovat. integerr. capitul. terminalibus, sessilibus: calycibus setaceis, longitudine tubi. *Syst. veg. ed. 14:*

*Ad cap. b. Spei h.*

Arb. glabra, ramis teretibus. Fol. opposita, petiolat. venosa. Receptac. pilosum. Cor. limbo regul. laciniis lanceol. Fl. in planta sicca nigri.

151. PETE-SIA. Cor. 1-petal. infundibul. Stigma 2-fid. Bacca (globosa), polysperma.

1. *stipularis*. P. fol. lanceol-ovat. subtus tomentosus: thyrsis lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 2. f. 2.*

*In Jamaica h.*

Frutex. Fol. opposita, integerr. Stipul. rigidæ. Racemi axill. brachiati, fol. breviores.

2. *Lygistum*. P. fol. ovat. nudis, lineatis: caul. flexuoso. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 3. f. 2.*

*In Jamaica h.*

Frutex caul. lævi. Fol. petiolat. opposita, acuta. Pedunc. axill. sæpius gemini, 1-fl.

152. MIT-CHELLA. Cor. 1-petalæ, binæ eidem germi, superæ. Stigm. 4. Bacca 2-fid. 4-sperma.

1. *repens*. M. *Syst. veg. ed. 14.*

Syringa &c. *Pluk. amalt. tab. 444. f. 2. Catesb. carol. 1. tab. 20.*

Baccifera &c. *Pet. gaz. tab. 1. f. 13.*

*In Carolina, Virginia &c. h.*

Fol.

Fol. subovata. Fl. gemelli, albi. Cor. tubus. longus, angustus, limbo expanso, laciniis acutis, intus villosis. Baccæ globosæ, molles.

153. **CALLICARPA**. Cal. (campanul.) 4-fid. Cor. (tubulosa) 4-fid. Baccæ (globosæ) 4-sperma.

1. *americana*. C. fol. ferratis, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.* Burchardia. *Du-Hamel. Arb. 1. tab. 44.*

*Anonymus &c. Pluk. alm. tab. 136. f. 3.*

*Frutex &c. Catesb. carol. 2. tab. 47.*

*In Java h.*

Altitudo humana. Frutex ramis compressiusculis, albidis, tomentosis. Fol. opposita, petiolat. ovar. lanc. supra nervosa. Panicul. axill. dichotomæ, tomentosæ; bract. minutis, subulatis, ad singulam dichotomiam oppositis. Baccæ rubræ.

2. *tomentosa*. C. fol. integerr. lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India h.*

Arb. singularis, & sine pari tota tomentosa.

Fol. opposita, petiol. ovata, acuminata, coriacea, rugosa, nuda, magnitudine manus.

Pedunc. axill. solitarii, dichotomi, divaricati.

3. *japonica*. C. fol. ferratis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

Caul. erect. fruticos. glaber. Rami oppositi, divaricati, purpur. Fol. 2-pollic. opposita, breviter petiol. oblonga, acuminata; basi, & apice integra, nervosa, supra virid. subtus pallida. Fl. axill. paniculati, minimi. Panicula trichotoma. Bract. linear. Pedunc. semipollic. pedicellis breviss. Cor. alba.

*integrifolia*. C. fol. integerrim. subtus lævissime tomentosis. *Jacq. amer. tab. 173. f. 7. ed. 2. picta tab. 259. f. 6.*

*In sylvaticis Cartagenæ h.*

Arb. 12-ped. inordinatim ramosa. Fol. 2-3-pollic. opposita, petiolat. oblongo-ovata, odore subaromatico. Racemi axill. & terminal. compositi, densi, incani. Fl. numerosi, albi, odorati. Baccæ nitidæ, virides, ad basin flavæ, Pisiform.

154. **AQUARTIA**. Cal. campanul. Cor. rotata, laciniis linearibus. Baccæ globosæ, polysperma.

308 TETRANDRIA MONOGYNIA.

1. *aculeata*. A. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Amer. tab. 12. ed. 2, pida tab. 15.

In Amer. Merid. h.

Frutex 4-ped. ramosus, habitu accedens ad *Solanum incanum*. Rami seniores aculeati, aculeis brevibus, subulatis. Fol. pollic. alterna, periolat. subovata, integerr. vel repanda, tomentosa, incana. Pedunc. lateral. breviss. 1-fl. Cor. candida. Bacca Pisi magnitudine, flava, nitens.

155. POLYPREMUM. Cal. 4-phyll. Cor. 4-fida, rotata, lobis obcordatis. Caps. compressa, emargin. 2-locul.

1. *procumbens*. P. Syst. veg. ed. 14.

Linum &c. Pet. gaz. tab. 5. f. 6.

In Carolina, Virginia ☉.

Caul. procumb. dichotom. Fl. solitarii, sessil. in ramificationibus. Calyx intus coloratus. Caps. ovata.

156. PENÆA. Cal. 2-phyll. Cor. campanul. (4-fida). Syl. 4-angul. Caps. 4-gona, 4-locul. 8 sperma.

1. *Sarcocolla*. P. fol. ovatis, plantis: calycibus ciliatis, folio maioribus. Syst. veg. ed. 14.

Tithymali &c. Pluk. mant. tab. 44.

In Æthiopia h.

Arbascula. Caul. dichotom. Fol. opposita, crassa, cbrutiosc. Fr. 4-5. Cal. intermedio flori nullus. Cor. obtrusa, limbo rubicundo. Syl. magis subulatus quam in reliquis.

2. *macronata*. P. fol. cordatis, acuminat. Syst. veg. ed. 14.

In Æthiopia h.

Caul. fruticosus, ped. Fol. opposita, sessilia, patientia. Fl. congesti, rubri.

3. *marginata*. P. fol. cordatis, marginatis: fl. lateralibus. Syst. veg. ed. 14.

Ad capitis b. Spei fluvius h.

Frutex stratus, ramis sæpius ternis. Fol. opposita, seu terna, subsessil. obtusiusc. nitida, magnitudine Buxi. Fl. inter folia, subsessil. foliis non longiores, a bi.

4. *furcata*. P. fol. rhombeo-ovat. bract. cuneatis, acutis, coloratis. Syst. veg. ed. 14.

In cap. b. Spei montibus h.

Frutex ramosiss. ramis teretibus; ramulis angulatis. Fol. opposita, patula, acuta, lævia. Fl. terminal. fasciculati, purpur. Bract. purpur.



5. *squamosa*. P. fol. rhombéo-cuneiformibus, carnosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Æthiopia* h.  
 Bractææ spicæ fol. duplo latiores, ciliatæ, resinoso-unctuosæ. Cor. maiusc.
6. *fruticulosa*. P. fol. oblongiusc. obtusis: bract. orbiculat. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei* h.  
 Fruticul. ramis decorticandis teretibus. Fol. opposita, subpetiolat. crassiusc. avenia, remota: Fl. in apice ramorum subsolitarii, brevissime pedunculati, acutiusculi.
7. *Myrtoides*. P. fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei* h.  
 Rami erecti, teretes, rubri. Fol. conferta, opposita, sessil., lævia, Myrti Tarentinæ, subtus vix nervosa. Fl. terminal. subsolitar. cincti bracteis viridibus, acutis, sub quibus foliola 2. parva. Cal. acutus, virid. non coloratus.
8. *lateriflora*. P. fol. ovatis: fl. lateralibus, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Linn. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei* h.  
 Caul. rubent. ramis elongatis. Fol. opposita, sessil. acutiusc. integerr. lævia, sub basi fere carinata, interstitiis longiora. Fl. sessil. lutei, longitudine fol. Cor. laciniis lanceol. triquetris, seu introrsum carinatis, carina basi ex-cisa.
- 
- tetragona*. P. fol. rhombeis, quadrifariam imbricat. patentibus: tubis fl. longis; foliol. calycin. obovat. ciliatis. *Berg. Fl. cap.*  
*Ad cap. b. Spei* h.  
 Caul. fruticos. vix ped. 4-gon. superne ramosus. Rami simpl. umbellati, foliosi. Fol. sessil. firma, crassa. Fl. aggregati. Cor. purpur.
157. **BLÆRIA**. Cal. 4-part. (potens). Cor. 4-loba. Stam. receptac. inserta. Caps. (4-gona) 4-locul. polysperma. *Differt ab Erica solum antheris bicornibus.*
1. *ericoides*. B. fl. capitatis; cor. campanulat. *Syst. veg. ed. 14. Erica &c. Pet. gaz. tab. 2. f. 10.*  
*Ad cap. b. Spei* h.  
 Planta fruticosa, ramosiss. statura *Ericæ vulg.*  
 Fol. quaterna, ovat-oblon. adpressa, gibba,  
 V ij

- piloso-scabra, longitudine internodiorum caulis. Fl. terminal. albo-purpureasc. Cor. erecta.
2. *ciliaris*. B. fl. capitatis; calycibus ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Similis priori tota sua statura. Dignoscitur calycibus aibis, distincte ciliatis; staminibus inclusis.
3. *articulata*. B. staminibus exsertis, 2-part. cor. cylindricis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Penica Sarcololla. Berg. cap.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
*Differt a B. ericoide, quæ cor. campanulat. staminibus aequalibus, fol. magis imbricatis: a B. pusilla, quæ calyc. glabris; cor. infundibulif.*  
 Fruticul. dilortus, statura *Ericæ vulg.* Fol. quaternaria, ovata, adpressa, ramis longitudine internodiorum, ovata, scabra. Capitula terminal. calyc. albo-villosis. Cor. incarnatæ. Anth. exsertæ, angustiss. 2-part. nigrae.
4. *purpurea*. B. staminibus inclusis, 2-part. cor. oblong. rectis: fl. terminalibus, aggregat. peduncul. erect. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Simil. B. articulatae; at in illa capitula cernua.
5. *pusilla*. B. fl. sparsis: cor. infundibulif. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Statura *Ericæ min.* Rami pubescent. Fol. quaternaria, petiolat. linear. scabra, subtus lineæ exarata. Fl. minuti, fol. breviores. *Caute ab Ericis distinguenda.*
158. BUDDLEJA. Cal. 4-fid. Cor. 4-fid. Stam. ex incisuris. Caps. (oblong.) 2-fulca, 2-locul. polysperma.
1. *americana*. B. fol. ovat. ferratis, opposit. fl. racemoso-spicatis; caul. fruticoso.  
 B. fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Verbasci &c. Sloan. Jam. 1. hist. 2. tab. 173. f. 1.*  
*In Caribæis ad ripas, & torrentes h.*  
 Caul. fruticos. tomentosus. Fol. *Verbasci* æmula. Racemi terminal. oppositi, recti. Cor. lutea.
2. *occidentalis*. B. fol. lanceol. acuminat. oppositis, integert. spicis interruptis.  
 B. fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Ophioxylum &c. Pluk. alm. tab. 210. f. 1.*  
*In America h.*  
 Fol. subtus lanuginosa.

3. *virgata* B. fol. linear-oblong. obtusis, integris: racemis terminalibus, ramis virgatis, erectis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Habitus *Hyssopi*. Rami, & fol. subtiliore tomento cana.
4. *incompta* B. fol. fasciculat. ovaris, canis; ramis flexuosis, rigidis: racemis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei h.*
159. EXACUM,  
 1. *albens* E. fol. subdecurrentibus: staminibus exsertis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Afr. tab. 74. f. 4. Pluk. alm. tab. 343. f. 3.*  
*In India ☉.*  
 Caul. palm. herbac. dichotomus, 4-gon. lævis. Fol. oleracea, cordata, lævia. Cor. alba. *Adfinc Gentianis.*
2. *aureum* E. fol. sessilibus: staminibus exsertis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pluk. alm. tab. 275. f. 3. bona.*  
*Ad cap. b. Spei ☉.*  
 Habitus *Gentianæ Cent.* Caul. palm. brachiat. dichotomus, sub 4-gon. lævis. Fol. opposita, infer. & super. lanceol.
3. *cordatum* E. fl. 5-fid. calyc. foliol. cordatis, striatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Afr. tab. 74. f. 3. Seb. mus. 1. tab. 22. f. 7.*  
*Centaurium &c. Pluk. alm. tab. 275. f. 4.*  
*In Asia, & Africa ☉.*  
 Caul. erectus, spitham. simpl. dichotom. 4-gon. lævis. Fol. opposita, sessil. ovata, integerr. Fl. ex divaricat. caulis, solitarii, fol. maiores. Cor. lutea.
4. *punctatum* E. fol. breviss. petiolat. oblong. trinerviis, punctatis: staminibus exsertis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In India.*  
 Maior prioribus. Fol. glandulosa, ut in *Hyperico*, punctata. Cor. cœrul. Stam. lutea.
- Guianense* E. fol. connatis, oblong. acutis: fl. purpureo-scent. *Aubl. Guian. tab. 26. f. 1.*  
*In Guiana ☉, V iij*

312 TETRANDRIA MONOGYNIA.

Caul. ped. ramis, & ramulis oppositis. Fol. opposita, integerr. glauca. Fl. axill. solitar. Cor. lacin. subrotund. undulatis.

*renuifolium*. B. fol. linearibus: fl. violaceis. *Aubl. Guian. tab. 25. f. 2.*

*In Caienna, & Guiana* ☉.

*Differt a priore caul. tenuiore: fol. minimis, angustiss: fl. min: cor. violac. laciniis acutis.*

*Ad hoc genus spectat Coutoubea ramosa, & spicata Aublet Guian. T. 27. 28.*

160. PLAN- Cal. 4-fid. Cor. 4-fid. limbo reflexo. Stam. long-  
TAGO. giss. Caps. ovat. 2-locul. circumscissa.

*Appendices parva, membranacea, ovat-lanceol. in apice, ut plurimum leviter, 2-fid. unicuique anth. subiectæ.*

\* *Scapo nudo.*

1. *maior*. P. fol. ovat. glabris: scap. tereti: spica floscul. imbricatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 461. Gmel. Sib. 1. tab. 35. 36. Black. tab. 35.*

*In Europa, & Japonia ad vias* 24.

Fol. spitham. 7-nervia, integerr. late virent. Spica cylindrica. Bract. lanceol. Fl. parvuli, herbidi, anth. albis.

1. *var. fol. dentat.*

2. . . . *minor.*

3. . . . *spica 2-multifida.*

4. . . . *rosea, fl. quasi in spicam dispositis.*

5. . . . *rosea, fl. expanso.*

2. *Asiatica*. P. fol. ovat. glabris: scap. angulato: spica floscul. distinctis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. tab. 37.*

*In China, Sibiria.*

*Simillima priori; at differt spica longiore: fl. distantibus; fol. sæpius basi subdentat: scap. angulato.*

3. *media*. P. fol. ovat-lanceol. pubesc. spica cylindrica: scap-tereti. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 381.*

*In Europæ pascuis apricis, argillofis* 24.

Fol. in rosulam sparsa, integerr. pallida. Calyc. glabri. Filam. purpureæ. *Var. spicis multis. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 15. f. 7.*

4. *virginica*. P. fol. lanceol-ovat. pubesc. subdenticul. spicis

floribus remotis: scap. tereti. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 15. f. 8. Pet. gar. 1. tab. 1. f. 10.*

*In Virginia* ☉.

Fol. 3-4-unc. obtusa, semitrinervia. Spica palmar. Flos in Amer. cor. explicat, & Stam. exsert, in Europa vero vix.

5. *altissima*. P. fol. lanceol. 5-nerviis, dentat. glabris: spica oblong. cylindrica: scap. angulato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. obs. 4. tab. 83.*

*In Italia* ☿.

Scap. 2-3-ped. scaber. Fol. 1-fesquiped: obtuse dentata, dentibus remotis, crassa, glabra. Spica cylindr. vix fesquipollic. glabra.

6. *lanceolata*. P. fol. lanceol: spica subovata, nuda: scapo angulato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 487. Black. tab. 14.*

*In Europa campis sterilibus* ☿.

Planta multifloris. Fol. petiolat. rariter dentata, nervosi, duriora, glabri, obscure virent. Cor. fusco-albida. Stam. albida.

1. *Var. minor, & humilior.*

2. . . . *trinervia, fol. angustiss. Ger. Prov. tab. 12.*

3. . . . *hirsuta.*

4. . . . *alpina, scap. lanugin. capitula nigro.*

5. . . . *spica 2-3-multifida.*

6. . . . *caulis summitate foliosa.*

7. *Lagopus*. P. fol. lanceol. subdenticul: spica ovata, hirsuta: scapo tereti. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 16. f. 13. Rauw. it. 4. tab. 6.*

*In Gallia Narbon. Hispania &c.* ☉.

Fol. subtrus pubesc. apice, denticul. sq. obsoletis, fusca.

8. *lusitanica*. P. fol. lato-lanc. trinerviis, subdent. subpilosis: spica oblong. hirsuta: scapo angulato. *Syst. veg. ed. 14. Barr. rar. tab. 745.*

*In Hispania* ☿.

Fol. palmar. erecta, latiora quam in *P. media*: Scap. foliis longior. subhispidi, 5-fuscat. Spica *P. Lagopi*, sed oblong. bract. breviter hirsutis. Cor. alba, stria flavescente. Stam. alba. Styl. elongatus, pubescens, albus.

9. *albicans*. P. fol. lanceol. obliquis, villosis: spica erecta, cylindr: scap. tereti. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. p. 110.*

# 314 TETRANDRIA MONOGYNIA:

- P. cylindrica*. Forsk. *Æg. monente Vahl*.  
*In Hispaniæ, & Narbonæ aridis &c.* ☉.  
 Caul. palmar. Fol. tomentosa. Spica conferta.
10. *alpina*. *P. fol. linearibus, planis: scap. tereti, hirsuto: spica (florente ovata; fructif. cylindrica, erecta).* *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 125. Hort. rom. 2. tab. 7.*  
*In Helvetiæ, Austriæ alpinis* 24.  
 Fol. sæpius integerr. subtus convexa, nitida. Spica ante anthescentiam cernua. Cor. lat. in. nigra. *Var. spicis ramosis. Zann. tab. 140.*
11. *cretica*. *P. fol. linearibus: scap. breviss. tereti, lanato: spica subrot. nutante.* *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. p. 11.*  
*In Creta.*  
 Fol. ped. villosa. Pedunc. lignosi, recurvi, villosi.
12. *maritima*. *P. fol. semicylindr. (sæpius) integerr. basi lanatis: scapo tereti.* *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 243.*  
*In litoribus maritimis Europ. Amer. boreal. 24.*  
 Scap. 6-unc. Fol. cespitosa, linearia, glauca, subtus trinervia. Spica cylindr. Cor. herbida. Anth. luteæ.
13. *incurvata*. *P. fol. lineari-subulat. canaliculat. recurvatis, denticulat. punctatis: scapo tereti.* *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1780. tab. 6.*
14. *subulata*. *P. fol. subulat. triquetris, striatis, scabris: scap. tereti.* *Syst. veg. ed. 14.*  
*Serpentina &c. Lob. ic. 439.*  
*In maritimis arenosis Mediterranei* 24.  
 Scap. fol. longior, non glaber. Fol. conferta. Spica ovato-oblonga, non villosa.
15. *ferraria*. *P. fol. lanceol. 5-nerviis, dentato ferratis: Scap. tereti.* *Syst. veg. ed. 14. Barr. ic. 749. Col. ephr. 1. tab. 239. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 16. f. 19.*  
*In Apulia, Mauritania* 24.  
 Fol. subpetiol. striata, subpubescentia. Scap. pubesc.
16. *coronopus*. *P. fol. linearibus, dentatis: scap. tereti.* *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 272. Dod. pempt. 109.*  
*b. Black. tab. 460.*  
*In Europa glareosis* ☉.

Scap. dodrant. subhirsut. Fol. longa, ex petiol. latefcente semipinn. vel solum dentata, subhirsuta. Spica cylindric. Squamæ ovatae, albæ.

*b. in montibus saxosis.* Scap. erectus, 3-unc. Fol. uncial. integra, vel subdent. pilosiss. Spica cylindrica, hirta, canescens, semiunc.

17. *Læstingii.* P. fol. linearibus, subdent. Scap. tereti: spica ovata: bract. catinatis, membranaceis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 126. Pet. herb. 3. tab. 9.*

*In Hispaniæ collibus &c. ☉.*

Differt a priore, quod sit minor, & ut in definitione.

18. *Cornuti.* P. fol. pinnatis, pinnis inæqualibus, & distantibus: scapo tereti; stylis longiss. filament. breviss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Misc. 2. Ic. rar.*

*Habitas . . . . .*

Fol. radical. multa, humifusa, acuta, pilis molibus ciliata, semipedal. costa canaliculata. Pinnæ sessil. inordinato situ egressæ, linear. acutæ, integerr. vel rariter incisæ. Scap. pl. adscendentes, dense villosi, longitudine fol. Spica 3-unc. linear. aphylla, erecta, teres, gracilis, bracteata. Petal. albida.

*\*\* Caule ramoso.*

19. *Psyllium.* P. caul. ramoso, herbaceo: fol. subdent. recurvatis: capitulis aphyllis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 412. Ludw. ed. tab. 44. Sabb. hort. 2. tab. 10. Psillio Maith.*

*Inter segetes Europæ australis ☉.*

Caul. erecti, villosi. Fol. infer. opposita, super. terna-quaterna, linear. villosa-viscida, latiora P. *Cynops.* Pedunc. fol. longiores. Capitul. bract. & calycin. foliol. prædita.

20. *squarrosa.* P. herbacea, caulibus diffusis, decumbentibus, ramosis: fol. linearibus, integerr. capitatis, squarrosis. *Syst. veg. ed. 14. Com. Gotting. 1781. tab. 3.*

P. *Ægyptiaca.* *Jacq. Misc. 3.*

*In Ægypto.*

21. *indica.* P. caul. ramoso, herbac. fol. integerr. reflexis, ciliatis: capitul. foliosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Ægypto, & circa Astracan ☉.*

- Caul. erectus, pilis albis. Fol. superior. ternæ. Pedunc. axill. Spica subovata, basi cincta foliol. 4, inæqualibus, spica longioribus. Calyc. foliol. 2. infer. spatulata, obtusiss. valde gibba, intus concava.
22. *pumila*. P. caul. ramoso, herbac. fol. integerr. subulat. carnosus: ramis lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
P. exigua. *Comm. Gott. 1778. tab. 5.*  
*In India Orient.*  
Similis P. *indica*. Caul. spitham. varie flexus. Fol. opposita, super. ternæ-quaterna, patentiss. apice reflexo, pubesc. vel ciliata.
23. *Cynops*. P. caul. suffrutic. ramoso: fol. filiformibus, strictis, integerr: capitul. subfoliatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
Ptyllium &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 17. f. 1.*  
*In Italia, Gallo-provincia &c. collibus siccis h.*  
Caul. repens, palmar. purpurasc. durus. Fol. opposita, canalicul-trigona, erecta, subvillosa. Pedunc. axillar. Bract. inter floscul. ovatæ, concavæ.
24. *asra*. P. caul. frutic. ramoso: fol. lanceol. dentatis: capitul. aphyllis. *Syst. veg. ed. 14.*  
Ptyllium &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 19. f. 4.*  
*Bocc. sic. 8. tab. 7. f. B.*  
*In Sicilia, Barbaria h.*  
Caul. erect. ped. pubescens. Fol. subvillosa, striata. Spicæ pl. ad apices ramorum.
- Columna*. P. fol. 2-pinnat. basi lanatis; foliol. confluentibus, summis auriculat: scap. tereti. *Govan. Illust.*  
*In montibus.*  
Scapi pl. sub 2-unc. alii erecti, alii deflexi. Fol. hirta, variabilia, quandoq. pinnata more Scabiosarum; in junioribus tantum pinnata, pinnula terminal. 3-fid. Spica semunc. cylindr. canescens, subglabra.
- Ceranti Gouan.* P. fol. ovat. integerr. carnosus, pustulatis, basi lanatis. *Govan. Illust.*  
21.  
Proxima P. *maiori, sed triplo mai: salsa, carnosissima, glauca*. Fol. petiol. longis, basi villosis, 7-nervia, glaberrima. Scapi 2-ped. rubentes, vix ad basin villosi, Spica longiusc. glaberr.



- ovata*. P. fol. linearibus, utrimq. hirsutis: scapis erectis, hirsutis: spicis ovato-oblongis: cor. ovatis. *Forsk. Æg.*  
*In Ægypto.*  
 Spicæ vix pollic. Fl. conferti. Cor. latissima, cordato-acuta.
- crassifolia*. P. fol. carnosis, semiteretibus, linearibus, ciliatis, basi nudis. *Forsk. Æg.*  
*Alexandriæ.*  
 Vix differt a *P. maritima*, nisi fol. basi nudis. Scapi teretes, villis adpressis. Spicæ 2-pollic. cylindricæ.
- Bellardi*. P. pubescens, fol. sublinearibus, planis, petiolat: scapo tereti, foliorum longitudine: spicis cylindricis. *All. Fl. Ped. tab. 85. f. 3.*  
*In locis sterilibus* ☉.  
 Fol. radicalia, petiolata, subtus tribus nervis percurta. Scapi 3-4. erecti 2-4-unc. Spicæ primum ovatæ, & compactæ, dein cylindricæ. Bractæ lanceol. Cor. flavescent.
- Serpentina*. P. *All. Fl. Ped.*  
 P. gramineo fol. *Tourn. inst.*  
*Ad montium radices, locis sabulosis, & aridis* 24.
161. SCOPARIA.  
*RIA*. Cal. 4-part. Cor. 4-part. rotata, (concava). Caps. oblong. 1-locul. 2-valv. polysperma.
1. *dulcis*. S. fol. (summis) ternis: fl. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Veronica* &c. *Herm. Par. tab. 241. Sloan. Jav. 1. tab. 108. f. 2.*  
*Phytænoides* &c. *Pluk. aln. tab. 215. f. 1.*  
*Scoparia ternata. Forsk. Æg. monente Vahl.*  
*In Jamaica, Curaçao* ☉.  
 Caul. erect. 3-ped. ramosiss. angularis. Fol. in petiolum attenuata, oblonga, acuta, ferrata; inferiora opposita. Pedunc. axill. 1-fl. Cor. alba.
2. *procumbens*. S. fol. quaternis: fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Amer. calidiore* ☉.  
 Vix semiped. Habitus prioris, sed caul. procumbens erecti, dichotomi. Fol. parva, subulata, acuminat. Fl. parvi, albi.
3. *arborea*. S. fol. alternis, lanceol. integerr. corymbo supradecomposito, trichotomo. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei* 1.

Habitus facie *Olea*, seu *Phyllirææ*. Inflorescentia maxima, & summe composita. Fl. parvi.

162. SKIMMIA. Cal. 4-part. Pet. 4. concava. Bacca 4-sperma.

1. *japonica*. S. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Fl. Jap.*

Mijama skimmi. *Kamph. am. exot. p. 779.*

*In Japonia* h.

Caul. erectus, fruticos. glaber. Rami alterni, sub 4-goni. Fol. in apice ramorum digitalia, alterna, petiolat. frequentia, oblonga, undulata, integerr. sed apicem versus obsoletere crenata, erecta, margine reflexo, supra viridia, rugosa, subtus pallida, punctata, sempervirentia, sapore aromatico. Fl. terminal. paniculati. Cor. alba. Bacca magnitudine Pisi, rubra, intus farinacea, pulposa, alba.

163. RHACOMA. Cal. 4-part. Cor. 4-part. Caps. (subrotunda) 1-locul. 1-sperma.

1. *Crossopetalum*. R. *Syst. veg. ed. 14.*

*Crossopetalum*. *Brown. Jam. tab. 17. f. 1.*

*In Jamaica* h.

Suffrutex ramis dichotom. pubescentibus. Fol. opposita, subpetiol. ovata, mucronata, tenuissime acute ferrata, subpubesc. Pedunc. axillar. filiform. pilosi. Umbella composita, 2-4-chotoma. Pedicelli capillar. Involuc. minima.

164. OTHE- Cal. 4-part. Petala 4. ovata, plana. Stigma  
RA. sessile. Capsula?

1. *japonica*. O. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia* h.

Caul. fruticosus. Rami teretes, striati, purpur. Fol. sesquipollic. alterna, petiolat. ovata, obtusa, patentia, coriacea, integra, glabra. Fl. axillar. aggregati, pedunculat. Cor. alba.

165. ORIXA. Cal. 4-part. Petala 4. lanceol. plana. Stigma capitatum. Capsula?

1. *japonica*. O. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia* h.

Caul. erectus, orgyal. frutescens, flexuosus, ramosus. Rami alterni, glabri, ultimi villosi. Fol. semipollic. alterna, petiolat. ovata; integra, supra viridia, subtus pallida, villosa, præcipue iuniora. Fl. racemosi, racemis pollicar. alternis. Cor. virescens. Bract. sub pedicellis concavæ. Pedunc. & pedicelli villosi.

166. CEN- Cal. 4-fid. (patens). Cor. rotata, 4-fid. Stam.  
TUNCULUS. brevis. Capf. rotund. 1-locul. circumscilla.

1. *minimus*. C. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 177. *optima*.

Ephem. cur. Cent. VI. tab. 10. f. 31.

Anagallidiastrum &c. Mich. gen. tab. 18.

Anagallis &c. Vaill. parif. tab. 4. f. 2.

Alline &c. Mentz. tab. 4. f. 5.

In Italia &c. arenosis subudis ☉.

Caul. procumb. uncial. herbaceus, ramosus. Fol.  
alterna, parva, simplicia, lanceol. caulina  
interiora opposita, sessilia, serpyllifolia. Flos  
axill. sessilis, albus, fugax, vix conspicuus.

167. SANGUISORBA. Cal. (brevis) 2-phyll. (Cor. 4-part.  
plana). Germen inter cal. & cor. Fruct. 2-  
locul. Fol. impari-pinn. Fl. spicati.

1. *officinalis*. S. spicis ovatis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab.  
97. Ludw. ed. tab. 94. Sabb. hort. rom. 2. tab. 70.

In Europa pratis siccis 24.

Planta glabra. Caul. 3-pedal. herbac. subramosus.  
Fol. petiolat. Foliol. ad 6-iuga, cordato-ova-  
ta, acute ferrata, firma, sicca. Pet. iuniora  
alba; adulta col. sanguinei obscuri.

2. *media*. S. spicis cylindricis. Syst. veg. ed. 14. Zan. tab.  
138. Morif. hist. 3. f. 8. tab. 18. f. 2.

In Canada 24.

Spicæ, & stam. longiora quam in priore.

3. *canadensis*. S. spicis longissimis. Syst. veg. ed. 14. Zann. tab.  
137. Knorr. del. hort. 1. tab. P. 5. Morif. hist.  
3. f. 8. tab. 18. f. 12. Barr. rar. tab. 739.

In Canada, Sibiria 24.

Caul. 4-ped. Fol. lata basi amplexicaul. glabra.  
Fl. pulli.

*auriculata*. S. Scop. Fl. Carn. ed. 2.

Pimpinella &c. Bocc. Mus. tab. 7.

In Carniola &c. 24.

Ad Poterii genus spectat.

Caul. 2-ped. ramosus, glaber. Fol. oblong. den-  
tata, glabra, supra nitida, subtus pallidiora.  
Ad basin petioli fol. sessile, ovatum, denticu-  
lat. Spicæ cylindricæ, rubræ.

168. CISSUS. Bacca (rotunda) 1-sperm. cincta calyc. corollaq.  
4-part. (Sem. osseum).

Sp. omnes Sælanthi Forsk. huc pertinent, monente  
Vahl.

320 TETRANDRIA MONOGYNIA.

1. *vitiginea*. C. fol. cordatis, sub 5-lobis, tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Arbustula &c. Pluk. mant. tab. 337. f. 2.*  
*In India h.*  
*Arbust. habitu Vitis. Fol. alterna, petiolat. Caul. tomentosus. Umbel. axillar. prolifera. Bacca nitens, argentea.*
2. *cordifolia*. C. fol. cordatis, integerr. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Sahelanthus rotundifol. Forsk. ic. rerum natural. tab. 4.*  
*Vitis &c. Plum. Amer. ic. 159. f. 3.*  
*In America 24.*  
*Fol. cordato-orbiculata. Racemi corymbosi.*
3. *Sicyoides*. C. fol. subcordat. nudis, setaceo-ferratis: ramulis teretibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Amer. tab. 15. ed. 2. pica tab. 20.*  
*Vitis &c. Plum. ic. 259. f. 2.*  
*Funis crepitans. Rumph. amb. 5. tab. 164. f. 1.*  
*Schunumpi-vali. Hort. Mal. 7. tab. 11.*  
*Irtiola &c. Burw. Jam. tab. 4. f. 1. 2.*  
*Bryonia &c. Sloan. Jam. tab. 144. f. 1.*  
*In Jamaica 24.*  
*Habitus singularis, scandens. Caul. lignosi. Fol. 3-4-pollic-semiped. alterna, petiol. subdisticha, nitida. Umbellæ lateral. compositæ, alternæ. Involuc. minimum, multidentat. Fl. multi, parvi, inodori, rubri, flavi, virides. Baccæ Pisi magnitudine, succulentæ, nigræ, nitidæ.*
4. *quadrangulalis*. C. fol. (cordatis) carnosis, ferrato-dentat. caul. 4-pono, tumidiusc. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Sacanthus tetragonus. Forsk. ic. rerum &c. tab. 3.*  
*Funis quadrangular. Rumph. amb. 5. tab. 44. f. 2.*  
*In Arabia, India 24.*  
*Radix tuberosa. Caul. scandens, longiss. carnosus, lævis, perennis. Fol. alterna, petiolat. subhastata, argute, remoteq. serrata, utrimque glabra. Cirrhi oppositifolii.*
5. *acida*. C. fol. ternatis, obovatis, incisif, carnosis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Bryonia &c. Rumph. amb. 5. tab. 66. f. 2. Sloan. Jam. 1. tab. 142. f. 6.*  
*Bryonioides &c. Pluk. alm. tab. 152. f. 2.*  
*Vitis &c. Plum. sp. tab. 259. f. 5.*  
*In America 24.*  
*Caul. scandens, lignosus, ramosiss. cirrhifer. Fol.*

**TETRANDRIA MONOGYNIA. 321**

alterna. Foliol. acuta, glabra. Umbellulæ ut in *C. Sycioide*.

6. *trifoliata*. *C.* fol. ternatis, subrotundis, subdent. hirsutis: ramis membranaceo-angulatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Amer. tab. 182. f. 10. ed. 2. pinda tab. 259. f. 8.*

*Bryonia* &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 144. f. 2. In Jamaica 24.*

Scandit, superatque altiss. arboresc. Caul. lignosi, cirriferi. Fol. alterna: foliol. acuta; medium ovatum; lateral. femicordata, latere interno ad basin oblitterato. Umbell. & fl. ut in *C. Sycioide*, sed omnia paulo maiora. Flos ruber. Fruct. maturus niger.

*arborea.*

*C.* fol. oblongis, integris, crassis. *Forsk. Æg. In Arabia 24.*

Arbor ramis debilibus recurvis. Fol. opposita, petiol. oblong-acuta, glabra. Pedunc. terminal. brachiatum paniculati. Fl. sessil. Cor. revoluta, viridis, laciniis ovalibus, semimarcidis. Bacca Piso maior, sessil. flava, vel nigra, basi cincta cal. & cor. marcida; edulis.

169. **EPIME-NECTARIA** 4. cyathiform. petalis incumbentia. Cal. DIUM. caducus, 4-phyll. Cor. 4-pet. Capsula acuminata, 1-locul. 2-valv. polysper.

1. *alpinum*. *E. Syst. veg. ed. 14. Lob. Hist. 176.*

*In alpinum, & collium umbrosis. 24.*

Caul. cubital. in ternos furculos divisus, fuscus, pallidus. Fol. longe petiolar. fastigiata, ternata. Foliol. cordiform. dentata, satore virent. glabra, venosa, rigida. Fl. purpureo-flavi, variegati, emarginati.

170. **CORNUS**. Involuc. 4-phyll. sæpius (Cal. minim. 4-dentat.). Petal. 4. supera. Drupa (umbilic.) nucleo 2-locul.

1. *florida*. *C.* arborea; involucr. maximo, foliol. obcordat. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. carol. tab. 27. Pluk. alm. tab. 20. f. 3. phyt. tab. 26. f. 3.*

*In Virginia sylvis 24.*

Arb. medioc. magnitudinis. Fol. maiora *C. mare*. Bacca ovata, rubra. *Var. involuc. sanguinei col.*

2. *mascula*. *C.* arborea; umbellis involucrum æquantibus. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 38. Knorr. del. hort. 1. tab. Z. Black, tab. 121. Kniph. sent. 1. tab. 18.*

Corniolo. *Matth.*

*In sepibus Europæ* h.

Arbor. Fol. lata, mucronata, integerr. venosa.

Fl. flavi. Bacca oblong. magna, coccin. vel

lutes. *Var. fol. eleganter variegatis.*

3. *japonica*. C. arborea; umbell's involucrum superantibus;  
fol. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Japon.*

Jamma sumira. *Kämpf. am. exot. Fase. V. p. 747.*

*In Japonia* h.

Frutex erectus, orgyal. Rami oppositi, striati, cinerei, glabri. Fol. in apice ramorum opposita, 3-pollic., 2-pollic. lata, petiolat. ovat-acumin. ferrata, basi integra, nervosa, subtus pallida, glabra. Umbella decomposita, patentiss. 3-4-5-radiata. Cor. alba. Drupa magnitudine Pisi min. compressa, rubra. Nux lentiform. dura. Nucleus durus, albus.

4. *sanguinea*. C. arborea; cymis nudis; ramis rectis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 481. Lob. 2. p. 169.*

*Virga sanguinea. Matth.*

*In Europæ, Afrix &c. dumetis* 24.

Cortex sanguineus fruticis, & ramorum. Fol. ovat-lanceol. subtus nervosa. Fl. parvi, albi, odori. Baccæ parvæ, subrotundæ, sature violac.

5. *alba*. C. arborea; cymis nudis, ramis recurvatis. *Syst. veg. ed. 14. Amm. ruth. tab. 32. Mull. tab. 104.*

*In Sibiria, Canada* h.

*Simil. omnino priori: differt ramis recurvatis, & baccis albis.* Stolones multi ad radicem enati procumbunt. Cor. alba, receptacul. atro-purpur.

6. *sericea*. C. arborea; cymis nudis; fol. subtus sericeis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Amer. Septentr. h.*

Frutex. Rami sanguinei, punctis subverrucosis, cinereis adpersi, quibus prior orbat. Fol. opposita, nec bifaria, ovata, plicato-lineata, subtus alba, non pallide virid. sericeo-nitent. Petala patentia, alba. Stam. alba, cor. duplo longiora. Receptac. purpurasc. Baccæ atro-purpur. maturæ albæ.

7. *alternifolia*. C. arborea; fol. alternis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Amer. Septentr. h.*

Rami

Rami atro-purpureasc. punctis albidis. Fol. petiol. ovata, acuta, integerr. lævia, lineata, subrus pallida. Stipulæ nullæ. Panicula corymbosa, supra plana, alba. Petala revoluta, alba.

8. *svecica*. C. herbacea, ramis binis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Lapp. tab. 5. f. 3. Fl. Dun. tab. 5. Dill. elth. tab. 91.*

*In Svecia, Norvegia, Russia 24.*

Caul. 4-unc. lignosus, fusco-virens. Fol. Androsæmifolia, satore viridia. Fl. albo-virent. Baccæ flavo-rubrae.

9. *canadensis*. C. herbacea, ramis nullis. *Syst. veg. ed. 14. Burf. X. 106.*

*In Canada 24.*

Caul. vix 9-pollic. Fol. 2. in medio caulis, opposita, ovalia. Pedunc. terminal. 2-pollic. involucr. quam in priore longius.

171. **SAMARA**. Cal. minim. 4-part. Pet. 4. ovata, basi lacuna longitudinali. Stam. basi petali immersa. Stigm. infundibul. Drupa subrot. *Fol. alterna.*

1. *lata*. S. *Syst. veg. ed. 14.*

*Memecylon &c. Burm. Zeyl. tab. 31.*

*In India Orient. h.*

Arbor. Rami purpureasc. læves. Fol. alterna, petiolat. interrupte-pinnata, 5-iuga. Foliol. opposita, breviter petiol. lanceol-ellipt. obtusa, integerr. utrimq. lævia. Corymb. lateral-axill. vix petiolis longiores. Fl. copiosi, lutei.

172. **FAGARA**. Cal. (parvus) 4-fid. Pet. 4. (oblonga, patent.). Capf. 2-valv. (Sem. 1. rotundum).

1. *Evodia*. F. fol. simplicibus, oppositis, lanceol. elongatis: racemis axillaribus, solitariis, ramosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Evodia hortensis. Forst. gen.*

*In Tonga tubu.*

Planta bene odorata. Stigma 4-fid. Capf. 4.

2. *Pterota*. F. foliol. emarginatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Pterota &c. Brown. Jam. tab. 5. f. 1.*

*Lauro &c. Sloan. Jam. 2. tab. 162. f. 1.*

*In Jamaica h.*

Odor hircosus. Arb. 20-ped. ligno duriss. ramis alternis, hamatis. Fol. 3-4-iuga. Foliola ovata, ferrulata, impari longiore. Petioli alati, articulati, inter binos aculeos reflexos. Spic. axill. Fruct. ovat.

*Tom. I.*

X

3. *Piperita*, F. foliol. crenatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Piper &c. Kæmph. am. tab. 893.*  
*In Japonia h.*  
 Arbusc. sapore Piperis, 2-orgyal. ramosa. Rami purpur. aculeis sparsis, horizontalibus. Fol. plura, in apice ramulorum, Fraxiniform. sub 6-iuga. Foliol. unguicul. alterna, & opposita, subsessil. ovata, emarginata, glabra. Fl. inter fol. paniculati, parvi. Cor. herbido-livida. Caps. rufo. Sem. atrum, nitidum.
4. *tragodes*, F. articulis pinnarum subrus aculeatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 14. edit. pida tab. 19.*  
*In America h.*  
 F. *Pterotæ vuide adfinis*. Frutex suberect. 5-ped. ramosus. Aculei gemini, recurvi, fusci, nitidi. Fol. alterna, sessil. pinnato-articulata. Foliol. 5-6-iuga, sessil. obl-obtus, basi attenuata, integerr. nitida. Fl. axillar. aggregati, parvi. Caps. globosa.
5. *oëandra*. F. foliol. sæpe tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Elaphrium &c. Jacq. amer. tab. 71. f. 1. 3. edit. pida tab. 106.*  
*In Curacao duris h.*
173. *ÆGIPHILA*. Cal. breviss. campaniform. 4-dent. Cor. tubul. 4-fid. Stylus semi-2-fid. Bacca (subrotunda) 4-sper.
1. *martinicensis*. *Æ. Syst. veg. ed. 14. Jacq. obs. 2. tab. 27. Amer. pida tab. 16.*  
*In Martinica ad sylvarum margines h.*  
 Frutex orgyal. ramis oppositis, 4-gon. glabris. Fol. opposita, petiolat. simplicia, lanceol-ovata, acuminata, integerr. glaberr. Panicul. terminal. & axillar. compositæ, foliosæ, strictæ. Cor. alba. Baccae Piso mæ: luteo-purpur.
174. *PTELEA*. Cal. (parvus) 4-part. inferus. Pet. sæpe 4-raro 5. coriacea, plana. Fruct. membrana subrotundus, centro 1-spermos.
1. *trifoliata*. P. fol. ternatis. *Syst. veg. ed. 14. Trew. rar. tab. 9. Miller. ic. tab. 211. Du-Hamel. arbr. tab. 43.*  
 Frutex &c. *Dill. elik. tab. 122. f. 148.*  
*In Virginia h.*  
 Frutex orgyal. ramis patulis. Foliol. ovat-lanc. medio mæ: Fl. cymosi. Petala parva, dilute viridia. *Var. fol. quinis.*
2. *pinnata*, P. fol. abrupte-pinnat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*



*Blackburnia pinnata*. *Kerst. gen.*

*In insula Norfolk.*

Fol. alterna, 2-3-iuga; foliol. oppositis, ovatis, obliquis, glaberrimis. Panicul. axill. parvæ.

175. HYDROPHYLAX. Cal. 4-part. Cor. infundibulif. Fruct. anceps, 1-spermus.

1. *maritima*. *H. Syst. veg. ed. 14.*

*Ad litora maris, prope Gaduluhr. 24.*

*Facies Arenariae maritimæ, at maior. Radix longa, filiform. carnosa, dulcis, sanguinea. Caul. repens, filiform. articul. vaginatus, glaber, coloratus, longiss. Fol. opposita, petiolat. patentia, adproxinata, ovata, acuta, integerr. carnosa, nitida, exasperata, callis minimis, albicantibus, pellucidis. Petioli breves, membranac. Fl. axill. subsessil. erecti, plerumq. binati, non oppositi. Cor. pallide cœrul. Anth. cœrul.*

176. SIRIUM. Cal. semi-4-fid. Cor. o. Nectario 5-phyll. claudente calycem. Germ. inferum. Stigma 3-fid. Bacca 3 locul.

1. *myrtifolium*. *S. Syst. veg. ed. 14.*

*In India Orient. h.*

Arb. facie Myrti; ramis strictis, brachiatis, passim articulatis. Fol. opposita, petiolat. simplicia, 2-pollic. lato-lanceol. integerr. tenera, glabra, subius glauca. Stipulæ nullæ. Fl. in thyrsus collecti. Cal. coloratus. Baccæ obovat. coronata.

177. LUD-  
WIGIA. Cal. 4-part. superus. Cor. 4-pet. Capsl. 4-gon. 4-locul: infera, polysperma.

1. *alternifolia*. *L. caul. erecto: fol. alternis, lanceol. Syst. veg. ed. 14. Trew. chr. 2. tab. 2.*

*Lythmachia &c. Pluk. alm. tab. 203. f. 2.*

*Frutex &c. Pluk. amalt. tab. 412. f. 1.*

*In Virginia ☉.*

Caul. herbac. sæpe declinatus, teres, glaber. Fol. petiolat. integerr. glabra. Fl. lateral. axill. pedunculat. solitarii. Pet. flava. Capsl. cubicæ, calyce minores.

2. *oppositifolia*. *L. caul. diffuso: fol. opposit. lanceolat. Syst. veg. ed. 14.*

*In India 24.*

Habitus *Lythri hyssopifolii*. Caul. spitham. Fol. petiol. integerr. striata, lævia. Flos axill. fo-

326 TETRANDRIA MONOGYNIA.

- litarius, *Caryophylli* *Offic.* figura. Cor. flava, calyce brevior. Caps. fol. dimidio brevior.
3. *erigata*. L. caul. erecto: fol. oppositis, lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In India* ☉.  
 Caul. herbac. pedal. brachiatus, lævis. Fol. petiolat. integerr. lævia. Pedunc. terminal. subtermi, 1-fl. raro axillar. Germina 4-gono-alata. Cal. minuti. Cor. vix conspicua. Caps. subcubica.
- 
- trifolia*. L. fol. ternis, ovat-lanceol: fl. terminalibus, pedunculat. *Burm. Ind.*  
*In Java*.  
 Radix fibrosa. Caul. erectus, spitham. herbaceus, striatus, lævis. Fol. opposita, petiolat. Pedunc. pollic. Bract. ovatae. Fl. gemini, pedicellati.
178. RANK-SIA, Ament. squamat. Cor. 4-pet. Anth. in cavitate laminarum sessiles. Caps. 2-valv. Sem. bipartibile.
1. *ferrata*. B. fol. linearibus, in petiol. attenuatis, æqualiter, ferratis, apice truncatis cum mucrone. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In nova Hollandia*.  
 Speciosiss. species huius generis, Fol. in apice ramorum confluentia, sparsa, spitham. patentiss. coriacea, plana, glabra, amentum cingentia. Amentum maximum, crassum, erectum, teres, obtusum. Fl. adscendent. patentiss. laminis extus pubescentibus, canis.
2. *integrifolia*. B. fol. cuneiformibus, integerr. subtus toment-albis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In nova Hollandia*.  
 Fol. in apice ramulorum subverticillata.
3. *Ericæfolia*. B. fol. adproximat. acerosis, truncato-emarginat. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In nova Hollandia*.  
 Fol. huius minima, sed copiosiora.
4. *dentata*. B. fol. oblong. in petiolum attenuatis, curvis, flexuosis, dentatis, dentibus spinula terminatis; subtus albis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*In nova Hollandia*.  
 Fl. huius minores.

179. OLDEN-*Cal.* 4-part. superus. Cor. 4-pet. Caps. (sub-  
LANDIA. globosa, coriacea) 2-locul. infera, polysperma.

1. *verticillata*. O. fl. verticillat. sessilibus: stipul. fetigeris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Crateogonum*. *Rumph. amb. 6. tab. 10.*

*In Amboinæ, Jamaicæ collibus apricis.*

Caul. sub-ped. simpl. articulati, teretes, læves, utrimq. sulco exarati. Fol. opposita, sessil. angusto-lanc. acuminata, costa exarata, scabra. Fl. congesti.

2. *repens*. O. capsul. sessilibus, hispidis: fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 15. f. 2.*

*Crufta* &c. *Rumph. amb. 6. tab. 170. f. 4. Pluk. phyt. 356. f. 5.*

*In India.*

Caul. repens, filiform. ramosus, articulatus, ad singula genicul. radicans, lævis. Fol. opposita, subpetiol. integerr. lævia, parva. Fl. axill. folitarii, alterni, subsessil.

3. *capensis*. O. pedunc. axillaribus, 1-fl. fol. linearibus, acutis, *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad. cap. b. Spei.*

Simillima O. *repenti*, at caps. glabra.

4. *uniflora*. O. pedunc. simpliciss. lateralibus: fructibus hirtis: fol. subovatis, acutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Alfine* &c. *Pluk. alm. tab. 74. f. 5. mala.*

*In Virginicæ, Jamaicæ aquosis.*

Caul. repentes, ramosi, subdivisi. Fol. opposita, subpetiol. integerr. Fl. pauci. Germ. hispida.

5. *biflora*. O. pedunc. bifloris, petiolo longioribus; fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

*Antirrhinum* &c. *Burm. Zeyl. tab. 11.*

*In India* ☉.

Caul. erectus, herbac. dichotomus, articulatus. Fol. opposita, petiolat. basi angusta, integerr. Fl. axill.

6. *umbellata*. O. umbellis nudis, lateralibus, alternis: fol. (lanceol-linearibus). *Syst. veg. ed. 14.*

*Lyfimachia* &c. *Pluk. alm. tab. 119. f. 4.*

*In India* ☿.

Habitus *Cisti Helianthem*. Radix extrus alba, intus ruberrima. Caul. procumb. palmar. dichotomi. Fol. subquaterna. Pedunc. axill. & tor-

328 TETRANDRIA MONOGYNIA.

minales, alterni, umbellati. Pedicell. ex singula umbella 2-5-6-fl.

7. *hirsuta*. O. umbellis axillar. caul. calycibusq. hispidis: fol. ovatis, acutis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Java.*

Planta diffusa. Fol. opposita, petiol. integerr. nervosa, venosa. Umbell. peduncul. paucifl.

8. *corymbosa*. O. pedunc. multifi. fol. linearilanceol. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 212. f. 1. Ehret. pict. tab. 2. f. 1.*

*In Amer. merid. ☉.*

Caul. subprostrati, adscendent. 4-goni, læves, ramis oppositis. Fol. opposita, longitudine internodiorum, lævia, linea longitudinali exarata. Stipul. oppositæ, connectentes folia, obtusiss. apice arillis tribus. Pedunc. laterales, alterni, solitarii, filiform. nudi, longitudine folii. Umbellula sub-4-fl. absq. involuc. Cor. alba.

9. *paniculata*. O. pedunc. terminalibus, paniculat. fol. ovalilanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

Mollugo &c. *Burm. Zeyl. tab. 71. f. 2. Ind. tab. 15. f. 1.*

*In India Orient.*

Caul. erectiusc. pedal. dichotomus, lævis. Fol. opposita, subpetiolat. integerr. lævia. Panicula aphylla. Fruct. læves.

10. *stricta*. O. pedunc. terminalibus, racemosis: fol. linearibus: caul. erecto, brachiato. *Syst. veg. ed. 14.*

Alfine &c. *Pluk. mant. tab. 332. f. 2.*

*In Malabar 24.*

Caul. fruticos. teres, articulatus, striatus, pedal. trichotomus. Fol. opposita, articulis breviora; radicalia fere lanceol. Pedunc. stricti. Caps. obovata, truncata.

- pentandra*. O. fl. pentandris, monogynis: fol. linearibus: peduncul. 2-fl. *Retz. Obs. fasc. 4.*

*In Tranquebaria.*

Simil. *O. biflora*, sed maior, semiped. Caul. erectus, pubescens. Fol. opposita, sessil. integerr. pubescent. Pedunc. axill. solitar. simplic. Petal. parva, albida, cum levi rubedine. Cal. pubesc.

- digyna*. O. fl. pentandris, digynis, sessilibus: fol. lanceolat. Retz. Obs. fasc. 4.  
In *Tranquebaria*.  
*Facies ab Oldenlandia aliena*. Caul. decumbent, ramosi. Fol. sessil. integra. Fl. axillar. quandoq. brevissime peduncul. Cal. tubo globoso. Petal. minuta; alba.
- trinervia*. O. caul. decumbent, fol. ovat. trinerviis: fl. axillar. verticillatis: capsul. hispidis. Retz. Obs. fasc. 4.  
In *Tranquebaria*.  
Caul. depressi, angulati, ramosi. Fol. opposita, petiol. lato-ovata, integerr. subpilosa. Fl. breviter pedicellati. Fruct. didymus, 4-dentat.
- tenuifolia*. O. pedunc. 1 fl. alternis: fol. linearibus, pedunc. longioribus. Burm. Ind. tab. 14. f. 1.  
In *Java*.  
Caul. procumb. spitham. Fol. opposita. Pedunc. axill. brevissi. Fl. albicantes.
180. AMMANNIA. Cal. 1-phyll. tubulosus, plicatus, 4-8-dent. inferus. Cor. 4-petala, calyci inserta, vel nulla. Caps. (subrot.) 4-locul.
1. *latifolia*. A. fol. semiamplexic. caul. 4-gono, ramis erectis. Syst. veg. ed. 14.  
Aparines &c. Sloun. hist. 1. tab. 7. f. 4.  
In *Caribæis*, locis humidis ☉.  
Caul. angulis obtusis, lateribus alternis, convexis. Fl. verticillat. utrimq. 3. sessil. Calyc. dentes alterni, conniventes. Cor. alba. Stylus germine brevior.
2. *ramosior*. A. fol. semiamplexic. caul. 4-gono: ramis patentiss. Syst. veg. ed. 14. Bucc. Mus. tab. 104.  
In *Virginia* ☉.  
Caul. angulis acutis, lateribus planis. Fol. lanceol-linear. basi dilatata, rufescentia. Fl. lateral. axillar. utrimq. 3. subpeduncul. Cal. dentibus 8. patulis. Pet. subrot. patentia, purpur. Filam. purpur. Styl. germine longior.
3. *baccifera*. A. fol. subpetiolat. capsulis calyce maioribus, coloratis. Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 15. f. 3.  
Cornelia &c. Arduin. 2. tab. 1. Ad. Bonon. tab. 7.  
Anonymos &c. Pluk. alm. tab. 136. f. 2.?  
In *China*, & in *Italia* ☉.  
Planta erecta, digiti longitudine, tenera, absque

ramis. Caul. teres, rufescens. Fol. opposita, lanceol. integerr. Cal. 4-dent. Fl. axill. verticillati, plurimi, peduncul. minimi. Caps. rubra, calyce maior.

4. *oëandra*. A. fl. petaloideis, oëandris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ammannia coccinea*. Rottb. *Progr.* 1775.

*In India Orient.*

Caul. giganteus, erectus, brachiatus, lævis. Fol. opposita, sessil-amplexicaul. linear-lanceol. integerr. lævia. Pedunc. axill. breviss. 1-3-fl. Petal. sanguinea.

5. *pinnatifida*. A. caulibus procumbentibus, radicantibus, compressis: fol. linearibus, pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Java.*

*Ammannia* reliquis facie simil. Fol. sparsa, magis adproximata, pinnis minimis, quasi filiformibus. Fl. axill. parvi, solitar. vel pl. Cor. incarnata.

181. *ISNARDIA*. Cal. campanulat. 4-fid. Cor. o. Capsul. 4-locul. cincta calyce, polysper.

1. *palustris*. I. *Syst. veg. ed. 14. Zann. tab. 67.*

Dantia &c. *Petit. gen. tab. 49.*

Glaux &c. *Bocc. Mus. tab. 84. f. 2.*

Alfine &c. *Lind. alfat. tab. 2.*

*In Italia, Gallia, America &c. ad lacus, & fossas 24.*

Simil. *Pepli portulacæ*; repens, natans. Caul. procumb. palmar. ex viridi ruber. Fol. opposita, ovalia, integerr. quandoq. rubentia. Fl. axill. oppositi, sessil. virides.

182. *TRAPA*. Cal. 4-part. Cor. 4-pet. Nux ovata, spinis 4. oppositis cincta; quæ calyc. fol. fuere.

1. *bicornis*. T. nucibus bicornibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Plum. ic. tab. 67. fol. infima.*

*In Chinæ aquis.*

2. *natans*. T. nucibus quadricornibus: spinis patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Panover &c. *Hort. Mal. 11. tab. 33.*

Tribulus aquaticus. *Cam. epis. 715. Matth.*

*In Europæ, Asie stagnis ☉.*

Radix longa, fibrosa. Caul. submersus longe per aquas repens. Fol. immersa multifido-capillacea, *Myriophylli*; natantia rhombæa, crenata,

supra glabra, subtus rugosa. Petala alba, exigua. Germen cingunt calyc. fol. 4. duobus ad latera, duobus ad angulos germinis, unde cornua fructus, qui primum cinereus, dein niger.

183. **DORSTENIA**. Receptacul. commune 1-phyll. carnosum, in quo sem. solitaria nidulantur.

*Fl. aggregati. Involucr. magnum, angulatum. Flos 1-petal. anomal. carnosus, pedem antherinum referens. Fruct. eiusdem formæ.*

1. *Houffoni*. D. scapis radicatis: fol. cordatis, angulatis, acutis: receptacul. quadrangulis. *Syst. veg. ed. 14. Houff. Ad. Angl.*

*In Campechia 24.*

2. *Contrajerva*. D. scapis radicatis: fol. pinnatif-palmat. serratis: recept. cul. quadrangul. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 579. Houff. Ad. angl. f. 1. Plum. ic. 119.*

*Drakena radix. Clus. exot. 83.*

*In nova Hispania, Mexico &c. 24.*

Radix insit. Cyperi tuberculosa, & nodosa. Fol. radical. petiolat. in 7. lobos acuminatos, & serratos divisa.

3. *Drakena*. D. scapis radicatis: fol. pinnatif-palm. integerr. receptaculis ovalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In vera cruce 24.*

4. *caulescens*. D. pedunc. caulinis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Parietaria &c. Plum. ic. 120. f. 1.*

*In Amer. merid. 24.*

Planta humilis. Caul. simpl. Fol. opposita, longe petiolat. sinuata, denticul. Fl. pedunculati, in placentam collecti.

184. **COMETES**. Invol. 4-phyll. 3-fl. Cal. 4-phyll. Caps. 3-cocca.

1. *alterniflora*. C. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 15. f. 5. Clinopodium &c. Pluk. alm. tab. 380. f. 4. ? quod fl. sessilibus differt.*

*In Suratte ☉.*

Caul. ped. herbac. Fol. opposita, sessil. obovata, acumin. integerr. glabra. Pedunc. axill. alterni, (alterius alæ) solitarii, 1-fl., patuli, longitudine fol. Involuc. foliola hispida. Petal. 4. oblonga, obtusa, erectiusc.

185. **NIGRINA**. Cal. 0. Cor. 4-pet. Capsula.

1. *spicata*. N. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. erectiusc. herbac. palmær. & ultra, teres, subsucculentus, glaber. Fol. sesquipollic. opposita, breviter petiol. ovat-oblong. obtusa, ferrata, glabra, supra viridia, subtus pallida. Fl. spica axillar. composita spiculis alternis, floscul. oppositis. Bractea sub singulo flore ovata, acuta.

*Planta siccatione nigrescit.*

186. ELÆAGNUS. Cal. 4-fid. campanul. superus, interne coloratus. Cor. nulla. Drupa intra calyc. (ovata, glabra) 1-locul. 1-sperm.

1. *angustifolia*. E. inermis; fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Du-Ham. arbr. 1. tab. 39. Hort. Angl. tab. 19.*

*In Bohemia, Hispania, Augusta Pretorisæ &c. h.*

Arbor mediocris magnitud. cortice albicante.

Rami patuli. Fol. alterna, fescuncem longa,

unciam fere lata, & angustiora, breviter petiol.

modice obtusa, albescentia, præcipue subtus.

Fl. axill. parvi, lutei, argenteo col. nitentes, odori.

Baccæ parvæ, oblong.

2. *orientalis*. E. inermis; fol. ovatis, oblong. opacis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente h.*

Facies prioris, sed fol. duplo latiora, utrimq.

tactu mollia, subtus pallida, sed neutra pagina nitentia, aut argentea.

3. *latifolia*. E. inermis; fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 39. f. 2.*

*In Zeylona h.*

Fol. ovato-subrotunda.

4. *crispa*. E. inermis; fol. lanceol-oblong. obtusis, undulatis: fl. solitariis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

Arb. ramis, & ramulis erectis, alternis, divaricatis, teretibus; punctato-scabris, cinereis.

Ramuli ultimi angulati, albidi. Fol. sesquipollic. alterna, petiolat. erecto-patula, integerr. supra nuda, fuscescentia, punctata, sulco

medio longitudinali, subtus argentea. Fl. in ultimis ramulis sparsi, peduncul.

5. *multiflora*. E. inermis; fol. obovat. obtusis: fl. axillaribus, adgregatis: peduncul. flore longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*



Caul. fruticosus, parum ramosus. Rami, & ramuli alterni, rari, patentes, teretes, punctato-scabri, fulco-ferrugin. Fol. e singula gemma plura, inæqual. subpollic. alterna, petiol. erecti, integerr. supra punctis squamosis, argenteis, subtus tota squamoso-argentea. Fl. inter fol. pl. peduncul. Pedunc. subpollic. laxi, argentei. Calyx clavatus, oblong.

6. *umbellata*. E. inermis; fol. obovatis, obtusis: fl. axillar. adgregatis: peduncul. flore brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 14.*

*In Japonia h.*

Adfinis priori. Caul. fruticosus. Rami, & ramuli erecti, alterni, teretes, punctato-sabri, ferrugineo-fuscesc. Fol. e gemmis alternis plura, unguicul. petiol. patula, supra nudiusc. punctis argenteis, subtus tota argentea. Fl. inter fol. pl. subumbellati, cernui.

7. *glabra*. E. inermis; fol. ovato-oblong. acuminat. fl. axillaribus, subfoliatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

Arbor. Rami subteretes, nudiusc. fusci. Ramuli erecto-patuli, alterni, angulati, punctato-sabri, cinereo-rufescent. Fol. sesquipollic. alterna, petiolar. patent-erecta, integerr. supra virid. glabra, subtus rufescenti-squamosa, intersparis punctis ferrugin. Fl. erecti, peduncul.

8. *spinosa*. E. fol. ellipticis: basi ramulorum spinosa. *Syst. veg. ed. 14. Med. obs. soc. æcon. Lutr. 1774. p. 196.*

*In Ægypto h.*

Fol. dimidio breviora, sed non angustiora E. angustifol. Fl. quadruplo min.

9. *pungens*. E. ramulis spinulentibus: fol. oblong. undulat. fl. axill. subbinis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Akin-gomi. *Kämpf. am. ex. Fasc. V. p. 789.*

*In Japonia h.*

Arbor orgyal. erectus, ramosus, scaber, fuscus. Rami patent. teretes, flexuosi, aphylli. Fol. pollic. alterna, petiolar. reflexo-patenti, obtusiusc. integerr. rigida, supra viridia, glabra, subtus squamoso-argentea, intersparis punctis ferrugineis. Fl. distichi, erecti. Dis-

fert ab *E. spinosa*-ramul. spinescentibus: fol. oblong; latioribus: fl. ma:

*macrophylla*. *E. inermis*; fol. rotundato-ovat. argenteis.

*Thumb. Jap.*

Fou-Gomi. *Kampf. am. exot. Fasc. V. p. 789.*

*In Japonia* ♀.

Arb. erecta. Rami erecti, teretes, striati, tuberculati, ramulis deciduis, punctato-scabri, cinerei. Ramuli alterni, angulati. Fol. pollic. alterna, petiolat. integerr. erecto-patula, supra glabra, virid. subtus argentea. Fl. axill. adgregati, suberecti, pedunculati.

Differt ab *E. orientali* cui fol. ovat oblong.-fol. rotundato-ovat. subtus argenteis. Ab *E. latifolia*-fol. magis rotundatis; ramulis inermibus, nec spinescentibus.

187. GONO-Cor. 4-fida. Drupa subglobosa, 8-gona, 1-sperm.

1. *micranthus*. *G. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 15.*

*In Japonia* ☉.

Radix fibrosa. Caul. folitar. vel pl. vix spitham. 4-gonus, basi decumbens, apice erectiuscul. superne ramosus. Fol. lineam longa, opposita, brevissime petiol. patentia, ovata, acuta, serrata, glabra. Fl. ramei, spicati, remoti, minuti, subsecundi, cernui.

188. SANTA-CAL. 4-dent. Cor. 4-petala; petalis calyci innatis, præter glandulas 4. Bacca infera, 1-sperma.

1. *album*. *S. Syst. veg. ed. 14. Breyn. ic. tab. 5. f. 1. Rumph. amb. 2. tab. 11.*

*In India* ♀.

Arb. altitudinis Juglandis. Rami ramosi. Fol. impari-pinnata. Foliol. opposita, petiolat. ovat-obl. integerr: iuniora viridia; adulta sub-lutea. Cor. cœrul-nigricans. Bacca Lauriform. matura e cœrul-nigra.

189. STRUTHIOLOLA. (Cal. 2-phyll. tubulosus, lacin. acutis, compressis, carinatis. Nect. 8. antheriform. singulo basi corona fetarum circumdato, faucis margini imposita. Bacca exsucca, 1-sper.)

1. *virgata*. *S. pubescens. Syst. veg. ed. 14.*

*Thymelæa* &c. *Burm. Afric. tab. 47. f. 1. sed fol. breviora.*

*Ad cap. b. Spei* ♀.

Frutex ramis longis, simplicibus, virgatis, subvillosis, ramul. 4-gonis. Fol. opposita, lanceol. acumin. striata, canaliculata, margine ciliato-barbata. Fl. axill. folitar. sessil. longitudine folii, rubri, extus tomentoso-sericei. *Var. fl. flavescent.*

2. *creda*. S. glabra. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Pallierina &c. Burm. Afric. tab. 47.*  
*Ad cap. b. Spei h.*

Planta glabra. Caul. ped. & ultra, fruticos. erectiusc. ramosus, cinereus. Rami simpl. aggregati, corymbosi. Fol. sparsa, sessil. imbricata, lanceol.-subulata, obtusiusc. 2. circiter lineas longa. Fl. lateral. axill. folitarii, sessiles. Cor. alba.

3. *nana*. S. fol. linearibus, obtusis, pilosis: fl. terminabilibus, fasciculatis, tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Bractææ cœrulescent.

- lanceolata*. S. fol. ovato-lanc. corollisq. nudis: calycibus pubescent. *Retz. Obs. fasc. 3.*

Rami stricti, teretes, nudi; ramulis 4-gon. Fol. integerr. coriacea, patula. Fl. in apice ramorum opposita congesti, bracteati. Cor. tubo longo; limbo lineari-rufescente.

- juniperina*. S. fol. linearibus, acutis, patentibus: cor. calycibusq. nudis. *Retz. Obs. fasc. 3.*  
 Fruticulus totus glaber. Rami tenues, teretes, ramulis 4-gon. Fol. patentia. Fl. a media ramulorum parte ad apicem fere intra bractæas foliis similes, oppositas, sessil. Cal. glaber. Cor. glabra, alba, laciniis acutis.

190. MA-  
 NETTIA. Cal. 8-phyll. Cor. 4-fid. Caps. infera, 2-valv. 1-locul. Sem. imbricata, orbiculata, seminulo centrali.

1. *reclinata*. M. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Mexico ☉.*

Caul. reclinatus, herbac. debilis, ramosus. Fol. adproximata, opposita, petiol. ovata, acuta, subciliata, subrus pubescent. semipollicar. Petioli breviss. hirsuti. Stipul. oppositæ, petiolis adnatæ, adpressæ, semicurcul. breviss. Pedunc. axill. folitar. foliis breviores, multiss.

336 TETRANDRIA MONOGYNIA.

pedicell. oppositis, teretibus, hirsutis. Bractea ad singulum pedicellum minuta, acuta. Cor. alba.

*Ad hoc genus spectat Nacibea. Aubl. Guian. T. 37.*

191. KRAMERIA. Cal. o. Cor. 4-pet. (Petal. oblong. potentia). Nectario super. 3-part. infer. 2-phyll. Bacca (globosa) sicca, echinata, 1-sperma.

1. *ixina*. K. *Syst. veg. ed. 14. Loebl. it. 195.*  
*In Cumana America h.*

Planta fusco-cana. Caul. fruticosus, inferne procumbentes, undique sparsi. Fol. alterna, subsessil. lanceol., superiora linearia, acuta. Racemus terminalis fl. alternis, cum binis bracteolis. Cor. roseo-purpur. Nectar. superius apice pallidum; inferius nigro-purpur.

192. HARTOGIA. Cal. 5-fid. Cor. 4-pet. patens. Drupa ovata, 2-sperma

1. *capensis*. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spri h.*

Arbor. Fol. oblonga, obtusa, ferrata, glabra. Fl. axill. minuti, pedunculati.

193. ACÆNA. Cal. 4-phyll. Cor. 4-petala. Bacca (obovata), sicca, infera, 1-sperma, retrorsum echinata.

1. *elongata*. A. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Mexico h.*

*Krameria affinis*. Caul. pl. lignosi, erectiusc. 2-ped. ramosiss. ramis longiss. Fol. pinnata, sparsa; vaginant. foliola adproximata, sessil. subtus pubescentia; paribus primum minimis, linearibus, acutis, integerrimis; paribus 4-8. ina: oblongis, ferratis, ferraturis apice barbatis. Spicæ axillar. apicites, erectæ, rigidulæ, spithameæ. Bract. propriæ ovat-oblong. concavæ. Fl. subsessil. alterni.

194. RIVINA. Cal. o. Cor. 4-pet. persistens. Bacca (globosa) 1-sperma. Sem. lentiforme, scabrum.

1. *humilis*. R. racemis simplicibus: fl. tetrandris: fol. pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Amaranthus &c. Comm. hort. 1. tab. 66.*

*Solanum &c. Pluk. alm. tab. 112. f. 2.*

*In Caribæis &c. 24.*

Caul. pedal. Fol. alterna, brevibus petiol. purpureo. innixa, ovata, acumin. late virentia. Racemi infer. nudi, axillar. Pet. alba. Baccæ

# TETRANDRIA MONOGYNIA. 337

puniceæ, magnitudine baccarum *Sambuci*, dulces. Sem. tubnigris.

2. *levis*. R. racemis simplicibus: fl. tetrandris: fol. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 151. f. 3.*

*In America h.*

Priori nimis adinis, sed tota glabra. Fol. margine purpurasc. Fl. extus rubicundi.

3. *octandra*. R. racemis simplicibus, fl. octandris, dodecandrisve. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. obs. 1. tab. 2. edit. 2. picu tab. 21. Plum. ic. tab. 241. Brown. Jam. tab. 23. f. 2.*

*In Amer. calidiore h.*

Arb. 20-ped. ramulif. farmentosa, ramis longiss. Fol. multa, alterna, petiolat. lanceol-ovata, acuminata, integerr. glabra, quandoq. sesimpedat. Racemi terminal. laxi, raro axillar. Cal. in fl. albus; in fructu ex purpuro-saturate rubens. Bacca atro-purpur. Sem. nigricans.

4. *paniculata*. R. paniculæ racemis compositis, oppositisq. *Syst. veg. ed. 14.*

*Salvadora persica, Syst. veg. ed. 14. monente Vahl.*

195. EMBO-THRIUM. Cor. 4 pet. Anth. sessil. apicibus petalorum insertis. Follicul. teres.

1. *umbellatum*. E. umbellis axillar. simpliciss. pedunculatis: fol. oblong: avenis; anth. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Forst. gen.*

*In nova Caledonia h.*

Frutex pulcher. Fl. min. rubicundi.

2. *coccineum*. E. thyrsis terminalibus, sessilibus: fol. obovatis, venosis: antheris pedicellatis. *Syst. veg. ed. 14. Forst. gen.*

*In terra del Fuego h.*

Fl. maior. purpurei.

196. SALVADORA. Cal. 4-fid: laciniis revolutis. Cor. o. Bacca 1-sperm. Sem. rotundum, arillo vestitum.

1. *persica*. S. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Angl. 1749. n.º 491. Ad sinum Persicum, in India Or. h.*

Frutex fol. oppositis. Racemus terminalis, compositus.

*Videtur eadem planta ac Rivina paniculata. Vahl.*

197. CAMPHOROSMA. Cal. urceolat. dentibus 2. oppositis; alternisq. minimis, reflexis. Cor. o. Capf. 1-sperm. (calyce obvoluto).

1. *monspeliaca*. C. fol. linearibus, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

### 338 TETRANDRIA MONOGYNIA.

- Buxb. cert. 1. tab. 28. f. 1. Gmel. Sib. 3. tab. 22. Bauh. hist. 3. p. 379.*  
*In Hispania, Tartaria &c. arenosis 24.*  
 Caul. ped. fruticos. subvillosus, albescens. Fol. alterna, f. lilia, odore Camphoræ.  
 2. *acuta.* C. fol. subulatis, rigidis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Anthyllis &c. Lob. ic. 404. Dalech. hist. 1150. In Italia, Tartaria 24.*  
 3. *glabra.* C. fol. subtriquetris, glabris, inermibus. *Syst. veg. ed. 14. Dalech. hist. 1179.*  
*In Helvetia 24.*  
 Caul. hum. f. li, cubital. ramosi. Fl. axill. sessiles.  
 4. *Pteranthus.* C. ramotiss. pedunculis entiformibus, dilatatis: bract. cristatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Pteranthus. Forsk. Æg. monente. Vahl. In Arabia ☉.*  
 Radix fibrosa. Caul. palm. herbac. articulatus, 2-3-chotomus. Fol. linear. subramosa, teretiusc. verticillata; 2. inferioribus paulo maioribus. Fl. parvi, subsessil. virides, cincti membrana 2-fid. breviss.  
 5. *paleacea.* C. fruticosa; ramis spicæformibus, paleaceis, pilosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spec. h.*  
 Frutex vix ped. determinate ramosus. Rami foliis, floribusque imbricatis mixti. Paleæ membranac. minutæ, albæ. Fol. minuta, sessil. elliptica, lævia. Petal. breviss. obtusa, ciliata.  
 198. **ALCHEMILLA.** Cal. 8-fid. Cor. o. Sem. 1. (calyce tectum).  
 1. *vulgaris.* A. fol. lobatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 72. Ludw. ed. tab. 176. Knorr. del. hort. tab. A. 9. Fl. Dan. tab. 693. Garid. Aix. tab. 4.*  
*In Europæ pascuis 24.*  
 Fol. septemlobata, ferrata; infer. longe petiol., superiora breviter & subreniform. Stipul. foliaceæ. *Var. kirsatie, cujus fol. ultra medium in lobos scissa.*  
 2. *alpina.* A. fol. digitat. ferratis, sericeis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 49. Moris. hist. 2. f. 2. tab. 20. f. 3. Barr. ic. 27. n. 11. Pluk. phyt. tab. 240. f. 2. hybrida.*  
*In alpinis Europæ 24.*  
 Fol. ovata, lobis 5-7-9. Stipul. membranac. integerr.  
 3. *spha-*

TETRANDRIA MONOGYNIA. 339

3. *aphanoides*. A. caul. erecto : fol. multipart. Syst. veg. ed. 14.  
Lin. Suppl.

In nova Granata ☉.

Caul. spitham. subramosi, teretes, pubesc. Fol.  
Aph. nis simillima, nuda; radical. petiol., re-  
liqua amplexicaulia. Racemi terminal. subver-  
ticill.

4. *peniaphylla*. A. fol. quinatis, multifid. glabris, Syst. veg. ed.  
14. Bocc. mus. 1. tab. 1.

In Helvetiæ &c. montibus 24.

Habitus humilior, vix semiped. totus glaber.  
Lobi in pl. minores divisi.

DIGYNIA.

199. GALOPINA. Cal. o. Cor. 4-fid. Sem. 2. nuda.

1. *circæoides*. G. Syst. veg. ed. 14. Thumb. diff. nov. gen.

200. APHANES. Cal. 8-fid. Cor. o. Sem. 2. calyce inclusa.  
Ab Alchemilla differt fl. axillar. sessilibus; cæterum  
habitu convenit.

1. *arvensis*. A. Syst. veg. ed. 14.

Alchemilla &c. Moris. hist. 2. tab. 20. f. 4. Petiv.  
tab. 9. Col. ecphr. tab. 146.

In Europæ, & Orientis arvis, inter segetes ☉.

Caul. palm. Fol. parva, alterna, sæpe 3-fida,  
laciniis 3-fid. Stipul. serratæ, magnitudine fol.  
Fl. fascicul. herbacei. Var. pist. & sem. 1.

201. CRUZITA. Cal. 4-phyll. exterior 3-phyll. Cor. o. Sem. 1.  
(in calyce conniventi).

1. *hispanica*. C. Syst. veg. ed. 14. Loeffl. it. 203.

In Cumana Americæ ☉.

Caul. erectus, 4-pedal. superne brachiatus, ra-  
mis erectis, oppositis. Fol. opposita, lanceol.  
integerr. fusca. Fl. in paniculam collecti, mi-  
nimi.

202. BUFONIA. Cal. 4-phyll. persistens, foliol. alternis mi-  
noribus. Petal. 4. calyce breviora, angusta.  
Caps. 1-loc. 2-sperma.

1. *tenuifolia*. B. Syst. veg. ed. 14. Magn. monspel. tab. 97. hort.  
tab. 15.

Alsine &c. Pluk. alm. tab. 73. f. 3.

In Anglia, Gallia, Hispania, Italia ☉.

Tom. I.

Y

Caul. erectus, subped. basi plerumq. ramosus, ramis diffusis, procumbentibus; genicul. tumen-  
tibus, inferne crebrioribus, tandem rarioribus.  
Fol. lineari-fetacea, sensim angustiora, integerr.  
glabra: inferior. internodiis æqualia, vel lon-  
giora, basi connata, subvaginant. vagina bre-  
vi, subventricosa. Fl. axillar. & lateral. sessil.  
terminal. peduncul. recti, ramis adpressi, spi-  
cas filifor. raras formantes. Pet. angusta, cal-  
yce min. membranac. diaphana. Capl. ovata  
plana.

203. HAMAMELIS. Involuc. 3-phyll. Cal. proprius 4-phyll.  
Pet. 4. longiss. linear. Nux 2-corn. 2-locul.

1. *virginica*, H. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. Car. 3. tab. 2. Dukam. arbr. 1. tab. 114.*

*In Virginia h.*

Frutex furculis, & stolonibus Corylo similibus.  
Fol. alterna, petiol. ovata, crenata. Pedunc.  
3-fl. Nect. ex 4. foliol. truncatis, ad ungues  
petalorum, minimis. Nux globularis, superne  
cum 2. sulcis cruciatim, & in 4. cuspides ob-  
tusos secta. Nucleus ovato-obl. nitidus. *Flores*  
*Autumno, insequente vere sem. perficit.*

204. CUSCUTA. Cal. & Cor. 4-5-fida. Squamæ nectariferæ fl.  
segmentis interpositæ. Stam. 4-5. Capl. (su-  
brotunda, carnosæ) 2-locul. (3-4. sperma).  
Planta parasitica, aphylla. Fl. in glomeres  
congesti.

1. *europæa*. C. fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 199. Black. tab. 554.*

*Epitimo Matth.*

*In Europæ pratis collium ☉.*

Caul. volubil. ruber. Fol. albo-rubescens. Fruct.  
rubri.

2. *epithymum*. C. fl. sessilibus, 5-fid. bracteis obvallatis. *Syst. veg. ed. 14. Loeft. it. 216. Fl. Dan. tab. 427.*

*Habitat in iisdem locis.*

Minor priore.

3. *americana*. C. fl. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Sloan. Jam. 1. tab. 128. f. 4.*

*In Virginia fruticibus.*

Planta ramosiss. tenera, subflavescens, nitida.  
Pedunc. comm. breviss. Fl. parvi, flavesc. vel  
virentes. Sem. 1-2-3.



*surinamensis*. C. Schilling. de Lepra tab. 2.

In Surinam.

Planta parasitica, aphylla. Caulicul. luxuriat, & multiplicatis in immensum filamentis suis involvit plurimas arbores, frutices, herbas. Flosculorum fasciculos undiq. pandit; mire prolifera.

205. **HYPECOUM**. Cal. 2-phyll. Pet. 4. exterioribus 2. latioribus, 3-fid. Fruct. Siliqua.

1. *procumbens*. H. siliquis arcuatis, compressis, articulatis. Syst. veg. ed. 14. Dod. pent. 499.

Mnemosilla. Forsk. Æg. monente Vahl.

Inter Narbonæ &c. segetes ☉.

Caul. spitham. simpl. Fol. radical. composita ex foliol. alternis, laciniatis, laciniis alternis, acuminatis, terminali 3-fida. Fl. terminal. brevissimi, pedunculati. Cor. citrina: petal. 2. interiora, in lobis externis, nigris brevibus striis maculata.

2. *pendulum*. H. siliquis cernuis, teretibus, cylindric. Syst. veg. ed. 14.

Cuminum &c. Dalech. hist. 698.

In Gallo provincia, Sibiria ☉.

Caul. ramosi. Fol. longiora, angustiora, tenuius divisa, glauca. Fl. axill. flavi.

3. *erectum*. H. siliquis erectis, teretibus, torulosis. Syst. veg. ed. 14. Amm. ruth. tab. 9.

In Dauuria.

Stam. videntur tetradynama.

206. **GOMOZIA**. Cal. o. Cor. campanul. 4-fid. supera. Bacca 2-locul.

1. *granatensis*. G. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Amer. merid.

Caul. diffus. herbac. spitham. ramis brevioribus oppositis. Fol. opposita, petiol. orbicul. cordata, obtusiusc. integerr. lævia. Fl. terminal. minuti, solitar. sessul. pallidi.

## TETRAGYNIA.

207. **ILEX**. Cal. 4-dent. Cor. rotata, 4-fida. Styl. o. Stigm. 4. Bacca 4-sperma.

Y ij

342 TETRANDRIA TETRAGYNIA.

1. *Aquifolium*. I. fol. ovatis, acutis, spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Fl. Dan. tab. 508. Black. tab. 305. Matth.*  
*In Europa, Japonia, Virginia h.*  
 Frutex sempervirens. Fol. alterna, petiol. Lauriform. viridiss. plerumque undulata, nitida.  
 Fl. axill. glomerati, albi. Baccæ rubræ, quandoq. luteæ. *Var. folior. pagina Super. echinata: & altera fol. inferioribus tantum aculeatis.*
2. *Cassine*. I. fol. ovato-lanceol. serratis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Aquifolium &c. Catesb. car. 1. tab. 31.*  
*In Carolina h.*  
 Planta 16-ped. ramis erectis. Fol. longiora, dilutiora, inermia. Baccæ rubræ.
3. *asiatica*. I. fol. lato-lanceol. obtusis, integerr. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In India Asiæ h.*
4. *integra*. I. fol. obl-obtusis, integris: peduncul. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*In Japonia h.*  
 Caul. fruticosus, erectus. Rami, & ramuli alterni, patentēs, angulati, fusci. Fol. pollic. alterna, petiol. margine parum reflexo, supra virid. subtus pallida. Fl. axill. umbellati, umbel. sessili. Pedunc. semiunguic. subquaterni, erecti, angulati, 1-fl.
5. *rotunda*. I. fol. rotundato-ovat-acutis, integris: pedunc. umbelliferis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*In Japonia h.*  
 Caul. fruticosus. Rami subumbellati, nodulosi. Fol. versus apicem ramulorum sparsa, frequentia, sesquipoll. petiolat. glabra, subtus pallidiora. Fl. axillar.
6. *arenata*. I. fol. ovatis, crenatis: pedunc. rameis sparsis, sub 3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*In Japonia h.*  
 Caul. erectus, fruticosus. Rami, & ramuli paruli, subteretes, nodulosi. Fol. sparsa, unguicul. breviter petiol. obtusa, margine reflexo, supra viridia, subtus pallida.
7. *emarginata*. I. fol. obovatis, emarginatis: fl. axill. binis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*In Japonia h.*  
 Caul. fruticosus. Rami flexuosi, ramulosi, teretes, glabri, cinerei. Fol. alterna, breviss. petiol. obtusa, crenata, margine revoluta, sem.

**TETRANDRIA TETRAGYNIA. 343**

pervirent. supra virid. sulco longitudinali, sub-  
tus pallida, carina media elevata. Fl. axill.  
peduncul. bini, raro solitar.

8. *serrata*. 1. fol. ovatis, acutis, ciliato-serratis: fl. axill.  
solitariis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

Caul. erectus, fruticosus, ramosissim. Rami te-  
retes, laeves, glabri, cinerei. Ramuli paruli,  
filiform. Fol. semipollic. alterna, petiolat. pa-  
tentia, tenuia, supra virid. subtus pallida. Fl.  
pedunculati.

9. *japonica*. 1. fol. oppositis, sessilibus: fl. terminalibus, race-  
mosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

Caul. humilis, fruticosus, glaber. Fol. sesqui-  
pollic. dentato-spinosa, glabra. Racemi digital.  
bracteati. Pet. obovata, integra, alba.

10. *latifolia*. 1. fol. ovatis, serratis: fl. axill. aggregatis. *Syst.*  
*veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia h.*

Caul. arboresc. Rami angulati, rigidi, fusci.  
Fol. 3. pollic. longa, 2. lata, alterna, perio-  
lata, obtusiusc. margine reflexo, patentia, su-  
pra nitida, subtus pallida. Petioli fusci. Fl.  
supraxill. pedunculati.

- cuneifolia*. 1. fol. cuneiformibus, tricuspidat. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Plum. ic. 118. f. 2.*

*In Amer. meridion. h.*

Fol. alterna, sessil. tribus angulis acutis, spinu-  
losis rigida.

108. **COLDENIA**. Cal. 4-phyll. Cor. infundibulif. (4-fid. la-  
ciniis obtusis). Styl. 4. Sem. 2. bilocul. (an-  
gulato-scabra, stylis rostrata).

1. *procumbens*. C. *Syst. veg. ed. 14.*

*Teucrii &c. Pluk. alm. tab. 64. f. 6.*

*In India ☉.*

Planta depressa, ramis alternis, diffusis, confer-  
tis, spitham. pilosis. Caul. lignosi, tomentosi.  
Fol. unciam longa, semuncem lata, alterna,  
petiolat. obovata, latere superiore subclunata,  
plicata secundum serraturas profundas, to-  
mentosa. Fl. lateral. sessiles.

109. **POTAMOGETON**. Cal. o. Pet. 4. ovata, decidua. Styl.  
nullus. Germ. 4. Sem. 4, nuda.

# 344 TETRANDRIA TETRAGYNIA.

1. *natans*. P. fol. oblongo-ovat. petiolat. natantibus. *Syst. veg. ed. 14. Fuchsf. p. 651.*  
*In Europæ lacubus & fluviis* 24.  
Caul. ramosus, articulatus. Fol. firma, integerr. nervis ellipticis; vaginæ maximæ. Fol. submersa graminea. Spica floralis axillar. longa, densa, gracilis. *Var. fol. lanceol-oblong.*
2. *perfoliatum*. P. fol. amplexicaulibus, cordatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 196. Loef. pruss. tab. 65.*  
*In Europæ lacubus, fluviisq. argillosis* 24.  
Fol. tenuia, pellucida, apice tenuiter denticulato, nervosa, undulata. Vaginæ nullæ, aut breves. Spica brevis, crassa.
3. *densum*. P. fol. oppositis, confertis, ovatis, acuminatis: caulibus dichotomis: spica 4-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
Fontinalis &c. *Bauh. hist. 3. p. 769.*  
Tribulus aquaticus &c. *Clus. hist. 252.*  
*In Gallia, Italia* 24.  
Fol. latiuscula, iuxta nervum plicata, ut angustiora videantur: in summa planta congesta, imbricata. Spica exigua, rotunda, 4-fl. Pedunc. e dichotomia caul. breviss.
4. *lucens*. P. fol. lanceol. planis, in petiolos desinentibus, *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 195.*  
Fontinalis &c. *Bauh. hist. 3. p. 769.*  
*In Europæ lacubus, stagnis, fluviis argillosis* 24.  
Habitus natabilis. Fol. prælonga, undulata, pellucida, raro ovata; super. longe petiolat. Vaginæ magnæ, virides. Spicæ axill. longe peduncul.
5. *crispum*. P. fol. alternis, oppositisq. lanceol. undulatis, ferratis. *Syst. veg. ed. 14.*  
Fontilaothum &c. *Lob. ic. 286.*  
*In Europæ fossis, & rivulis* 24.  
Caul. compressi, ramosi. Fol. sessil. contracta, apice spinuloso. Vaginæ breves, albæ. Spica paucifl.
6. *ferratum*. P. fol. oppositis, lanceolat. subundulatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 195.*  
*In Europæ rivulis* 24.  
*An var. prioris?* Fol. sessil. nitida. Vaginæ maximæ, ciliatæ. Pedun. curvi, laxi. Spicæ cylindricæ, densæ.
7. *compressum*. P. caul. compresso: fol. linearibus, obtusis.

TETRANDRIA TETRAGYNIA. 345

*Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 203. Loef. pruss. tab. 66.*

*In Europæ fossis paludosis* 24.

Caul. pallens. Fol. graminea, plana, vel undulata, acute lanceol. aristata. Vaginæ albæ. Stipul. breviss. albæ. Spicæ paucifl. *Var. fol. alternis, & oppositis.*

8. *pedinatum*. P. fol. setaceis, paralell. adproximatis, distichis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europæ fossis, & paludibus* 24.

Caul. ramosiss. dichotom. subruber. Fol. 2-unc. Pedunc. sub-10-fl. sessil. adproximati.

9. *setaceum*. P. fol. oppositis, lanceol. acuminatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europæ fossis paludosis* 24.

Fol. adproximata, plana.

10. *gramineum*. P. fol. linearilanceol. alternis, sessilibus, stipulationibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 222. Rati. Angl. 3. tab. 4. f. 3.*

*In Europæ fossis, & paludibus* 24.

Habitus *Graminis*. Caul. longus, planus. Fol. longe linear. lente decrefcentia. Vaginæ pl. magnæ. Pedunc. axill. breves, recti, 6-fl.

b. Fontinalis media lucens. *Bauh. hist. 3. p. 777.*

11. *marinum*. P. fol. linearibus, alternis, distinctis, inferne vaginantibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 186. Vaill. parif. tab. 32. f. 5. Boec. Sic. tab. 20. f. 5. Pluk. alm. tab. 216. f. 1.*

*In Europa, ad maris litora* ☉.

Fol. 2-unc. plana, angusta. Vaginæ strictæ, breviter 2-fid. in ortu albescentes. Stipul. fine capillaceo. Fl. primum congesti in spicas; dein longis, & nudis intervallis distincti.

12. *pufillum*. P. fol. linearibus, oppositis, alternisq. distinctis, basi patentibus, caul. tereti. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 186. Loef. pruss. tab. 67. Vaill. parif. tab. 32. f. 4.*

*In Europæ paludibus* ☉.

Fol. multa, uncial. Caul. gracilis. Vaginæ ovatæ, & oblongæ. Vagina ramorum longa. Pedunc. axill. 3-4-fl.

*heterophyllum*, P. fol. submersis linearibus, sessilibus; natantibus petiolat. lanceol. Schreb. - l. Lipf.

*Differt a P. natante, quod longe minus, & tenerius sit. Accedit ad P. gramineum fol. latiusc. & rumificationibus dense stipatis. R.ii. Sinop. 3. tab. 4. f. 3. pro cuius varietate forte haberi potest.*

Caul. ramosiss. teres, internodiis brevibus. Fol. linear. acuta, basi angustata, tenera, subdiaphana; natantia latiuscula, breviter petiolat. Stripul. intrafoliaceæ, solitariæ, fol. angustiores.

410. RUPPIA. In summis ramulis prodeunt spicæ, ferentes anth. 8 reniformes, sessiles. Inter hæc nascuntur pedunculi 8, tenues; singuli subnantes germen parvo stigmate instructum. Caps. acumin. aspera, 1-sperm.

1. *maritima*. R. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 364.

Buccaferrea. Mich. gen. tab. 35.

Potamogeton. Raii Angl. tab. 6. f. 1.

Fucus &c. Lob. ic. 255.

In Europæ maritimis ☉.

Caul. demersus, herbac. articulatus. Fol. simplicia, alterna, sessil. linear. Fl. axill. solitar. pedunculati.

211. SAGINA. Cal. 4 phyll. Petal. 4. (patentia, calyce breviora). Caps. ovata, 4-locul. 4-valv. polysperma.

Num. partium aliquando quinarium.

1. *procumbens*. S. ramis procumbentibus. Syst. veg. ed. 14. Ard. sp. 2. tab. 8. f. 2.

Alfene. Pluk. tab. 74. Seguiet. ver. tab. 5. f. 3.

Lind. hort. alf. tab. 8.

b. Saxifraga &c. Vaill. parif. f. 2.

In Europæ pascuis sterilibus, uliginosis, aridis.

Caul. 2-unc. ramosus. Fol. ima in cespitem congesta: caulina breviora. Fol. lineari-lanceol. rigida, glabra, læte virentia. Pedunc. axill. solitar. 1-fl. fol. triplo longiores, erecti; fructiferi recurvi. Pet. parva, albido-virescent: in sylvis maiora quam in agris; vel nulla.

2. *apetala*. S. caul. erectiuscul. pubescente; fl. alternis, 1-petal. Syst. veg. ed. 14. Ard. sp. 2. tab. 8. f. 1.

In Italia ☉.

Caul. sub 3-unc. filiform. dichotom. Fol. amplexicaul. lineari-lanceol. subtus convexa, subhirsuta, obscure viridia. Fl. axill. Cor. o.

3. *erecta*. S. caul. erecto, sub 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 845.*  
*Aline &c. Rati Angl. 3. tab. 15. f. 4. Vaill. parif. tab. 3. f. 2.*  
*In Europæ sterilibus, glareosis ☉.*  
 Caul. 3-unc. Fol. linear-lanc. duriora, glabra, satore virent. oppositionibus 4-7. Pedunc. longi, nudi. Calyc. foliol. lanceol. acuminata. Cor. alba.
4. *virginica*. S. caul. erecto: fl. oppositis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia, inter Muscos ad margines fontium.*  
 Caul. digital. filiflor. Fol. remota, minima, subulata, opposita. Flos terminalis. Caps. rostrata. *An huius generis?*
112. TILLÆA. Cal. 3-4-part. Pet. 3-4. æqual. (acuta, plana, calyce fere minora) Caps. 3-4. (oblong-acumin.), polysperm.
1. *aquatica*. T. erecta, dichotoma: fol. acutis: fl. 4-fid. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Sedum &c. Vaill. parif. tab. 10. f. 2.*  
*In Europæ inundatis ☉.*  
 Planta minima, sub-pollic. Fol. opposita, amplexicaul. 2. lin. longa, obscure virent. Petala rosea.
2. *perfoliata*. T. fol. perfoliat. ovat. corymbis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei, in aquis.*
3. *capensis*. T. fol. oblongiuscul. fl. 4-fid. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
*Videtur var. T. aquaticæ. Radices copiosæ, capillar. Caul. herbac. pollic. dichotom. Fol. opposita, subcarnea. Fl. solitarii, pedunculati. Petala alba.*
4. *muscosa*. T. procumb. fl. 3-fid. (æpius) *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 20.*  
*Polygonum &c. Bocc. Sic. tab. 29.*  
*Sempervivum &c. Bocc. Musf. tab. 22.*  
*In Italia &c. muscosis.*  
*Fruificationis partes ternæ. Caul. pl. uncial. Fol. brevissima, verticillata, capillar. Fl. herbacei.*
113. MYGIN-DA. Cal. 4-part. (minimus). Pet. 4. (subrot. patentiff.) Drupa globosa. (Nux ovata).

1. *uragoga*. M. Syst. veg. ed. 14. Jacq: am. tab. 16. ed. 2. pida tab. 22.

In Amer. calidiore h.

Frutex in litoribus arenosis 3-ped. in sylvaticis 8-ped. Eol. ovata, vel lanceol-acuta, petiol. breviss. rubentibus innixa, opposita, interdum alterna, dimidium, vel sesquipoll. longa, tenuissime ferrata. Pedunc. comm. axill. oppositi, filiform. 2-fidi, lacinia utraque 3-fid. & 3-fl. Fl. exigui, nitidi, atro-rubent. Fructus Pisi magnitudine, rubri.

## MONOGYNIA.

### TOMEX

Genus proximum *Callicarpæ*.

**P** Erian. 1-phyll. 4-dent. subventric. urceolatum, dentibus patentibus.

Cor. Pet. 4. lineari-lanc. basi erecta, limbo patente, cal. duplo longiore.

Nect. squamæ 4. erectæ, suborbicul. carnosæ, retusæ, extus unisulcatæ; singulæ inter petalum, & stam. triplo brevior. filamentis.

Stam. Filam. 4. erecta, subulata, basi connata, in tubum quadrangul. quod. Monadelphicæ proprium est. Anth. erectæ, lanceol. longitudine filament.

Pist. Germ. superum, cylindrico-ventricosum. Styl. germine angustior, & triplo brevior. Stigma 2-lobum, & capitatum.

Peric. ovale, succo viscido, violac. insipido; edule.

Sem. unicum, ovatum, oblong. carnosum.

*glabra*.

T. fol. ovatis, glabris: staminibus basi connatis. Forsk. Æg.

In Arabia h.

Arbor maxima, ramis teretibus. Fol. opposita, petiol. versus basin crassiora, sæpe 2-pollic.



# TETRANDRIA MONOGYNIA. 349

coriacea, acumin. plana, integerr. flavescent. Pedunc. ex ultimis axillis prodeuntes, conferti, brachiati, paniculari, nuli. Fl. spicati. Cal. viridi-albesc. Pet. alba. Fructus pollic. tuberculofus.

*dubia.*

*T. Jacq. hort. tab. 192.*

*In Africa h.*

Arbuseula. Fol. inordinatim alterna, breviter petiol. oblong-acuta, utrimq; attenuata, subdenticul. firma, glabra, inodora, saporis subadstringent. Pedunc. 1-fl. Fl. parvi, inodori. Cor. minima, 4-dent. virid. Pet. subovat. obtusiss. plana. Fructus glaber.

*An huius generis? idcirco dubia dicta fuit.*

## PETASIOIDES.

Cal. Per. 1-phyll. 4-part. lacin. subrot. obtusis, concavis, conniventibus, coloratis.

Cor. 1-pet. erecta, conica, longitudine calyce. margine 4-part. truncato, & connivente.

Stam. Filam. 4. breviss. erecta, longitudine tubi cor. cui inserta.

Anth. erectæ, acumin. 3-angul.

Pist. Germ. subrotund. intra calyc. corollamq; Styl. erectus, cylindrac. longitudine cor. Stigma simpl. obtusum.

Per. . . . .

Sem. . . . .

*Laurifolium. P. Jacq. Amer. pag. 17.*

*Ad cacumina montium in Domingo h.*

Arbuseula inelegans. Rami pauci, teretes. Fol. 5-pollic. alterna, petiol. ovat-oblong. obtusa, crassa, integerr. nitida, ad tactum pinguis, gracilia. Racemi compositi, thyrsiform. terminal. 2-pollic. Fl. multi, exigui. Cal. subrubens. Cor. alba.

## CHOMELIA.

Cal. Per. parvum, 1-phyll. germi. insidens. Tubus erectus, cylindrac. Limbus 4-fid. lacin. lanceol. acumin. planis, revolutis, tubo brevioribus.

Cor. 1-pet. Tubus cylindric. longissim. tenuis,

erectus. Limb. 4-fid. lacin. lanceol. planis, in æcumen setaceum abeuntibus, patentissimis, tubo brevioribus.

*Stam.* Filam. 4. breviss. erecta, subulata, in super. parte tubi cor.

*Anth.* magnæ, linear. incumbentes, longitud. tubi.

*Pist.* Germ. parvum, oblong. 4-fid. inferum.

*Styl.* filiform. longitud. staminum. *Stigm.* 2-fid. lacin. oblong. crassiusc. patentibus.

*Peric.* Drupa oval. calyc. coronata.

*Sem.* Nux oblong. 4-fulca, 2-locul. Nuclei folitar. teretes.

*spinosa.*

*C. Jacq. Amer. tab. 13. edit. 2. pida tab. 17.*

*In Cartagena sylvaticis h.*

*Arb.* 12-ped. tota ramosiss. & spinosiss. Rami horizontal. g'abri. Fol. in apice ramulorum conferta, opposita, in brevem petiolum attenuata, subpollic. subovat. acuta, integerr. nitida, per venas subrugosa. Pedunc. axill. solitar. plerumq. 3-fl. Fl. sesquipollic. sessil. tenues, interdum inodori, nocte suavissimi. Cor. levic. cum virore albescens. Drupæ cortex nigricat; pulpa mollis, & albida. Nux dura.

### SIDEROXYLOIDES.

*Cal.* Perian. minimum, 1-phyll. acutum, 4-dent. germi. infidens.

*Cor.* 1-per. Tubus longus, cylindr. incurvus. Limb. 4-fid. lacin. oblong. obtusis, planis, reflexis, tubo duplo brevioribus.

*Stam.* Filam. 4-breviss. orta infra divisuras limbi.

*Anth.* erectæ, oblongæ.

*Pistil.* Germ. subrot. inferum. *Styl.* filiform. longitudine tubi cor. *Stigm.* oblong. obtusum, crassiusc.

*Peric.* . . . . .

*Sem.* . . . . .

*ferreum.*

*S. Jacq. Amer. tab. 75. f. 9. ed. 2. pida tab. 259. f. 7. Pluk. alm. tab. 224. f. 2.*

*In Sylvis montosis Martinicæ h.*

*Arbor* procera, ramosa. Fol. semiped. opposita, petiolat. ovat-lanc. acuta, integerr. nitida. Pedunc. axill. breviss. sæpe 3-fl. Fl. parvi, extus rosei, intus candidi.

## P E T I T I A .

*Cal.* Perian. 1-phyll. parvum, erect. 4-dent. inferum, persist.

*Cor.* 1-pet. Tubus erect. cylindrac-longus. Limb. 4-fid. lacin. ovatis, acut. planis, reflexis.

*Stam.* Filam. 4. breviss. subulata, in super. parte tubi. Anth. erectæ.

*Pist.* Germ. parvum, subrot. Styl. erect. subulat. longitud. flaminum. Stigma simpl.

*Peric.* Drupa subrot.

*Sem.* Nux. ovat. obtusa 2-locul. Nuclei solitar. oblongi.

*Domingensis.* P. Jacq. *Am. tab.* 182. f. 6. ed. 2. *picda tab.* 259. f. 5.

*In Sylvaticis Domingo h.*

Arbuse. erecta. Rami junior. 4-gon. sulcati. Fol. semiped. opposita, petiolis superne ad angul. obusum inflexis, ovat-oblon. acumin. integerr. glabra, subtus venosa. Paniculæ axill. 3-pollic. Fl. plurimi, exigui, albi, sæpe triandri; calyce, corollaq. 3-part.

## P E R A M A .

*Cal.* Perian. 4-phyll. laciniis ovatis, acut. villosis.

*Cor.* 1-pet. Tubus longus, receptac. pistilli infertus. Limb. 4-fid. lacin. subrotund.

*Stam.* Filam. 4. intra divisuras cor. Anth. subrot. 2-locul.

*Pist.* Germ. ovatis, utriusq. sulcatum. Styl. long. Stigm. acutum.

*Peric.* . . . . .

*Sem.* . . . . .

*hirsuta.* P. Aubl. *Guian. tab.* 18.

*In Guianæ locis humidis h.*

Planta herbacea, tota cooperta pilis rufescentibus. Caul. 1-2-ped. ramosus. Fol. opposita, sessil. ovata, nervis longitudinalibus. Fl. terminal. capitati. Receptacul. paleaceum, paleis fimbriatis intra singulos fl. Cor. lutea.

## M O N E T I A .

*Cal.* Perian. 1-phyll. ventricos. obsolete semi-4-fid. nunc 2-3-fid. pubesc. lacin. lanceol. acutis, reflexis.

*Cor.* Pet. 4. receptac. inserta, linear. acuta, revoluta.

*Stam.* Filam. 4. erecta, receptac. inserta, fere longitud. cor. Anth. oblon. 2-locul. peltatæ, luteæ.

*Pist.* Germ. superum, sub 4-gon. Styl. crassiusc. conicus. Stigm. acutum.

*Peric.* Bacca? globosa, exsucca, calyculata; capitulo mammoso apici imposito; 2-locul. 3-lin. longa, & lata.

*Sem.* 2. adpressæ, orbicular. compressa, intus plana, extus subconvexa.

*Character essentialis.*

*Cal.* 4-fid. Pet. 4. Germ. superum. Bacca? 2-locul. Sem. solitaria.

*barlerioides.* M. Herit. *Surp. nov. tab. 1.*

*Lycium* Ind. &c. *Seb. thes. 1. tab. 13. f. 1.*

*Synon.* *Barleria hystricis* in *Lin. ic.* *Seb. fl. vidua* utriusq. convenit.

*In India* h. *Sonnerat.*

*Frutex* mediocris, aculeatus, habitu *Barleria hystricis*. Rad. cinerea, odore *Glycyrrhizæ*. Caul. erectus, rimosior, cinereus. Rami oppositi, diduci, ramuloti. Turiones ramulis conformes, in solo natali pubescent. in hortis nudi. Acul. 4-verticillati, decussati, horizontal. axillar. e singula ala binati, subulati, pungent. apice sphacelati, longitudine dimidii fol. Fol. opposita, breviter petiol. patentia, ovat-lanceol. acumine spinoso, arguto, sphacelato, reflexo, 1-nervia, integra, persistent. 1.  $\frac{1}{2}$  poll. long. 8. lin. lata. Fl. axillar. nonnihil conferti, ad apicem terni, quandoq. solitar. sessil. herbac. autumnal. 2. lineas lari. Bract. (seu nascentes aculei) opposita, 2-phyll. Petal. linear. revoluta. Fruct. globosus, exsuccus, calyculatus; capitul. mammoso apice imposito; 3. lin. longo, & lato.

*Hospitatur in Tepidario.*

## MANABEA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. villosum, 4-dent. denticul. acunis.

*Cor.* 1-pet. tubulosa: tubus calyce longior, receptaco pistil. insertus: limb. 4-fid.

*Stam.* Filam. 4. oblong. tubo inserta, infra divisuras.

*Pist.* Germ. minim. subrot. Styl. longus, 2-part. Stigm. obtusum.

*Peric.* Bacc. ovata, calyc. obvoluta, 2-locul.

*Sem.* 1-2.

*villosa*, *M.* fol. ovat. subtus incanis: fl. glomeratis, viscentibus. *Aubl. Guian. tab. 23.*

*In Caienna h.*

*Frutex* 8-ped. *Caul.* pl. erecti, ramosi 4-goni, incani. *Fol.* opposita, breviter petiol. inaequalia, uno ma; altero min. acuta, integerr. *Fl.* subaxill. corymbosi, corymb. oppositis, pedunc. comm. 3-part. *Cor.* subviridis. *Bacca* lutea.

*arborescens*, *M.* fol. ovatis, acumin. fl. glomeratis, albis. *Aubl. Guian. tab. 24.*

*In Caienna, & Guiana h.*

*Frutex* 10-pedal. superne ramosus, ramis, & ramulis 4-gonis, nodosis, sparsis. *Fol.* opposita, petiol. integerr. glabra, supra viridia, subtus pallidiora. *Fl.* axill. corymb. oppositis, 3-part. *Cor.* alba, *Drupa* compressa, lutea.

*lævis*, *M.* fol. oblon-ovat. acuminat. *Aubl. Guian. tab. 25.*

*In Guiana h.*

*Frutex* 8-ped. *Caul.* pl. recti, ramosi, 4-goni. *Fol.* opposita. *Fl.* subaxill. corymbis oppositis, pedicell. 3-part. *Bract.* 2. ad basin ramorum. *Fl.* in capitulum collecti. *Cor.* flava, lacin. obtusis.

## TACHIA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. oblong. tubulos. 5-dent. denticul. erecti. acutis.

*Cor.* 1-pet. tubulosa, receptac. pistil. inserta; fauce inflata: limb. 5-fid. lacin. ovat. acut. reflexis.

*Stam.* Filam. 4. infimæ p. rti cor. adfixa. Anth. oblong. 2-locul. extra tubum prominentes.

*Pist.* Germ. oblong. disco 5-glandulari ad basin circumdatum. Styl. longiss. Stigm. bilamel-latum.

*Peric.* Caps. oblong. calyce tecta, 2-locul.

*Sem.* numerosa, minutissi.

*Guianensis.* T. *Aubl. Guian. tab. 29.*

*In sylvis Sinemariensibus h.*

Frutex 5-6-ped. Rami plurimi, oppositi, sar-mentosi, nodosi, 4-goni. Fol. opposita, am-plexicaul. ovata, acuta, integerr. glabra. Fl. axill. utrimq. solitar. Cor. lutea.

*Fagara pentandra non videtur pertinere ad hoc genus.*

### ROUPALA.

*Cal.* Perian. o.

*Cor.* Pet. 4. oblong. obtusa basi angusta, subtus convexa, supra concava.

*Stam.* Filam. 4. breviss. versus medium petali inserta.

*Anth.* oblong. obtusæ, 2-locul. in cavitate pe-tali reconditæ.

*Pist.* Germ. subrot. villosum. Styl. longus. Stigm. crassiusc. subovatum.

*Peric.* 1-locul.

*Sem.* 1.

*montana.* R. *Aubl. Guian. tab. 32.*

*In Guiana h.*

Frutex ramis 3-4-pollic. Fol. alterna, petiol. ovata, acuta, integerr. rigida, limbis sursum revolutis, quasi canaliculatis. Fl. axill. & ter-minal. spicati, bini, semper sessil. alterni. Pet. villosa, supra candicant. subtus lutea.

### POUTERIA.

*Cal.* Per. 1-phyll. 4-part. lacin. ovat. acutis, non deciduis.

*Cor.* 1-pet. tubulosa. Tubus brevis, calyc. fun-do insertus: limb. 4-dent. denticul. acutis, intra quos seta oblonga erigitur.

*Stam.* Filam. 4. tubo cor. ad basin inserta.

*Anth.* oblong. 2-locul.

*Pist.*

# TETRANDRIA MONOGYNIA. 355

*Pist.* Germ. superum, ovatum, villosum. Styl. 4-gon. Stigm. 4-cuspidat.

*Peric.* Capsl. ovat. pilis brevibus, rigidis tecta, 4-locul. 4-valv. valvis intus purpurascent.

*Sem.* solitar. oblonga, extus convexa, intus angulata, membrana tenui, purpur. involuta.

*Guianensis.* *P. Aubl. Guian. tab. 33.*

*In Sylvis sinemariensibus h.*

*Arb.* 40-ped. superne ramosa, ramis rectis, sparsis. Fol. congesta, alterna, longe petiolat. ovat-oblong. acuta, integerr. rigida, glabra. Fl. axill. & supra ramulos, binati, ternati, breviter peduncul. Cor. subvirid.

## MACOUCOUA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. 4-part. lacin. brevibus, acutis.

*Cor.* 2-pet. receptac. pistilli inserta: tubus breviss. limb. 4-fid. lacin. subrotun.

*Stam.* Filam. 4. intra divisuras cor.

*Anth.* subrot. 2-locul.

*Pist.* Germ. minimum, subrotun. Styl. nullus, Stigm. obtusum.

*Peric.* : : : : : : : :

*Sem.* : : : : : : : :

*Guianensis.* *M. Aubl. Guian. tab. 34.*

*In Caienna, & Guiana h.*

*Arb.* 30-40-ped. superne ramosa. Fl. axill. corymbosi, peduncul. Cor. alba.

## VOTOMITA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. 4-dent.

*Cor.* Pet. 4. oblong. acuta, reclinata, disco inserta.

*Stam.* Filam. 4. breviss.

*Anth.* oblong. membrana tenui terminatæ, & in cylindrum tubulosum quasi connatæ, introrsum dehiscences.

*Pist.* Germ. calyce inclusum, disco coronatum. Styl. longus, tubum, staminibus formatum, perforans. Stigm. 4. oblong. acuta.

*Peric.* Drupa infera, cal. adnata, & coronata, 1-locul.

*Sem.* 1, striatum,

Z

356 TETRANDRIA MONOGYNIA.

*Guianensis*, V. Aubl. *Guian.* tab. 35.

*In Guiana* h.

Frutex 5-6-ped. superne ramosus; ramis sparsis, nodosis; ramusc. 4-angul. Fol. opposita, subsessil. ovata, acuta, integerr. rigida, glabra. Stipula brevis, acuta, ad basin petioli, decidua. Fl. axill. corymbosi. Corymb. oppositi, 3-4-fl. Cor. alba.

ROUHAMON.

*Cal.* Perian. 1-phyll. 4-part. lacin. acutis; squamulis 2. ad basin munitum.

*Cor.* 1-pet. tubulosa. Tubus brevis, receptaculo pistil. insertus: limbus 4-fid. laciniiis acut. villosis.

*Stam.* Filam. 4. tubo cor. inserta.

*Anth.* oblong. 2-locul.

*Pist.* Germ. ovatum. Styl. longitudine cor. Stigma obtusum.

*Peric.* Capsul. orbicul. 1-locul.

*Sem.* 2. ovata, hinc plana, inde convexa.

*Guianense*, R. Aubl. *Guian.* tab. 36.

*Ad ripas fluvii Sinemariensis* h.

Frutex 7-8-ped. Rami longiss. supra arbores sparsi. Fol. opposita, subsessil. subrotund-acuta, integerr. supra pallide virent. subtus subcinerea, trinervia. Fl. corymbosi: corymbi axill. oppositi, subsessil. Cor. alba. Caps. flavescens. Quandoq. cirrhus axill. oblong. rectus, ad apicem incurvus, & incrassatus.

*Var. cirrhis orbata*: fol. glabrioribus: fl. & fructibus min.

COUSSAREA.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dent.

*Cor.* 1-pet. Tubus brevis, disco supra germen insertus: limb. 4-fid. lacin. oblong. acutis.

*Stam.* Filam. 4. tubo inserta, infra divifuras limbi.

*Anth.* oblong. 2-locul.

*Pist.* Germ. subrotund. cal. adnatum, disco coronatum. Styl. longus. Stigm. 4-5-cuspidat.

*Peric.* Bacca ovata. umbilic. 1-locul.

*Sem.* 1. coriac. subrotund.



violacea.

*C. Aubl. Guian. tab. 38.**In Guiana h.*

Frutex 8-ped. ramosus, ramis, & ramulis oppositis. Fol. ampla, opposita, petiolat. ovata, acuta, integerr. glabra. Stipul. ad basin utrimq. petiol. latæ, acutæ. Fl. terminal. corymbosi, corymb. subsessilibus. Cor. alba. Bacca cortice extus violac. intus subcarnos. lutea.

## E V E A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. patens, 4-dent. denticul. minimis.

*Cor.* 1-pet. infundibulif. Tubus longus, disco supra germen insertus; limb. 4-fid. lacin. acutis.

*Stam.* Filam. 4. breviss. tubo ad basin inserta.

*Anth.* oblong. linear. 2-locul.

*Pist.* Germ. inferum, ovat. calycis fundo adnatum, disco coronatum. Styl. brevis. Stigma 2-lobum.

*Peric.* . . . . .

*Sem.* . . . . .

Fl. capitati. Invol. 4-phyll. foliol. 2. inferior. latioribus, oppositis, subrotun. acutis.

Guianensis.

*E. Aubl. Guian. tab. 39.**In Guiana h.*

Frutex 6-8-ped. Rami oppositi, nodosi, 4-gonj

Fol. opposita, petiolat. ovata, oblonga, integerr. rigida, glabra. Stipul. 2. utrimq. ad basin petioli, breves, acutæ. Capitula axillar. pedunculata. Receptacul. fl. paleaceum.

## F A M A R E A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. 4-dent.

*Cor.* 1-pet. tubulosa. Tubus disco supra germen insertus: limb. 4-fid. lacin. oblong. acutis.

*Stam.* Filam. 4. brevia, tubo versus basin inserta.

*Anth.* oblong. linear, 2-loc.

*Pistil.* Germ. calyci adnatum, inferum. Styl. longus. Stigma subrotun. 2-lob.

*Peric.* 2-locul.

*Sem.*

corymbosa.

F. fol. ovat. acutis: pedunc. ternatis, corymbosis.

*Aubl. Guian. tab. 40. f. 3.*

*In Guiana h.*

Z ij

- Frutex 7-8-ped. Rami sparsi, oppositi. Fol. subsessil. integerr. glabra. Stipul. 2. utrimq. ad basin petioli, acutæ. Fl. in 3. corymbos terminal., pedunculati: corymbi compressi, quasi flabelli, 10-15-fl. Cor. alba.
- sessiliflora.* F. fol. ovatis, acutis: fl. sessilibus, terminatricibus. Aubl. Guian. tab. 40. f. 2.
- Idem in locis h.*
- Differt a priore fl. sessilibus, corymb. 3-4-fl. Cor. tubo longiore.*

## MALANEA.

- Cal. Perian. 1-phyll. 4-dent.
- Cor. 1-pet. Tubus breviss. disco supra germen insertus: limb. 4-fid. lacin. acut. villosis.
- Stam. Filam. 4. tubo inserta, intra divifuras cor.
- Anth. subrotund 2-locul.
- Pist. Germ. subrotund. calycis fundo adnatum, disco coronatum. Styl. 2-fid. Stigm. obtusum.
- Peric. Bacca ovata, calyc. denticul. coronata, 1-locul.
- Sem. Officul. 2-locul. Sem. 1. oblong. in quolibet loculo.
- sarmentosa.* M. Aubl. Guian. tab. 41.
- Supra arbores in Guiana h.*
- Frutex 3-5-ped. Rami longiss. oppositi, supra proceras arbores expansi. Fol. opposita, petiolat. ovata, obtusa, integerr. supra viridia, subtus tomentosa, lanugine rufescente. Stipul. utrinq. ad basin petiolor. oblong. acuta, villosa, decidua. Fl. glomerulis oppositis inspicam digesti; spicis oppositis, axillar. villosis. Cal. tomentosus. Cor. subcærul. Bacca viridis.

## TONTANEA.

- Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. 4-dent.
- Cor. 1-pet. infundibulif. Tubus longus, disco supra ovarium insertus. Limb. 4-fid. lacin. acutis.
- Stam. Filam. 4. oblong. fauci cor. inserta.

*Anth.* subrot. 2-locul.

*Pist.* Germ. subrotund. fundo calyc. adnatum, disco coronatum. Styl. longus, 2-part. Stigm. obrusa.

*Peric.* Bacca ovata, calyc. denticul. coronata, 2-partibil. 2-locul.

*Sem.* plurima, subrotund. convexa, marginata, dissepimento adfixa, nigricant.

*Guianensis.* *T. Aubl. Guian. tab. 42.*

*In sylvis Caiennæ & Guianæ 24.*

Caulis decumbent. radicans. carnosus, semiped. erectus, tomentosi. Fol. opposita, petiolat. ovata, carnosae, integerr. subroment. Stipul. utrimq. 2. ad basin petioli. Fl. axill. capitati, longe peduncul. Capirula 3-5-fl. Cor. alba, vel cœrul. Bacca carnosae, viscosa, cœrul.

## P A T A B E A.

*Cal.* Perian. 1-phyll. turbinat. 4-dent. denticul. acut.

*Cor.* 1-pet. Tubus oblong. disco supra germen insertus. Limb. 4-fid. lacin. oblong. acutis.

*Stam.* Filam. 4. brevia, tubo ad faucem inserta.

*Anth.* oblong. 2-locul.

*Pist.* Germ. inferum, calyc. fundo adnatum, disco coronatum. Styl. oblong. 2-fid. Stigm. 2. obrusa.

*Peric.* . . . . .

*Sem.* . . . . .

*coccinea.* *P. Aubl. Guian. tab. 43.*

*In Guiana h.*

Frutex 4-5-ped. superne ramosus. Fol. opposita, petiolat. subrus pallide virent. Stipul. utrimq. ad basin petioli, oblong. acutæ. Fl. terminali capitati. Capirulum squamosum. Receptac. paleis oblong. acutis, intra singulos fl. Cor. rubra.

*Embelia Burmanni.*

*De charactere huius generis essentiali nihil certi pronunciare audeo, non visa specie Burmanniana; fide utem König. binæ huius sunt spec.*

360 TETRANDRIA MONOGYNIA.

- Ribes*. E. fol. obovat. alternis. *Burm. Ind. tab. 23.*  
*In India.*
- Grossularia*. E. fol. ovat-lanceol. oppositis: fl. tetrandris.  
*Retz. Obs. fusc. 4.*  
*In Tranquebaria.*  
 Arb. ramis oppositis. Fol. petiolat. integerr.  
 nervosa, pallide virid. Racemi compositi, ter-  
 minal. ramorum, e folior. axillis prodeunt.  
 Fl. parvi, albescentes. Cal. inferus, cavus,  
 4-fid. laciniis rotundatis. Stam. 4. Pistil. Stigm.  
 capitatum. Stylus nullus, Germ. superum,  
 globosum. Bacca.  
*Huius gen. videtur Ribesoides Lin. Fl. Zeyl.*  
*etsi pentandra sit, & pentapetala.*

DIGYNIA.

PEGAMEA.

- Cal.* **P** Erian. 1-phyll. turbinat. 4-dent.  
*Cor.* 1-pet. Tubus brevis, disco supra germen  
 insertus: limb. 4-fid. lacin. subrotun. villosis.  
*Stam.* Filam. 4. breviss. fauci tubi inserta.  
*Anth.* subrot. 2-locul.  
*Pist.* Germ. fundo calyc. adnatum, subrot. dis-  
 co coronatum. Styli 2. Stigmata acuta.  
*Peric.* Bacca calyc. fundo immersa, 2-locul.  
*Sem.* Ovicul. 2. hinc convexa, inde plana, 2-  
 locul. unicum in quolibet loculo; quandoq.  
 unum abortitur.
- Guianensis.* *P. Aubl. Guian. tab. 44.*  
*In Guiana b.*  
 Frutex 7-8-ped. ramulis inclinatis. Fol. oppo-  
 sita, lanceol. integerr. glabra. Stipul. ample-  
 xic. 2-loba. Fl. axill. terminal. oppositi, fesi-  
 cil. laxe spicati. Cor. alba. Bacca viridis.



# CLASSIS V.

## PENTANDRIA.

### MONOGYNIA.

*Fl. monopet. inferi, monospermi.*

289. *Mirabilis*. Cal. inferus. Cor. infundibulif. supera. Nectar. globosum, germen includens. Nucula infra corollam.
256. *Weigelia*. Cor. infundibulif. Styl. e basi germinis. Stigm. peltat. Sem. 1.
258. *Plumbago*. Cal. 6-dent. Cor. infundibulif. 5-fid. Stam. squamis basin cor. claudentibus, inserta. Stigm. 5-fid. Sem. 1, oblong. tunicatum.
- Fl. monopet. inferi, 2-spermi. Asperifolia.*
221. *Cerithe*. Cor. limbus tubuloso-ventricosus, ore 5-dent. fauce nuda. Anth. pone hamulis cohærentes. Caps. 2-locul. ex seminibus binis, ossibus coalitis.
227. *Messerschmidia*. Cor. infundibulif. fauce nuda. Bacca suberosa, 2-partibilis; singulo 2-spermo.
- Fl. monopet. inferi, 4-spermi. Asperifolia.*
226. *Echium*. Cor. tubuloso-campanifor. irregular. fauce nuda. Stam. inæqualia.
214. *Heliotropium*. Cor. hypocraterif. 5-fida, dentibus interiectis; centro fl. plicato, sine glandulis.
219. *Pulmonaria*. Cal. prismatiko-5-gon. 5-dent. Cor. infundibulif. limbo 5-fid. concavo, lacin. rotundis, fauce pervia.
216. *Lithospermum*. Cal. 5-part. Cor. infundibulif. limbo 5-fid. fauce perforata, nuda. Sem. 4, dura. Differt a *Myosotide* fauce pervia, & stigmatibus binis.
222. *Onosma*. Cor. tubuloso-ventricosa, 5-fid. fauce pervia. Sem. 4, distincta.
220. *Symphytum*. Cor. tubuloso-ventricosa, limb. 5-fid. segmentis erectis; fauce clausa radius subularis.
223. *Borago*. Cor. rotata, 5-part. segment. cuspidatis; fauce rad. clausa duorum ordinum. Filam. brevissimi.

- ma; fulcro ad basin adfixa. Anth. oblong.  
acutæ, conniventes.
225. *Lycopsis*. Cor. infundibulif. tubo incurvo; limbo 5-fid.  
fauce fornicata.
224. *Asperugo*. Cal. 5-fid. post efflorescentiam compressus, forma 2-valv. Cor. infundibulif. tubo recto, brevissimo; limbo semi-5-fid. squamulæ 5. in fauce positæ.
218. *Cynoglossum*. Cor. infundibulif. tubo brevi, segment. orbicular. fauce clausa fornicibus. Sem. 4, depressa, interiore tantum latere stylo adfixa.
217. *Anchusa*. Cor. infundibulif. tubo longo, recto, limbi segment. orbicularibus; fauce clausa 5 squamul.
215. *Myosotis*. Cor. hypocraterif. 5-fid. emarginata; faux glandulosa, intericlis plie's albidis.  
*Fl. monopet. inferi, 5-sperm.*
229. *Nolana*. Cor. monopet. campanulata. Styl. inter germina. Sem. 5, baccata, 2-4 locul.  
*Fl. monopet. inferi, angiospermi.*
290. *Coris*. Cal. 10-dent. Cor. subringens, 5-fid. Stigm. capratum. Caps. 5-valv. 1-locul.
241. *Hydrophyllum*. Cor. campanul. intus striis 5, melliferis, longitudinalibus exarata. Stigm. 2-fid. Caps. globosa, 2-valv. 1-locul.
329. *Galax*. Cal. 10-phyll. Cor. hypocraterif. Stigm. subrotund. Caps. 2-valv. 1-locul. elastica.
234. *Cortusa*. Cal. 5-fid. Cor. rotata, semi-5-fid. fauce anulo elevato. Caps. ovalis, 1-locul. apice 5-valv.
244. *Anagallis*. Cal. profunde 5-fid. Cor. rotata, 5-fid. Caps. circumscissa, 1-locul.
243. *Lysimachia*. Cal. 5-fid. Cor. rotata, 5-part. Stigm. obtusum. Caps. globosa, mucronata, 5-10-valv. 1-locul.
237. *Cyclamen*. Cor. rotata, 5-part. reflexa, fauce prominente. Stigm. acutum. Caps. globosa, pulposa, 5-valv. 1-locul. polysperm.
236. *Dodecatheon*. Cor. rotata, reflexa. Stam. tubo insidentia. Stigm. obtusum. Caps. oblong. 1-locul.
235. *Soldanella*. Cal. 5-fid. Cor. campanulata, lacero-multifida. Stigm. simpl. Caps. cylindræa, 1-locul. apice multident.
233. *Primula*. Involuc. umbellæ. Cal. 5-fid. Cor. infundibulif. ore parulo, fauce pervia. Stigm. globosum. Caps. 1-locul. 5-10-valv.
232. *Androsace*. Involuc. umbellæ. Cor. hypocraterif. tubo brevi, ventricoso, ore 5-fid. glanduloso; fauce co-

- arctata. Capf. globosa, 1-locul. 5-valv. polysperm.
231. *Aresia*. Cor. hypocraterif. tubo ovato, limbo 5-fid. Stigm. depresso-capitatum. Capf. globosa, 1-locul. sub 5-sperm.
240. *Hottonia*. Cal. 5-fid. Cor. hypocraterif. tubo infra stam. limbo 5-fid. plano, plicis binis ad basin singuli segnenti. Stigm. globosum. Capf. acumin. 1-locul.
238. *Menyanthes*. Cal. 5-fid. Cor. campanul. semi-5-fid. laciniis ciliatis. Stigm. 2-fid. Capf. oblonga, 1-locul. 2-valv. polysperm.
239. *Doræna*. Cor. 5-fid. Stigm. emarginatum. Capf. 1-locul.
361. *Allamanda*. Contorta. Capf. lensiform. echinata, erecta, 2-valv. valvulis cymbiformibus polysper. Sem. imbricata.
245. *Theophrasta*. Cor. campanulata, laciniis, & divisuris obtusis. Stigm. acutum. Capf. maxima, globosa, 1-locul. polysper.
253. *Sheffeldia*. Cor. campanulata. Filam. 10, alterna sterilia. Capf. 1-locul. 5-valv.
246. *Retzia*. Cor. cylindrica, extrus villosa. Stigm. 2-fid. Capf. 2-locul.
247. *Spigelia*. Cor. infundibulif. Stigma simplex. Capf. globosa, didyma, 2-locul. polysper.
248. *Ophiorrhiza*. Cor. infundibulif. Stigma 2-fid. Capf. 2-loba, 2-locul.
261. *Convolvulus*. Cor. campanulata, plicata. Stigm. 2-fid. Capf. 2-locul. loculis 2-sperm.
250. *Lisianthus*. Cor. infundibulif. tubo ventricoso, laciniis recurvatis. Cal. carinatus. Stigm. 2-lamellatum. Styl. persistens. Capf. oblonga, 2-locul. 2-valv. valvulorum marginibus intortis, polysperma.
308. *Patagonula*. Cal. fructiferus maximus. Cor. rotata. Stylus dichotomus, declinatus. Capf. 2-locul.
293. *Datura*. Cal. tubuloso-angulatus, deciduus. Cor. infundibulif. 5-angulato-plicata. Capf. 4-valv. 2-locul. polysper. plerumq. echinata.
294. *Hyoscyamus*. Cor. infundibulif. inæqual. obtusa, 5-fid. Stam. declinata. Stigm. capitatum. Capf. operculata, 2-locul.
295. *Nicotiana*. Cor. infundibulif. limbo plicato. Stam. inclinata. Stigm. emarginatum. Capf. 2-valv. 2-locul.
292. *Verbascum*. Cor. rotata, subinæqualis, limbo 5-fid. Stam.

364 PENTANDRIA MONOGYNIA.

- inæqual. declinata. Stigm. obtusum. Capf. 1-valv. 2-locul.
306. *Chironia*. Cor. rotata. Stam. tubo cor. insidentia. Anth. defloratæ spirales. Capf. 2-locul.
230. *Diapensia*. Cal. 8-phyll. imbricatus. Cor. hypocraterif. Capf. 3-locul.
259. *Phlox*. Cal. prismaticus. Cor. hypocraterif. tubo curvo. Stam. inæqual. Stigm. 3-fid. Capf. 3-locul. 1-sperm.
263. *Polemonium*. Cor. 5-part. fundo clauso valvis staminiferis. Stigm. 3-fid. Capf. ovata, 3-locul. supera.
262. *Ipomea*. Cor. infundibulif. Stigm. capitato-globosum. Capf. 3-locul.
291. *Brossæa*. Cal. carnosus. Cor. truncata. Capf. 5-locul. polysper.
254. *Azalea*. Cal. campanif. 5-fid. repandus. Cor. campanulata. Stam. receptac. inserta. Stigm. obrusum. Capf. 5-valv. 5-locul. subrotunda. Staminum num. differt ab *Erica*, & *Andrameda*.
255. *Epacris*. Cor. infundibulif. villosa. Squamæ nectariferæ germini adnatæ (in quo essentia generis). Capf. 5-valv. 5-locul.
368. *Ceropogia*. Contorta. Cor. limbus connivens. Folliculi 2, erecti. Sem. plumosa.
363. *Nerium*. Contorta. Cal. parvus, 5-fid. Cor. tubus terminatus corona lacera villosa; laciniis magnis, profundis. Folliculi 2, erecti. Sem. plumosa.
364. *Echites*. Contorta. Cor. infundibulif. fauce nuda. Folliculi 2, erecti. Sem. papposa.
269. *Pergularia*. Contorta. Cor. hypocraterif. Nectar. ambiens genitalia cuspidibus 5. sagittatis. Folliculi 2.
365. *Plumieria*. Contorta. Cor. infundibulif. Follic. 2, reflexi. Sem. alata, membranæ propriæ inserta.
366. *Cameraia*. Contorta. Cor. hypocraterif. Follicul. 2, horizontales, lobati. Sem. alata.
367. *Tabernaemontana*. Cor. hypocraterif. Follic. 2, pulpofi. Sem. nuda.
362. *Vinca*. Contorta. Cor. hypocraterif. 5-fid. lacin. extrorsum latioribus. Follic. 2, erecti. Sem. nuda, remota.
302. *Ignatia*. Cal. 5-dent. Cor. infundibulif. longissima. Drupa 1-locul. polysper.
358. *Carissa*. Contorta. Baccæ 2, polysperm.
305. *Jacquinia*. Cor. 10-fida. Stam. receptac. inserta. Bucca 1-sperm.



PENTANDRIA MONOGYNIA. 365

311. *Laugiera*. Cor. 5-fid. Stigm. capitatum. Drupa nucleo 5-locul.
357. *Paderia*. Contorta. Styl. 2-fid. Bacca inflata, fragilis, 2-sperm.
310. *Varronia*. Cor. 5-fid. Stigm. 4-duplex. Nux 4-locul.
307. *Cordia*. Cal. baccæ accretus. Cor. infundibulif. Styl. dichotomus. Drupa nucleis 2-locul.
309. *Ehretia*. Stigm. emarginatum. Drupa 4-sperm. Nux 2-locul.
228. *Tournefortia*. Bacca 2-locul. 2-sperma, supera, apice 2 poris perforata.
356. *Rauwolfia*. Contorta. Bacca succulenta, 2-sperm. Sem. cordata.
359. *Carbera*. Contorta. Drupa 1-sperm. Nux compressa, retusa.
418. *Arduinia*. Cor. monopet. curvata. Stigm. 2-fid. Bacca 2-locul. 2-sper. Sem. oblong.
320. *Myrsine*. Cor. semi-5-fid. connivens. Stigm. villosum. Germ. corollam replens. Bacca nucleo 5-locul. Essentia generis sita est in stigmate maximo, fimbriato-plumoso, extra fl. exprorecto.
321. *Bladhia*. Cor. rotata, decidua. Bacca 1-sper. Sem. arilatum.
303. *Cestrum*. Cor. infundibulif. Stam. denticulo in medio notata. Bacca 1-locul. polysper. Differt a *Lycio* bacca 1-locul.
312. *Brunfelsia*. Cor. infundibulif. longissima. Bacca 1-locul. polysper.
251. *Randia*. Cal. 1-phyll. truncatus. Cor. hypocraterif. Bacca 1-locul. cortice capsulari.
252. *Fagraea*. Cal. campanulat. Cor. infundibulif. Stigm. peltatum. Bacca carnosæ, 2-locul. Sem. globosæ.
300. *Strychnos*. Cor. 5-fid. Stigm. capitatum. Bacca cortice lignoso, 1-locul.
299. *Capficum*. Cor. rotata. Anth. conniventes. Bacca exsucca, 2-locul.
298. *Solanum*. Cor. rotata. Anth. subcoalitæ, apice biperforatæ. Bacca 2-locul. calyce patulo recta.
297. *Physalis*. Cor. rotata. Anth. adproximatæ. Bacca 2-locul. intra calyc. inflatum clausa.
296. *Atropa*. Cor. campanul. Stam. distantia, incurva. Bacca globosæ, 2-locul.
242. *Ellisia*. Cor. infundibulif. angusta. Bacca subrotunda, exsucca, 2-locul. 2-valv. Sem. 2, punctata, altero supra alterum.

366 PENTANDRIA MONOGYNIA.

304. *Lycium*. Cal. 5-dent. Cor. tubulosa, fauce clausa filamentorum villo. Bacca 2-locul. polysperm.  
 206. *Menais*. Cal. 3-phyll. Cor. hypocraterif. Stigm. 2. Bacca 4-locul. 4-sperm.  
 314. *Sideroxylon*. Cor. 8-10-fid. laciniis interioribus incurvis. Stigm. simpl. Bacca 4-5-sper.  
 313. *Chrysophyllum*. Cor. campanul. 10-fid. lacin. exterioribus patentissimis. Bacca 10-sper.

\* *Achras*.

*Fl. monopet. superi.*

268. *Samolus*. Cal. 5-fil. Cor. hypocraterif. 5-fid. Stam. multinita squamulis cor. Stigm. capitatum. Capsf. 1-locul. infera, 5-valv. polysperm.  
 272. *Bellonia*. Cor. rotata. Stigm. acutum. Capsf. infera, 1-locul. polysper: umbilico rostrato.  
 249. *Vireia*. Cal. 5-phyll. dentibus interiectis. Cor. infundibulif. Stigm. 2-part. Capsf. 1-locul.  
 271. *Macrocnemum*. Cor. campanul. Stigm. 2-lob. Capsf. infera, turbinata, 2-locul. Sem. imbricata.  
 270. *Rondeletia*. Cor. infundibulif. Stigm. obtusum. Capsf. infera, subglobosa, coronata, 3-locul. polysper.  
 275. *Cinchona*. Cor. infundibulif. apice lanata. Stigm. simpl. Capsf. infera, 2-locul: dissepimento parallelo. Sem. imbricata.  
 273. *Portlandia*. Cor. ventricosa. Anth. longitudinal. Stigm. simplex. Capsf. 5-gona, retusa, 2-locul. polysper. coronata calyc. 5-phyll. Sem. imbricata.  
 265. *Rozella*. Cor. infundibulif. fundo clauso valvulis staminiferis. Stigm. 2-fid. Capsf. cylindrica, 2-3-locul. coronata, infera.  
 266. *Phyteuma*. Cor. tubuloso-corniculata, 5-fid. lacin. linearibus, basi coalitis. Stigm. 2-3-fid. Capsf. infera, 2-3-locul. Sem. exigua. Fl. in capitulum, aut spicam collecti.  
 264. *Campanula*. Cal. 5-fid. Cor. saepius campanul. 5-fid. fundo clauso valvulis staminiferis. Stigm. 3-fid. Capsf. infera, poris lateralibus, dehiscens.  
 274. *Scavola*. Cor. monopet. irregularis, tubo longitudinaliter fisso; limbo 5-fid. laterali, flabellifor. Drupa infera, 1-sper. Nux 2-locul.  
 267. *Trachelium*. Cor. infundibulif. Stigma capitatum. Capsf. infera, 3-locul. perforata.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 367

283. *Matthiola*. Cor. infundibulif. longiss. indivisa, supera. Cal. integer. Stigm. obtus. Drupa nucleo globoso.
282. *Morinda*. Fl. aggregati, infundibulif. Stigm. 2-fid. Drupæ aggregatæ, 1-sper.
276. *Ptychotria*. Cal. 5-dent. coronatus. Cor. infundibulif. Stigm. emarginatum. Bacca globosa. Sem. 2. hemisphærica, fulcata.
277. *Coffea*. Cor. hypocraterif. Stam. supra tubum. Stigm. 2-part. Bacca infera. Sem. arillat.
278. *Chiococca*. Cor. infundibulif. Stigm. simpl. Bacca infera, 1-locul. 2-sperm.
360. *Gardenia*. Contorta. Cor. monopet. Anth. tubo cor. absque filamentis, insertæ. Bacca infera, 2-4-locul. polysper.
301. *Genipa*. Cor. rotata. Stigm. clavatum. Bacca subrotund. 2-locul. Sem. nidulantia, cordata.
280. *Lonicera*. Cal. 5-dent. Cor. monopet. irregul. varia; tubulosa, vel campanul. limbo 5-fid. lab. super. 2-4-fid: infer. 3-fid. vel integro. Bacca infera, subrotund. 2-loc. polysper.
281. *Triosteum*. Cal. longitudine cor. Cor. monopet. subæqualis. Bacca infera, coriacea, 3-locul. 3-sper.
287. *Mussaenda*. Cor. infundibulif. Stigm. 2, crassiuscula. Bacca infera, oblonga, 4-locul.
279. *Hamellia*. Cor. tubo longo, limbo 5-fid. Stigm. linear. Bacca infera, 5-locul. polysper.
285. *Erithalis*. Cal. urceolat. Cor. rotata, 5-raro 6-part. lacin. linearibus, recurvis. Stigm. acutum. Bacca infera, subglobosa, 10-loc.

\* *Rubia*.

\* *Crucianella*.

\* *Prinos*.

*Fl. pentapet. inferi.*

337. *Hirtella*. Petal. 5. Filam. longissima, spiralia, persistentia. Styl. lateralis. Bacca 1-sperm.
315. *Rhamnus*. Cal. tubulosus, 4 fid. intus coloratus, squamis stam. munientibus. Petal. 4-5. Bacca rotund. 2-3-locul. Dantur etiam fl. sexu distincti.
317. *Ceanothus*. Cal. tubulosus. Petal. 5, fornicata, faccata. Bacca sicca, 3-locul. 3-sper.

368 PENTANDRIA MONOGYNIA.

322. *Celastrus*. Cal. planus. Cor. 5-pet. patens. Caps. 3-gon. 3-locul. Sem. arillata.
323. *Evonymus*. Cal. patens. Cor. 5-pet. Caps. ovata, 5-gon. 5-locul. 3-valv. colorata. Sem. baccato-arillata.
341. *Aquilicia*. Est *Leea aquata*.
343. *Vitis*. Cal. 5-dent. Petal. sæpe emarcido connata. Styl. nullus. Bacca supera, 4-5-sper. Fl. racemosi.
331. *Elæodendrum*. Cor. 5-pet. Drupa ovata, nuce 2-locul.
334. *Corynocarpus*. Nectar. 5, petaliform. cum petalis alternantia, basi glandulifera. Nux clavata.
336. *Mangifera*. Petal. 5, lanceol. Drupa reniform. Nucleus lanuginosus.
330. *Cedrela*. Cal. marcescens. Cor. 5-pet. infundibulif. basi receptac. adnata. Caps. lignosa, 5-valv. 5-locul. basi dehiscens. Sem. deorsum imbric. alata.
332. *Calodendrum*. Petal. 5, explicata. Nectar. 5-phyll. Caps. 5-locul.
319. *Bittneria*. Petal. 5, auriculata. Stam. apice petalis connata. Caps. 5-cocca, muricata.
324. *Diosma*. Cor. 5-pet. Nect. 5, supra germen. Caps. 3-5-coalitæ. Sem. arillata.
325. *Hovenia*. Petal. 5, convoluta. Stigm. 3-fid. Caps. 3-valv. 3-locul.
348. *Claytonia*. Cal. 2-valv. Cor. 5-pet. Stigm. 3-fid. Caps. 1-locul.
345. *Roridula*. Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. Anth. basi scrotiform. Caps. 3-valv. 1-locul.
328. *Itea*. Petal. longa, calyci inserta. Stigm. obtusum. Caps. 2-valv. 1-locul.
346. *Sauvagesia*. Cal. 5-phyll. Cor. 5-pet. fimbriata. Nectar. 5-phyll. cum petalis alternans. Caps. 1-locul.
347. *Caroxylon*. Cor. 5-pet. Nectar. 5-phyll. connivens, cor. insertum. Sem. tunicata.
326. *Brunia*. Fl. aggregati. Receptac. comm. villosum. Stam. unguibus petalor. inserta. Stigm. 2 fid. Sem. 1, villosum.
284. *Kuhnia*. Flos compositus, sicciculosus. Receptac. comm. nudum. Sem. 1, papposum.
269. *Nauclea*. Cor. infundibulif. Receptac. comm. globosum, nudum. Sem. 1, 2-locul.

\* *Casalpinia pentandra*. \* *Bombax pentandrum*.

\* *Cassia nictitans*.      \* *Viola*.*Fl. pentapet. superi.*

339. *Ribes*. Petal. 5., & Stam. calyc. 5-fid. inferta. Styl. 2-fid. Bacca infera, globosa, umbilicata, polyperm.
333. *Escallonia*. Petal. 5, distantia, lingulata. Stigm. capitatum. Bacca 2-locul. polyperm.
342. *Hedera*. Petal. 5, oblong. patentia, apice non coalita. Stigm. simpl. Bacca globosa, 5-sperm. calyce cincta. Fl. in umbella simplici. Frutex volubilis.
338. *Plectro-* Pet. 5, calycis fauci inferta. Anth. inclusæ, *nia*, geminatæ. Bacca infera, 2-sperm.
316. *Phylla*. Cal. turbinat. 5-part. Cor. o. Squamæ 5. Stam. munientes. Caps. infera, 3-cocca. Fl. plurimi in discum, vel capitulum collecti.
340. *Gronovia*. Cal. coloratus. Pet. minuta, cum staminibus calyc. incisuris inferta. Caps. infera, colorata, 1-sperm.
349. *Haliconia*. Spathæ utræque. Cal. o. Cor. 3-pet. irregular. Nectar. 2-phyll. Caps. 3-cocca.
327. *Cyrilla*. Pet. acuta, receptac. inferta. Styl. 2-fid. persistens. Caps. 2-locul. polyperm.
335. *Argophyl-* Pet. 5. Nectar. pyramidale, 5-angul. longitudine *lum*. cor. Caps. 3-locul.
344. *Lagœcia*. Involucra utraque. Petal. bicornia. Sem. 2., nuda.
283. *Conocar-* Cal. campanul. Pet. 5. conniventia, aut nul- *pus*. la. Sem. 1. inferum, nudum. Fl. adregati, excepta *C. racemosa*.
- Fl. incompleti, inserti.*
350. *Achyran-* Cal. exter. 3-phyll. Cor. o. Stigm. 2-fid. Sem. *thes*. 1. oblong.
351. *Celosia*. Cal. exter. 3-phyll. coloratus. Stam. basi nectario plicato coniuncta. Caps. horizontaliter dehiscens, 3-sper.
352. *Chenolea*. Cal. globosus, 1-phyll. 5-fid. Caps. 1-valv. 1-sperm.
353. *Illece-* Cal. cartilagineus, 5-phyll. Cor. o. Stigm. simpl. *brum*. Caps. 5-valv. 1-sper.
354. *Glaux*. Cal. campanul. 5-fid. coloratus. Caps. 5-valv. 5-sperm.

\* *Polygonum amphibium*: *Lapathifolium*.

# 370 PENTANDRIA MONOGYNIA.

## \* *Caratonia*.

*Fl. incompleti, superi.*

355. *Theſum*. Sem. 1. calyci aonaf. itur itaut ſegmenta cal. ex ſummo ſemine naſci videantur. Segmenta cal. triangularia, 3-4, intus colorata. Stam. tot, quot ſegmenta fl. Tuba ſimpl. apice globoſo.

## \* *Loranthus*. *Trianthema monogyna*.

## DIGYNIA.

*Fl. monopet. inferi.*

375. *Stapelia*. Contorta. Cor. rotata. Nectar. duplici ſtellula tegente genitalia. Planta carnoſa, ſuccoſa. Follic. 2.
372. *Cynanchum*. Contorta. Differt ab Aſclepiade nectario cylindrico, 5-dent.
371. *Periploca*. Cor. rotata. Nectar. 3, filiformia. Follic. 2.
373. *Apocynum*. Cor. campanul. ſemi 5-fid. Nect. glanduloſa, 3, ſetis 3. Follic. 2.
374. *Aſclepias*. Contorta. Cor. plana, vel reflexa, 5-fid. Nectar. 3, auriformia, unguicular. Follic. 2. Sem. pappoſa.
270. *Melodinus*. Contorta. Faux cor. coronata. (Nectar. in medio tubi ſtellatum). Bacca 2-locul. polyſper.
392. *Swertia*. Cor. rotata. Pori 3, nectariferi ad baſin cor. Capſ. 2-valv. 1-locul.
393. *Gentiana*. Cor. monopet. varia. Capſ. oblong. conica, 2-valv. 1-locul. receptacul. 2, longitudinalibus.
382. *Creſſa*. Cal. 5-phyll. Cor. hypocaterif. 5-fid. limbo reflexo. Filam. tubo infidentia. Capſ. 2-valv. 1-ſper.
388. *Hydrolea*. Cal. 5-phyll. Cor. rotata. Filam. baſi cordata. Capſ. 2-valv. 2-locul.
260. *Porana*. Cal. 5-fid. in fruſtu maior. Cor. campanul. Styl. elongatus, ſemibifid. perſiſtens. Stigm. globuſa. Fruſt. 2-valv.
389. *Schrebera*. Cal. 5-part. Cor. infundibulif. Filam. in fauce cor. ſquamis totidem baſeos.
383. *Steris*. Cal. 5-part. Cor. rotata. Bacca 1-locul. polyſper. *Fl. pentapet. ſuperi.*
395. *Ruffelia*. Cal. 5-phyll. Petal. 3, ſupera. Capſ. 1-locul. polyſper. *Fl. pentapet. inferi.*
391. *Velezia*. Cal. filiform. cylindric. 5-dent. Cor. 5-pet. par-

PENTANDRIA MONOGYNIA. 371

- va. Stam. etiam 6. Caps. cylindrica, 1-locul.  
polyperm. Sem. serie simpl.  
376. *Linconia*. Cal. 4-phyll. Pet. 5, foveolæ nectar. basi in-  
sculpta. Caps. feminifera, 2-locul.  
387. *Nama*. Cal. 5-phyll. Cor. 5-part. minor. Caps. 2-valv.  
1-locul.  
390. *Heuchera*. Cor. 5-pet. calyci inserta. Caps. 2-rostris, 2-  
locul.  
396. *Bumalda*. Cor. 5-pet. Styli villosi. Caps. 2-rostris, 2-locul.  
381. *Anabasis*. Cal. 3-phyll. Cor. 5-pet. minima. Bacca 1-sperm.  
calyce cincta.

\* *Staphylæa pinnata*.

*Fl. incompleti.*

380. *Salsola*. Cal. 5-phyll. subcoloratus. Cor. o. Caps. glo-  
bosa, 1-sperm. Sem. 1. cochleatum.  
378. *Chenopo-* Cal. 5-phyll. 3-gon. Cor. o. Sem. 1, lenticula-  
*dium*. re, superum, calyc. sicco involutum. Fl. glo-  
merato-racemosi.  
379. *Beta*. Cal. 5-phyll. basi semen fovens. Cor. o. Sem.  
1, reniform.  
377. *Hernia-* Cal. 5-part. Cor. o. Filam. 5, sterilia. Tubu-  
*ria*. 2-fid. Caps. 1-sper. Sem. ovatum.  
384. *Gomphre-* Cal. coloratus, exterior 3-phyll. compressus. Pet.  
*na*. 5, rudia, villosa. Nectar. cylindric. 5-dent.  
Styl. semi 2-fid. Caps. circumscissa, 1-sper.  
385. *Bosca*. Ad polygamas est relata.  
386. *Ulmus*. Cal. monophyll. 5-fid. emarcidus. Bacca ovalis,  
compressio-membranac. exsucca. Sem. 1.

\* *Rhamnus Ziziphus*.

\* *Polygonum Virginicum*.

\* *Trianthema pentandra*.

*Fl. pentapet. superl, dispermi.*

U M B E L L A T Æ.

*Involucro utroque.*

394. *Vahlia*. Ad *Russelliam* est relata.  
397. *Phyllis*. Fructificationes sparse. Stigmata hispida.  
404. *Copros-* Flos hermaphroditus. Cal. 5-part. Cor. 5-7-fid.  
*ma*. Stam. 5 ad 7. Styl. 2, longi. Bacca 2-sper.  
Sem. planiuscula. Fl. fem. & mascul. ut in  
hermaphr.

Tom. I.

A a

372 PENTANDRIA MONOGYNIA.

398. *Eryngium*. Fl. capitati. Cal. comm. 5-phyll. foliol. longissimis, acutis, rigidis. Petal. introrsum flexa. Thalam. paleaceus. Sem. 2, latere plano contigua.
399. *Hydrocotyle*. Umbella parva, simpl. irregular. Involuc. 4-phyll. Pet. integra. Sem. semi-orbiculato-compressa.
400. *Sanicula*. Umbella subcapitata, conferta. Involuc. universale fere 5-phyll. 3-lobat. aut certe dentatum. Partiale ex 5 foliol. lanceolat. Sem. oblong. muricata, cal. proprio coronata.
401. *Astrantia*. Involuc. universale magnum, polyphyll. coloratum. Cal. 5-dent. persilens. Fl. masculi, & hermaphroditi. Sem. non alata, 5-costata, sed membrana transversim plicata recta. Sem. si hac membrana, quæ facile separabilis est, exuantur, ad Ligulici sem. accedunt.
421. *Heraclium*. Involuc. caducum. Cor. radiata, inflexo-emarginata. Fruct. ellipcticus, compressus, striatus, vix emarginatus, membranaceus.
428. *Oenanthe*. Involuc. simpl. Fl. radiati, disco sterili. Pet. inæqual. Fruct. ovatus, cal. insigni, 5-dent. coronatus. Sem. ovatum, non acuminatum, striatum, intus planum.
403. *Echinophora*. Involuc. universale paucorum fol. partiale 1-phyll. multifid. Fl. radiati, petal. inæqualibus. Sem. sessil. coronata involuc. indurato.
407. *Caucalis*. Involuc. simpl. Cor. radiatæ, disci masculæ. Pet. inflexo-emarginata. Fructus muricatus.
408. *Artemisia*. Involuc. pinnatifida. Fl. radiati, disci masculi. Sem. margine crenis foliaceis.
409. *Daucus*. Involuc. universale fol. profunde pinnatifidis. Umbella in senio connivens, concava. Cor. subradiatæ, omnes hermaphrod. Fruct. pilis hispidus. Sem. ovalia, costata, aut striata.
406. *Tordylium*. Involuc. simpl. Cor. radiatæ, omnes hermaphroditæ. Fruct. suborbiculat. margine crenatus.
420. *Laserpitium*. Fl. flosculosi, abortivi. Pet. inflexo-emarginata, parentia. Sem. plerumque 4-alata.
416. *Peucedanum*. Involuc. simpl. brevissima. Fl. flosculosi, abortivi. Fructus ovatus, utrimque striatus, ala cinctus non pellucida.
410. *Ammi*. Involuc. pinnatifida. Cor. radiatæ, omnes hermaphroditæ. Fruct. exiguus, subrotund. lævis. Sem. intus planum, dorso tenuius striato.



405. *Hassel-quistia*. Pet. cordata. Fl. laterales masculi, centrali hermaphrodito. Sem. ambitus geminata, margine crenata, ovalia, plana, medio convexa; disci foliati, urceolata, hemisphaerica.
412. *Conium*. Involuc. dimidiata, sub 3-phyll. Pet. inflexo-emarginata. Fruct. subglobosus, 5-striatus, utrinque crenatus.
411. *Bunium*. Umbella conferta. Involucc. setacea. Fl. flosculosi, fertiles. Pet. cordata, reflexa. Fruct. ovali-longior, fere cylindric. Sem. subtiliter striata. Rad. carnosio-ruberosa.
414. *Ashamanta*. Pet. inflexa, emarginata. Fl. flosculosi, fertiles. Fruct. ovat-oblong. striatus. *Plures spec. spectant ad Selini genus.*
402. *Buplenrum*. Involucra umbellul. maiora (si adsint) 5-phyll. Fl. flosculosi, flavi. Petal. involuta. Sem. in variis speciebus varia, oblonga, ovat. ovat-acumin. costata, aut simpliciter striata. Fol. in nostris, simplic. integerr.
424. *Sium*. Involuc. polyphyll. Fl. flosculosi, fertiles. Petal. cordata. Fruct. oblong-ovat. Sem. ovata, leviter striata, intus plana, calyce minimo coronata.
413. *Selinum*. Involuc. reflexum. Fl. flosculosi. Pet. cordata. Fruct. ovali-oblong. compresso-planus, in medio striatus, striis eminentibus, & subalatis, margine alato, ala magna, membranac.
427. *Cuminum*. Umbella 4-fid. involuc. longissim. setaceis. Fl. flosculosi, fertiles. Pet. cordata. Fruct. ovatus, striatus.
419. *Ferula*. Fl. flosculosi, fertiles. Pet. cordata. Fruct. magnus, ovalis, compresso-planus, 5-striat. cinctus ala magna, solida, non membranacea.
417. *Crithmum*. Involuc. horizontalia. Fl. flosculosi, fertiles. Pet. planiuscula. Sem. ovale, intus planum, tota superficie cohaerens; dorso 3 obscuris costis percurso.
426. *Bubon*. Involuc. 5-phylla. Fl. flosculosi, fertiles. Pet. planiuscula. Fruct. ovatus, striatus, villosus.
418. *Cuchrys*. Fl. flosculosi, fertiles. Pet. planiuscula. Fruct. magnus, subovatus, angulatus, cortice suberoso.
422. *Ligusticum*. Involuc. membranacea. Fl. flosculosi, fertiles. Pet. involuta. Fruct. ovato-acuminat, 5-costatus, costis subalatis, non rostratus.

374 PENTANDRIA MONOGYNIA.

423. *Angelica*. Fl. flosculosi, fertiles. Umbellul. globosæ. Pet. incurva. Fruct. subrotund. angulatus, solidus, alis 2, membranaceis.
425. *Sison*. Involucra paucifol. sub 4-phyll. Fl. flosculosi, fertil. Pet. cordata. Fruct. parvus, ovali-oblon. Sem. subtiliter striata. *Carum*, *Bunium*, & *Sison* adfinia sunt genera, ut ægre distingui possint.
431. *Æthusa*. Involucc. dimidiata, 3-phyll. pendula. Fl. subrad. fertil. Fruct. subrotund. Sem. ovatum, intus planum, maxime gibbum, 5-costatum.
432. *Coriandrum*. Fl. subglobosi. Involuc. universale 1-phyll. Involucc. dimidiata. Fl. radiati. Pet. inflexo-emarginata. Fruct. sphaericus, aut didymus.
433. *Scandix*. Cor. radiata. Pet. emarginata. Flosc. disci sæpius masculi. Fruct. subulati.
434. *Charo-phyllum*. Involucc. 3-phyll. reflexa, concava. Fl. floscul. Pet. inflexo-cordata. Fruct. oblong. lævis.
429. *Phellandrium*. Cor. radiata. Pet. cordiform. Fruct. ovatus, lævis, obiter 3-striatus, coronatus cal. & pistil.
435. *Imperatoria*. Umbella expanso-plana. Fl. floscul. fertil. Pet. inflexo-emarginata. Fruct. subrotund. compressus, medio gibbus, margine cinctus.
436. *Seseli*. Umbellæ globosæ, rigidulæ. Involuc. universale foliol. uno, alterove. Partiale polyphyll. Fl. floscul. fertil. Pet. cordata, reflexa. Fruct. subrotund. aut ovatus. Sem. ovatum, acuminat. intus planum, gibbum, 5-costatum.
430. *Cicuta*. Fl. floscul. fertil. Pet. planiuscula. Fruct. subovatus, sulcatus.

\* *Bupleurum rotundifol.*

\* *Apium*.

*Petroselinum, & Anisum.*

*Involucro nullo.*

439. *Smyr-nium*. Involuc. nulla. Fl. floscul. abortivi. Pet. acuminata. Fruct. magnus, subrotund. Sem. carinata, dorso subrotunda, & tribus costis obtusis, & veluti funiculis percurto; interiore facie veluti triangulari; neque idcirco tota plana, & contigua.
441. *Carum*. Fl. floscul. abortivi. Pet. carinata, inflexo-emargin. Fruct. ovat-oblong. striatus. Sem. intus plana.

437. *Thapsia*. Fl. floscul. fertil. Pet. lanceol. integra. Fruct. oblong. membrana cinctus, quæ supra, & infra ampliter truncata est, & emarginata.
438. *Pastinaca*. Fl. floscul. fertil. Pet. involuta, integra. Fruct. elliptic. compresso-planus, striatus, vix emarginatus.
440. *Anethum*. Fl. floscul. fertil. Pet. involuta, integra. Fruct. subovat. compressus, striatus.
445. *Ægopodium*. Fl. exter. inæqual. inter. æqual. Pet. profunde cordata. Sem. magna, oblong. convexa, profunde striata, nuda.
444. *Apium*. Involuc. 1-phyll. vel 0. Fl. floscul. fertil. Pet. inflexa, integra. Fruct. minimus, subrot. Sem. ovatum, intus planum, dorso tenuissime striato.
442. *Pimpinella*. Fl. subradiati, fertil. Umbel. ante efflorescentiam nutantes. Pet. cordata. Fruct. subrotund. aut subovatus. Sem. intus plana, paulisper acumin. dorso gibbo, tricostrato.
443. *Cussonia*. Pet. trigona. Margo receptac. dilatatus in calyc. 5-dent.

## TRIGYNIA.

Fl. superi.

448. *Viburnum*. Cal. 5-dent. superus. Cor. campanul. 5-fid. Bacca 1-sper.
450. *Sambucus*. Cal. 5-fid. Cor. rotata, concava, 5-fid. Bacca 2-3-sper. Fol. pinnata. Fl. in nostris cymosi.

Fl. inferi.

446. *Semecarpus*. Cor. 5-pet. Drupa cordata, cellulosa, 1-sper.
447. *Rhus*. Cal. 5-part. Pet. 5. Bacca coriacea, 1-sper.
449. *Cassine*. Cal. 5-part. Cor. 5-pet. Bacca 3-sperm.
451. *Spathelia*. Cal. 5-phyll. Cor. 5-pet. Filam. basi dent. Caps. 3-gona, 3-locul. Sem. solitar.
452. *Staphylea*. Cal. concavus, 5-fid. marcescens. Pet. 5, elliptica. Styli 2-3. Caps. vesicæform. membranacea, 3-locul. Sem. globosa, cicatrizata, ossæ.
453. *Tamarix*. Cal. campanul. 5-part. Pet. 5. Stam. etiam 10. Caps. 3-valv. 1-locul. Sem. papposa.
460. *Drypis*. Cal. 5-dent. Pet. 5, coronata. Caps. circumscissæ, 1-sper.
455. *Turnera*. Cal. infundibulif. 5-fid. exter. 2-phyll. Pet. 5,

A a iij

- calyci inserta. Stigmat. multifid. Capsf. 3-valv. 1-locul.
462. *Sarothra*. Cal. 1-phyll. 5-part. Cor. 5-pet. Capsf. 3-valv. 1-locul. colorata.
459. *Alfne*. Cal. 5-phyll. Pet. 5, bifid. æqualia. Capsf. 3-valv. 1-locul. polysper.
456. *Telephi-um*. Cal. 5-phyll. Pet. 5, æqual. receptac. inserta. Capsf. triquetra, 3-valv. 1-locul. polysper.
457. *Corrigiola*. Cal. 5-phyll. Cor. 5-pet. Sem. 1, triquetrum, nudum, cal. contentum.
458. *Pharnaceum*. Cal. 5-phyll. Cor. o. Capsf. 3-locul. polysper.
454. *Xylophylla*. Cal. 5-part. coloratus. Cor. o. Stigm. lacera. Capsf. 3-cocc. Sem. 2. Fl. hermaphr. & fem. in eodem caule.
461. *Basella*. Cal. o. Cor. 7-fid. laciniis 2 oppositis, latioribus. Sem. 1, globosum, calyc. baccato.

\* *Rhamnus Paliurus*.

\* *Celastrus*.

## TETRAGYNIA.

463. *Parnassia*. Cal. 5-part. Cor. 5-pet. Nectar. 5, cordata, ciliata, apicibus globosis, (in quibus essentia generis). Capsf. 4-valv. 4-locul. locul. polysper.
464. *Evolvulus*. Cal. 5-phyll. Cor. rotata, sub-5-fid. Sem. solitar.

## PENTAGYNIA.

- Fl. superi.*
465. *Aralia*. Involuc. umbellulæ. Cal. 5-dent. superus. Cor. 5-pet. Bacca 5-sper.
- Fl. inferi.*
472. *Crassula*. Cal. 5-phyll. Cor. 5-pet. Squamæ 5 nectariferæ ad basin germinis. Capsf. 5. *Staminibus 5 a Sedo differt.* Fol. carnosæ, succosæ.
471. *Gisekia*. Cal. 5-phyll. Cor. o. Capsf. 5, adproximatæ, subrotund. Sem. solitar.
468. *Linum*. Cal. 5-phyll. Pet. 5, æqualia. Filam. 5. basi membranosa communi inter se connexa. Capsf. 5-valv. 10-locul. Sem. solitar.

# PENTANDRIA TETRAGYNIA. 377

469. *Aldrovanda*. Cal. campanul. 5-part. Cor. 5 pet. Capf. 5-valv. 1-locul. 10-sper.  
 470. *Drosera*. Cal. tubulosus, 5-fid. Cor. 5-pet. Capf. apice dehiscens, 5-valv. 1-locul. polysper.  
 473. *Muhernia*. Cal. 5-dent. Cor. 5-pet. Nect. 5, obcordata, filamentis supposita. Capf. 5-locul.  
 466. *Commersonia*. Cal. 1-phyll. corollifer. Cor. 5-pet. Nect. 5-part. Capf. echinata, 5-locul.  
 474. *Sibbaldia*. Cal. 10-fid. Pet. 5, calyci inserta. Styli e latere germinis. Sem. 5.  
 467. *Statice*. Involuc. universale varium. Cal. proprius infundibulif. limbo integro, plicato. Pet. 5, sensim dilatata, & iuxta se posita, infundibulum referentia. Fruct. stellatus, 1-sperm. ex calyc. persistente.

\* *Cerastium pentandrum*.

\* *Spergula pentandra*.

\* *Gerania pentandra*.

# POLYGINIA.

475. *Myosurus*. Cal. 5-phyll. basi adnatus. Nectar. 5, subulata, petalifor. Sem. numerosa.

\* *Ranunculus kederaceus*.

# MONOGYNIA.

214. **HELIO-**  
**TROPIUM.** Cor. hypocraterif. 5-fida, interiectis dentibus : centro floris plicato, sine glandulis.  
 1. *peruvianum*. H. caul. frutescente : fol. lanceol-ovat. spicis numerosis, aggregato-corymbosis. *Syst. veg. ed.* 14. *Mill. ic. tab.* 243.

*In Peru* h.

Caul. 2-ped. hirti, inferius longe ramosi. Fol. lineata, rugosa, pubescent-scabra, utrimq. viridia, breviter petiol. Pedunc. versus extremitates hirti, 2-fidi, seu dichotomi. Spicæ 3-4. secundæ, recurvatae. Cor. cœrul. simil. H. *indico*, odore debili Vanillæ.

A a iv

2. *indicum*. H. fol. cordato-ovat. acutis, scabriuscul. spicis (sæpe) solitar. fructibus 2-fid. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. 245. f. 4.*  
 b. H. americ. &c. *Sabb. hort. rom. 2. tab. 34. In India utraque.*  
 Caul. herbaceus, ped. Fol. petiolat. integerrima. Spicæ longissimæ, palmar. apice revolutæ. Cor. cœrul. Sem. unilocul. per paria adproximata.
3. *parviflorum*. H. fol. ovat. rugosis, scabris, oppositis, alternisque: spicis coniugatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 146. f. 175. Pluk. phyt. tab. 404. f. 3.*  
*In India ☉.*  
*Adfine admodum priori.* Caul. erectus, ped. pubesc. Fol. petiol. acuta, lucida. Pedunc. oppositifol. aut e dichotomia caul. erecti. Spicæ imbricatæ, recurvatæ. Cor. parva, alba, fundo flavo.
4. *europæum*. H. fol. ovat. integerr. tomentosis, rugosis: spicis (supremis) coniugatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 107. Sabb. hort. 2. tab. 33. Bocc. Sic. tab. 49.*  
*In Europa australi ☉.*  
 Caul. cubital. fere diffusus. Fol. alterna, petiol. nervosa, albida. Spicæ longæ, intortæ, secundæ. Cor. albescens. *Var. fl. ma: odore Jasmini.*
5. *supinum*. H. fol. ovat. integerr. tomentosis, plicatis: spicis solitariis. *Syst. veg. ed. 14. Gouan. Monsp. cum fig. Clus. hist. 2. p. 47. fig. bona.*  
*In Salmantica agris, & Monspelii in litore ☉.*  
 Planta procumbens. Fol. parva.
6. *fruticosum*. H. fol. lineari-lanceol. (hispidis): spicis solitar. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Sloan. Jam. 1. tab. 132. f. 4.*  
*In Jamaica h.*  
 Frutex parvus, vix spithameus.
7. *curassavicum*. H. fol. lanceol.-linearibus, glabris, aveniis: spicis coniugatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 16. f. 2. Pluk. alm. tab. 36. f. 3. Sloan. Jam. 1. tab. 132. f. 3. Moris. Hist. 3. f. 11. tab. 31. f. 12. Herm. Par. tab. 183.*  
*In America calidioris maritimis ☉.*  
 Caul. palmar. teres, glaberrimus, rore glauco.

Fol. subpetiol., passim alterna, & opposita, obtusiusc. oleracea, erecta, integerr. Spicæ recurvæ. Cor. alba, fundo flavo, fauce patula.

8. *orientale*. H. fol. linearibus, glabris, aveniis: fl. laterali-  
bus, sparsis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Asia* ☉.

Planta parva, procumb. repens. Fol. alterna.  
Fl. solitar. alterni, subsessil.

9. *gnaphalodes*. H. caul. frutesc. fol. linear. obtusis, tomentosis;  
pedunculis dichotomis, spicarum fl. quaternis.  
*Syst. veg. ed. 14. Jacq. Amer. tab. 173. f. 11.  
ed. 2. pida tab. 259. f. 9. quoad folium. Moris.  
hist. 3. f. 11. tab. 28. f. 6. Pluk. alm. tab. 193.  
f. 5.*

*In Barbados, Jamaica maritimis* ☿.

Caul. plerumque 2-raro 6-pedal. Rami formantes  
comam convexam, candicantem. Fol. nume-  
rosa, sessil. sparsa, cuneiformi-linear. crassa,  
glauca, conferta in summis ramis. Pedunc.  
terminal. tomentosi. Spica secunda, sæpius  
2-fida. Cor. alba.

- bacciferum*. H. caul. frutescen. prostrato: fol. oblongis, hi-  
spidis, margine reflexis. *Forsk. Æg.*

*In Arabia*.

Cor. tubus flavus, calyce duplo longior; limbus  
albus; faux nuda. Stylus medio incrassatus,  
& anulo lato circumdatus sub stigmate, quod  
2-fid. est. Sem. intra baccam 4-angular. um-  
bonatam.

- ovalifolium*. H. caulibus decumbentibus: fol. petiolat. oblong-  
ovalibus, integris. *Forsk. Æg.*

*In Arabia*.

Stylus anulatus. Dentes nulli in fauce.

- scabrum*. H. caul. diffuso, ramoso: fol. lanceol. strigosis:  
fl. congestis. *Retz. Obs. fasc. 2.*

Radix simpl. fusiform. Fol. alterna, in summis  
ramulis quandoq. opposita, plerumq. obliqua,  
integerr. Fl. terminal. parvi, albi, fol. ob-  
vallati.

- Marifolium*. H. caulibus procumbentibus, fruticulosis: fol. lan-  
ceol. hispidis: spicis simplicibus, alternis. *Retz.  
Obs. fasc. 2.*

Radix lignosa. Caul. ramosi, hispidi. Fol. alter-

na, & sparsa (*Teucrii Mari*, sed minora).  
Spicæ copiosæ: bractææ forma fol. Cor. alba,  
extus, sicuti calyx, hirsuta.

*Coromandelianum*. H. fol. obovat. integris, villosis: spicis simplicibus, coniugatisque: seminibus punctatis.  
*Retz. Obs. fasc. 2.*

Radix simpl. fusiform. Caul. erecti, ac prostrati, hispidi. Fol. opposita, & alterna. Spicæ lateral. & terminal. Cal. inæqualiter hispidus. Cor. parva, alba.

*malabaricum*. H. fol. ovatis, plicatis, integerrim. strigosis: spicis subsolitar. *Retz. Obs. fasc. 4. Burm. Ind. tab. 16. f. 1.*

*In Malabarica.*

*Differt ab H. europæo strigositate totius plantæ: folior. plicis, & parvitate: petiol. brevibus: spicis sæpe geminis, sed non coniugatis: calycibus minime imbricatis.*

215. MYOSOTIS. Flos *Heliotropii*, sed faux glandulosa, interiectis plicis albidis.

1. *scorpioides*. M. seminibus lævibus: fol. apicibus callosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*arvensis*. *Fl. Dan. tab. 583.*

*In Europæ campis aridis* ☉.

Planta hispida. Caul. ramosus, 4-unc. Fol. ovato-lanceol. tuberculo terminata: ima petiolat. superiora sessil. sordide virentia, sicca. Spicæ scorpioideæ, aphyllæ, incurvæ. Cor. cœrul. vel carnea, umbilico flavo, vel albo; raro alba. *In alpinis adnata villosior est.*

*palustris*. Species distincta a priore. *Zan. tab. 151.*

*In aqueis senturiginosis* ☿.

Planta glabra. Caul. ped. Fol. crassiusc. læte virent. Cor. cœrul. vel alba.

2. *fruticosa*. M. semin. lævibus: caul. fruticoso, lævi. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spci h.*

Caul. ped. ramosus. Rami multi floriferi ad summitatem caul. Fol. alterna, linear. fere lævia, pilis raris adspersa. Spicæ sessil. secundæ. Fl. & fruct. parvi.

3. *virginiana*. M. seminibus aculeato-glochidibus: fol. ovato-oblong. ramis divaricatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cynoglossum &c. *Morif. Hist. 3. f. 11. tab. 30. f. 9. In Virginia* ☉.



Fol. magna, acumin. utrinque viridia. Flos minimus, albus. Fructus nutans. Sem. interiore latere nuda, angulata, erecta, basi adfixa, ut in sequenti.

4. *Lappula*. M. feminibus aculeis glochidibus: fol. lanceol. pilosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 692.*

*In Europæ argillofis, muris &c. ☉.*

Caul. ped. ramosus. Fol. angusta. Fl. axill. subsessil. Spica scorpioidea, incurva. Cor. parva, cœrul. vel alba. Capf. echinata, aculeorum apicibus stellatim fimbriatis.

5. *apula*. M. feminibus nudis: fol. hispidis: racemis foliosis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. 16. f. 5.*

*Echioides &c. Col. ceph. 1. tab. 185.*

*Anchusa &c. Lob. ic. 312.*

*In Italia, Hispania &c. ☉.*

*Differt a M. scorpioide, cor. tubo longiore; flaminibus altius cor. parietibus adfixis; cor. lutea.*

- (*pauciflora*.) *Myosotis* (*Scorpiurus*) fol. ovatis: spica pauciflora; calycibus tomentosis. *Hall. Hyst. n. 592. Bocc. Mus. 1. tab. 107.*

*In alpibus Helvetiæ.*

Plantula humillima, nequidem trientalis, cespite foliorum densissimo. Fol. Serpylli, subrotunda, subhirsuta. Spica parva, 3-fl. aut paulo ultra, ut unicus flos totam occupet; grandes enim sunt, & læte cœrul. Cal. longo villo sericeo barbatus. *Flos maior ex tota familia.*

- rupestris*. M. *Pall. It. 3. tab. E. f. 3.*

*In Dauriæ montibus 24.*

Caul. pl. digital. diffusi, adscendent. simpl. pilosi. Fol. radical. conferta, obovato-lanceol. obrufa, dura, hispida: caulina alterna, oblongo-linear. Fl. racemosi, ante efflorescentiam revoluti, breviss. dein elongati. Cal. hispidus. Cor. nunc mediocris, nunc magnitudine *M. scorpioidis*, speciosa, sature cyanæa, fauce flava. Pedunc. fructiferi elongati.

- pedinata*. M. *Pall. It. 3. tab. E. f. 4. Semen.*

*In Dauria.*

Priori crescendi modo similis. Fol. omnia ovato-lanceol. acutiusc. tenuiora, pilis longis hirsuta: radical. conferta; caulina sparsiora, alterna, sessil. Caules pauciores, dodrant. & ultra, sub-

hirsuti. Racemi floriferi pl. subdivisi; post efflorescentiam elongati, foliolis min. adspersi. Cal. ut in priore. Cor. min. cyanæa, fauce pallida.

*echinophora*. M. Pall. It. 3. tab. I. 1. f. 1. A.

In Dauria ☉.

Planta subdigital. pilis albis hispida, M. *Lappula* succulentior. Caul. rectus, initio subimpl. fructificando sensim elongatus, in paucos ramos dichotomus. Fol. duo feminal. ovata, basi attenuata, glabra; cætera alterna, linearia, apice latiusculo, subtrus, margineq. pilosa. Cor. minuta, limbo azureo, fauce albida, coarctata.

*Terglouensis*. Myosotis. Hacquet pl. alpin. Carniol. tab. 2. f. 6. In Carniola 24.

Plantæ col. tristis, vel viridi-fuscus, excepto fl. Olor *Syringæ*. Caul. 1-pl. recti, vel procumbentes, foliosi, imbricati, hirsuti. Fol. ima subnigrescent. cætera fusco-virent. sessil. oblonga, ovata, aut spathulata, 2-3. lineas longa, integerr. plana, pilis albis rigidis obsita; caulem circumdantia: in medio 2-3. fl. nascuntur. Cor. tubus ventricosus anulum cylindricum efformat, flavum, sulphureum. Cor. limb. planus, eleganter cœruleus, segmentis subrotund. ovatis, integris.

*squarrosa*. M. feminum angulis setoso-uncin. fol. lanceol. pilosis, apice callosis. Retz. Obs. fasc. 2.

Radix annua, ramosa. Caul. in culta planta 2-ped. pilosus, dense ramosus, ramis inferior. brevioribus. Fol. alterna, obtusa, integerr. Racemi alterni, longi, laxi. Fl. parvi, cœrul. fauce flava, bracteati. Cal. pilosus.

An M. *echinophora*. Pall. It. 3. tab. 1. f. 1. A?

*nana*. M. fol. tomentosis, feminum marginibus serrato-marginatis, invicem coniunctis. Vull. prosp. tab. 23. f. 3. Fl. Ped.

Echium &c. Bocc. Mus. tab. 129.

In monte Cenisio &c. 24.

216. LITHOSPERMUM. Cal. 5-part. Cor. infundibul. limbo 5-fido, fauce perforata, nuda. Sem. 4, dura.

(Differt a *Myosotide* fauce pervia, & stigmatibus binis.)

1. officinale. L. feminibus lævibus: cor. vix calycem superantibus: fol. lanceol. Syst. veg. ed. 14. Black. tab.

426. *Sabb. hort. 2. tab. 29. Ludw. ed. tab. 147.*

*In Europæ ruderatis 24.*

Caul. erectus, teres, supra medium ramosus. Fol. alterna, sessil. elliptica, hirta, cinereo-virent. integerr. Fl. axill. parvi, albid. Sem. candida. *Canadense totum hirtum.*

2. *arvense*. L. feminibus rugosis: cor. vix calycem superantibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 456.*

*In Europæ agris, & arvis ☉.*

Radix rubra. Caul. diffus, pedal. ramosi. Fol. elliptica, aspera, sicca, cinereo-virent. Fl. congesti. Cal: peduncul. Cor. parva, cœrul. vel alba.

3. *virginicum*. L. fol. subovalibus, nervosis: cor. acuminat. *Syst. veg. ed. 14. Morif. hist. 3. f. 11. tab. 28. f. 3.*

*In Virginia.*

Caulicul. doctant. Fol. sesquiunciam longa, inordinata, obtusa, aspera. Puncta adspersa foliis sunt excavata, horum latiora seta egrediente notata. Cor. ex albid.

4. *orientale*. L. ramis floriferis lateralibus: bracteis cordatis, amplexicaulibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Buglossum &c. *Dill. elth. tab. 52. f. 60. Buxb. cent. 3. tab. 29.*

*In Oriente ☉.*

Caul. sterilis erectus, pilis rarioribus. Fol. lanceol. basi angustiora, obtusa, integerr. utrimq. pilis roriferis. Rami floriferi ex alis fol. inferiorum. Bract. pilosæ, roridæ. Fl. subpendunc. lutei. Stam. tubo breviora. Anth. nigræ.

5. *purpureo-ruleum*. L. feminibus lævibus: cor. calycem multoties superantibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 14.*

*Bocc. Sic. tab. 40-41. Dod. pempt. 83.*

*Anchusa &c. Pluk. tab. 76. f. 2.*

*In Europæ nemoribus &c. 24.*

Caul. steriles repentes, radicanter; floriferi erecti, villosi, subnigri. Fol. lanceol. nervo medio notata, hispida, dura, integerr. pallide virent. Fl. multi cœrulei, & purpur.

6. *fruticosum*. L. fruticosum; fol. linearibus, hispidis: staminibus cor. æquantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Anchusa &c. Barr. ic. 1168.*

*Buglossum &c. Garid. aiz. tab. 15.*

*b. Anchusa &c. Alp. exot. tab. 68.*

*In Gallia, Samo, & Europa australi h.*

Caul. parvus, ramosus, hispidus. Fl. in apice ramorum. Cal. sessil. Cor. violac.

**7. tenuiflorum.** L. fol. lineari-lanceol. strigosus: cor. filiformibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Buglossium chium, arvense &c. T. Cor.

*In Ægypto ☉.*

Planta palm-spitham. facie minoris L. *arvensis*.

Caul. erect. subramos. filifor. subpubescens.

Fol. alterna, sessil. obtusiusc. Calyces ramorum secundi, alterni, subpedicell. laterifolii, oblongi. Cor. minutissimæ, cœrul.

**8. dispernum.** L. feminibus duobus: calycibus patentibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. dec. 1. tab. 7.*

*In Hispania ☉.*

Caul. erectus, palmar. herbac. ramosus, teres,

hirtus. Fol. alterna, sessil. lingulata, pollicem longa, obtusa, hirta: ramea lanceol. acuta.

Fl. ramei, oppositifol. alterni, pedunculat.

Cal. quasi inflatus. Cor. dilute purpur. Sem.

tantum 2. nec tamen bilocular.

**retortum.**

L. *Pall. It. 3. tab. 1. 1. f. 2. B.*

*In Dauria ☉.*

*Simile L. dispermo, sed constanter 1-spermum.*

Plantula dodrantal. sicca, rigida. Fol. feminalia pro radicalibus, vel sola, vel rarius adhuc altero pare duplicata, sessil. ovalia, nuda: caulina alterna, oblongo-lineararia, cauli adpressa, pilosa, Racemi circinnati. Fl. secundi, minuti, pallide cyanæi, fauce pallida.

**hispidum.**

L. caul. procumb. fol. lanceol-linearibus, sessilibus, undato-dentatis: spicis terminalibus, secundis. *Forsk. Æg.*

*In Arabia 24.*

Caul. pedal. ad basin ramulosi, dichotomi, hispidi. Fol. pollic. alterna, rigida. Pedunc. spicati, ante efflorescentiam revoluti. Fl. conferti. Cal. hispidus. Cor. calyce longior, plicata, obtusa, alba.

**Heliotropioides.**

L. caul. procumb. fol. breviter petiolat. ovalibus, subrepandis: spicis lateralibus, & terminalibus. *Forsk. Æg.*

*In Arabia 24.*

Simile priori. Rami alterni, binis propioribus. Fol. obrufa, utrimq. villosa, venis simplicibus, remoris. Pedunc. 2-pollic. Cal. hispidus, non 5-part. sed 3-dent. Cor. vix calyce longior, acumin. alba, fauce pervia. Sem. oblong. lævia.

*ciliatum.* L. fol. ovato-lanceol. tomentosis, aculeato-ciliatis. Forsk. *Æg.*

*In Arabia.*

Caul. aculeis hispidus. Fol. brevissima. Cor. calyce longior, violac. fauce pervia. Sem. parva, nigra.

*angustifolium.* L. seminibus levibus: cor. calyce triplo longiore: caul. diffuso: fol. lanceol. Forsk. *Æg.*

*In Arabia.*

Habitus L. *purpureo-cærul.* sed nec repens, nec latifolium. Caul. pl. dimidiam spithamam longi, apice parum ramosi, albo-rufesc. hispidi. Fol. erecta, patentia; superiora pollic. sessil. alterna, hispida, potissimum subtus. Spicæ terminal. pedunculat. secundæ, ante florescentiam revolutæ; fl. alternis, bracteatis. Cor. incarnata, limbo violac. laciniis ovatis. medio albis; defflorata cærul.

*digynum.* L. fol. ovaris, margine reflexis: seminibus villosis. Forsk. *Æg.*

*In Arabia h.*

Fruticul. diffusus, ovalis, ramosus. Fol. alterna, sessil. nudentia, villosa, scabra, supra profunde venosa, subtus iisdem venis valde elatis. Stipulæ 2. lanceol. parentes, foliola aliquot fasciculata in qualibet axilla foveantes. Pedunc. ramorum terminales, oppositi, secunde spicati, aphylli. Cal. hispidus. Cor. viridis, apice albido-flavo.

217. ANCHUSA. Cor. infundibul. tubo longo, recto, limbi segmentis orbicularibus: fauce elausa 5 squamulis.

1. *officinalis.* A. fol. lanceol. spicis imbricatis, secundis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 572.*

*Ad Europæ rudera 24.*

*Confundebatur a Botanicis cum A. Italica Retz. Obs. fasc. 1. A qua differt magnitudine; fl. aequalibus, multo magis imbricatis; limbi laciniis ovatis; faucis squamis leviter tantum tomentosis, & quasi cucullatis; calycis laciniis brevioribus, latioribus.*

386 PENTANDRIA MONOGYNIA.

2. *angustifolia*. A. racemis subnudis, coniugatis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. Dict. tab. 82.*  
*Borago* &c. *Zan. tab. 39.*  
*Buglossum* &c. *Morif. Hist. 3. f. II. tab. 26. f. 4.*  
*Echii* &c. *Lob. ic. 576.*  
*In Italia, Germania, ad vias, & secus arva* *U.*  
*Radix* crassa, fulva. *Caul.* cubital. & ultra. *Fol.* humifusa, & erecta, crassa, hirsuta, aspera, e viridi-pallescentia: caulina sessil. breviora, angustiora, basi attenuata, subdent. spinulis aspera. *Fl.* terminal. initio capitati, dein spicati, spicis incurvis. *Cor.* parva, violac. cœrul. sanguinea, raro alba, staminibus candidis.
3. *italica*. A. fol. lanceol. undulat. summis acumin. squamulis faucis penicilliformibus. *Syst. veg. ed. 14. Trew. pl. rar. dec. 2. tab. 28.*
4. *undulata*. A. strigosa; fol. lineariibus, dentat. pedicellis bractea minoribus; calycibus fructifer. inflatis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. dict. tab. 29. Gmel. it. 1. tab. 37. Bocc. Mus. tab. 77. Barr. ic. 578.*  
*In Hispania, Lusitania, Sibiria pratis.*  
*Planta pilosa. Fol. undulata.*
5. *sindoria*. A. tomentosa; fol. lanceolatis, obtusis: staminibus corolla brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 584.*  
*Monspeltii, in Sicilia, Pedemontio, locis aridis* *U.*  
*Similis A. lanata, & tota albo villo tecta. Pali*  
*staminum longitudine cor. Radix rubra, succo*  
*sanguineo prædita. Caul. hirsutus. Fol. plerq.*  
*radical. cætera alterna, pilis albis obsita. Fl.*  
*terminal. purpurasc.*
6. *virginica*. A. caul. glabro: fl. sparsis. *Syst. veg. ed. 14. Lithospermum &c. Morif. Hist. 3. f. II. tab. 28. f. 4.*  
*In Virginia* *U.*  
*Fol. oblong. angusta, obtusa, subhirsuta. Fl.*  
*axill. Poralyfi similes, lutei.*
7. *lanata*. A. fol. villosis; calycibus hirsutis: staminibus cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Halgeria.*  
*Caul. ped. simpl. Fol. alterna, lanceol. obtu-*  
*fuso. Racemi ex alis superior. foliosi, recur-*  
*vati, valde villosi. Cal. albido-flavesco. Cor.*  
*cœrul. Nect. unguibus 5. breviss. Anth. in-*  
*cumbent. Styl. longior.*

8. *sem-*

8. *sempervirens*. A. peduncul. diphyllis, capitatis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 2. tab. 23.*

Buglossum &c. *Morif. Hist. 3. f. 11. tab. 26. f. 2. In Anglia, Hispania 24.*

Caul. ad latera capitis rad. erecti, hispidi. Fol. ovata, lineata, albo-maculata, petiolat. remota. Pedunc. axill. multifl. Bract. 2. oppositæ, sessil. lanceol-ovatæ. Cor. cœrul. tubo brevi, uti *Omphalodes*.

*lucida.*  
(*italica.*)

A. fol. lucidis trigonis: racemis 2-part. 2-phyll. fl. subinæqualibus, fauce barbatis. *Reiz. Obs. fasc. 1.*

Buglossum Italicum, fl. cœrul. *Eyst. Æst. Ord. 8. fol. 5.*

Buglossum vulg. maius. *J. B. Hist. 3. In Italia.*

*Confusa cum A. officinali, & angustifolia.* Caul. erect. 4-ped. & ultra, ramosus, angulatus, strigosus. Fol. infer. 2-ped. in petiolum desinentia, lanceolata; media pedalia, lanceolata; super. semiped. sessil. coriata, acumin. Pedunc. axill. & terminal. 2-phylli, foliol. cordatis, sessilibus terminati; spica coniugata, secunda, reflexa. Pedicel. erecti. Cal. hispida. Cor. nonnihil inequal. longitudine calycis. *Ergo A. officinalis esse nequit. Differt ab A. angustifolia, magnitudine, & fol. integerr. convenit vero cum hac racemis coniugatis, 2-phyllis.*

*saxatilis.*

A. *Pall. It. 3. tab. F. f. 1. In Dauuria 24.*

Radix extus fusco-rubra. Caul. 1-pl. quandoq. ramosi, erecti, vel patuli, uti tota planta, maxime setosi. Fol. radical. ante efflorescentiam marcescentia; caulina alterna, oblongo-linearia, utrimq. pilosa; floralia lanceol. Fl. e medio caule alterne sparsi, axill. breviter pedunculati, secundi. Cor. purpuro-cœrul.

*hispida.*

A. peduncul. axillar. brevibus: caule retrorsum hispidato: fol. inferioribus petiolat. *Forsk. Æg. In Arabia ☉.*

Caul. diffusus, spitham. ramosus. Fol. hispida. Bract. sessil. ovat-lanceol. hirsuto-hispidæ. Cal. extus hirsutus. Cor. violac. vix calyce longior, fauce clausa. B b

*Spinocarpus*. A. fl. paucis, albis: fornicibus 5. supra antheras. *Forsk. Æg.*

*In Ægypto.*

Caul. diffusus, scabri. Fol. vix pollic. linearia, villosa, mollia. Cor. non emarginata. Sem. muricato-spinosa.

*tuberculata*. A. feminibus tuberculatis. *Forsk. Æg.*

*In Ægypto.*

Caul. prostratus. Fol. lanceol. hispida. Spicæ foliolæ. Cor. lacin. obtusissim. non emarginatis, cœrul. Fornices faucis 5.

*Barrelieri*. A. (*Buglossum*) fol. ovato-lanceol: caule erecto: axillis folior. florigeris: racemis florum unilateralibus. *Alt. Ped. Barr. ic. 333.*

*Secus vias, & in vallibus 24.*

Rad. fusca, intus dilute rubens, lignosa. Fol. ad radicem plura, elliptico-lanceol. subdecurrentia, petiolo lato, canaliculato, basi ampliore, ambitu obsolete denticulata. Caulina semiamplexicaul. inordinata, conferta, magis lanceolata. Caul. angulatus, striatus. Rami florigeri, atque, si folia floralia exceperis, nudi sunt. Pedunc. bracteati. Bractæ in oppositos latus reflectuntur. Cor. azurrea, vix calyce maior. Fol. radicalia hispido-verrucosa, sensim pili molliores in caule, & fol. Pedunculi, & summi rami hirsutæ subincani.

218. *CYNOCOR. infundibul. tubo brevi, segment. orbicular. GLOSSUM.* fauce clausa fornicibus. Sem. 4. depressa, interiore tantum latere stylo adfixa.

1. *officinale*. C. staminibus corolla brevioribus: fol. lato-lanceol. (undulatis, sericeis.) *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 249. Ludw. ed. tab. 81.*

*In Europæ ruderatis 3.*

Caul. cubital. erectus, ab imo ad summum ramosus, angulatus, villosus. Fol. magna, obscure virentia, mollia, integerrima, alterna; ima petiol. caulina sessili-amplexicaul. Fl. axill. Spicæ nudæ. Cor. sanguinis emortui col. vel alba. Caps. echinata.

2. *virginicum*. C. fol. spatulato-lanceol. lucidis, basi trinerviis: bractea pedunculorum amplexicauli. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 30. f. 9.*

*In Virginia ☉.*

Adfines priori: differt fol. supra lucidis.



3. *cheirifolium*. C. cor. calyce duplo longioribus: fol. lanceol.  
*Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. p. 612.*  
*In Creta, Hispania, Carniola, Oriente, Pedemontio* ☉.  
 Fol. tericeo-argentea. Cor. alba, venis sanguineis.
4. *apenninum*. C. flaminibus corollam æquantibus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 2. tab. 36. Col. ecphr. 1. tab. 170.*  
*In Apennino &c.*  
 Caul. erectus, 2-cubital. hirsutus, minus foliosus. Fol. maiora, sessilia, elliptico-lanceol. aspera, non tericea. Cor. brevior.
5. *lævigatum*. C. fol. lanceolato-ovar. glabriusculis: calycibus tomentosis: seminibus lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*C. Rindera. Lin. Suppl.*  
*Rindera tetraspis. Pull. ii. 1. tab. F. f. 1. 2.*  
*In Sibiria, Oroburgi, & ad Jaccum* 24.  
 Caul. pedal. erect. superne paniculat. striatus.  
 Fol. radical. petiol. caulina parva, sessilia.  
 Cal. 5-pyil. Cor. 5-fid. alba. Filam. nulla.  
 Anth. in ipso sinu inter lacinias cor. sessil.  
 Styl. seraceus. Stigm. globosum, vix conspicuum. Sem. depressa, superius acuta, unisque alata, margine lito, striato, rigide membranac. quæ confertim adhærent medio receptaculo crasso, conico, stylo persistente terminato. Sem. unum, alterumq. raro marcescit.
6. *lusitanicum*. C. fol. lineari-lanceol. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Lusitania* ☉.  
 Adfne sequenti, sed maius, & asperius.
7. *linifolium*. C. fol. lineari-lanceol. (supra) scabris. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 30. f. 11.*  
*In Lusitania* ☉.  
 Caul. spitham. Pedunc. axill. multifi. subnudi.  
 Cor. alba.
8. *Omphalodes*. C. repens; fol. radicalibus cordatis. *Syst. veg. ed. 14. Kniph. cent. 1. tab. 22. Knorr. del. 2. tab. C. 7. Fl. Carn. ed. 2. tab. 3.*  
*Borago &c. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 26. f. 3.*  
*In Lusitaniæ, Carniolæ, Pedemontii nemoribus, ad radices montium* 24.

Radix obliqua, fusca, fibrosa. Caul. florifer simpl. semipedal. e basi stolones longos emittens. Racemi axill. paucifl. Cor. pulchre cœrul. fauce albida, plicis 3. cordiformibus.

9. *japonicum*. C. caulibus prostratis: fol. oblong. villotis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*  
*In Japonia* ☉.

Radix fibrosa. Caul. 4-5. palmar. flexuosi-erecti, teretes, inæqual. villosi. Fol. radical. subligitalia, ramea sensim min. unguicularia: amplexicaulia, acuta, tenuissime ferrulata, patentia. Fl. terminal. racemoti. Cal. totus villosus. Cor. purpur.

*lanceolatum*. C. fol. lanceolat. basi attenuatis, pubescentibus, scabris: staminibus corolla brevioribus. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

119. PULMO. Cal. prismatico-5-gonus, 5-dent. Cor. infundibulif. limbo 5-fid. concavo, laciniis rotundis, fauce pervia.

\* *Perianth. longitudine tubi cor.*

1. *angustifolia*. P. fol. radicalibus lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 483. Bocc. mus. tab. 86. Clus. hist. p. 170.*

*In Helvetia, Pannonia, Italia, Germania, Suecia* ☿.

*Sequenti valde adfinis; differt solum fol. angustis.*  
 Caul. sequenti altior, 3-ped. & ultra. Fol. hispida, sordide virentia: ima elliptica, obtusa; superiora sessil. cordiformia. Fl. terminal. congesti, cœrul. rubri, albi.

2. *officinalis*. P. fol. radicalibus ovato-cordatis, scabris. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 482. Blak. tab. 376. Sabb. hort. 2. tab. 26. Ludw. ed. tab. 45.*

*In Europæ nemoribus* ☿.

Planta subhirsuta. Caul. ramosus, brachiatus. Fol. dilute virent. sæpe cum maculis albis: ima in petiolum desinentia; superiora sessil. Fl. spicæ incurvæ. Cor. cœrul. rubra, alba.

3. *suffruticosa*. P. fol. linearibus, scabris: calycibus subulat. 5-part. *Syst. veg. ed. 14.*

PENTANDRIA MONOGYNIA. 391

*Lithospermum* &c. *Pluk. phyt.* 41. f. 7. *Bucc.*  
*fic.* 77.

*In alpidibus Italiae* h. .

Caul. radicales lignosi, perennantes cum foliis:  
florentes caules palmar. simplicif. subpilosi.  
Fol. fere filiform. sparsa, longa, hispida. Fl.  
terminal. fasciculati.

\*\* *Calyces tubo cor. dimidio breviores.*

4. *virginica*. P. calycibus abbreviatis: fol. lanceol. obtusiuscul. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 212. Trew. Ehret. tab. 12.*

*Symphytum* &c. *Pluk. alm. tab. 227. f. 6.*

*In Virginia* 24.

Caul. pedat. Fol. ima triuncial. petiolat. ovalia, carnosa, glabra, glauca; caulina angustiora. Fl. corymbosi, longiores, coerul.

5. *sibirica*. P. calycibus abbreviatis: fol. radicalibus cordatis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 39.*

*In Sibiria* 24.

Caul. etiam cubital. striati. Fol. variae magnitudinis, fature viridia, glabra, glauca, venosa: radical. petiol. cordata; caulina sessil. ovata. Corymbi ramosi, nutantes. Cor. purpur. vel coerul.

6. *maritima*. P. calycibus abbreviat: fol. ovatis: caule procumb. ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 25.*

*Cerithe* &c. *Dill. elth. tab. 65. f. 75.*

*Cynoglossum* &c. *Pluk. alm. tab. 172. f. 3. Moris. hist. 3. f. 11. tab. 28. f. 12.*

*In Anglia, Norvegia, Islandia litoribus, sili-  
ceis* ☉. 24.

Caul. dein. erectus, pedat. pallidus. Fol. crassiuscula, glabra, glauca, venosa. Fl. coerulescent. immaturi coccinei.

*Tres ultimae nimis adfines: 4. caul. erecto; cor. tubo longiore quam limbus: 5. fol. radicalibus cordatis: 6. caul. ramifiss. qui eadem pro varietate habet, vix errat.*

210. SYMPHYTUM. Cor. limbus tubulato-ventricosus: ore 5-fid. segmentis erectis: fauce clausa radiis subulatis.

1. *officinale*. S. fol. ovat-lanceol. decurrentibus, (alternis). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 664. Bluck.*

B b iij

tab. 252. Sabb. hort. 2. tab. 30. Luth. ed.  
tab. 80.

In Europa umbrosis subhumidis 24.

Planta aspera. Caul. erectus, brachiatus. Fol. magna, pallide virentia, rugosa. Spica longa, secunda, fl. cernuis. Cor. albido-flavescent, vel purpur.

2. *tuberosum*. S. fol. semidecurrentibus; summis oppositis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. obs. 3. tab. 13. Fl. Austr. 3. tab. 225. Sabb. hort. 2. tab. 31.

In Germania, Monspelii, Italia, Hispania, ad agrorum margines, in pratis montanis 24.

Prioris forte varietas. Tota planta hirsuta. Radix tuberosa, alba, nec extus nigra, ut in priore. Caul. ped. 5-gonus. Fol. elliptica; inferiora rariora, alterna, minora, angustiora priore. Cor. ochroleuca, vel magis flava.

3. *orientale*. S. fol. ovat. subpetiolat. Syst. veg. ed. 14. Buxb. cent. 5. tab. 68.

Juxta Constantinopolis rivulos, primo vere 24.

Planta aspera. Fol. Boraginis, satyre virentia. Cor. alba, vel caerulea.

221. CERIN-  
THE. Cor. limbus tubulato-ventricosus, ore 5-dent. fauce perva. Anth. pone hamulis cohaerentes. Caps. 2. biloculares, ex seminibus coalitis.

1. *maior*. C. fol. amplexicaulibus: cor. obtusiusc. patulis. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 1. tab. 12.

In Helvetia, Italia &c. ☉.

Caul. cubital. ramosi. Fol. alterna, oblonga, basi latiore, mucrone obtuso, glauca, verrucosa, maculis albis adspersa. Fl. pedunculati, penduli. Cor. lutea, vel rubro-purpurea.

Var. fol. asperis, & fl. flavo.

.... fol. emarginatis.

2. *minor*. C. fol. amplexicaulibus, integris: cor. acutis, clausis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 124.

In Italia, Austria &c. 24.

Priori valde affinis.

222. ONO-  
SMA. Cor. tubuloso-ventricosa, 5-fida, fauce perva. Sem. 4. distincta.

1. *simplicissima*. O. fol. confertis, lanceo-linearibus, pilosis. Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 40.

*Echium* &c. *Alp. exot. tab.* 129.

*In Sibiria.*

Caulis. vix palm. Fol. digiti fere longitudine.

Racemi sæpius 2. terminales, vix peduncul.

Cor. *Symphyti*, vix 5-fida. Apex floriferus nutans, flavescenti-albus.

2. *orientalis*. O. fol. lanceol. hispidis: fructibus pendulis. *Syst. veg. ed.* 14.

*In Oriente* h.

*Hutus plantæ, versus mare Caspium crescentis, iconem dedisse credit cl. Pallas in itin. sui vol. 2. tab. L.*

Caul. teretes. Fol. alterna, sessil. integerr. Racemus terminalis, duplex. Bract. lanceol. angustæ. Fl. pedunculati.

3. *echioides*. O. fol. lanceol. hispidis: fructibus erectis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Austr. 3. tab.* 295.

*Anchusa* &c. *Sabb. hort. 2. tab.* 32. *Col. ecphr. tab.* 183.

*In Italia, Austria, Helvetiæ &c. rupibus* 24.

*Tota planta hispida. Folia primo anno prodit sola radicalia, 2-5-unc. longa: altero anno, caulem semi-fesquiped. suberectum, purpur. vel magis pallidum; qui peracto fructu perit. Fol. alterna, sessilia. Rami axillar. peduncul. breves, ex alis superioribus solitarii, 1-fl. nutantes. Post fecundationem calyx fructiger erigitur. Cor. primum nivea, dein ochroleuca, extus parum villosa. Sem. cinerea.*

223. **BORAGO**. Cor. rotata, profunde 5-fid. segmentis cuspidatis: faucibus radiis clausa.

1. *officinalis*. B. fol. omnibus alternis: calycibus patentibus. *Syst. veg. ed.* 14. *Black. tab.* 36. *Sabb. hort. 2. tab.* 20. 21. *Ludw. ed. tab.* 3. *Knorr. del. 1. tab.* B. 1.

*In Europa: venit olim ex Aleppo* ☉.

Caul. humilis, ramosus. Fol. ovato-lanceol. lata, rugosa, hispida, integerr. e viridi-nigricantia; inferiora petiolat. super. sessil. Pedunc. terminal. multifl. Cor. magna, cœrul. carnea, alba.

2. *indica*. B. foliis ramificationum oppositis, amplexicaulibus: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed.* 14.

*Cynoglossoides* &c. *Isnard. Ad. 1718. tab.* 10.

*Anchusæ* &c. *Pluk. alm. tab.* 76. f. 3.

*In India Orient.* ☉.

Caul. ramosus. Fol. lanceol. minus hirsuta, scabra; infer. opposita, super. alterna. Rami axill. alterni, patentes. Pedunc. cernui. Fol. calycina cordato-sagittata. Cor. alba.

3. *africana*. B. fol. oppositis, petiolat. ovatis: pedunc. multifl. Syst. veg. ed. 14.

Cynoglossoides &c. Isnard. Ad. 1718. tab. 11. In Æthiopia ☉.

Similis priori, sed altior, & robustior. Caul. magis divisus. Fol. longe latiora, & ovata, magisque hispida. Planta stimulis adspersa. Fol. floralia alterna. Pedunc. e summis alis, & ramulis, pilosi. Fl. parvi, cernui, sordide cœrulei, medio flavo, punctis 5. purpur.

4. *zylunica*. B. fol. rameis alternis, sessilibus: pedunc. 1-fl. calycibus inauritis. Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 14. f. 2.

Anchusa &c. Pluk. mant. tab. 335. f. 4.

In India Orient. ☉.

Differt ab Europæa, & Afric. pedunc. 1-fl. a B. Indica fol. non amplexantibus; calycibus non calcaratis. Caul. ramosus, hispidus. Fol. caulina opposita, sessil. lanceol. hispida; ramea plura, alterna, minora, acutiora. Pedunc. ad singula fol. ramea solitar. filiform. fol. longiores, pilosi. Cal. erectus, longitud. cor. pilosus, canescens. Sem. glabra, quasi ossea Cérinthæ.

5. *orientalis*. B. calycibus tubo cor. brevioribus: fol. (radicalibus) cordatis. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 2. tab. 22. Tourn. it. tab. 523. Buxb. cent. 5. tab. 30.

Circa Constantinopolin. 24.

Caul. sesquiped. rubens. Fol. radical. petiol. amplexicaul. bipalmar. cordata: caulina subsessil. ovata. Pedunc. axill. multifl. Cor. revoluta, hispida, cœrulescens.

- verrucosa*. B. fol. verrucosis: verrucarum fetis rigidis, pungentibus. Forsk. Æg.

In Arabia.

Cal. prismaticus. Antheræ longis fetis terminatæ. Sem. extus plana, emarginata, serrata.

224. ASPERUGO. Cal. 5-fid. post. efflorescentiam compressus, forma 2-valvi. Cor. infundibulif. tubo recto,

brevissimo; limbo semi 5-fid. Squamulæ 5 in fauce positæ.

1. *procumbens*. A. calycibus fructus compressis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 352. Sabb. hort. 2. tab. 23.*

Buglossum &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 26. f. 13. In Europæ ruderalis pingutibus* ☉.

Caul. decumbens. Fol. alterna, petiolat. oblongo-ovata, hispida, cinereo-virent. superiora subopposita. FL. parvi, prius rubicundi, dein violac. *Var. fl. albis.*

2. *Ægyptiaca*. A. calycibus fructus ventricosus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 21.*

*Anchusa flava. Fersk. Æg. monente Vohl.*

*In Ægypto* ☉.

Caul. semiped. & ultra, divaricatus, polidomaculatus, hispidus. Fol. alterna, subpetiol. lanceol. crassula, venosa, adpersa maculis albis, subconicis; infima obtusa, summa acuta. FL. unilaterales. Cal. hispidus, longitud. fere cor. Cor. ochroleuca.

- divaricata*. A. calycibus fructus ventricosus; fol. sessilibus. *Murray. Comm. Guttin. 1776. tab. 2.*

*Habitat* . . . .

Habitus totius plantæ hispidus, & succosus. Rad. ramosa, extus fusca. Cespes radicalis densus folior. & caulium. Caul. ped. obliquus, angulat. in 2. ramos plerumq. superne divisus, quorum inferior simplex; alter 2-fid. uterque divaricatus. Fol. lanceol. setis irregularibus, ciliis remotis, sessil. venosa, obsolete repanda, costa crassa: radical. pedalia, basi linear. canaliculata; caulina breviora, basi latiore, subdecurrentia. FL. ramei, solitar. alterni, infimi aphylli, superior. axill. peduncul. Pedunc. dein cernui. Cal. ovato-oblong. lacin. acuminat. 2. superior. latioribus; fructu maturescence inflexus, connivens, dein patens. Cor. alba, limbo patente, fauce subclausa squamis 5. pilosis. Sem. nigra.

225. LYCOPSIS. Cor. tubo incurvato; limbo 5-fido.

1. *vesicaria*. L. caul. prostrato: fol. integerrimis: calycibus fructescens in flatis, pendulis. *Syst. veg. ed. 14. Zann. tab. 38.*

Buglossum &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 26. f. 11. In Europa australi* ☉.

Caul. ped. hispidus, in tres ramulos divisus.  
Fol. alterna, sessil. angusta, hirsuta, aspera.  
Pedunc. axillar. Cor. exigua, pulla, atra.

2. *pulla*. L. caul. erecto: fol. integerr. calycibus fructescentibus inflatis, pendulis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Jacq. Austr. 2. tab. 188.*

*In Germania, Tartaria &c.*

*Differt a priore radice repente; caule erecto. Planta tota hirsuta. Rad. repens. Caul. subped. superne ramosus. Fol. alterna, sessil. lanceol. acuta, crassula, mollia, pallide virentia. Fl. solitar. nunc axillar. nunc inter folia. Petala superne fusca, inferne atro-purpur.*

3. *egyptia*. L. caulibus adscendentibus: fol. integerr. scabris: caulibus fructescentibus inflatis, pendulis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Misc. vol. 3. ic. rar.*

*In Aegypto.*

4. *variegata*. L. caul. decumbent. fol. repandis, dentatis, callosis: cor. cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 435. Zann. tab. 37. ?*

*Buglossum &c. Stiff. Bot. tab. 57. Morif. hist. 3. f. 11. tab. 26. f. 10.*

*In Creta, Dania, Pedemontio &c.*

Caul. dodran-pedal. Fol. radical. virid. bullis albis adspersa. Fl. terminal. parvi, coerul. vel rubri, striis albis.

5. *arvensis*. L. fol. lanceol. hispidis: calycibus florescentibus erectis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 435.*

*Buglossum &c. Black. tab. 234.*

*In Europæ arvis ficcis &c.*

Planta hispida. Caul. sesqui-spitham. ramis sparsis. Fol. læte virent. tenera, succosa, quandoq. decurrentia, sinuato-dentata, vel integerr. Fl. spicati, multi, parvi, pallide coerul. vel albi.

6. *orientalis*. L. fol. (cordato-ov. ) integerr. scabris; calycibus erectis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente &c.*

Caul. ped. inferior. longe petiol. semipedal: caulina angustiora. Fl. parvi, coerul.

7. *virginica*. L. fol. lineari-lanceol. confertis, tomentosis, mollibus: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia ad vias &c.*



226. ECHIUM. Cor. irregularis, tubuloso-campaiifor. fauce nula. Stam. inæqualia.

1. fruticosum. E. caul. fruticoso: ramis, foliisq. pilosis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 2. tab. 54.*

Buglossum &c. *Pluk. mant. tab. 341. f. 7.*

*In Æthiopia h.*

Caul. 3-ped. fuscus. Fol. fescunc. longa, mediam lata, sessil. lanceol. inferne attenuata, viridia. Bract. lineari-lanceol. obtusæ. Rami superne breviter corymbosi. Cor. cœrul. fundo purpur. lacin. rotundatis. Stam. cor. non longiora.

2. candicans. E. caul. fruticoso; hirsutum, albicans: fol. lanceol. utrimq. acuminat. venoso-nervosis: panicul. terminal. pedicell. spicatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Maderæ rupibus altis h.*

Frutex pulcher. Tota planta albicans, quasi argentea hirsutie albida. Fol. adproximata, spithamæa, basi attenuata usque ad infertionem, ubi dilatata, supra lineata; subtus venosa. Panicula conica. Spicæ secundæ, incurvæ. Cor. ex minoribus huius generis, subhirsuta, cœrul.

3. giganteum. D. fruticosum; ramis canis, glabris: fol. sessilibus, lineari-lanceolat. scabriuscul. thyrsis terminali; spicis simpliciss. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In rupibus Teneriffæ h.*

Altissimum. Fol. spitham. longa, latitudine digiti, venosa. Thyrsus maximus, pyramidal. Fl. secundi. Cor. subæqual. obtusæ, albæ. *Differt ab E. altissimo Jacq. App.*

4. stridum. E. fruticosum: fol. petiolat. ellipticis, hisp'dis, scabris: caul. reverse-hispido: pedunc. axillaribus, spicato-capiatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In rupibus Teneriffæ h.*

*Dignoscitur caule strido: fol. petiolat. oblong: pilis caulis deorsum versis. Peduncul. in apice caulis, sulcatis, nudi, apice spicul. 3-part. Fl. parvi, cœrul. Stam. exserta.*

5. spicatum. E. caulibus ascendentibus, simpliciss. fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Fol. radicalia plurima, palmar. lanceol-linear. valde pilosa. Caul. fol. duplo longiores; foliis aliquot minoribus, alternis, pilosis. Spica terminal. fere digital. compacta. Calyc. con. Stam. cor. longiora.

6. *argenteum*. E. fol. linearibus, albido-hirsutis, apice patulis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In cap. b. Spei montibus nigris.*

Caul. determinate ramosus. Fol. vix pollicar. sparsa, acuta, apice extrorsum curva. Fl. axillar. sessil. foliar. alterni. Cor. cœrul.

7. *capitatum*. E. caul. piloso fol. hispidis: fl. capitato-corymbosis, æqualibus; staminibus cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Caul. fruticosus, ramosus, pilosus. Fol. fol. adpersa setis patulis, pellucidis, basi confusis. Capitula terminalia. Cor. infundibulif. vix *Lycopsidis* ma. Stam. corollis; & styl. staminibus duplo longior.

8. *plantagineum*. E. fol. radicalibus ovatis, lineatis, petiolat. *Syst. veg. ed. 14.*

E. lato &c. *Barr. rar. f. 1026.*

E. *plantaginei* varietas; fol. radicalibus lanceol. longe petiol. *Jacq. Austr. t. 1. tab. 45.*

*In Italia, ubique ad vias, & loca sicca h.*

Fol. supra pilosa, mollia, hispida. Radical. magna (*Plantaginis*): caulina sessil. lanceol. Caul. pilosi, punctis fuscis sub pilis, ut in reliquis, sed minutis. Cor. violac. (non cœrul. E. *vulg.* nec calyce breviores E. *cretici*). Bract. inter. fl., semicordatæ, longitudine calyc. (non subulatæ E. *vulg.* nec calyce longiores E. *cretici*).

9. *lævigatum*. E. caul. lævi: fol. lanceol. nudis, margine, apiceq. scabris: cor. subæqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*

b. E. *pyrenaicum*. E. maius, & asperius, fl. dilute purpur. *Tourn. inst. 135.*

*Ad cap. b. Spei: b. Montpelii 24.*

Caul. suffrutic. pedal. læves. Fol. glabra. Racemi ex alis fol. supremorum, secundi, læves. Cal. lævis. Stam. declinata. Sem. muricata.

b. Simil. E. *italico*, hispidum, ut fere *urens* si-

mulis albis. Cor. calyce non latior, subincarnata (nec alba), infundibulif. fere regular. calyce duplo longior, extus pubescens, pallidiorque. Filam. duplo longiora, sature rubra. Ant. cœrul. Sem. lœvia, apice subtrigona, quasi denticulo intermedio, seu interiore productiore.

10. *italicum*. E. caul. erecto, piloso: spicis hirsutis: cor. subæqualibus: staminibus longissim. *Syst. veg. ed. 14. Cam. ept. p. 738.*

An E. altissimum. *Jacq. Austr. 5. app. tab. 16. mera huius var.?*

*In locis siccis Pedemontii &c. ♂.*

Caul. ped. erectus, vix ramosus, asper. Fol. glauca, pilis longioribus. Fl. parvi. Cor. vix calyce longior, violac. vel alba.

11. *rubrum*. E. caul. ex racemulis brevibus longe spicato: fol. hispidis: cor. subæqualibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. app. tab. 3.*

*In pratis ♀.*

Differt potissimum a vulgari, fol. minor. angustioribus: & fl. rubro.

12. *vulgare*. E. caul. tuberculato, hispido: fol. caulinis lanceol. hispidis: fl. lateralibus, spicatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 445. Black. tab. 229. Knorr. del. vol. 2. tab. E.*

*In Europa ad vias, & agros ♂.*

Caul. cubital. erectus, simpl. maculatus. Fol. inferiora lingulata, pilis bulbosis, petiolat. super. sessilia. Cor. violac. immatura rubra. Stam. corollam æquantia. *Var. fl. albo, & rubro; & panicula crisp.*

13. *violaceum*. E. cor. stamina æquantibus: tubo calyce brevior. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Austria, Germania ☉.*

*Simil. priori, sed cor. violac. Caul. magis diffus. Cor. tubus longitudine fere calyc. Stam. non longiora, purpur. tamen stylo albo, piloso. Facies distincta.*

14. *creticum*. E. caul. procumbente: calicibus fructescentibus distantibus. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. p. 165.*

*In Creta, Oriente ☉.*

Caul. asperi. Fol. radical. humifusa, maculis pallidioribus adspersa. Cor. sature rubra, tu-

bo calycibus brevior. Filam. apice parum villosa.

15. *orientale*. E. caul. ramofo: fol. caulinis ovat. fl. lateralibus, folitar. *Syst. veg. ed. 14. Tourn. it. 2. f. 107. ed. alt. it. 3. pag. 94.*

*In Oriente.*

Caul. 3-pedal. dilute virid. Fol. infer. sub 15. pollic. longa, 4-5. lata, dilute virid. mollia, tomentosa: caulina semipedal. mollia, acutiora, minus tomentosa. Pedunc. axill. Fl. magni, campanulati, dilute purpur.

16. *lusitanicum*. E. cor. stamine longioribus. *Syst. veg. ed. 14. In Europa australi 24.*

Caul. simpl. Fol. ampl.; caulina lanceol. sericea. Fl. laterales, spicati.

227. *MESSERSCHMIDIA*. Cor. infundibulif. fauce nuda. Bacca suberosa, 2-partibilis; singulo dispermo.

1. *fruticosa*. M. caul. fruticoso: fol. petiolat; cor. hyprocateriformibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Septentrionalibus plagis Teneriffæ h.*

*Simil. sequenti; discrimen ex definitione.* Frutex alius, hirtus, scaber, ramis apice paniculat. Fol. alterna, longe petiol: lanceol. integra, hirta, venosa. Spicæ terminal. compositæ, dichotom. secundæ. Cal. breviss. Cor. parva, versus limbum inflata, globosa. Bacca rotundata, sicca.

*Cor. Tournefortiæ, sed fruct. Messerschmidæ.*

2. *Arguzia*. M. caul. herbac. fol. sessilibus: cor. infundibulifor. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Petrop. 1763. tab. 11. Gmel. it. 2. tab. 27.*

*In Dauuriæ apricis glareosis, aridis 24.*

Radix repens. Caul. erectus, spitham-palm. rami alterni, steriles. Fol. alterna, ovato-oblon. venosa, tomentosa. Fl. fasciculi saxe bini. Calyx tubo cor. brevior. Cor. alba.

228. *TOURNEFORTIA*. Bacca 2-locul. disperma, supera, apice 2. poris perforata.

1. *ferrata*. T. fol. ovatis (acuminat.), serratis; petiolis spinulentibus: spicis terminalibus, recurvis. *Syst. veg. ed. 14*

*Pittonia &c. Plum. gen. ic. 228. f. 1. b. 2.*

*In America calidiore h.*

Planta arborescens. Fol. alterna, petiolis a cau-

le divaricatis. Pedunc. axillar. longiss. tricho-  
tomi, racemis secundis. Cor. magna.

2. *hirsutissima*. T. fol. ovat. (acuminat.), petiolat. caul. hirsu-  
to: spicis terminalibus, ramosis. *Syst. veg.*  
*ed. 14.*

Pittonia &c. *Plum. gen. ic.* 209.

*In America calidiorē h.*

Planta arborelscens. Fol. alterna, supra glabra,  
subtus hirsuta. Racemi secundi. Baccæ albæ.

3. *volubilis*. T. fol. ovat. acuminat. glabris, petiol. reflexis:  
caul. volubili. *Syst. veg. ed. 14.*

Bryonia &c. *Sloan. hist. 1. tab. 143. f. 2.*

Virga aurea &c. *Pluk. alm. tab. 235. f. 6.*

*In Jamaica, Mexico, arborescens h.*

Planta 7-8-pedal. Fol. alterna, unciam longa,  
parum reflexa, col. leucophæo. Racemi ter-  
minal. Fl. plurimi, herbacei.

4. *foetidissima*. T. fol. ovat-lanceol. hirtis; peduncul. ramosis:  
spicis pendulis. *Syst. veg. ed. 14.*

Pittonia &c. *Plum. gen. ic.* 230.

Heliotropii flore &c. *Sloan. Jam. 2. tab. 212.*  
*f. 1.*

*In Mexico, Jamaica h.*

Frutex 3-4-pedal. valde ramosus. Fol. magna,  
9. unc. longa, 3. lata, petiolat. rugosa, sub-  
tus lanuginosa, obscure virid. foetida. Racemi  
terminal. magni, ramosiss. & penduli, quibus  
a cæteris speciebus differt. Fl. & baccæ albæ.

5. *humilis*. T. fol. lanceol. sessilibus: spicis lateralibus, sessi-  
libus, recurvis. *Syst. veg. ed. 14.*

Pittonia &c. *Plum. gen. ic. tab. 227. f. 2.*

*In America calida h.*

Simil. T. *volubili*. Planta humilis, diffusa. Fol.  
alterna, integerr. subtus hirsuta.

6. *cymosa*. T. fol. oblon-ovat. integerr. nudis: spicis cy-  
mosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Heliotropii flore &c. *Sloan. hist. 2. tab. 212. f. 2.*

*In Jamaica h.*

Priori nimis affinis.

Fol. magna, glabra. Cor. albicans. Baccæ ni-  
væ, cum maculis nigris.

7. *argentea*. T. fol. ovat. obtusis, tomentoso-sericeis: spicis  
terminalibus, compositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*

*Suppl. Rumph. Amb. 4. tab. 55.*

*Ad litora maris Zeylanici h.*

Species pulcherrima. Altitudo vix humana. Rami patentiss. hirsuti. Fol. in apice ramulorum adproximata in rosam, alterna, sessil. linguiform. Panicula terminalis, magna, divisa in spiculas secundas, revolutas. Fl. nivei, recurvati. Baccæ imperforatæ.

8. *suffruticosa*. T. caul. suffrutic: fol. sublanceol. incanis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Thymelæa* &c. *Sloan. Jam. 2. tab. 161. f. 4.*  
*In Jamaica* h.

Caul. 7-pedal. cortice fusco-rubente, superne divifus. Fol. multa, unciam longa, sessil. crassa, succulenta. Pedunc. incurvi. Fl. 4-pet. flavi.

- maculata*. T. fol. ovatis, utrimq. glabris: spicis ramosissim. pendulis. *Jacq. Amer.*

*In Carthagenæ sepibus* h.

Frutex ramis debilibus. Fol. petiolat. acumin. integerr. inodora; fructibus luteis, basi 4. maculis atris notatis.

- glabra*. T. ramosissima, baccis niveis. *Aubl. Guian. Plum. MSS. tab. 6. f. 53.*

*In Guiana.*

229. *NOLANA*. Cor. campanulata. Stylus inter germina. Sem. 5. baccata, 2-4-locul.

1. *prostrata*. N. *Syst. veg. ed. 14. Lin. fil. dec. 1. tab. 2. Sabb. hort. 1. tab. 4.*

*Atropa* &c. *Gouan. hort. 82.*

*Waltheria*. *Ehret. Ad. Angl. 1764. tab. 10.*

*Zwingera*. *Ad. helv. 5. tab. 1.*

*In Peru* ☉.

Planta humifusa, ramosa. Fol. geminata, altero brevior, decurrent. integerr. ciliata, carnosæ. Cor. & fructus fig. *Convolvul.* Cor. cinerea, venis cœrulescentibus. Stam. cœrulescent. villosiss.

230. *DIAPENSIA*. Cor. hypocraterifor. Cal. 3-phyll. imbricat. foliol. 3. Stam. tubo cor. imposita. Caps. 3-locul.

1. *lapponica*. D. fl. pedunculatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 47. Fl. Lapp. tab. 1. f. 1.*

*Androsace* alp. perenn. &c. *Tourn. I. R. H.*

*In alpibus Lapponicis* H.

Habitus *Sedi*. Caul. digital. ramosus, foliosus. Fol.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 403

Fol. radicalia, imbricata, longitud. unguis, linear. obtusa, fere membranac. superne patentia. Pedunc. longitud. pollicis transversis, in apice ramul. 1-fl. Cor. alba.

231. **ARETIA**. Cor. hypocraterif. 5-fid. tubo ovato. Stigma depresso-capitatum. Caps. globosa, 1-locul. sub 5-sperm.

1. *helvetica*. A. fol. imbricat. fl. subsessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Hall. helv. tab. 8. Jacq. Vind. 303.*

*In alpinis occidentalibus Helvetiæ &c. 24.*

*Ad Androsacen spectat.* Planta cespitosa, cauliculi muscosi, Sedi facie, tecti. fol. pubescentibus. Fol. breviss. ovata, conniventia, hirsutie albida. Scapus 1-fl. Cal. magnus. Cor. segmenta planissima, rotunda, alba.

2. *alpina*. A. fol. linearibus patentibus: fl. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. app. tab. 18. Hall. Helv. n. 618. tab. 11.*

*In Valleis 24.*

*Ad Androsacen spectat.* Scapus 2-linear. Fol. pene glabra, ciliata. Flos maior. Cal. hirsutus, cylindric. semi-5-fid. Cor. tubus brevis, limbi segmentis emarginatis, ferratis; albæ. *Var. fol. villosis, & cor. rosea: vel fol. tomentoso-villosis, & cor. purpur. Caps. 5-valv.*

3. *Vitaliana*. A. fol. linearibus, recurvatis: fl. subsessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Vitaliana Sest. epif. tab. 10. f. 1.*

*Sanicula &c. Pluk. alm. tab. 108. f. 6.*

*Sedum &c. Colum. ecphr. tab. 65. f. 1.*

*In alpinis Pyrenæis, Helveticis, & Italicis 24.*

Planta cespitosa. Scap. breviss. 1-fl. Fol. subtiliter villosa, per oras ciliata, inferne latiora. Cal. ultra medium 5-fid. villosus. Cor. longe de calyce eminet, flava, tubo longo, segmentis ovatis. Sem. 5.

232. **ANDROSACE**. Involuc. umbellæ. Cor. tubus brevis, ventricosus; ore glanduloso, 5-fido. Caps. globosa, 1-locul. 5-valv. polysperm.

1. *maxima*. A. perianthiis fructuum maximis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 331. Subb. hort. 2. tab. 1.*

*Inter Germaniæ, Helvetiæ &c. segetes 24.*

Scap. 2-6-unc. rubellus, superne incrassatus.

Fol. radical. petiolat. ovalia, denticulata.

*Tom. I.*

*C c*

Umbella 5-8-fl. Cor. minima, alba, intra calyc. maximum.

3. *elongata*, A. fol. subdentat. pedicellis longiss. cor. calyce brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. obs. 1. tab. 19. Fl. Austr. 4. tab. 330. Gmel. Sib. 4. tab. 44. f. 4.*

*In Sibiria, Germania.*

*Simil. priori, sed calyc. maiores non evadunt absoluto fl. Verum pedunc. proprii elongantur, longitudine ipsius scapi. Planta 2-unc. & ultra. Scap. medius erectus, reliqui patentiss. Fol. plura, radical. lanceol. vel oblonga, crassula, quandoq. integerr. Cor. alba.*

3. *septentrionalis*. A. fol. lanceolat. dentat. glabris: perianth. angulat. cor. brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 7. Gmel. tab. 4. tab. 43. b. f. 2. f. 1. A. B. Buxb. ad. 2. tab. 23. f. 2.*

*In alpibus Lapponiæ, Russiæ, Germaniæ &c.*

4. *villosa*, A. fol. pilosis: perianth. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 332. Clus. hist. 2. p. 62.*

*In alpinis Rheticiis, Carinthiis, Pyrenæis &c. 24.*

Scap. 2-unc. rubellus. Fol. lanceol. Cor. alba, ad faucem rosea, lutea, vel carnea. *Variet. 1-fl.*

5. *lactea*, A. fol. lanceol. (plerumq.) glabris; umbella involucris multoties longiore. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 333.*

*In Austria, Helvetiæ &c. alpinis 24.*

Odor gratus *Pri-nulæ*, Scap. 1-7-fl. Fol. angusta, nitida, margine scabro. Cal. e viridi-luteus. Cor. nivea, raro rosea, segment. emarginatis. In scap. 1-fl. involucri fol. 2. aut nulla.

*Ad Aretia genus pertinet.*

6. *carnea*, A. fol. subulatis, glabris: umbella involucri æquante (demum longiore). *Syst. veg. ed. 14. Sedum &c. Colum. ceph. 2. tab. 65. f. 2. Sanicula &c. Pluk. alm. tab. 108. f. 5. b. Aretia &c. Hall. Helv. 486. tab. 7. ed. 2. n. 619. tab. 17.*

*In alpinis Pyrenæis, Helveticis 24.*

*Simil. Aretia Vitalianæ, sed differt umbella, fl. parvitate, colore &c. Scap. triental. hirsutus,*



3-fl. Fol. Graminea, ciliata, rugosa, plana, margine scabro. Cor. tubus brevis, limbo ovato, roseo.

*odoratissima*. A. fol. triquetris, ciliatis: perianthis hirsutis.

Schreb. dec. 1. tab. 4.

A. oriental. &c. Tourn. Cor.

In Cappadocia alpina.

*obtusifolia*. A. All. Fl. Ped. tab. 46. f. 1.

Aretia &c. Spec. Ped. tab. 4. f. 2.

In herbidiis nivosis iugis 24.

Fol. elliptica, lingulata, obtuse acuminata. Fl. segmenta ovata, integerrima: color plerumque purpur. aliquando albus. Var. 1-fl.

233. PRIMULA. Involuc. umbellæ. Cal. 5-fidus. Cor. tubus cylindric. longus, ore patulo. Caps. 1-locul. 5-10-valvis.

Var. num. fluminum in toto Genere.

1. *vera*. P. fol. dentatis, rugosis. Syst. veg. ed. 14.

a. officinalis P. limbo cor. concavo. Fl. Dan. tab. 433.

b. elatior. P. limbo cor. plano. Fl. Dan. tab. 434.

y. acaulis. P. scapo nullo. Fl. Dan. tab. 194.

Var. fl. viridi, pleno.

In Europa pratis 24.

Fol. radical. sessil. oblonga, obrufa, pallide, aut luteo-virentia. Scap. brevis. Fl. cernui. Cal. subluteus. Cor. 2-fid. lutea, cum macula crocea, odora.

2. *farinosa*. P. fol. crenatis, glabris: fl. limbo plano. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 125. Gmel. Sib. 4. tab. 44. f. 3. Clus. hist. p. 300.

In alpibus, frigidisque Europa pratis, uliginosis 24.

Fol. lato-lanceol. dentata, late virent. farina subtus adspersa. Caul. 5-unc. simpl. Fl. umbellati, erecti: cor. limbus cordat. angustus, purpureo-cœrul. aut. albus. Var. fol. utrimque viridibus.

3. *Auricula*. P. fol. ferratis, glabris (inverse ovatis). Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 415. Sabb. hort. 1. tab. 98.

In Italia alpinis Helveticis &c. 24.

Juniora fol. integra; adulta supra medium ferrata, crassa, quandoq. pulvere albedo veluti adspersa.

Cc ij

fa. Fl. interdum umbellati, quandoq. solitarii. Involucri foliol. ovata. Pedunc. farinosi. Cor. varians col.

4. *longiflora*. P. fol. ferratis, glabris: umbelli nuntante: cor. tubo longiss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. App. tab. 46. Atl. Fed. tab. 39. f. 3.*

*In Austria &c. 24.*

Diverfa a *P. farinosa*. Fol. multa, radical. obtuse tublanceol. dilute virent. subtus pallidiora, ferrata. Scapus spithami. Fl. umbellati, 2-6. r-ro pl. in florekenia secundi. Cor. tubus extrus pallide rubris, intus albus: limbus 5-part. lacin. obverle cordatis, pallide rubellus, per ætatem viol. c.

5. *villosa*. P. fol. ferrulat. p. anis, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Austr. App. tab. 27.*

*Auricula &c. 3. Clus. Hist. p. 303.*

*b. pubescens Jacq. Mjse. tab. 18. f. 2.*

*In alpium rupibus 24.*

Fol. radical. in orbem sparsa, oblong-ovata, obtusiusc. cretula, undiq. villosula, cris. anterioribus obtuse ferratis. Scap. ab uno pollice ad dimidium spitham. altus, teres, villosulus. Involuc. foliol. 3-7. parva, ovata, oblonga, villosa. Fl. umbellati 2-12. Cor. elegans, dilute cœrul. vel violac. fauce alba. Odor suavis. Farina nulla in planta. *Var. 1-fl.*

6. *glutinosa*. P. fol. lanceol. ferrulat. glutinosi: involuc. longirud. fl. sessile. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Jacq. Austr. App. tab. 26.*

*Auricula &c. Pluk. alm. tab. 1496.*

*In alpibus Tirolensibus 24.*

*Statura P. farinosæ. Fol. & fl. odore Orchidis Canopsea, aut odoratissima. Fol. plura, radical. lineari-lanc. obtusiusc. ferrata, nuda, fere pulposa, viscida. Scap. 1-2-pollic. erectus, nudus. Fl. 5-7. umbellati, subsecundi. Involuc. foliol. 4-5. inæqual. oblong-ovat. viridi-atropurpur. Cor. limb. 5-fid. satore violac.*

7. *minima*. P. fol. cuneiformibus, dentat. nitidis, hirsutis: sc. p. sub 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 1. tab. 14. Fl. Austr. tab. 273.*

*Sonicula &c. Lob. ic. 871.*

*Auricula VIII. Clus. hist. 1. p. 305.*

*In alpibus Helvetiæ, Austria, Silesia.*

Planta subcespitosa. Scap. brevis, quandoq. nullus. Fol. in rosulas collecta, sessil. crassula, semper glaberrima. Bractæ 1-2. Involuc. 2-phyll. Cal. tubo longior, quandoq. rubens. Cor. intus hirsuta, lutea, carnea, vel purpur. raro alba.

8. *cortusoides*. P. fol. petiolat. cordatis, sublobat. crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 45. f. 1.*

In Sibiria.

Herba fol. *Cortusa*; fl. *Aretia Vitaliana*. Planta hybrida ex utrisque. Caul. semiped. pilosi. Fol. radical. multa, profunde laciniata, P. *Auricula* similia: caulina oblonga, angusta. Fl. terminal. purpur. umbilico flavescente.

9. *integrifolia*. P. fol. integerr. oblong. glabris: calycibus tubulosis, obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 1. tab. 15. Austr. tab. 327. Fl. Dan. tab. 183. Auriculæ &c. IV. Clus. Hist. 1. tab. 304.*

In alpinis &c.

Habitu, & statura convenit cum P. *Auricula*. Scap. setquicunc. subbiflorus. Fol. plura, sessil. crassa, nitida, ciliata. Involuc. foliola terno-quaterna, inæqual. linearia. Fl. magni, cernui. Cor. violac. vel purpur. odore melleo, laciniis semibifid. tubo simpl. absque collo contracto.

10. *carniolica*. P. fol. integerr. elliptic. umbella erecta: calycibus breviss. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. App. tab. 4.*

In Carniolæ &c. alpinis &c.

Differt a P. *integrifolia* solo fl. Cal. in nostra plusquam duplo brevior est tubo cor. Laciniæ cor. non valde secantur. Fol. oblong-ovata, subacuta, parum crassa.

*nivalis*. P. *Patl. It. 3. tab. G. f. 2.*

In Dauuria &c.

Scapi spitham. & ultra, recti. Fol. radical. erecta, oblonga, argute dentata, glabra, digitalia. Fl. umbellati. Involuc. 1-phyll. profunde 5-fid. laciniis subulatis. Stipul. linear. ad peduncul. partial. Cal. parvus, subcoloratus. Cor. majuscula, purpurasc. Caps. magna, grisea.

*verticillata*. P. fl. verticillat. fol. lanceol-ovat. serratis, petiolat. subtus farinosi. *Forsk. Æg.*

In Arabia &c.

Cc iij

Fol. ped. petiolo ad basin latiore, utrimq. a-  
lato, fol. continuo. Fol. basi integra, super-  
ne inæqualiter ferrato-dent. Scap. 2-ped. fa-  
rinofus. Bract. farinosæ. Cor. flava, apice ar-  
ctato. *Odor Primulæ veris.*

*viscosa.*

P. fol. viscosis, odoratis, linguiformibus, sinuatis,  
integerrimis. *All. Fl. Ped. tab. 5. f. 1.*

*Ad rupes 24.*

Rad. crassa. Fol. radical. palmaria, petiolo un-  
cial. bitumen olentis, subtiliter villosa, sub-  
tus pallida, figura *Cyn-glossæ vulgaris*. Scapus  
palmar. Fl. umbellati, 6-7. cœruleo-pallidi.

234. CORTUSA. Cal. 5-fidus. Cor. rotata, semi 5-fida; fau-  
ce anulo elevato. C. ps. oval. 1-locul. apice  
5-valv.

1. *Mathioli.* C. calycibus cor. brevioribus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Cam. epit. 278. Clus. hist. 1. p. 307. Mauh.*

*In alpinis Austria, Silæ, Sibiria &c. 8.*

Fol. radical. 6-7. longe petiolat. petiol. villosis.  
Fol. diametro 3-unc. rotunda, lobata, lobis  
3-fid. odora. Scap. quandoq. cubital. pilosus.  
Involucrum ex 3. foliol. sublinearibus, inæqua-  
libus, pinnato-dentat. quandoq. laciniatis. Radii  
umbellæ 1. 2-unc. 1-fl. Fl. longe pedunculati,  
primum quandoq. penduli, dein erecti. Cor.  
patens, semi- & ultra 5-fida, segment. o-  
vat-acutis, integerr. purpureo-viol. odora.

2. *Gmelini.* C. calycibus cor. excedentibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Gmel. ib. 4. tab. 43. f. 1.*

*In Sibiria 24.*

Fol. radical. in orbem sparsa, longe petiol. læte  
viridia, utrimq. hirsuta, reniformi-cordata,  
lobis rotundatis. Scap. foliis altiores, ad fum-  
mum 4-unc. hirsuti. Umbella sub 3-fl. involu-  
t. foliol. ovat. Cal. magnus, hirsutus. Cor. alba.

235. SOLDANELLA. Cal. 5-fidus. Cor. campanulara, lacero-  
multifida. Caps. (cylindræa) 1-locul. apice  
multidentata.

1. *alpina.* S. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 13. Sabb.*  
*hort. 1. tab. 16. Moris. hist. 2. f. 3. tab. 15.*  
*f. 8.*

*In alpinis Helvetiæ, Austria, Pyrenæorum 24.*

Fol. inferiora longe petiol. subrotunda, integerr.  
quandoq. obsolete crenata, crassa, lævia, ni-  
tida, supra satyre virentia, subtus dilutiora.

Scap. 2. 6-unc. 2-raro-3-fl. Flos nurans. Cor.  
sature cœrul. raro alba. Caps. erecta.

236. DODECATHEON. Cor. rotata, reflexa. Stam. tubo in-  
fidentia. Caps. oblong. 1-locul.

1. *Meadia*. D. Syst. veg. ed. 14.

*Meadia*. Cates. Car. 3. tab. 1. Trew. Ehret. tab. 12.

Auricula &c. Pluk. alm. tab. 79. f. 6.

In Virginia 24.

*Plantæ habitus Primulæ. Flos Cyclamini. Invo-*  
*luc. parvulum, multifolium. Fol. radical. ob-*  
*verse ovata, serrata, involuta, glabra. Um-*  
*bella simpl. fl. peduncul. dilute purpur.*

237. CYCLAMEN. Cor. rotata, profunde 5-fida, reflexa; tubo  
brevissi. fuce prominente. Caps. globosa, 5-  
valv. 1-locul. polysperma.

1. *europæum*. C. cor. retroflexa. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Astr.  
tab. 401. Knorr. del. V. 1. tab. S. 16. Sabb.  
hort. 2. tab. 68. Black. tab. 147.

In Europæ, Tartariæ siccis, umbrosis, nemorosis 24.

Radix tuberosa, orbiculata, foris nigricans, in-  
tus alba. Fol. bina radical. denticulata, cras-  
sa, sature virent. cum maculis albis. Petioli  
multi, unifolii, aut 1-fl. Variat fol. cordatis,  
orbiculatis, reniformibus, immaculatis: fl. pur-  
pur. carneis, albis, variegat.

2. *indicum*. C. cor. limbo nutante. Syst. veg. ed. 14.

In Zeylona.

238. MENY- Cal. 5-fid. Cor. campanulata, semi 5-fida, la-  
ANTHES. ciniis ciliatis. Stigm. 2-fid. Caps. oblon. 1-  
locul. 2-valv. polysperma.

1. *Nymphoides*. M. fol. cordato-orbiul. integerr. cor. ciliatis.  
Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 339. Sabb.  
hort. 2. tab. 67.

*Nymphæa* &c. Dalech. hist. p. 1010. f. 1.

*Limonanthemum*. Gmel. Ad. Petrop. 1769. Vol.  
14. tab. 17. f. 2.

In Belgii, Angliæ, Germaniæ fossis maioribus 24.

Fol. maiora, opposita, petiolat. vaginantia, læ-  
te virentia, venosa, glabra. Scap. pedat. erec-  
tus, simplex, teres, punctatus. Pedunc. e  
latere petioli. Fl. fimbriati, aurei.

2. *indica*. M. fol. cordatis, subrenatis; petiolis floriferis:  
cor. interne pilosis. Syst. veg. ed. 14. Rumph.  
Amb. 6. tab. 72. f. 3.

Nedel-ambel. H. Mal. 11. tab. 28.

In Malabariæ, Zeylonæ fossis. C c iv

410 PENTANDRIA MONOGYNIA.

- Caul. rotundi, fistulosi, in quorum apice fol.  
cæteris rotundiora. Pedunc. e latere petioli,  
ut in priore. Fl. candidi.
3. *ovata*. M. caul. paniculato: fol. petiolat. ovar. Syst.  
veg. ed. 14. Lin. Suppl.  
Ad cap. b. Spei.  
Facies *Alismæ*; at flos *Menyanthis*.
4. *trifoliata*. M. fol. ternatis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab.  
341. Gmel. Sib. 4. tab. 97. Subb. hort. 1. tab.  
48. Black. tab. 474.  
In *Europæ paludosis* 24.  
Fol. longe petiol. oblonga, subserrata, crassiusc.  
nitida, læte virentia. Scapus pedalis-cubital.  
vaginis tectus, racemosus. Cal. 6-7-fid. Fl.  
albi, rubro variegati.
239. *DORÆNA*. Cor. 5-fida. Stigm. emarginatum. Capf. 1-  
locul.
1. *japonica*. D. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.  
In *Japonia* h.  
Caul. arboreus, orgyal. Rami alterni, divarica-  
ti, teretes, glabri, cinerei. Fol. digital. al-  
terna, petiolat. oblongo-acumin. patentia, re-  
mote, & obsolete serrata, nervosa, glabra.  
Fl. racemosi, minuti, albi.
240. *HOTTO-NIA*. Cal. 5-fidus. Cor. hypocraterif. 5-fid. plana,  
plicis binis ad basim singuli segmenti. Stam.  
tubo cor. imposita. Capf. acumin. 1-locul.
1. *palustris*. H. pedunc. verticillato-multifl. Syst. veg. ed. 14.  
Fl. Dan. tab. 487.  
*Myriophyllum alterum*. Matth. 1168.  
In fossis, & paludibus *Europæ borealioris* 24.  
Scap. pedalis erectus, fistulosus. Fol. alterna,  
impari-pinnatifida, pinnis linearibus, tenera,  
læte virentia. Pedunc. bractea suffulti. Cor.  
pallide purpur. fauce sublutea; lacin. emargi-  
natis, planis.
2. *indica*. H. pedunc. axillar. 1-fl. Syst. veg. ed. 14. Burm.  
Zeyl. tab. 55. f. 1.  
Erica &c. Seb. mus. 2. tab. 37. f. 5.  
Thiunda Tüera. Hort. Mal. 12. tab. 36.  
In *India*.  
Genus etiam num dubium. Caul. digital. simpl.  
Fol. verticillata, sæpe 8-rona, linear. 3-fida-  
tertrifid. Pedunc. solitar. fol. longiores.
241. *HYDROPHYLLUM*. Cor. campanul. interno striis 5. mel-

PENTANDRIA MONOGYNIA. 411

liferis, longitudinalibus: stig. 2-fid. Caps. globosa, 2-valv.

1. *virginicum*. H. fol. pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 1. tab. 15.*

Dentariæ adfinis &c. *Dodart. mem. tab. 77.*

Dentariæ facie &c. *Morif. hist. 3. f. 15. tab. 1. f. 1.*

*In Virginia 24.*

Radix nodosa. Caul. subped. Fol. longe petiol. dentata. Pedunc. multipl. Fl. oblongi, albi. Caps. hirsuta.

2. *canadense*. H. fol. lobato-angulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Canada 24.*

Differt a priore folis foliis *Aceriformibus*.

242. ELLISIA. Cor. infundibulif. angusta. Bacca subrotunda, sicca, 2-locul. 2-valv. Sem. 2. punctata, altero supra alterum.

1. *Nyctelea*. E. *Syst. veg. ed. 14. Nov. Ad. Ups. Vol. 1. tab. 5. f. 5.*

Planta &c. E. N. C. 1761. tab. 7. f. 1.

Scorpiurus &c. *Morif. hist. 3. f. 11. tab. 28. f. 3.*

*In Virginia 24.*

*Adfinis Hydrophylla*. Caul. diffusus, prostratus, herbac. ramosiss. dichotom. Fol. alterna, petiol. pinnatifida, foliatione retrorsum imbricata, laciniis acutis, utrinq. dente notatis. Pedunc. oppositifol. patentes, elongati, pubescent. 1-fl. Fl. cernui. Cal. cor. maior. Cor. tubo filifor. curvo, limbo 5 fid. albi, laciniis intus punctis minutis purpur. Caps. scrotiform. coriac. calyculata. Sem. globosa, nitida.

243. LYSIMACHIA. Cal. 5-fid. Cor. rotata, profunde 5-fid. Caps. globosa, mucronata, 5-to-valv.

\* *Pedunc. multiss.*

1. *vulgaris*. L. paniculata; racemis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 689. Black. tab. 278. Sabb. hort. 2. tab. 41. 42. Math. 349.*

*In Europa ad ripas, & paludes 24.*

Caul. 2-3-cubital. erectus, ramosus, angulatus, hirsutus. Fol. opposita, terna, quaterna, ovato-lanceol. acumin. glabra, integerr. supra atro-virent. subtus albescent. Racemi coniugati. Fl. multi, sature flavi. Filam. basi coadunata.

2. *Ephemerum*. L. racemis terminalibus, simplicibus: petalis obtusis: staminibus cor. brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1782. tab. 2. Sabb. hort. 2. tab. 43. Buxb. cent. 1. tab. 33. Tilli Pis. tab. 40. f. 2.*

*In Media, Siberia* ☉.

*Convenit cum L. atropurpurea habitu, structura, col. glauco. Differt fol. plerumque subtus fusco-punctatis, quod non sequens: petalis obtusis, patulis: staminibus cor. brevioribus, st. pedicello infidentibus.*

3. *atropurpurea*. L. spicis terminalibus: petalis lanceol. staminibus cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1782. tab. 1. Com. rar. tab. 33.*

*In Oriente* ☉. ♂.

*Adfinitas nimia cum priore, sed revera distincta. Caul. erectus. Fol. lanceol-linear. glauca, subtus in punctata. Petal. acumin. calyc. paul. longiora, conniventia, saturate rubra, vel sanguinea.*

4. *thyrsiflora*. L. racemis lateralibus, pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 517. Clus. hist. 2. 53. f. 12.*

*In Europæ padulibus* ♀.

*Caul. sub 2-ped. erectus, simpl. Fol. opposita, longe ovat-lanceol. punctis nigris adpersa, pallide virent. glabra. Stipul. longæ, angustæ. Racemi parvi, ovati, densi. Pet. lutea, apice fulvo punctata.*

\*\* *Pedunc. 1-fl.*

5. *quadrifolia*. L. fol. quaternis, petiolo ciliatis: pedunc. quaternis, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*Anagallis &c. Pet. gar. 5. tab. 2. f. 5. Pluk. mant. tab. 333. f. 1.*

*b. ciliata. Sp. pl. Walth. hort. tab. 12.*

*In Virginia, Canada.*

*Fol. subsessil. ovat-acuta. Cor. lutea.*

*b. Fol. in summis ramulis quaterna. Pedunc. gemini, 1-fl. sub calyce turbinati. Fl. cernui. Petal. mucronata, ferrata.*

6. *punctata*. L. fol. subquaternis, subsessilibus: pedunc. verticillat. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 366. L. H. Clus. hist. 2. p. 52. f. 2.*

*Blattariæ &c. Moris. hist. 2. f. 5. tab. 10. f. 15.*

*In Hollandia, Helvetia &c.*



Caul. 3-ped. incani, tori foliosi. Fol. ovat-lanceol. subtus nigro-punctata. Fx qualibet ala pedunc. 2. simpl. Cal. pubesc. Cor. lutea, intus maculis fulvis punctata.

7. *Linum stel-latum*. L. calycibus cor. superantibus: caul. erecto, ramoliss. *Syst. veg. ed. 14.*

*Linum* &c. *Magn. Monsp. tab. 162.*

*In Gallia, Italia collibus* ☉.

Caul. vix sesquiunc. Fol. subulata. Pedunc. fol. breviores. Cor. Centunculi, 5 fid. Fructus 5-valv.

8. *memorum*. L. fol. ovat. acutis: fl. solitar. caul. procumbente. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 174.*

*Anagallis* &c. *Morif. hist. 2. f. 5. tab. 26. f. 5.*

*In Germaniæ, Gallia &c. nemoribus glareosis ro-ridis* ☿.

9. *Nummularia*. L. fol. subcordat. fl. solitariis: caul. procumb. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 493. Black. tab. 542. Ludw. ed. tab. 143. Sabb. hort. 2. tab. 44.*

*In Europa, iuxta agros, & rivulos* ☿.

Fol. opposita, breviter petiol. crassiuscula, nitida, glabra. Pedunc. axill. oppositi, longi, nudi, 1-fl. Cor. magna, flava.

10. *japonica*. L. fol. subcordat. fl. axillaribus; pedunculi. fol. brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Radix fibrosa. Caul. decumbens, apice flexuoso-erectus, palmar. simpl. filiform. villosus. Fol. unguicul. patentia, opposita, petiolat. subrotunda, obtusa, integerr. tenuid. villosa. Fl. raro solitar. sæpe bini.

144. ANA-GALLIS. Cal. profunde 5-fid. Cor. rotata, 5-fida. Caps. circumscissa.

*Differt a Lysimachia filament. hirsutis.*

1. *arvensis*. A. caul. procumb. fol. indivisis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 2. tab. 46. Black. tab. 274.*

a. A. fl. cæruleo.

b. A. phæniceo fl. *Fl. Din. tab. 88. Black. tab. 43. abb. hort. 2. tab. 45.*

*In Europæ arvis* ☉.

Caulic. teneri, ramosi. Fol. parva, opposita, integerr. crassiusc. glabra, glauca. Pedunc. axill. longi, aphylli, 1 fl. Cor. nutans, crenulata. *Var. a. fol. ternis, quaternis. Var. b. var. fl. albo, umbilico purpur.*

414 PENTANDRIA MONOGYNIA.

2. *majelli*. A. fol. indivisis: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Veronæ* ☉.  
 Caul. brevis, ramosus, angulatus. Fol. opposita, sessil. ovat-lanc. acumin. Cor. intense cœrul.
3. *latifolia*. A. fol. cordat. amplexicaulibus: caul. compresso. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Cruciata* &c. *Barr. ic. 584.*  
*In Hispania* ☉.  
 Caul. erecto patens, brachiatus, ramosus, 4-gon. Fol. basi deorsum spectantia, obtusiusc. nervosa, glabra, subius palide punctata. Pedunc. axill. folitar. 1-fl. nudi, teretes. Cor. cœrul. fundo purpurasc. Filam. purpur. Anth. oblong. flavæ. *Dignoscitur caul. compresso: fol. magnis, & latis.*
4. *linifolia*. A. fol. linearibus: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Lusitania, Hispania &c.* ☉.  
 Caul. palmar. 4-gon. rigidulus, ramis alternis, erectis. Fol. opposita, sessil. lævia, internodiis longiora. Pedunc. filiform. foliis duplo longiores. Cor. cœrul. Fruct. cernui, calyce breviores.
5. *tenella*. A. fol. ovatis, acutiusc. caul. repente. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Numinaria* &c. *Morif. hist. 2. l. 5. tab. 26. f. 2.*  
*In Italix, Gallix, Anglix Ericetis humidis* 24.  
 Fl. longe peduncul. folitar. purpurasc.
- 
- verticillata*. A. erecta, fol. caulinis verticillatis: axillis foliorum in caule, & ramis florigeris. *All. Fl. Ped. tab. 85. f. 4.*  
*An Crucata* &c. *Barr. ic. 584?*  
*In Comitatu Nicæensi* ☉.  
 Caul. erectus, pedic. 4-gonus, ramosus. Fol. caulina quaterna-quina; ramea opposita, elliptico-lanceol. glabra, sæpius deorsum reflexa, subius fusce, & minutim punctata. Rami inæquales. Pedunc. nudi. Fl. erecti, dein nutantes. Cal. margine albo. Cor. late cœrul.
245. THEO-PHRASTA. Cor. campanulata, laciniis, & divisuris obtusis. Capf. maxima, globosa, 1-locul. polysperma.

1. *americana*. T. *Syst. veg. ed.* 14.

Ereha &c. *Plum. gen.* 8. *ic.* 126.

In *Amer. aquinoct.* h.

Caudex simpliciss. nudus, apice frondosus, ut in Palmis. Fol. longiss. undique diffusa, lanceol. dentata, nervis undulatis. Fructificat. diffusæ, ramulæ, inter folia.

246. RETZIA. Cor. cylindrica, extus villosa. Stigma 2-fidum. Caps. 2-locul.

1. *spicata*. R. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*

R. *capensis*. Thumb. *Act. Lund.* P. 1. tab. 1. f.

2. *pulchra*.

Ad cap. b. *Spei* h.

Maximam affinitatem cum *Convolvulis* habet. Quadriped. erecta, subramosa. Rami breves, inæqual. pilosi. Fol. quaterno-verticillata, conferta, adproxinata, sessil. lanceol.-linear. erecta, punctis impressis, subtus bifurca. Fl. laterales, versus apicem conferti, erecti, sessil. inter fol. fere absconditi. Bract. lanceol. hirsutæ. Cor. rufescens, extus versus apicem hirsuta.

247. SPIGELIA. Cor. infundibulif. Caps. globosa, didyma, 2-locul. polysperma.

1. *Anthelmia*. S. caul. herbac: fol. summis quaternis. *Syst. veg.*

*ed.* 14. *Lin. amœn. Acad.* 5. tab. 2. *Brow.*

*Jam. tab.* 37. f. 3. *Plenk. fusc.* 4. tab. 88.

Brazeel-parlis. *Pet. gar. tab.* 59. f. 10.

In *Caienna*, *Brasilia* ☉.

Caul. erectus, spitham. simpl. brachiat. glaberrimus, superne parum crassior. Fol. lanceol: caulina alia 2. opposita. Ramus ex ala singula fol. caulini solitarius, terminatus fol. 4. cruciati: positus, ut in caule. Racemi terminal. breves, bracteati. Fl. parvi, unilateral. purpurasc.

2. *marilandica*. S. caul. tetragono: fol. omnibus oppositis.

*Syst. veg. ed.* 14. *Ad. Edin.* 3. an. 1771. tab.

1. *Plenk. fusc.* 4. tab. 89.

*Peryclimeni* &c. *Catesb. carol. tab.* 78.

In *Virginia*, *Marilandia*, *Carolina* h. 24.

Caul. erecti, simpl. rigidi, scabri, annui. Fol. sessil. ov.-lanceol. integerr. patentia, glabra. Spica solitar. secunda; bract. parvulis, oppositis. Cor. coccinea, superne 5-angulata,

416 PENTANDRIA MONOGYNIA.

fauce gibba, basi dilata. Limb. 3-part. lacini. lanceol. revolutis.

248. OPHI- Cor. infundibulit. Stigm. 2-fidum. Fructus 2-lo-  
ORRHIZA. bus.

1. *Mungos*. O. fol. lanceol-ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. med. tab. 1. Plenk. fasc. 4. tab. 90.*  
*In India orient. 24.*

Caul. simpl. Fol. opposita, petiolat. *Adhatoda* familia, integerr. glabra, nervis oblique transversis. Corymb. terminal. ex spicis simplicibus, seu 2-hd. umbellatis. Fl. sessil. Caps. ovata, compressa, 2-locul. 2-valv.

2. *Mitreola*. O. fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Mitra. Horst. MSS. T. bona.*

*In Amer. meridian.*

Caul. erectus. Fol. opposita, petiolat. utrimque integerr. glabra. Rami oppositi. Racemus terminalis, ex racemulis dichotomis, patentibus, Fl. alterni, sessil.

249. VIRE- Cal. 5-phyll. dentibus interiectis. Cor. infun-  
CTA. dib. Stigm. 2 part. Caps. 1-locul.

1. *bistora*. V. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Surinami subhumidis ☉.*

Herba tenera, *Mercurialis annua*. Caul. spitham. & ultra, simpl. interdum radicans, teres, pubescens. Fol. opposita, in petiolum decurrentia, parva, ovata, obtusa, integerr. venosa. Stipul. interfoliaceæ, parvæ, erectæ, subulatæ. Pedunc. terminal. inter ramos duos teneros, foliis sæpius brevior, 2-fl. Fl. inferior. sessil. Cor. rubesc. ore albo.

250. LISIAN- Cor. tubo ventricoso, laciniis recurvatis. Cal.  
THUS. carinatus. Stigm. 2-lamellatum. Caps. oblong. 2-locul. 2-valv. valvularum marginibus intortis.

1. *longifolius*. L. fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Brow. Jam. tab. 9. f. 1.*

*Rapunculus* &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 101. f. 1.*

*In Jamaica sylvis h.*

Frutex. Fol. opposita. Fl. terminal. solitarii, speciosi, lutei.

2. *cordifolius*. L. fol. cordatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Jamaica h.*

Valde affinis priori.

3. *Chelonoides*. L. glaber; fol. oppositis, subconnatis, oblong. panic. terminali, dichotoma, racemosa. *Syst. veg. ed. 14.*

L. alatus. *Aubl. Guian. tab. 80.*

In Surinamo, Cayena, in alitis arenosis.

Caul. 2-3-ped. herbac. simpl. teres. Fol. elliptico-oblong. obtusiusc. sessil. integerr. glauca, glabra. Fl. remoti, alterni, secundi, penduli, lutei. Cal. globosus. Cor. tubo subre-curvo, sensim ampliato. Copt. decumbens, cum stylo.

Herba vulde amara, & ut validum purgans adhibetur.

4. *glaber*. L. glaber; fol. petiolat. ovatis; corymb. terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Icon. Mutis Amer. 2. tab. 1.*

In Amer. meridion.

Glaberrimus, nec pubescens, & canus, ut L. cordifolius. Cor. lutea.

- purpurascens*. L. fol. ovat. acutis, integerr. *Aubl. Guian. tab. 79.*

In fissuris humidis Guianæ. ☉.

Caul. pl. 2-pedal. erecti, 4-goni, nodosi. Fol. opposita, sessil. subcarnosa, glabra, glauca. Fl. terminal. dichotomi. Cor. purpurasc.

Tota planta gustui amara.

- grandiflorus*. L. fol. connatis, ovat-oblong. acutis; fl. vire-scentibus. *Aubl. Guian. tab. 81.*

In locis humidis Caiennæ &c. ☉.

Caul. erectus, simpl. nodosus. Fol. integerr. glabra, glauca. Fl. terminales, ramusculo ad apicem dichotomo; & iterum in dichotomia desinente. Fl. intra dichotomiam axillar. foliatar. pedunc. incurvo. Cal. carnosus. Cor. ampla, introrsum flexa.

- cærulescens*. L. caul. 4-gono, marginato: fol. angusto-lan-ceol. Cor. laciniis acut. *Aubl. Guian. tab. 82.*

In pratis humidis Guianæ ☉.

Caul. pedal. membranac. Fol. sessil. integerr. glabra, glauca. Fl. terminal. dichotom. Cor. subcærul.

251. RAN-DIA. Cal. 1-phyll. Cor. hypocrat. Bacca 1-locul. cortice capsulari.

1. *mitis*. R. subiaermis. *Syst. veg. ed. 14.*

In America h.

- Frutex 10-12-ped. ramis oppositis. Fol. unc. longa, dimidiam lata, opposita, in medio lata, apice sensim angustato, glabra, luteo-viridia, nitentia. Fl. axili. parvi, stellati, albi. Fruct. semunc. pyramidal. umbilicati, virides.
2. *aculeata*. R. ramis bisinosis. *Syst. veg. ed. 14. Brow. Jam. tab. 8. f. 1.*  
*Lycium* &c. *Pluk. alm. tab. 97. f. 6.*  
*In Jamaica* †.  
 An var. prioris?
252. FA-  
 GRÆA. Cal. campanulat. Cor. infundibul. Bacca 2-locul. carnosa. Sem. globosa.
1. *ægilanica*. F. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Ad. Stock. 1782. tab. 4.*  
*Habitat.* . . . .
253. SHEF-  
 FIELDIA. Cor. campanulata. Filam. 10. alterna sterilia. Capf. 1-locul. 5-valv.
1. *repens*. S. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen. In nova Zeelandia.*  
*Simil. Peplidi Portulæ, excepta fructificat.*
254. AZA-  
 LEA. Cal. campanifor. 5-fidus, repandus. Cor. campanulata. Stam. receptaculo inserta. Capf. 5-valv. 5-locul. subrotun. Stam. num. differt ab *Erica*, & *Andromeda*.
1. *pontica*. A. fol. nitidis, ellipticis, utrimq. glabris: racemis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Chamærhododendron* &c. *Buxb. cent. tab. 69.*  
*In Ponto, Trapezunte* †.  
*Simil. Rhododendro pontico, sed huic stam. 5. cor. lutea, nec violac. Fol. min. ovata, ciliata. Altitudo Rhododendri pontici, quandoq. altior. Fol. in apice ramorum 4-poll. longa, sesquipoll. lata, petiolat. integerr. nervosa, pulchre virent. Fl. conferti in apice ramorum, breviter peduncul. lutei, odore Caprifolii, sed vehementiore.*
2. *indica*. A. fl. subsolitaris; calycibus pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Cistus* &c. *Herm. Lugd. tab. 153.*  
*Tutulusi. Kamf. am. tab. 846.*  
*In India* †.  
 Frutex 2-cubital. ramis brevibus, contortis. Fol. festigiata, villosa. Fl. ampli, dilute coccinei.
3. *nudiflora*. A. fol. ovatis: cor. pilosis; staminibus longiss. *Syst.*

*Syst. veg. ed. 14. Duham. arb. 1. tab. 3. Trew. Ehret. 48.*

*In Virginia siccis h.*

Fol. alterna, integerr. Rami nudi. Fl. terminal. conferti. Cor. lutea.

*Floret ante sol. vel sub ipsa vernatione; & flam. gerit duplo cor. longiora.*

4. *viscosa.* A. fol. margine scabris: cor. piloso-glutinosi. *Syst. veg. ed. 14.*

*Cistus &c. Comm. Car. 1. tab. 57. Pluk. alm. tab. 161. f. 4.*

*In Virginia h.*

Adinis priori. Caul. erect. ramosus. Fol. alterna, petiolat. ovalia. Fl. corymbosi. Cor. alba.

*Floret postquam omnia adulta sunt.*

5. *lapponica.* A. fol. (superne) adspersis punctis excavatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Lapp. tab. 6. f. 1.*

*In alpidus Lapponia h.*

Fruticul. spitham. divaricatus, Fol. perennantia, elliptica, rigida, petiol. conferta, margine reflexo, subtus ferruginea.

6. *procumbens.* A. ramis diffuso-procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 9. Fl. Lapp. tab. 6. f. 2.*

*Chamaerhododendros. Bocc. mus. 2. tab. 53.*

*In alpidus Europa h.*

Caul. semiped. & ultra, ramosiss. lignosus, fuscus. Fol. *Thymi*, opposita, subsessil. ovatlanc. convexa, dura, nervo eminente, sordide virent. subtus ferruginea. Fl. terni-quaterni, amæni, solitar. ex summis alis, & breviter pedunculati. Cal. purpureasc. Cor. carnea.

*Rosmarinifolia.* A. fol. quaternis, & ultra, lanceol. fl. solitariis. *Burm. Ind. tab. 3. f. 3.*

*In Japonia, & Java h.*

Frutex ramis simplicibus, scabris. Fol. *Rosmarini*, marginibus reflexis, supra villosa, linea longitudinali prædita, subtus ex griseo-tomentosa, caulem terminantia, ad exortum pilis ferrugineo-rubris. Pedunc. terminal. pollicar. solitar. 1-fl. pilis ferrugineis lanati. Flos magnus. Cal. e ferrugineo-ruber. Cor. flava.

255. EPACRIS. Cor. intundibulif, villosa. Squamæ nectariferæ  
D d

germini adnatæ. Caps. 5-loc. 5-valv. *Essentia Gen. in Nectario.*

1. *longifolia*. E. arborea; fol. subulat. vaginantibus: racemis erectis; fl. oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.*

*In nova Zeelandia h.*

2. *juniperina*. E. arborea; fol. sparsis, linearibus, acutis, patentibus, sessilibus: racemis cernuis; fl. alternis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.*

*In nova Zeelandia h.*

3. *pumila*. E. herbacea; fol. ovat. imbricatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.*

*In nova Zeelandia.*

256. WEIGEA. Cor. infundibulif. Stigma peltatum. Styl. e basi germinis.

1. *japonica*. W. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. ad. Stock. 1780. tab. 5. Jap. 16.*

*In Japonia h.*

Caul. fruticosus. Rami oppositi, teretes, ciner. glabri. Ramul. erecti, sub 4-goni. Fol. 2-pollic. opposita, petiolat. ovata, acumin. ferrata, glabra, venis utrimq. hirtis, patentia, subrus pallida. Petiol. lineam longi. Fl. in ramis, & axill. fol. Pedunc. comm. solitar. e singula ala, unguicular. 3-fl. Cor. purpur.

257. TECTO-NA. Cor. infundibulif. stig. dentatum. Drupa sicca, spongiosa, intra calycem inflatum. Nucleus 3-locul.

1. *grandis*. T. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Rheed. Mal. 4. tab. 27.*

*In Zeylona h.*

Arb. procera, trunco alto, cortice *Alni*. Fol. maiora, opposita, petiol. parabolica, acuta, plerumq. basi obliqua, pendula, parentiss. supra glabra, punctis minutiss. albis, subrus argentea. Pedunc. comm. erectus, 4-gonus, divisus in paniculam. Bractæ ad omnes ramificationes 2. oppositæ, ovatæ. Cal. tomentosus, albus. Cor. alba, extus pubesc. punctis atris intersparis. Nectar. rubro-aurantiacum. Drupa magnitudine nucis *Avellanæ*, grisea, friabilis.

258. PLUMBAGO. Cal. 5-dentatus. Cor. infundibulif. 5-fida. Stam. squamis basin cor. claudentibus inserta. Stigm. 5-fid. Sem. 1. oblong. tunicatum.



1. *europaea*. P. fol. amplexicaulibus, lanceol. scabris. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 2. tab. 39. 40. Clus. hist. 2. 123.*  
Tripolium &c. *Col. ecphr. 1. tab. 161.*  
*In Europa australi 24.*  
Caul. 2-cubital. purpurasc. Fol. quandoq. obverse ovata, atro-virent. Fl. congesti. Cal. extus tuberculis bateos 5, præter glandulas petiolatas. Cor purpurasc.
  2. *zeylanica*. P. fol. petiolat. ovatis, glabris: caulibus filiformibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
Lychnis &c. *Comm. hort. 2. tab. 85.*  
Tumba codivelli *H. Mal. 10. tab. 8.*  
*In India h.*  
Caul. 2-3-ped. nodosi. Fol. opposita, subtus albida. Fl. spicati. Cor. alba.
  3. *rosea*. P. fol. petiolat. ovar. glabris, subdenticul: caul. geniculis gibbosis. *Syst. veg. ed. 14.*  
Radix vesicatoria. *Rumph. Amb. 5. tab. 168.*  
Schetti-codivelli. *H. Mal. 10. tab. 9.*  
*In India h.*  
Cortex niger. Caul. 4-5-ped. Geniculi quandoq. non adparent. Fol. breviter petiol. cuspidè angusto, subtus dilutiora, quandoq. undulata. Cal. subruher. Cor. miniato rubra.
  4. *scandens*. P. fol. petiolat. oblong-ovat. glabris: caul. flexuoso-scandente. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. pict. tab. 23.*  
Dentellaria &c. *Sloan. Jam. 1. tab. 133. f. 1.*  
*In Amer. calidiore h.*  
Caul. viticulosus, 3-8-ped. ramosus, debilis. Fol. alterna, acuta, integerr. Racemi terminal. semi-2-pedal. Fl. fere sessil. Cor. alba.
259. PHLOX. Cal. prismaticus. Cor. hypocraterif. Filam. inæqualia. Stigma 3-fid. Caps. 3-locul. 1-sperma.
1. *paniculata*. P. fol. lato-lanceol. margine scabris: corymbis paniculat. *Syst. veg. ed. 14. Mill. dict. tab. 205. f. 2.*  
Lychnidea &c. *Dill. elth. tab. 166. f. 203.*  
*In Amer. Septentr. 24.*  
Planta magna, alta. Caul. obtusus, lævis. Corymbi conferti in umbellam, fl. numerosis. Cor. dilutiss. violac. tubo pubescente.
  2. *maculata*. P. fol. cordato-lanceol. lævibus: racemo opposi-

te corymbose. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 127.*

*In Virginia 24.*

Caul. erect. ped. teres, scabriusc. purpurasc. punctis virentibus. Fol. altern. (infimis oppositis) sessil. acumin. margine scabro. Racem. terminal. corymb. alternis, interstinctis foliol. Cal. 5-gon. Cor. violac.

3. *pilosa*. P. fol. angulato-lanceol. villosis: caul. erecto: corymbo terminali. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnidea &c. Pluk. alm. tab. 98. f. 1.*

*In Virginia 24.*

Caul. teres, hirsutus. Fol. opposita. Cal. hirsutus, & lanuginosus.

4. *carolina*. P. fol. ovato-lanceol. lævibus: caul. scabro: corymbis subsessiliat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnidea &c. Mart. cent. 10. tab. 10.*

*In Carolina 24.*

Simil. P. *glaberrima*, sed caul. triplo altior, nonnihil scaber. Fl. numerosi. Cor. tubus lævis.

5. *glaberrima*. P. fol. lineari-lanceol. glabris: caul. erecto: corymbo terminali. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnidea &c. Dill. elth. tab. 166. f. 202.*

*In Virginia 24.*

Caul. pl. sesquiped. simpl. Fol. opposita. Cor. amæne purpurasc. subtus dilutior.

6. *divaricata*. P. lato-lanceolat. superioribus alternis: caul. bifido, peduncul. geminis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Mill. dict. ic. f. 1.*

*In Virginia.*

Caul. erectiusc. simplic. dein divisi in duos ramos. Fol. in caul. simpl. opposita per 5. oppositiones, molliuscula, scabra; super. alterna. Cal. 5-part. Cor. pallide cœrulesc. tubo curvato.

7. *ovata*. P. fol. ovatis. fl. solitariis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnidea &c. Pluk. mant. tab. 348. f. 4.*

*In Virginia 24.*

Flos amplus.

8. *subulata*. P. fol. subulatis, hirsutis: fl. oppositis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lychnidea &c. Pluk. alm. tab. 89. f. 2.*

*In Virginia.*

PENTANDRIA MONOGYNIA. 423

9. *sibirica*. P. fol. linearibus, villosis: peduncul. ternis.  
*Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 46. f. 2.*  
*In Asia boreali 4.*  
 Caulic. usque pedal. Fol. ex eodem centro prodeuntia, subtus pilosa, succosa, late viridia.  
 Pedunc. axillar. hirsuti. Cal. longitudine tubi  
 Cor. laciniis rotundatis, integris. Petala purpur. vel alba, striis purpureis.
10. *setacea*. P. fol. setaceis, glabris: fl. solitariis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lychnidea &c. Pluk. alm. tab. 98. f. 3.*  
*In Virginia.*
260. PORA- Cal. 5-fid. in fructu maior. Cor. campanulata.  
 NA. Styl. longior, semibifid. persistens. Stigm. globosa. Peric. 2-valve.
1. *volubilis*. P. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 21. f. 1.*  
*In India Orient. 5.*  
 Frutex caule glabro. Fol. distantia, alterna, petiolat. ovata, vix acumin. plicata, laevia.  
 Panicula terminalis, magna, patula. Cor. semi-5-fid. lacin. ovatis.
261. CON- Cor. campanulata, plicata. Stigm. 2-fid. Caps.  
 VOLVULUS. 2-locul. loculis dispermis.
- \* *caul. volubili.*
1. *arvensis*. C. fol. sagittatis, utrinq. acutis: pedunc. sub  
 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 459.*  
*Knorr. del. 1. tab. W. 6.*  
*Elxine Cissampelos. Math.*  
*b. Bocc. mus. tab. 33.*  
*In Europæ agris 4.*  
 Caul. repens. Fol. opposita, breviter petiolat. glabra, venosa, pallide virescent. Cor. rosea.
2. *sepium*. C. fol. sagittatis, postice truncatis: pedunc. 4-  
 gonis, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 458. Black. tab. 38.*  
*In Europæ sepibus 4.*  
 Planta lactescens. Caul. orgyal. Fol. alterna, petiolat. glabra, late viridia, margine fusco.  
 Calyc. foliol. 2. exteriora cordata. Cor. magna, lactea.
3. *scammonia*. C. fol. sagittatis, postice truncatis: pedunc. teretibus, sub. 3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Mill. Dict. tab. 102. Moris. hist. 3. f. 1. tab. 3. f. 5.*  
*In Syria, Mysia, Cappadocia 4.*

Simil. priori, sed fol. non margine fusca. Involuc. minimum, patulum, remotum. Cal. lateribus dilatatus, emarginatus.

4. *fibricus*. C. fol. cordatis, acuminatis, lævibus: pedunc. 2-flor. *Syst. veg. ed. 14. Pall. it. 3. tab. K. In Sibiria* ☉.

Caul. orgyal. lævis, biangulatus, (a stipulis decurrentibus non tamen anceps) volubil. Fol. vix repanda, acumine longitudine fol. subtrus pallidiora, venosa. Petioli supra canaliculati. Stipul. parvæ, vertical. subdecurrentes. Cal. ovatus, arcus, ebracteatus. Cor. albida, seu subincarnato-albida, fundo flavesce. campanul. (*Convolv. arvensis*, sed dimidio minor) plicata. Stam. cor. dimidio breviora. Anth. flavæ.

5. *farinosus*. C. fol. cordatis, acuminat. repandis: pedunc. sub-3-fl. caul. farinoso. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 35.*

*Habitat* . . . . ☉.

Caul. volubil. orgyal. teres. Fol. postice obtusiss. emarginata, nuda, supra rugosi, subtrus venosa, valde acuminata, duplo longiora quam lata. Petioli farinosi. Cal. teres, arcus. Cor. calyce triplo maius: acuta, 5-fida, subincarnata. Stigm. 2. oblonga.

6. *Medium*. C. fol. linearibus, hastato-acuminat. auriculis dentat. pedunc. ( sæpe ) 1-fl. calycibus sagittat. caul. volub. *Syst. veg. ed. 14.*

*Tela-neli. H. Mal. 11. tab. 35.*

Adfinis *C. reptanti*. Caul. volub. non radicans. Fol. auriculæ recurvæ. Bract. in medio pedunc. 2. oppositæ, lanceol. acumin. Calycis foliol. sagittata.

7. *japonicus*. C. caul. volub. fol. hastatis, lanceol. lobis lateralibus 1-dent. pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*Firagawo. Kæmf. am. exot. Fasc. V. p. 856.*

*In Japonia.*

Caul. filifor. simpl. glaber. Fol. semipollic. alternæ, petiolat. subsecunda, glabra: lobus intermedius pollic. lanceol. acutus, integerr. laterales parum reflexi. Fl. axill. solitarii.

8. *panduratus*. C. fol. cordatis; (inferioribus integris; superioribus) panduriformibus: calycibus lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 85. f. 99.*

*In Virginie arenosis.*

Caul. volubil. Fl. axill. 1-2-3. ampli, lactei, fundo eleganter purpur.

9. *carolinus*. C. fol. cordatis, integris, trilobisque, villosis: calycibus lævibus: capsul. hirsutis: pedunc. sub 2-fl. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 84. f. 98.*

*In Carolina 24.*

Caul. rufescens. Fl. C. *arvensis* magnitudine, & figura, dilute purpur.

10. *hedera-ceus*. C. fol. cordatis, integris, trilobisque; cor. indivis: fructibus erectis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. W. 3. Dill. elth. tab. 83. f. 96. infer. & tab. 81. f. 93.*

*In India ☉.*

Caul. obscure purpur. Fol. varia, subhirsuta, subrus pallidiora. Fl. 4-5. Cal. hirsutus, punctis nigris adpersus. Cor. primo sature purpur. fundo albido; dein pallide purpurascens.

11. *Nil*. C. fol. cordatis, trilobis: pedunc. petiolo brevioribus, cor. semi-5-fid. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 80. f. 91-92. Bauh. hist. 2. p. 164.*

*In America ☉.*

Fol. dilute virentia. Pedunc. breviss. Fruct. erecti. Cor. cyanæa.

12. *purpureus*. C. fol. cordatis, (sæpe) indivis: pedicell. incrassatis: fructibus cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. W. 2. & W. 4. Ehret. piñ. f. 2. b. Dill. elth. tab. 82. f. 94. y. Dill. elth. tab. 84. f. 97.*

*In America ☉.*

Pedunc. erecti. Cal. tuberculis pilosus. Cor. purpur. vel cœrul.

13. *angularis*. C. fol. cordatis, quinqueangularibus, integerr. villosis: pedunc. (sæpe) multifi. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 19. f. 2.*

*In Java.*

Caul. volubil. lignosus, pubescens. Fol. subsessil. angulis obtulis, villoso-scabra. Pedunc. 3-raro 1-fl. Cor. aurantiaca.

14. *Batatas*. C. fol. cordat. hastatis, 5-nerviis: caul. repente, tuberifero, hispido. *Syst. veg. ed. 14. Cates. Carol. tab. 60. Moris. hist. 2. f. 1. tab. 3. f. 4. Rumph. amb. 3. tab. 130.*

Kappa Kelengu. *Hort. Mal. 7. tab. 50.*

*In India utraque b.*

426 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Radix grandis, dodrantal. tuberculata, odore viroso, sed cocta edulis, rubra evadens. Cortex purpurasc. pallidus, vel albus. Caul. procumbent. Fol. longe petiolat. carnosæ, ex viridi-canefcentia. Cor. pallide purpur. oris albicantibus.

*An huius pl. species distinctæ?*

15. *biflorus*. C. fol. cordat. pubescentibus: pedunc. geminis: cor. lobis trifidis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In China* ☉.

Caul. volubil. magnitudine C. *arvensis*, basi ramosus, teres, pilosus. Fol. oblong. petiolis pilosis. Cal. 5-phyll. foliolis 2. exterioribus cordato-oblong. 2 intimis linearilanceol. quinto semicordato. Cor. parva, 5-fida, plicata, alba.

16. *verticillatus*. C. fol. cordatis oblongis, nudis: pedunc. umbellatis, 2-fid. multifi. *Syst. veg. ed. 14.*  
Quamoclit &c. *Plum. ic. 92. f. 2. sed cor. non scda.*

*In America.*

Fol. quandoq. ovata, margine subrepando, scabriusculo. Fl. parvi, cœrulesc.

17. *umbellatus*. C. fol. cordat. caul. volubili: pedunc. umbellatis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. Amer. tab. 102. Pluck. alm. tab. 167. f. 1.*

*In Martinica, Domingo, Jamaica* ☿.

Fol. petiolat. Pedunc. axill. longi. Cor. lutea.

18. *malabaricus*. C. caul. perenni, villosa: fol. cordatis (subpilis). *Syst. veg. ed. 14.*

Kattu-Kelengu. *H. Mal. 11. tab. 51.*

*In Malubaria arenosis* h.

Caul. sublignosus. Petioli oblongi, pilosi. Cor. albo-viridi-flavescent, fauce fusco-purpurea.

19. *canariensis*. C. fol. cordatis, pubescentibus, caul. perenni, villosa: pedunc. (sæpe) multifi. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 2. tab. 51. Pluk. alm. tab. 325. f. 1. Phyt. tab. 301. f. 3.*

*In Canariensibus insulis* h.

Caul. fruticosus, 20-ped. subrubus. Petioli tomentosi. Fol. mollia, & incana. Cor. ex albidopurpur.

20. *muricatus*. C. caul. muricato: fol. cordatis: peduncul. in-crassitis, calycibusque lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Surate.*

alis *C. purpureo*, sed caul. lævis, adspersus aculeis inermibus. Fol. indivisa. Pedunc. sæpius 2-fl. Cor. purpur. infundibul. magis quam *C. purpurei*. *Diversus ab Ipomea bona nocte*.

21. *an-eps*. *C. fol. cordatis*: caul. volubili, utrimq. carinato. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Zeylona, Java.*

Caul. anceps. Fol. oblonga, lævia. Cor. parva, 5-fida, rubra.

22. *Turpenthum*. *C. fol. cordatis*, (sæpe) angulatis; caule membranac. (plerumq.) 4-gono: peduncul. multifl. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 397. Zan. tab. 57. Herm. Lugd. tab. 178. 179.*

*In Zeylona 24.*

Radix crassa, 3-4-cubital. fusca, succo lacteo, flavescente. Caul. 6-7-uln. Fol. petiol. submucronata, mollia, incana, subvillosa. Fl. magnitudine *C. vulgaris*, albi.

23. *grandiflorus*. *C. fol. cordat. ovatis*, obtusiusc. integerr. pedunc. sub-2-fl. calycibus coriaceis: caul. petiolisque pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Jacq. app. tab. 69.*

*In insula Martinica.*

Caul. volub. 12-ped. inferne lignosus, ramosus, cinereus. Fol. ampla, alterna, longe petiolat. Cor. grandis, nivea, suaveolens.

24. *maximus*. *C. fol. cordat. ovatis*, acuminat. integerr. glaberrim. caule, petiolisque glaberrimis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Tiru-Tali. H. Mal. 11. tab. 53.*

*In Zeylona 15.*

Caul. inferne ligneus, dein volubil. altissime scandens.

25. *speciosus*. *C. fol. cordatis*, ovatis, acutis, supra hirtis; subtus argenteo-sericeis; petiol. teretibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Brasilia 24.*

Caudex arboreus, erectus, dein volubil. teres, pubescens. Fol. maxima, supra viridia.

26. *trinervius*. *C. caul. volubil. tereti*: fol. cordat. oblong. glabris, trinerviis: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. simpl. filiform. glaber. Fol. pollic. & paulo ultra, opposita, petiolat. acumin., subtus pal-

foliol. lanceolat. serratis; lateralibus sensim brevioribus. Stipul. parvæ, fol. simil. Pedunc. axill. compressi. Bract. 2. minutæ. Cal. muricatus. Cor. 5-fida, acuta, alba. Stigma sanguin. Caps. ratione plantæ magna.

34. *vitifolius*. C. fol. palmat. quinquelobis, dentatis, glabris: caul. piloso: pedunc. multifloris. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 18. f. 1. Pluk. alm. tab. 25. f. 3.*

*In India orientali.*

Fol. ad dimidium divisa, laciniis acumin. Racemi 2-part. Cal. villosus. Cor. aurantiaca.

35. *difsectus*. C. fol. palmatis, septempart. dentato-sinuat. glabris: caul. piloso: pedunc. sæpe 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 2. tab. 28. Hort. 2. tab. 159.*

*In America ☉.*

Caul. alie scandentes. Fol. petiolis longis, pilosis innixa, lobis lanceol. acutis, & varie difsectis. Pedunc. axill. solitar. Cal. membranac. subpellucidus. Cor. albida, fundo purpur.

36. *macrocarpus*. C. fol. palmato-pedatis, 5-part. pedunc. (alatis) 1 fl. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 91. f. 1.*

*In America.*

Foliorum lobi lanceol. integerr. medii maiores. Fl. axill. magni, peduncul. purpur. Caps. magna, torosa, purpur.

37. *paniculatus*. C. fol. palmatis: lobis 3-5-7. ovatis, acutis, integerrimis: pedunc. paniculatis. *Syst. veg. ed. 14. Pal-modecca. Hort. Mal. 11. tab. 49. b. Modecca. Hort. Mal. 8. tab. 20.*

*In Malabaræ arenosis.*

Radix crassa, tuberosa, cubital. Caul. vetustiores cinerei. Fol. supra fusca, & nitentia, subtus dilute viridia: petioli rufescent. Pedunc. spitham. ramosi, incurvi, subrubesc. Cor. purpureo-rubra.

38. *macrorrhizos*. C. fol. digital. septenis, integerr: caul. glabro: pedunc. 3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Plum. sp. 1. ic. 90. f. 1.*

*In America.*

Radix crassa, brachiata. Fol. lobi lanceol-acumin. Fl. magni, coccinei.

39. *quinquefolius*. C. fol. digital. dentat. glabris: pedunc. lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 167. f. 6.*

*In America ☉.*



Flos magnus, purpur.

40. *pentaphyllus*. C. fol. digitat. quinis, pilosis; caul. piloso. *Syst. veg. ed. 14. Herm. Lugd. tab. 185.*

b. *Plum. Amer. 1. ic. 91. f. 2.*

In America ☉.

Foliorum laciniae lanceol. subtiliter denticulatæ, intermediis mai. Pedunc. axillar. longi, ramosi. Bract. 2. magnæ. Fl. terni, vulgaris forma, albi. Caps. obrufa.

41. *martinicensis*. C. caul. repente, subvolub: fol. elliptic. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Amer. pict. tab. 24.*

In Martinicæ umbrosis, inundatis.

Caul. longi. Fol. obrufa, cum stipula in acumine, petiol. 2-pollicar. Pedunc. axillar. superne stipulis 2. opposit. Cor. alba.

\*\* Caul. non volubili.

42. *spinosus*. C. erectus, fruticosus: fol. lanceol. sericeis: ramulis floriferis, spinosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

C. fruticosus. *Pall. It. 2. tab. M.*

In Dauuria ☿.

Frutex humilis, subflexuosus, ramosus, furculis tomentosis. Fol. alterna, sessil. oblongo-lanceol. Fl. terminal. sursum versi, 1-lateral. Cal. tomentosus. Cor. plicato-5-dent. tubo extus tomentoso, limbo rubicundo.

43. *ficulus*. C. fol. cordato-ovat. pedunc. 1-fl. bract. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Bocc. Sic. tab. 48. Moris. hist. 2. f. 1. tab. 7. f. 3.*

In Sicilia.

Caul. subvolubil. 2-ped. Fol. parva, humifusa, longe petiolat. mucronata. Fl. axill. minimi, cœrul.

44. *pentapetaloides*. C. fol. lanceol. obtusis, nudis, lineatis; ramis declinatis: fl. solitar. semi-5-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

In Maiorca ☉.

Simil. C. *tricolori*, sed minôr. Fol. subpetiol. Fl. axill. solitar. brevissime peduncul. Cor. cœrulesc. fauce lutea, semi-5-fid. lacin. acuminat.

45. *lineatus*. C. fol. lanceol. sericeis, lineatis, petiolat. pedunc. 2-fl. calyc. sericeis, subfoliac. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 2. f. 1. tab. 4. f. 2. mala. Barr. rar. tab. 1132. Triumph. obs. tab. 91. f. 2.*

In Hispaniæ, Siciliæ & c. maritimæ 24.

Caul. prostrati, flexuosi, semiped. incani. Fol. remota, basi angustiora, acuta, ad angulum acutum lineata. Bract. 2. calyo. longiores. Cor. dilute purpur. extus hirta.

46. *Cncorum*. C. fol. lanceolat. tomentosis: fl. umbellatis: calyc. hirsutis: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Morif. hist. 2. f. 1. tab. 3. f. 1. Bocc. rar. 4. tab. 470. Bocc. mus. 2. tab. 70. Burr. rar. tab. 470.*

*In Hispania, Crata, Syria &c. 24.*

Fol. sericea. Umbella 4-phylla, 5-radiata; pedunc. centrali 1-fl. aphylo, lateralibus. 4-5-fl. Bract. 2. subbifurcatura & 2. sub altero fl. Calyc. obtusi, hirsuti uti bract. Cor. alba.

47. *Cantabrica*. C. fol. lineari-lanceol. acutis: caul. erectiusc. ramoso: pedunc. sub 2-fl. calycibus pilosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 296. Morif. hist. 2. f. 1. tab. 4. f. 3. Clus. hist. 2. p. 49.*

b. C. terrestris. *Bauh. hist. 2. p. 160.*

*In Europa australi, Sibiria, Africa 24.*

Tota planta villosa. Caul. sesquiped. Fol. alterna, integerrima: radical. petiolat. obtusiora; caulina sessil. Pedunc. axillar. Cor. carnea, cum lineis rubris.

48. *Dorychnium*. C. fol. sublinearibus, sericeis: caul. fruticul. paniculato: calycibus obtusis, nudiuscul. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente h.*

Rami rigidi, raro dichotomi. Fl. solitar.

49. *Scoparius*. C. erectus, fruticosus, glaber, ramis virgatis: fol. sessilibus, linearibus: racemo terminal. peduncul. sub 3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Barancas oppidum s. Crucis h.*

*Facies Spartii, seu Genistæ, & non Convolvuli.* Caul. teres. Rami erecti, simpliciss. foliosi. Fol. remota, brevia, erecta, alterna, subpilosa. Racemus subsecundus. Cor. alba, extus hirsuta.

*Rasura huius ligni spargit odorem rosaceum; & saporem acriusculum habet. An vero Lignum Rhodium Off.?*

50. *Ænotheroides*. C. erectus, fruticosus: fol. linearibus, canescentibus: peduncul. axill. solitar. erectis, 1-fl. bracteatis: calyc. lanceol. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Habitus *Oenothera mollissima*. Caul. rubicundi, glaucescente quadam tecti. Fol. longitudine digiti, laxa, plana. Pedunc. breves. Cor. magna, fulva.

51. *floridus*. C. fruticosus, prostratus, canus: fol. linearilanceol. glabris: thyrsis terminali, pyramidata, composito. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. In rupibus circa Barrancas h.*

Similis C. *cucuro*. Fol. digital. petiolat. undulata, integerr. venosa, glabra. Fl. min. Cor. dilute rubra, extus hirsuta. *Copia fl. omnium pulcherrimus.*

52. *corymbosus*. C. caul. repente (flexuoso): fol. cordatis: pedunc. umbellatis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. Sp. 1. ic. 89. f. 2.*

*In America.*

Fol. petiol. acumin. integerr. Pedunc. axill. longiss. Fl. vulgaris forma, ac magnitudine. Cor. alba.

53. *spithameus*. C. fol. cordatis, pubescentibus: caul. erecto: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Virginia.*

Fol. pauca. Flos pro plantæ modo magnus, albus.

54. *persicus*. C. fol. ovalibus, tomentosis: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Cmel. ii. 3. tab. 7.*

*In Persia, ad maris Caspici litus u.*

Tota planta *Verbasci insiar tomentosa*. Fol. magnitudine extimi articuli pollicis, breviter petiolat. obtusa, integerr. Pedunc. axillar. Involuc. 2-phyllum, ovatum. Cor. alba.

55. *tricolor*. C. fol. lanceol-ovat. glabris: caule declinato: fl. solitar. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 2. f. 1. tab. 4. f. 4.*

*In Africa, Hispania, Sicilia ☉.*

Caul. sesquiped. flexilis. Fol. infer. 3-4-unc. superiora min. Fl. axillar. Cor. magna, azurra, umbilico niveo, fundo luteo.

56. *repens*. C. fol. sagittatis, postice obtusis: caul. repente: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Plum. Amer. tab. 105.*

*Ballel. Hort. mal. 11. tab. 52.*

*In America marijimis u.*

Radix longa. Cor. magna, potens, plicata, subto crenata, alba, margine dilute rubente.

57. *repens*. C. fol. hastato-lanceol. auriculis rotundatis : caule repente : pedunc. 1-2-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Olus vagum. Rumph. amb. 5. tab. 155. f. 1.*  
*Ipomea aquat. Forsk. Æg. Arab. Vahl.*  
*In India.*  
 Planta ex minoribus. Caul. filiform. lævis. Fol. glabra, interdum dentata. Pedunc. breves. Cal. rotundatus. Cor. tubo purpureo-rubente, limbo albicante.
58. *edulis*. C. caule repente, angulato : fol. cordatis, integris, trilobisve, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Thumb. Jap.*  
*In Japonia.*  
 Differt a C. Batata fol. in medio non angustatis, ut sagittata evadant. *Ipomea triloba non potest esse.*  
 Radices magnitudine sæpe pugni, tuberculatæ, carnosæ, uti Batatas, esculentæ, mollissimæ, & sapidissimæ.
59. *hirsus*. C. fol. cordatis, subhastatisq. villosis : caul. petiolisq. pilosis : pedunc. multifl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In India.*  
 Planta non magna, minus volubilis. Fol. parum villosa : primaria cordato-subrotunda : secundaria proprie cordata : fl. proxima sæpe hastata. Pedunc. nudi, fl. alternis, pedicellat. involucris ad singulum pedicellum minimis, lanceol.
60. *foldanella*. C. fol. reniformibus : pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Brassica &c. Bauh. Hist. 2. p. 166.*  
*In Angliæ, Frisiæ litoribus maris ; in Carniola, Pedemontio &c. 24.*  
 Caul. repens, sarmentosus, rubescens. Fol. longe petiol. crassa, obscure viridia, glabra. Bract. 2. cordatæ, calyce ma. Cor. rosea.
61. *Pes capræ*. C. fol. bilobis : pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Rumph. 5. amb. tab. 159. f. 1.*  
*Schovanna-adambœ. H. Mal. 11. tab. 57. Herm. Lugd. tab. 175. Pluk. phys. tab. 167. f. 3.*  
*In India.*  
 Radix obliqua. Caul. repens, herbac. 3-4 uln. Fol. alterna, subrotunda, cor referentia, carnosæ, lucida, glabra. Cor. ampla, rosea, umbone atro-purpur.

434 .PENTANDRIA MONOGYNIA.

62. *brasiliensis*. C. fol. emarginatis, basi biglandulosis: pedunc. 3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Plum. Amer. tab. 104. In Brasiliæ, Domingo maritimis.*

Fol. subrotunda, nitida. Cor. purpur.

63. *sublobatus*. C. procumb. fol. superior. apice dentato-repandis: fl. capitatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. In India* ☉.

Fol. subpilosa; infer. cordata, super. obtusa. Fl. terni, sessil. parvelli. Involuc. 6-phyll. Cor. magna.

64. *litoralis*. C. fol. oblong. lobato-palmat. pedunc. 1-fl. caul. repente. *Syst. veg. ed. 14. Plum. Sp. 1. ic. 90. f. 2.*

*In America.*

Fol. ad nodos petiolat. laciniis irregularibus, obtusis. Fol. min. 3-lobata. Pedunc. longi. Fl. vulgaris forma.

*Guianensis*. C. fol. oblong. hirsutis, e viridi-cinereis: fl. parvis in capitulum collectis. *Aubl. Guian. tab. 52.*

*In Guiana* 24.

*Tota planta lacteo succo scatet.* Caul. pl. volubil. tomentoso-cinerei. Fol. alterna, petiolat. ovata, integerr. tomentoso-cinerea. Fl. longo pedunculo axill. innixi. Cor. alba, aut cœrul. calyce paulo maior. Caps. villosa. Sem. angulata, nigra.

*glaber*. C. pentaphyllos: fl. magno, albo. *Aubl. Guian. In Caienna* 24.

*Tota planta lacteo succo scatet.* Rad. crassa, tortuosa. Caul. pl. volubil. supra arbores sparsi. Fol. alterna, digitata. Foliol. inæqual. longe petiol. lanceol. acuta, integerr. glabra. Fl. axill. racemosi, longe peduncul. albi.

*minimus*. C. villosus, Helianthemī fol. *Aubl. Guian. Plum. cat. p. MSS. tab. 6. f. 47.*

*In Guiana.*

*Mechoacan*. *Convolvulus Jettiaucu. Pif. In. cum fig.*

*In Brasilia, & in Mechoaca novæ Hispaniæ h.*

*Proxime accedit ad C. septum.* Radix 2-fida, extrus fusca. Caul. sarmentosi, longe scandentes, multiangul. Fol. alterna, petiolata, cordiformi-aurita, sat ure virid. subtus nervosa. Cor. alba, vel dilute incarnata, intus purpur. Sem. fusca, hava-

- havanensis*. C. fol. oblong. nitidis: pedunc. 1-fl. caul. volubil. *Jacq. Obs. 2. tab. 45. f. 3. Amer. ed. 2. pida tab. 264. f. 97.*  
*In Havana.*  
 Altitudo humana. Caul. herbaceus, ramosiss. glaber. Fol. multa, alterna, obtusiss. integerr. semipoll. Pedunc. axill. 1-fl. Fl. parvi, albidi.
- gemellus*. C. caul. volub: fol. cordatis, glabris: pedunc. 2-fl. *Burm. Ind. tab. 21. f. 1.*  
*In Java.*  
 Caul. simpl. glaber. Fol. integerr. Pedunc. axill. folitar. Cor. albicans, vel lutea.
- uniflorus*. C. caul. volubil. fol. lineari-lanceol: pedunc. 1-fl. bracteis binis, ovatis. *Burm. Ind. tab. 21. f. 2.*  
*In Java.*  
 Fol. subpetiolat. Pedunc. breves.
- nervosus*. C. fol. cordatis, nervosis, subtus tomentosis: pedunc. umbellatis, multifi. *Burm. Ind. tab. 20. f. 1.*  
*Habuat Coromandeli.*  
 Planta tomento albo obsita. Fol. palmat. acumin. integerr. supra nigra, subtus sericeo-albicantia, nervis cum costa protuberantibus. Fl. capitati. Cor. magna, purpur. extus sericea.
- prostratus*. C. caul. plerumque prostrato: fol. sessilibus, lineari-uneatis, pilosis: pedunc. axill. 1-fl. bracteatis. *Forsk. Suppl. Æg.*  
*In Arabia.*
- hastatus*. C. caul. volub. 2-cubit. scandente: fol. hastatis, 2-pollic: basi infra unident: pedunc. geminis, semel dichotomis. *Forsk. Suppl. Æg.*  
*In Arabia.*  
 Fl. forma, & col. *C. arvensis*.
- Hermannie*. C. fol. subhastatis, postice obtusis: peduncul. 2-fl. cor. apice pilosis. *Herit. Stirp. nov. fasc. 4. tab. 33.*  
*In Perua &c. aridis 24.*  
 Planta volubil. tota cana. Rad. fusiform. carnos. sa, ramosa, grisea, intus alba. Caul. teres, ramosus, fuscescens. Rami volubiles, alterni, villosissimi. Fol. alterna, petiolata, sub-lanceol. seu oblonga, apice obtusiusculo cum acumine minuto, reflexo; integerrima, quan-

doq. subundulata, supra lineata, subtus subnervosa, villosa, vel subtomentosa, patentia, 2-2½ poll. longa, 1 poll. lata. Petioli tortiles, foliis tercies breviores, hinc teretes, inde unifulci, villosi. Pedunc. axill. solitar. obsolete contorti, 2-fl. bracteati, villosissimi, longitudine fol. Fl. bini, altero serotino, pedicellati, albi, 6 lin. longi, & lati. Bractæ parvæ, lineares, acutæ, sub pedicellis.

262. IPO-  
MEA.

Cor. infundibulif. Stigm. capitato-globosum. Capf. 3-locul.

\* *Fl. distinctis.*

1. *Quamoclit*, I. fol. pinnatifid. linearibus: fl. subsolitar. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 214. Sabb. hort. 1. tab. 85.*

*Convolvulus &c. Col. aquat. tab. 72.*

*Flos Cardinalis. Rumph. amb. 5. tab. 155. f. 2. Thiuria-cranti. Hort. mal. 11. tab. 60.*

*In India ☉.*

Caul. volubil. scandens. Fol. satore viridia. Fl. axill. intense rubri, seu sanguinei.

2. *rubra*.

I. fol. pinnatifid. linearibus: fl. racemosi, pendulis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Quamoclit &c. Dill. elth. tab. 241. f. 312.*

*In Carolina cæterioris arenosis.*

Planra non lactescens. Caul. suffruticosus, sesquiped. & ultra, superne ramosus, totus foliosus, rectus. Fol. primi anni in orbem disposita, *Coronopi* instar laciniata. Cal. tubo brevi, dentibus subulat. Cor. amæne purpur. extus saturatior, intus maculis albicantibus, striis purpur. variegata.

3. *umbellata*. I. fol. digitatis, septenis: pedunc. umbellatis, brevissim. *Syst. veg. ed. 14.*

*Quamoclit &c. Plum. sp. 3. ic. 92. f. 2.*

*In America.*

Fol. petiolat. lacin. lanceol. subæqualibus, integerr. Cor. coccinea. Capf. oblonga, acuminata.

4. *carolina*. I. fol. digitat: foliol. petiolat: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*Convolvulus &c. Cates. Car. 2. tab. 91.*

*In Carolina.*

Cor. parva, extus dilute viridis, intus violac.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 437

5. *coccinea*. I. fol. cordatis, acuminat. basi angulatis: pedunc. multifl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Quamoclit. Comm. rar. tab. 21.*  
*Convolvulus &c. Plum. amer. tab. 103. Pluk. phyt. tab. 385. f. 2.*  
*In Domingo* ☉.  
 Caul. debilis, subcinereus. Fol. longe petiol. cordiform. 4-5. digitos longa, tenella. Pedunc. axill. longi, ramosi. Cor. dilute coccinea.
6. *lacunosa*. I. fol. cordatis, acuminat. scrobiculatis, basi angulatis: pedunc. sub-1-fl. flore brevioribus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Convolvulus &c. Dill. elth. tab. 87. f. 102.*  
*In Virginia, Carolina* ☉.  
*Similis I. coccineæ, sed pedunc. 1-2-fl. Fl. tubo crassiore, albo, ore purpureo, nec coccineo.*
7. *solanifolia*. I. fol. cordat. acutis, integerr. fl. solitar. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Quamoclit &c. Plum. Sp. 3. ic. 94. f. 1.*  
*In America.*  
 Caul. angulatus. Fol. petiolat. venosa. Pedunc. axill. longi. Cor. patens, 5-fid. rosea.
8. *tuberosa*. I. fol. palmatis; lobis septenis, lanceol. acutis, integerr. pedunc. 3-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Convolvulus &c. Sloan. Jam. 1. tab. 96. f. 2.*  
*Pluk. alm. tab. 276. f. 5.*  
*In Jamaica* 24.  
 Tota planta lactescens; florens pulchra visui.  
 Caul. fruticosus. Fol. palmam humanam æquant. Pedunc. axill. Fl. 2-pollic. sature sulphur. odori. Caps. membranac. ex quadrato-subrotunda, sub-pellucida. Sem. 4. atra, villosa.
9. *digitata*. I. fol. palmatis; lobis septenis, lanceol. obtusis; pedunc. 3-fl. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Quamoclit &c. Plum. Sp. 3. tab. 92. f. 1.*  
*In America.*  
 Radix ingens, tuberculata, brachiata. Caul. flexuosus. Fol. lobi integerr. exter. min. Fl. longi. Cor. coccinea. Caps. oblong. Sem. conica.
10. *bona nox*. I. fol. cordat. acutis, integerr. caul. aculeato: fl. binis-ternis; cor. indivisus. *Syst. veg. ed. 14.*



Convolv. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 96. f. 1. Pluk. alm. tab. 276. f. 3.*

Munda-valli. *H. Mal. 11. tab. 50.*

*In Indiæ arenosis, arbores scandens.*

Caul. orgyal. Fol. magna, longe petiolat. mollia, subtus dilute virid. trita odoris gravis. Fl. axillar. pedunculat. tortuosi. Cor. ampla, violac.

11. *campanulata*. I. fol. cordatis: pedunc. multifi. periant. exter. orbiculari: cor. campanul. lobatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Adamboe. *H. Mal. 11. tab. 56.*

*In India.*

Caul. repentes, pilosi. Fol. magna, mollia, tenuia, petiolis pilosis innixa. Cor. præ reliquis crassior. 4-part. laciniis inæqualibus, inferne purpuro-rubra, superne purpuro-albescentes.

12. *violacea*. I. fol. cordat. integerr: fl. confertis; cor. indivisus. *Syst. veg. ed. 14.*

Convolvulus &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 98. f. 1.*

Quamoclit &c. *Plum. sp. 3. tab. 93. f. 1.*

*In America merid.*

Fol. ampla, longe petiol. acuta. Pedunc. axill. longiss. Fl. longiss. purpur. Caps. subrotunda.

13. *carnea*. I. fol. cordat. glabris: pedunc. multifi. cor. marginatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Am. tab. 28. ed. 2. piñ. tab. 25.*

*In America h.*

Caul. orgyal-20. ped. fruticosus. Fol. alterna, petiol. subrotundo-cordata, integerr. venosa. Pedunc. terminal. Fl. 3-pollic. carnei. Caps. fusca, nitida.

14. *repanda*. I. fol. cordat. oblong. repandis: pedunc. ramosis, tymosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 20. ed. 2. piñ. tab. 27.*

*In America.*

Caul. volubil. Planta glaberrima. Fol. petiolat. supra virid. subtus viridi-glauca, cum venis violac. Cor. plicata, 2-pollic. elegans, coccin. nitidiss. Caps. coccinea.

15. *filiformis*. I. fol. cordat. obtusis cum acumine, integerr: pedunc. ramosis, filiformibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. ed. piñ. tab. 26.*

*In Martinicæ sylvaticis.*

Planta glaberrima. Caul. volubil. 10-ped. Fol. magnitudine varia, breviter petiolat. Racemi axillar. longiss. Fl. numerosi, purpur. inodori.

16. *hastata*. I. fol. sagittato-hastatis: pedunc. 2-fl. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 18. f. 2.*

*In Java.*

Fol. glaberrima, lucida, lobo super. longiss. lanceol. Cor. lutea, limbo breviss.

17. *glaucifolia*. I. fol. sagittat. postice truncatis: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*Convolvulus &c. Dill. elth. tab. 87. f. 101.*

*In Mexicæ arvis.*

Caul. cubital. & ultra. Fol. alterna, *C. arvensis* similia, glauca. Fl. axill. carnei, fig. & magnitudine *Speculi Veneris*.

18. *triloba*. I. fol. cordatis, trilobis: pedunc. sub-3-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

*Convolvulus &c. Sloan. Jam. Hist. 1. tab. 97. f. 1.*

*In America ☉.*

Caul. volubil. angulatus. Fol. intermed. ovato, lateralibus semicordat. integerrima, glabra. Cor. violac. Caps. pilosa.

19. *hederifolia*. I. fol. cordatis, trilobis: pedunc. racemosis, multifi. *Syst. veg. ed. 14.*

*Quamoclit &c. Plum. sp. 3. tab. 93. f. 2.*

*In America.*

Fol. petiol. glabra, venosa. Pedunc. axill. longiss. Cor. magna, indivisa. Stam. longiss. huic speciei tantum propria. Caps. subrot. obtusa.

\*\* *Fl. aggregatis.*

20. *hepaticifolia*. I. fol. trilobis: fl. aggregatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 20. f. 2.*

*In Zeylona.*

Caul. volubil. longi, pilosi. Fol. pilosa, subtus pallidiora. Cor. 5-angul. pallide cœrul.

21. *tamnifolia*. I. fol. cordat. acuminat. pilosis: fl. aggregatis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Volubilis &c. Dill. elth. tab. 318. f. 414.*

*In Carolina.*

Fl. dense capitati, perpusilli, fol. pilosis cincti. Cor. plerumq. plicata, cœrulea, per ætatem fusca.

440 PENTANDRIA MONOGYNIA.

32. *Pes Tigri*-I. fol. palmatis: fl. aggregatis. Syß. veg. ed. 14. dis. Kniph. cent. tab. 53.  
*Convolvulus* &c. Herm. Lugd. tab. 287. Ad.  
 Boron. 11. tab. 23. f. 2. Pluk. phyt. tab. 166. f. 6.  
*Volubilis* &c. Dill. elth. tab. 318. f. 411.  
*Pulli-Schouadi*. H. Mal. 11. tab. 59.  
*In India*.  
 Planta pilosa. Fl. parvi, maioribus immixtis, albi, vel dilute purpurasc.
- 
- paniculata*. I. caul. volubil: fol. ovatis, acumin: pedunc. paniculatis. Burm. Ind. tab. 21. f. 3.  
*In Java*.  
 Folior. acumen aristatum: pedunc. incrassati. Caul. versus fines: fol. tenuiora: pedunc. & cal. toment.
- Eufuchiana*. I. fol. cordat. 3-lobis: pedunc. 2-fl. Jacq. Obs. 2. tab. 36.  
*In America*.  
 Non satis distincta ab *I. triloba*.
- verticillata*. I. Forsk. Æg.  
*In Arabia*.  
 Planta tota villosa. Fl. axillar. terni, non conferti. Caps. 4-locul.
- biloba*. I. fol. subrotund. 2-lobis, integris. Forsk. Æg.  
*In Arabia*.  
 Caul. scandens. Pedunc. sub-1-fl.
- scabra*. I. caul. volubil: fol. 3-lobis, utrimq. scabris: fl. axillaribus, solitar. cœrul. Forsk. Æg.  
*In Arabia*.  
 Habitus *Convolvuli hederacei*. Bract. 2. oppositæ, lineares. Calyc. scabro-hirsuti.
- eriflora*. I. fol. cordat. acuminat: glabris: pedunc. 3-fl. Forsk. Æg.  
*In Arabia*.  
 Fol. sesquipollic: integerr. petiolo vix sesquipollic. Pedunc. axill. Cor. pallide flava.
- Leucantha*. I. fol. cordatis, subangulatis; peduncul. plerisque 2-fl. Scop. Delic. Insul. Fasc. 2. tab. 4.  
 Habitat . . . ☉.  
 Caul. volubil. ramosus, glaber, rubellus, 4-5-pedal. Fol. petiolat. acuminata, glabra, subtus rubore suffusa. Pedunc. axillar. bracteati. Cor. alba, calyce vix duplo longior. Caps.

fulca, rarioribus pilis pubescens. *Differt ab l. coccinea.*

263. POLEMONIUM. Cor. fundo clauso valvis staminiferis. Stigm. 3-fidum. Caps. ovat. 3-locul. supera.

1. *cæruleum*. P. fol. pinnat: fl. erectis: calycibus tubo cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 255. Sabb. hort. 2. tab. 52.*

b. P. calycibus lanatis. *Gmel. Sib. 4. tab. 50. In Europa, Asia 24.*

Caul. cubital. & ultra, erectus, ramosus. Fol. elegantiss. læte virent. impari extremo: pinnae elliptico-lanc. integræ. Fl. terminal. subumbellati. Cor. cærul. vel alba.

2. *reptans*. P. fol. pinnatis, septenis: fl. terminalibus, nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Mill. dict. tab. 209. In Virginia 24.*

*Differt a priore rad. repente: fol. 7. nec 17: panicula laxa subnutante, nec stricta.*

3. *dubium*. P. fol. inferior. hastatis; superior. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. In Virginia.*

*Dubii generis. Facies aliena a Polemoniis, sed Veronica Teucrit. Styl. semibifid. Cor. dilute cærul.*

4. *Rælloides*. P. erectum; caul. filiform. fol. lanceol. ciliatis: panicula peduncul. paucifl. nuda. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

5. *Campanuloides*. P. erectum, glabrum; fol. erectis, lineari-lanceol. integris: fl. terminalibus, solitar. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

*Simil. Campanulæ Persicæ fol. at stigma simpl.*

264. CAMPANULA. Cal. 5-fidus. Cor. sæpius campanulat. 5-fida fundo clauso valv. staminiferis. Stigm. 3-fid. Caps. infera, poris lateralibus dehiscens.

\* *Fol. lævioribus, angustioribus.*

1. *cenisia*. C. caulibus 1-fl. fol. ovat. glabris, integerrim. subciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Alton. spec. Pedem. tab. 5. f. 1. Fl. Ped. tab. 6. f. 2.*

*In Alpibus montis Cenisii, & Helvætiæ 24.*

Radix repens, alternatim emittens ramos terminatos fol. radicalibus. Caul. pollic. filiform. simpl. Fol. radical. conferta: caulina 4-5. obo-

vata, obtusa, lævia. Pedunc. terminal. Flos ratione plantæ magnus. Cal. hirtus. Cor. semi-5-fid. cœrul.

2. *uniflora*. C. caul. calyc. corol. æquante. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Lapp. tab. 9. f. 5. 6.*

*In alpihus Lapponicis 24.*

Caul. simpl. digital. oblique erectus, teres. Fol. caulina 6-7. alterna, infima ovata, medialanceol. summa linear. Flos terminal. nutans. Cor. cœrul. Capf. pyriform.

3. *pulla*. C. caulicul. 1-fl. fol. caulinis ovatis, crenatis: fl. cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 1. tab. 18. Austr. 3. tab. 273.*

b. C. fol. subrotund. *Bauh. prodr. tab. 35.*

*In Austria.*

Radix repens, filiform. Caul. spitham. erecti, flexuosi, filiform. raro ramo uno, alterove, eoque florifero. Fol. petiol. nuda, crenis distantibus. Flos magnitudine C. *rotundifolia*, calyc. lævi.

b. *Fl. pl. in apice caulis variat.*

4. *rotundifolia*. C. fol. radicalibus reniformibus; caulinis linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Ait. Fl. Ped. tab. 47. f. 2. Dod. pempt. 167.*

b. C. minor. &c. *Bauh. prodr. tab. 34.*

y. C. alpina &c. *Fl. Dan. tab. 189. Bocc. mus. tab. 103. Barr. ic. 457.*

*In Europa, ad rupes, & loca sicca 24.*

Caul. pedal. & ultra, filiform. 1-multifl. Fol. radical. ferrata, obscure virent. caulina plerumq. integra. Cor. magna, cœrul.

b. *Differt fol. firmioribus nitidioribus: caulinis latoribus, ferratis; primis rhomboidæis, reliquis elliptic. acutis, radicalibus etiam angustius dentatis.*

y. *Differt fol. omnibus linearibus, semper integerr.*

5. *patula*. C. fol. strictis; radicalibus lanceol-ovalibus: panicula patula. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 373. Dill. elsh. tab. 58. f. 68.*

*In Angliæ, Sveciæ, Pedemontii, Helvetiæ arvis 24.*

Radix obliqua. Caul. diffusi, cubital. asperi. Fol. flavo-virentia, flaccida: caulina linearia, ferrata. Rami sparsi, paucifl. Fl. parvi. Cor. cœrulea.

6. *Rapunculus*. C. fol. undularis; radicalibus lanceol-ovalibus: panicul. coarctata. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. 855.*  
*Rapunculus* &c. *Fuchs. 214.*  
*In Helvetia, Italia &c. ♂.*  
 Caul. 1-2-cubital. superne pene nudus, angulatus, asper. Fol. obscure virent. molli lanugine obsita; caulina acutiora. Racem. terminal. Rami similes, breviores, erecti. Pedunc. sæpius terni, intermedio longiore. Cor. dilute purpur. vel alba.
7. *Perficifolia*. C. fol. radicalibus obovatis: caulinis lanceol-linearibus, subserrat. sessilibus remotis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. vol. 1. tab. 5. 1.*  
*Phyteuma Mauth.*  
*In Europæ septentrionalis asperis, & sylvis umbrosis 24.*  
 Radix Napiformis. Caul. cubital. simpl. angulatus. Fol. alterna. Spica rari; pedunc. 1-2-fl. Fl. magni, albi, vel azurrei.  
*Var. fl. duplici; pleno. Altera foliis (exceptis summis caulinis) truncatis.*
8. *pyramidalis*. C. fol. lævibus, ferratis, (inferioribus) cordatis; caulinis lanceolat. caulibus junceis, simplicibus, umbellis lateralibus, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Carniola, Sabaudia ♂.*  
 Altitudo humana, & ultra. Cor. cœrul.
9. *americana*. C. fol. cordatis, lanceolatisque, petiolat. ciliatis: fl. secundis; cor. 3-partit. planis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Trachelium &c. Dodart. mem. 4. tab. 111.*  
*In Pennsylvania ♂.*  
 Caul. & germina lævia. Fol. acuminata. Fl. 3-pl. ex singulis alis. Cor. parva, cœrul. Styl. corolla longior.
10. *liliifolia*. C. fol. lanceolat. caulinis acute ferratis: fl. paniculat. nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 26.*  
*In Sibiria, Tartaria ♂.*  
 Folia ante florum explicationem quasi in rosulam disposita, dein dispersa per caulem. Cor. pallide cœrul.
11. *rhomboidæa*. C. fol. rhomboidibus, ferratis: spica secunda; calycibus dentat. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 2. p. 806.*  
*Rapunculus &c. Barr. ic. 567.*  
*In alpibus Helvetiæ, Italia 24.*

- Caul. cubital. simol. Fol. tenera, glabra, quandoq. aspera. Spica rara. Cor. cyanæa, vel alba. Caps. glabra, venosa.
12. *unidentata*. C. erecta, glabra: fol. lanceol. acutis, utrimq. unident. panicula divaricata, foliosa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
Ad cap. b. Spei.  
Caul. simpliciss. Fol. setacea.
13. *capillacea*. C. herbacea, erecta: fol. filiformibus, glabris: panicula terminali; fl. alternis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
Ad cap. b. Spei.
14. *linearis*. C. herbacea, erecta: fol. linearibus, integris, glabris: fl. cernuis: capsul. hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
Ad cap. b. Spei.  
Differt a priore calyc. longitudine: cor. & capsulis hispidis.
15. *Lobelioides*. C. glaberrima, ramosissima: fol. lanceol. serratis, sessilibus: paniculis terminalibus, secundis: cor. infundibulif. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
In locis latebrosis Maderæ.  
Planta habitu *Lobelia*, adeo tenera, eodemq. modo divisa, etiam infloresc. Cal. 3-5-phyll. Cor. minutiss. albido-purpurasc.
16. *carpatia*. C. fol. cordat. serratis, glabris, petiolat. pedunc. elongatis: calyce reflexo, glutinoso; cor. patula. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Jacq. h. 1. tab. 37.*  
In alpinis Carpatibus 24.  
Caul. herbac. debiles, subramosi, 1-paucifl. (culti multi-ramosa, multiflora). Fol. radical. reniformi-subrotund. caulina petiolat. cordata, nitida, serraturis undulatis. Cor. ampla, patentiss. cærul. Caps. oblonga.
17. *grandiflora*. C. caul. sub 1-fl. fol. sublanceol. serratis: cor. patente. *Jacq. Hort. 3. tab. 2.*  
C. fol. ternis &c. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
In Sibiria, & Tartaria.  
Differt a priore potissimum caul. simplici: fol. nullis cordatis &c.  
Planta glaberrima. Caul. pauci, pedic. simplic. toti foliosi, quandoq. 2-fl. Fol. inordinate sparsa, raro ternata, brevissime petiol. ovata, vel sublanceol. acuta, argute serrata, subtus di-

lutiora. Cor. ampla, valde patens, ex cœrul. saturo violic. Anth. flavæ. Capf. ovato-acuta.

18. *auræ*. C. capf. 5-locul. stigmatibus 5-fid. caul. paniculato: fol. duplicato-ferratis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In Insula Madera.

Fol. lanceol. glabra. Cal. coloratus. Cor. tubus a calyce distans; laciniis linearibus, reflexis.

19. *tenella*. C. caulibus diffusis, filiformibus: fol. ovatis, sub 1-dent. reflexis. fl. terminalibus, solitar. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Simil. *Lobelia tenella*. Caul. durus, ramosus. Fol. minuta, confertiusc. alterna, sessil. subimbricata, ovata, obtusa, recurvata, canaliculata, lævia; in quorum sinu foliol. minima, sinu lima. Cor. 5-part. Rare carent fol. dente laterali.

20. *porosa*. C. caul. erecto, sursum punctis poroso: fol. lanceol. lævibus. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Planta difficile cognoscenda, nisi poris vix nudis oculis conspicuis, qui non deorsum, sed sursum cauli intrusi.

Caul. erectus, pedal. teres, ramis numerosis, brevibus, erectis. Fol. superiora linear. integerr. Racemi terminal. erecti. Fl. parvi, C. rotundifoliae minores, erectiusculi.

21. *undulata*. C. fol. lanceol. dentatis, undulatis: fl. subfolitar. pedunculat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Caul. erectus, sesquiped. filiform. superne subramosus, lævis. Fol. sessil. subdecurrent. repanda, læviuscula. Pedunc. terminal. longi, aphylli. Fl. solitar. magnitudine C. rotundifoliae.

\*\* Fol. scabris, latioribus.

22. *lasifolia*. C. fol. ovato-lanceol. caul. simpliciss. tereti: fl. subfolitar. pedunculat. fructibus cernuis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 85.

Trachelium &c. Clus. hist. 2. p. 172.

In Helvetiæ, Angliæ &c. montibus, sepibus &c.

Caul. 3-pedal. & ultra, angulosus, glaber. Fol. breviter petiolat. acute serrata, hirsuta, obscure viridia, venosa, rigida. Pedunc. axill. Cor. magna, cyanæa.



23. *rapunculoides*. C. caul. ramoso; fol. cordato-lanceol. fl. sparsis, secundis; calyc. reflexis. *Syst. veg. ed. 14. Morif. hist. 2. f. 3. tab. 3. f. 32. Bauh. hist. 2. p. 816. Cervicaria &c. Eyst. tab. 6. f. 1. In Helvetiæ, Galliæ, Austriæ &c. locis siccis* 24. Caul. cubital. & ultra, erectus, angulosus, scaber, purpur. Folia ima petiolat. ferrata; super. amplexicaul. Fl. axillar. longe peduncul. racemo laxo. Cor. speciosa, cœrul. *Edulis. Variat spicis foliosis.*
24. *bononiensis*. C. caul. paniculato: fol. sessilibus, ovat-lanceol. subtus scabris. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 2. p. 804. Morif. hist. 2. f. 3. tab. 4. f. 38. In Carniola; Baldi, Bononiæ &c. collibus* 24. Caul. habitu *Verbasci nigri*, erectus, 3-ped. & ultra, ramis pl. coniugatis, adscendentibus. Fol. amplexicaul. subtterrata, nervis subtus ferruginea lana pubescentibus. Thyrsus longiss. Pedunc. sæpius 3-fl. Cor. violac.
25. *graminifolia*. C. fol. lineari-subulat. capitulo terminali. *Syst. veg. ed. 14. Trachelium &c. Barr. ic. 332. Bauh. hist. 2. p. 802. In Italiæ montibus.* Simil. *Phyteumæ hemisphæricæ*, sed grandior. Radix multis cespitibus. Fol. basi ciliata: caulina subamplex. Caul. simplic. vix fol. longiores. Bract. ovata, apice subulata. Cor. cœrul-violac. Stigm. 2-fid.
26. *cinerea*. C. erecta, tomentosa: fol. subulatis, erectis, approximatis, integris: fl. terminalibus, solitar. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Ad cap. b. Spei.*
27. *hispidula*. C. hispida: fl. erectis; calyc. longitudine cor. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Comm. hort. 2. tab. 37. Ad cap. b. Spei.* Caul. palmar. superne magis ramosus. Fol. alterna, linear. acumin. ciliata, præcipue carina. Calycis carina ciliata. Cor. infundibulif. pallide violacea.
28. *Trachelium*. C. caul. angulato: fol. petiolat. pedunc. 3-fid. calyc. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Garid. Aix. tab. 19. Rapum. Dodon. cer. 31. 32. In Europæ sepibus* 24. Caul. 2-pedal. & ultra, hirsutus, nutans. Fol.

Urticaform. lacte virent. dura, aspera, venosa. Fl. axillar. bini-terni-quini, nutantes. Cor. magna, cœrul. alba. *Var. fl. pleno, & fl. monstroso.*

29. *glomerata*, C. caul. angulato, simpl. fl. sessilibus; capitulo terminali. *Syst. veg. ed. 14.*  
Trachelium &c. *Herm. par. tab. 235. Bauh. hist. 2. p. 300.*

Rapunculus &c. *Tragi. ic. 8. Barr. ic. 523. Pluk. phyt. tab. 152. f. 5.*

b. Trachelium &c. *Bocc. mus. tab. 58.*

*In Austria, Helvetiæ &c. pratis aridis* 24.

Caul. pedat. Fol. ovat-oblong. obtusiusc. radical. longe petiolat. caulina semiamplexicaul. pallide virent. venosa. Fl. ex supremis alis glomerati, cyanæi, raro albi. *Var. fl. pleno; & fl. per caulem sparsis: & altera fol. confertioribus & fl. dense spicatis.*

30. *Cervicaria*, C. hispida; fol. lanceol-linearibus, undulatis: capitulo terminali: fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Fl. Dan. tab. 787. Gmel. Sib. 3. tab. 31.*

Rapunculus &c. *Thal. ic. 8. n. 1.*

*In Helvetiæ, Germaniæ &c. asperis sylvaticis* ♂.

*Simil. priori, sed magis hispida, duploque altior; & fol. lingulat.* Caul. 3-ped. simpl. Fol. ima petiolat. ovat-lanceol. ferrata, subtus albotoment. caulina lingulata, linear. Fl. min. quam in priore, glomerati, e cœrul-purpur.

31. *thyrsoidæa*, C. hispida; racemo ovat-oblong. terminal. caul. simpliciss. fol. lanceol-linearibus *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 1. tab. 21. Austr. 5. tab. 411.*  
Cervicaria &c. *Thal. hanc. tab. 4.*

*In alpidibus Helvetiæ, Hærcyniæ, Carniolæ &c.* ♂.

Caul. 2-ped. purpur. cum pilis albidis. Fol. radical. humifusa, ovat-lanceol. caulina longiora, lingulata: sessil. integerr. aspera, pilosa, ciliata. Bract. 2. ciliatæ, pallidæ. Fl. sessil. longi, hirsuti, albi.

32. *petræa*, C. caul. simpl. angulato: fol. subtus tomentosis: fl. sessilibus, capitato-glomeratis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. 152. f. 1.*

Trachelium &c. *Bauh. hist. 2. p. 301.*

*In Baldi, Pedemontii alpidibus* 24.

*Videtur var. C. glomeratæ.* Fol. ovat-oblong. obtusiusc. ferrata, supra scabra, subtus nivea. Cor. alba.

\*\*\* *Capsul. obrectis calyc. sinubus reflexis.*

33. *dichotoma*. C. capsul. 5-locul. obrectis: caul. dichot: fl. cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Bocc. Sic. tab. 45. f. 2. Moris. hist. 2. f. 5. tab. 3. f. 26.*  
*In Syria, Sicilia.*  
 Caul. palmar. hirsutus. Fol. oblong. scabra. Fl. solitar. purpur. structura C. *Medii*, sed dimidio min. & duplo ma: quam in *Sibirica*.
34. *Medium*. C. capsul. 5-locularibus, obrectis: caul. erecto, indiviso, folioso: fl. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. 52. Garid. Aix tab. 20.*  
*Viola &c. Dod. pempt. 163.*  
*In Italia, Germania &c. sylvis apricis ♂.*  
 Caul. hirsutus. Fol. subcrispa, crenata, hirsuta. Pedunc. terminal. 2-3-fl. Calyc. laciniae reflexae. Cor. coerulea, violacea, purpur. alba.
35. *barbata*. C. capsul. 5-locularibus, obrectis: caul. simpl. sub-1-fol: fol. lanceol: cor. barbatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 2. tab. 37. Pluk. pht. 153. f. 6.*  
*In alpibus Austriae, Helvetiae, Pedemontii ♂.*  
 Caul. spitham. Fol. obrutiusc. integerr. scabra. Fl. secundi, intus valde barbati. Cor. plerumq: dilute coerulea. raro alba.
36. *spicata*. C. hispida: fol. linearibus, integerr. spica laxa; fl. alternis. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 46. f. 2. & tab. 47. f. 1. Pluk. alm. tab. 153. f. 3.*  
*Trachelium &c. Bauh. hist. 2. p. 801.*  
*In Valesia inferiori &c. aridis, apricis, montosis.*  
 Radix crassitie digiti. Caul. ped. ramis alternis. Spica longissima. Fl. plurimi, remoti, sessil. Cor. subcylindr. *Variam faciem exhibet ad radices alpium.*
37. *alpina*. C. caul. simpl. pedunc. axillar. 2-phyll. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 118.*  
*Trachelium &c. Clus. hist. 171.*  
*In alpibus Helvetiae, Austriae &c. 24.*  
 Simil. C. *barbatae*. Fol. lineari-oblong. superne lutescent. obtusa, integerr. hirsuta. Pedunc. longi. Bract. 2. Flor. magnus, pallide coerulea.
38. *mollis*. C. capsul. 5-locularibus, obrectis, peduncular: caul. prostrato: fol. suborbicul. *Syst. veg. ed. 14. b. C. hirsuta &c. Bocc. Sic. tab. 45. f. 1. Moris. hist. 2. f. 5. tab. 3. f. 26.*

*Viola* &c. *Barr. ic.* 759.

*In Syria, Sicilia, Hispania.*

Caul. decumbent. subramosi, rigidiusc. villosi.

Fol. parva, sessil., subintegerr. tomentosa,

pubescent. Fl. axill. longe peduncul. solitar.

Cal. magnus. Fl. foliis sextuplo ma. *Herba*

*Antirrhina mollis*. Fl. *Campan. Medii*; & *fla-*

*tura C. heterophyllæ*.

39. *saxatilis*. *C.* capsul. quinquecarinatis, obteclis: fol. obovatis, crenatis: fl. alternis, nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Barr. rar. tab.* 813.

*Trachelium* &c. *Bocc. mus. 2. tab.* 64.

*In Cretæ scopulis saxosis.*

Cor. magna, cœrulea.

40. *sibirica*. *C.* capsul. trilocularibus, obteclis: caul. paniculato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab.* 200. *Gmel. Sib. 3. tab.* 29. *Bacc. Sic. tab.* 45.

*In Sibiria, Austria, Pedemonte &c.*

Caul. ped. rectus, subhispid. angulatus, indivisus.

Fol. semiamplexicaul. linear. caulina

scabra. Panicula rarior, laxa. Fl. parvi, ob-

longi. Pedunc. sæpius 3-fl. Cal. hispid. Cor.

purpuro-cœrul. *Variat caul. subdiviso; fol.*

*latioribus.*

41. *tridentata*. *C.* capf. quinquelocul. obteclis: caul. 1-fl: fol. radicalibus 3-dent. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. dec. 3. tab.* 2.

*In Oriente.*

Fol. radical. *Statice reticulata*, lanceol. cunei-

form. apice sæpe sub. 3-dent. Caul. foliis du-

plo longior, fol. aliquot linearibus. Flos ere-

ctus, maiuscul. Cal. sinibus reflexis, germen

tegentibus.

42. *laciniata*. *C.* capsul. obteclis, pedunculat: fol. ferratis; radicalibus lyratis; caulinis lanceol. (subcuneiformibus) *Syst. veg. ed. 14. Tourn. ii. 1. tab.* 99. *Morif. hist. 2. f. 5. tab.* 3. f. 31.

*In Græcia, Libano.*

Planta læviuscula.

43. *striata*. *C.* capsul. obteclis: caul. simpliciss: fol. hirtis: caulinis lanceol. ferratis: fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Syria, Palæstina.*

Caul. sesquiped. hirtus. Fol. radical. cordata;

seu ovata, petiolat. obtusiuscula, ferrata. Cau-

lina remota, alterna, sessil. obrufa, serrato-dentata, basi angustiora. Fl. axill. erecti, solitarii.

44. *canariensis*. C. capsul. quinquelocularibus: fol. (rameis) oppositis, hastatis, dentatis, petiolat. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Canariis 14.*

Radix tuberoso-fusiform. Caul. erectus, 3-ped. simpl. teres, lævis, articulis incrassatis. Rami terni, superioribus longioribus, apice dichotomis. Fol. lævia, venosa; caulina terna. Fl. e dichotomia ramorum superior. solitar. peduncul. cernui. Cal. germine hexagono, coronato foliol. lanceol. recurvatis, lævibus. Cor. campanul. fol. maior, rufa *Fritillariae imperialis*. Nectar. valvul. distantibus. Filam. patentia. Anth. apice pendulæ. Styl. clavatus. Stigm. fissum. *Plerumque num. senarius in partibus fructificationis.*

45. *fruticosa*. C. capsul. columnaribus, quinquelocularibus: caul. fruticoso: fol. lineari-subulatis: pedunc. longissim. *Syst. veg. ed. 14. Herman. Afric. 5.*

*Ad cap. b. Spei h.*

Flos patulus, cœruleus.

46. *speculum*. C. caul. diffusio, ramosissimo: fol. oblong: subcrenatis: fl. (sepe ternis) capsul. prismaticis. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 168.*

*Inter segetes Europæ australis ☉.*

Caul. semiped. Fol. alterna, sessil. obtusa, apice latiore, undulata. Pedunc. axill. prælongi. Cal. cor. longior. Cor. patens, purpurea.

47. *hybrida*. C. caule basi subramoso, stricto: fol. oblong. crenulat. calycibus aggregatis, cor. longioribus: capsul. prismatic. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 2. f. 5. tab. 2. f. 22.*

*In Helvetia, Angliâ &c. inter segetes ☉.*

Differt a *Speculo*, seu matre, caul. basi tantum ramoso, erecto, superne vix ramoso, stricto: fl. sessilibus 3-4. simul: cor. sæpius non explicatis.

48. *limonifolia*. C. ramis patentibus, indivisis: fol. radical. ellipticis, integerr. lævibus: fl. sessilibus, subternis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Oriente.*

Caul. ramis simpliciss. virgatis; fol. subulatis. Fl. axill. remoti, bracteati.

49. *pentagonia*. C. caul. subdiviso, ramosiss: fol. linearibus, acuminatis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Thracia* ☉.  
 Caul. palm. debilis. Fol. digitum longa, sessil. inferiora latiora. Fl. in summis caulibus, & ramul. duplo ma: quam in C. *Speculo*, rotati, purpur. umbilico albo.
50. *perfoliata*. C. caul. simplici: fol. cordatis, dentatis, amplexicaulibus: fl. sessilibus, adgregatis. *Syst. veg. ed. 14. Morif. hist. 2. f. 3. tab. 2. f. 23. Barr. rar. tab. 1133.*  
*In Virginia* ☉.  
 Caul. erectus, plerumq. simplex. Fol. parva, alterna, subrotund. aurita. Fl. axill. purpur.
51. *capensis*. C. fol. lanceol. dentatis, hispidis: peduncul. longiss: capsul. strigosis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 2. tab. 35.*  
*Ad cap. b. Spei* ☉.  
 Caul. teres. Fol. opposita, longa, lata, mucronata. Pedunc. axill. ramosi. Cal. hirsutus. Cor. cœrul.
52. *elatines*. C. fol. cordat. dentat. pubescentibus, petiolat. caul. prostratis: peduncul. capillaribus, multiss. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In alpinis Europæ australis* 24.  
 Caul. pl. rotundi, plerumq. simpl. Fol. alterna, longe petiol. subcinerea. Pedunc. axillar. aphylli, laxi, sæpius 3-fl. Cor. cœrul-purpur. Tota planta molliter hirsuta.
53. *hederacea*. C. fol. cordatis, 5-lob. petiolat. glabris: caul. laxo. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. 330. Morif. hist. 2. f. 3. tab. 3. f. 18. Pluk. phyt. 23. f. 1.*  
*In Anglia, Gallia &c. locis umbrosis, humilissculis.*
54. *erinoides*. C. caulibus diffusis: fol. lanceol. subserrat. decurrentibus, linea scabra: fl. solitar. pedunculatis. *Syst. veg. ed. 14. Herm. Lugd. tab. 111?*  
*In Africa.*  
 Simil. *Lobelia erinoidi*. Caul. ramosiss. Fol. alterni, margine aculeis ciliato. Fl. terminal. erecti. Germ. læve. Styl. 3-fid.
55. *heterophylla*. C. fol. subovat. integerr. glabris: caulibus diffusis. *Syst. veg. ed. 14. Tourn. it. 1. tab. 243.*  
*In Oriente* 24.  
 Tom. I.

- Caul. alterne ramosus. Fol. pubescent. apice undulata. Fl. penduli, cœrulesc.
56. *Erinus*, C. caul. dichotomo: fol. sessilibus; superior. oppositis, 3-dent. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Erini &c. Column. phytob. tab. 28.*  
*Alme &c. Bauh. hist. 3. p. 367.*  
*In Italia, Hispania &c. ☉.*  
*Ramificatio opposita. Cor. regul. calyce min. Stigm. 3-fid.*  
 Caul. ramosiss. flaccidus, 4-gon. hispido-pubesc. Rami alterni, patentes. Fol. oblong. acuta, serrata, serraturis paucis, magnis. Fl. axill. parvi, solitarii, erecti, breviter peduncul. cœrul.
- \*\*\*\* —
57. *sessiliflora*. C. prostrata; fol. lineari-subulat. integris: fl. axillar. solitar. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
58. *fasciculata*. C. fruticosa, erecta: fol. ovatis, sub 1-dent. recurvis: fl. terminalibus, glomeratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
59. *paniculata*. C. herbacea: caul. paniculato; ramis divaricatis: fol. lanceolat. integerr. fl. terminalibus, solitar. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
60. *adpressa*. C. herbacea, erecta: fol. adpressis, lanceol. dentat. recurvis, basi ciliatis: panicula decomposita. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
61. *verticillata*. C. fol. floribusque verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pallas. It. 3. tab. G. f. 1.*  
*In Dauuria &c.*  
 Caul. pl. 1-sesquiuln. recti. Fol. 5-6. ovat-lanceol. ut in *Veronica Sibirica*, sed plerumq. lanceol. serrata. Fl. terminal. per verticillos plerumq. quinos, remotiss. dispositi; peduncul. subramosis. Calyc. laciniae setaceae. Cor. minuscula, dilute cyanæa, 5-dent.
62. *procumbens*. C. caul. diffuso, dichotomo: fol. obovatis, obtusis, crenatis: fl. solitar. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Planta tenella.

63. *triphylla*. C. fol. ternis, linearibus: fl. verticillato-ternis.  
Syst. veg. ed. 14. Thumb. Japon.

In Japonia.

Radix fusiform. Caul. herbac. erectus, glaber.  
Fol. pollic. sessil. integerr. patentia, margine  
reflexo, glabra. Fl. axill. peduncul.

64. *tetraphyl-  
la*. C. fol. quaternis, oblong. ferratis. Syst. veg.  
ed. 14. Thumb. Japon.

In Japonia.

Caul. 2-ped. angulatus, articulatus, glaber, su-  
perne paniculat. Rami 4. oppositi, & alterni,  
diffusi, virgati, sub-4-goni, glabri, floriferi.  
Fol. pollic. vel paulo ultra, sessil. inferne at-  
tenuata, erecta, glabra, nervo medio atten-  
nuato, supra viridia, subtus pallida. Fl. in  
ramis racemosi, cernui. Bract. setaceæ, gla-  
bræ. Cor. albida.

65. *glauca*. C. fol. sessilibus, ovatis, ferratis, subtus glaucis:  
caul. angulato, paniculato; pedunc. 1-fl. Syst.  
veg. ed. 14. Thumb. Japon.

In Japonia.

Caul. erectus, 2-ped. suffruticosus, glaber. Rami  
subfastigiati, erecti, flexuosi, glabri. Fol. pol-  
lic. sparsi, erecta, acuta, margine parum re-  
flexo. Fl. axill. in ramis, solitar. peduncul.  
bracteati. Cor. magna, cœrul.

66. *marginata*. C. fol. lanceolat. ferratis, undulatis, marginatis,  
ramis debilibus: fl. terminalibus, solitar. Syst.  
veg. ed. 14. Thumb. Japon.

In Japonia 24.

Caul. decumbens, sublignosus, basi crassus. Ra-  
mi spitham. erectiusc. capillar. parum ramulor.,  
glabri. Fol. unguicul. in infer. parte ramorum,  
alterna, sessil. lineari-lanc. margine albo, fer-  
raturis remotis, pilis albis oblita.

- Bellardi*. C. caul. nudo, 1-fl. fol. petiolat. elliptico-lanceol.  
dentatis. Alt. Fl. Ped. tab. 85. f. 5.

In summis montibus Pedemontii 24.

Fol. aliquot ex imo, suberecta, longe petiolata,  
ex eodem puncto non nascentia, dentibus ac-  
cutiusculis 2-3 utrimque, intense viridia, sub-  
aspera, firmata. Caulicul. dimidii digiti lon-  
gitudine, erectus. Flos minime nutans, cœ-  
rul.



- vesula*. C. 1-fl. fol. ovalibus, dentatis, glabris: caul. subnudo; calyce glabro. *All. Ped. tab. 7. f. 1.*  
*In montibus Pedemontii* 24.  
 Fol. ad rad. plurima, per petiolum decurrentia, subtus nervosa. Caul. spitham. rotundus. Cal. livers. Flos patens. *Parcius pilosa quam icon ostendat.*
- valdensis*. C. hirsuta; fol. elliptico-lanceol. raro denticulatis: caule 1-fl. *All. Spec. Ped. tab. 6. f. 2. Fl. Ped. tab. 6. f. 1.*  
*Ad alpium radices in umbrosis* 24.  
*Proxima C. linifoliae Bauh. differt fol. latioribus, & dentatis, strigosulis, hirsutis.*
- alpestris*. C. fol. hispidis: caule 1-fl. *Spec. Ped. tab. 6. f. 3. All. Fl. Ped. tab. 6. f. 3.*  
 C. trilocularis. *Turr. Fl. Ital. prod. p. 64. n. 10. In apium catuissimis inter diffractos lapides* 24.  
*Diversa a C. barbata. Var. fl. a. bo.*
- cespitosa*. C. caul. angulato: fol. imis ovatis, ferratis, glabris: germinibus decagonis. *Scop. Fl. Car. 2. tab. 4.*  
*In montibus saxosis.*  
*Var. C. alpina C. v. Haller. Caul. pl. cespitosi. Surculi sola gerunt fol. petiolat. acumin. altero anno floriferi evadunt, spitham. longi, ramosi, ramis paucis. Fol. sparsa, sessilia, lanceol. ad basin imbricata, & subtus punctata: fol. summa remotiora, linear. integerr. Fl. nutantes, saturæ cœrul. Var. fol. omnibus lanceolat.*
- Urticæfolia*. C. caul. erectiusc. fol. superior. sessilibus: spica secunda; pedunc. 1-fl. calyc. glabris. *Turre Giornale di Venezia tab. 1. Ponted.*  
*In Italia.*  
 Planta glabra. Caul. 2-cub. simpl. striatus. Fol. ovato-lanceol. inæqualiter & acute dent. Fl. ex singulis alis, breviter peduncul. *Similis C. rhomboidali.*
- edulis*. C. fol. ovat-acut. sessilibus, ferratis. *Forsk. Æg. In Arabia.*  
 Radix crassa; pueris edulis. Caul. ramosus, hispidus. Cal. fructus patens, ciliatus. Cor. pallide cœrul. venis violac. vel alba.
265. ROELLA. Cor. infundibulif. fundo clauso valvulis staminiferis. Stigm. 2-fidum. Caps. cylind. 2-3-locul. infera.

1. *ciliata*. R. fol. ciliatis; mucrone recto. *Syst. veg. ed. 14. Hort. Cliff. tab. 35.*  
*Campanula &c. Comm. hort. 2. tab. 30. Seb. thes. 1. tab. 16. f. 5.*  
*Aculeosa &c. Pluk. alm. tab. 252. f. 4.*  
*In Mauritania, Æthiopia &c.*  
 Caul. sesquiped. ramosus. Fol. parva, ultra lineam longa, angusta, patentia. Bract. foliis ma. Fl. terminal. 5-part. coerul. in medio atropurpur.
2. *reticulata*. R. fol. ciliatis, mucrone reflexo. *Syst. veg. ed. 14. Campanula &c. Pet. mus. tab. 157.*  
*Ad cap. b. Spei &c.*  
 Caul. fruticosus, dodrant. Fol. *Gorteria ciliaris*, sparsa, sessil. linearia. Fl. solitar. sessil. Cor. violac.
3. *squarrosa*. R. diffusa, herbacea; fol. ovat. dentat. recurvatis: fl. terminalibus, aggregat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Berg. Fl. cap.*  
*Ad cap. b. Spei.*
4. *muscosa*. R. diffusa, herbacea; fol. ovat. dentat. reflexis: fl. terminalibus, solitariis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*  
 Planta parvula.
5. *spicata*. R. erecta, fruticosa: fol. lanceol. integris, ciliat. fl. terminalibus, subspicat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
- 
- pedunculata*. R. fol. linearibus, ciliat. rectis: fl. pedunculat. germinibus longissim. *Berg. Fl. cap.*  
*Ad cap. b. Spei h.*  
 Simil. R. *ciliata*, sed caul. maior. Fol. unguicul. sparsa, sessil. supra nuda, subtus spinulis ciliata: foliol. min. axillaribus mixtis. Pedunc. palm. subnudi, sub 2-fl. Bract. lineari-subul. ciliatæ.
266. PHYTEUMA. Cor. tubuloso-corniculata, 5-part. laciniis linearib., basi coalitis in speciem tubi. Stigm. 2-3-fid. Caps. 2-3-locul. infera. Sem. exigua. Fl. in capitulum, aut spicam collecti.
1. *pauciflora*. P. capitulo subfolioso: fol. omnibus lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 2. p. 811.*  
*In alpidibus Helvetiæ, Styriæ, Pedemontii &c.*  
 Habitus humilis. Caul. 2-unc. unico foliol. or-  
 F f iij

natus. Fol. petiolata, sine obtuso, non lanceol. crenata, subhirsuta, sub capitulo maiora. Bract. cordatæ. Capitulum 2-3-fl. Petal. ovata, patentia, cœrul. Styl. sæpe 2-fid.

2. *hemisphærica*. P. capitul. subrot. fol. linearibus, subintegerr. ca. Syst. veg. ed. 14.

Rapunculus &c. Thal. herc. tab. 3.

Rapuntium &c. Column. ceph. 2. tab. 26.

In alpinis Helvetiæ, Italiæ &c. 24.

Caul. subtriental. pene nudus, 1-fl. Fol. radical. multa, Graminea, etiam ferrata: caulina amplexicaul. longe caudata. Flos cœrul. vel albus. Styl. 3-fid.

3. *comosa*. P. fasciculo terminali, sessili: fol. dentatis; radicalibus cordatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. App. 50. Barr. ic. 839.

Trachelium &c. Pon. bald. tab. 326.

Campanula &c. Pluk. alm. tab. 152. f. 6.

In Baldi, Carniolæ, & Tyrolensibus montibus &c.

Caul. vix spitham. Fol. ima petiolat. super. semiamplexicaul. Capitulum 2. fol. suffultum. Cor. inverse pyriformis, cœrul.

4. *orbicularis*. P. capitulo subrot. fol. serratis: radicalibus cordatis, oblongis (caulinis sessilibus, acutis.) Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 447.

Rapunculus &c. Moris. hist. 2. f. 5. tab. 5. f. 47. Barr. ic. 526.

In alpinis Italiæ, Helvetiæ &c.

Caul. ped. simpl. foliosus. Fol. acumin. læte virent. glabra, venosa; radical. longe petiol. obtusa, vel acuta. Bract. ovato-lanceol. Fol. radical. peracti fructificat. Autumno prodeunt. Spica hemisphæric. dein ovalis. Cor. saturæ cyanæ. In collibus adnata variat, cum vix digital. sit: altera var. latifol. & angustifol. multis spicis cauli hærentibus.

5. *spicata*. P. spica oblong: fol. radicalibus cordatis; (caulinis lanceol.), capsul. 2-locul. Syst. veg. ed. 14.

Rapunculus &c. Bauh. prodr. tab. 32. Moris. hist. 2. f. 5. tab. 5. f. 46.

In alpestribus Italiæ, Helvetiæ, Austriæ &c.

Fol. alterna; radical. longe petiolat. Violæ Martiæ similia, sæpe cum maculis nigris: caulina sessil. longiora, angustiora. Bract. linear. an-

gustæ. Spica longa. Cor. cœrul. purpur. alba, ochroleuca.

6. *pinnata*. P. fol. pinnatis: fl. sparsis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Rapunculus* &c. *Bauh. hist. 2. tab. 712.*

*In Creta.*

*americana*. P. *Hill. hort. Kewens.*

*In America* ♂.

Caul. 3-ped. erectus, ramosus. Fol. lanceol. Fl. axill. cœrul.

*Michellii*. P. spica oblonga: fol. lineari-lanceol. subintegerrimis. *All. Fl. Ped. tab. 7. f. 3. Comm.*

*Bonon. 4. tab. 1. f. 2.*

*In pratis montosis* ♀.

Rad. tuberosa, & nodosa. Caul. cubitalis, rotundus, striatus. Fol. sessilia, amplam basin habentia, ut amplexicaulia videantur, glabra, ad originem pilis ciliata, longissime lanceol. sine angustissimo, raris, & exiguis denticulis prædita. Spica primum obæsa, dein gracilis, 2-uncial.

*Scheuchzeri*. P. (*Rapunculus*) fol. imis longe petiolat. caulinis linearibus integris; bracteis linearibus duabus; imis longissimis. *Haller. hist. n. 682. All. Fl. Ped. tab. 39. f. 2.*

*Rapunculus* &c. *Scheuchz. it. 6. p. 460.*

*Ad rupes umbras* ♀.

Fol. longissime elliptica. Spica subrotunda, non ovata: fol. caulina ad usque summum caulem. Bract. inæquales.

*Halleri*. P. (*Rapunculus*) fol. radicalibus cordiformibus, acute incis; tubis longiss. hirsutis, emarginatis. *Hall. Helv. n. 683. An hac pertinet Fl. Dan. tab. 362.?*

*Rapunculus* &c. *Scheuchz. it. p. 518.*

*In pratis subalpinis* ♀.

Caul. cubital-2-ped. non ramosus. Fol. radical. longe petiol: Urticæform: caulina inferior, cordifor. summa longe lanceol. graciliora. Spica longa, crassa, ovalis. Bract. longæ, lineari-lanc: quarum sæpe 2. præmagnæ spicæ subiiciuntur. Cor. satore violac.

267. TRACHELIUM. Cor. infundibulif. Stigm. globosum. Caps. 3-locul. infera.

1. *diffusum*. T. diffusum, ramosiss. ramis divaricatis. recur-

- vis: fol. subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
2. *tenuifolium*. T. erectiuscul: fol. linearibus, ciliat. hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*  
*Ad cap. b. Spei.*
3. *cæruleum*. T. erectum, ramosum; fol. ovat. ferratis, planis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Italiæ, & Orientis umbr. fis ♂.*  
 Caul. ramosus. Fol. alterna. Corymbi compositi. Fl. purpuro-cærul.
268. SAMO- Cal. 5-fidus. Cor. hypocraterif: 5-fida. Stam.  
 LUS. munita squamulis cor. Capf. 1-locul. infera, 5-valv. polysperma.
1. *Vulerandi*. S. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 198. Sabb. hort. 2. tab. 47.*  
*Alline &c. Morif. hist. 2. f. 3. tab. 24. f. 28.*  
*b. S. africanus. Walt. hort. tab. 23.*  
*In maritimis Europæ, Asia, & Amer. boreal. ad litora, fentes ♂.*  
 Caul. ped-cubital. etiam ramosus, fusco-virens. Fol. petiol. obovata, subcrenata, nitida. Fl. racemosi, albi. Capf. fusca, glabra.  
*b. Differt caul. magis ramoso, & firmiore.*
269. NAU- Cor. infundibulif. Sem. 1. inferum, 2-locul. Re-  
 CLEA. ceptac. comm. globosum.
1. *orientalis*. N. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Katu-Tsiacca. hort. Malab. 3. tab. 33.*  
*In India asiatica h.*  
 Arbor procera, ramosa. Fol. magna, Limonii-form. breviter petiolat. utrimq; geminata, decussata, supra obscuro virore nitentia, subtus dilutiora. Capitula magna. Flosculi flavescent. Fruct. globosi, primum virides, dein rubri, tandem nigri.
270. RONDE- Cor. infundibulif. Capf. 2-locul. infera, polysper:  
 LETIA. subrotunda, coronata.
1. *americana*. R. fol. sessilibus: panicula dichotoma. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 342. f. 1.*  
*In America h.*  
 Arbuscula. Fol. opposita, cruciata, lanceol. integerr. Pedunc. comm. longiss. solitarii, nudi; in singula dichotomia flos sessilis, cum involuc. 2-phyllo.
2. *asiatica*. R. fol. petiol. oblong. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 140. f. 2.*

Cupi. Hort. Mal. 2. tab. 23.

In Malabaria, Zeylonia h.

Frutex orgyal. ramofus. Fol. alterna, breviter petiol. angufta, craffa, nervofa, fupra fature viridia, & nirentia, fubtus dilutiora, odore iucundo. Fl. fubumbellati, dein flavefcant. odori. Fruct. Lauriform. maturus nigricans.

3. *obovata*. R. fol. petiolat. fubovat. obtufis. Syft. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 42. ed. 2. pida tab. 61.

In America.

Frutex 6-ped. Fol. oppofita, integerr. fcarbriufc. Pedunc. terminal. terni, 3-fl. Fl. miniati, margine tubi aurantiaco, odore Violæ.

4. *trifoliata*. R. fol. ternis. Syft. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 43. ed. 2. pida tab. 62. Ehret. pida tab. 15.

In America h.

Frutex 12-ped. Fol. verticillata, 3-pollic. petiolat. lanceol. acuta, integerr. fubtus fubto- ment. Racemi axill. Fl. exigui, rubelli.

- disperma*. R. fol. petiolat. ovalibus, obtufis. Jacq. amer. pag. 59. ed. 2. pida tab. 259. f. 18.

In Carthagenæ rupeftribus h.

Arbufcula erecta, fub 15-ped. ramofa. Fol. magnitudine varia, oppofita, integerr. glabra. Racemi axill. compofiti, laxi, 5-fidi; pedunc. communibus partialibus dichotomis. Fl. multi feffil. & peduncul. e purpureo-albicantes, leviter odori.

271. MACROCNEUM. Cor. campanul. Capf. infera, 2-locul. Sem. imbricata.

1. *jamaicenfis*. M. Syft. veg. ed. 14.

In Jamaica.

Frutex ramis compofitis, inæqualibus. Fol. oppofita, fubpetiol. ovat-lanceol. integerr. lævia. Panicul. bi-trichot. vix fol. longiores. Cor. tubo brevi, fauce barbata; laciniis apice recurvis. Capf. oblonga, inferne anguftior.

272. BELLONIA. Cor. rotata. Capf. 1-locul. infera, polyfperma, calyce roftrata.

1. *aspera*. B. frutefcens, fol. Meliffæ afpero. Syft. veg. ed. 14.

In America h.

Arbuscula. Fol. opposita, ovalia, inæqualiter ferrata, subtus aspera, petiolis breviss. Fl. in corymbum, & per caulem sparsi. Caps. ovato-acumin.

273. PORTLANDIA. Cor. clavato-infundibulif. Anth. longitudinal. Caps. pentagona, retusa, 2-locul. polysperm. coronata cal. 5-phyll.

1. *tetrandra*. P. fl. tetrandris: fol. oblong. obtusis: stipulis latis. Syft. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

In insula Fera dicta.

Fol. in apice ramorum adproximata, petiolat. ellipt. integerr. glaberr. Fl. axill. solitar. peduncul. Cor. 4-gona, alba.

2. *grandiflora*. P. fl. pentandris: (fol. basi inæqualibus). Syft. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 44. Brown. Jam. tab. 11. f. 1.

In Jamaica h.

Arbor sub 15-ped. coma oblong. rara, ramis horizontalibus. Fol. opposita, breviter petiolat. sub 5-poll. ovata, acuta, crassiusc. integerr. nitida. Stipul. oppositæ. Pedunc. axill. breviss. oppositi, solitar. plerumq. 3-fl. Fl. grandes, semiped. pulcherrimi, noctu odori. Cal. e viridi-ruber. Cor. Daturæ, candida, margine rubente, striata. Caps. nigrescunt.

3. *hexandra*. P. fl. hexandris (fol. basi æqualibus). Syft. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 182. f. 20. ed. 2. pict. tab. 65.

Coutarea speciosa. Aubl. Guian. tab. 122.

In Carthagæ sylvis h.

Ad Cinchonæ genus spectat, monente Vahl.

Arbor 25-ped. apice ramosa. Fol. super. inferioribus alterne ma. opposita, breviter petiolat. ovata, acuta, integerr. glabra. Stipul. utrimq. ad basin petiolat. Fl. axillar. & terminal. corymbosi, peduncul. Cor. ampla, purpur. Caps. ovato-cordata, rufesc.

274. SCÆVOIA. Cor. monop. tubo longitudinaliter fisso: limbo 5-fid. laterali. Drupa infera, 1-sperm. Nux bilocul.

1. *Lobelia*. S. Syft. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 179. f. 88. ed. 2. pict. tab. 199.

Lobelia &c. Plum. gen. ic. 165. f. 1. Cates. car. 1. tab. 79.

Buglossum &c. Rumph. amb. 4. tab. 54.

In Indiis 24.

Planta non lactescens. Frutex 2-ped. procumb. basi ramosus, habitu neglecto. Fol. obverse ovata, integerr. glabra, fere enervia, crassa, succulenta, nitida, petiolat. super. conferta, decidua. Racemus axill. dichotomus, bract. oppositis, subulatis, interne ad basin villosis. Cor. albesc. intus villosa. Drupa pisiform. subrotund. atra.

275. CINCHONA. Cor. infundibul. apice lanata. Caps. infera, 2-loc. dissepimento parallelo. Sem. imbricata.

1. *officinalis*. C. fol. ellipticis, subtus pubescentibus: cor. limbo lanato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Comm. noric. 1744. tab. 1. f. 3.*

*In Loxa Peruviae* h.

Alb. 12-15-ped. Fol. 2-3. poll. longa, 1-2. lata, opposita, petiolat. ovato-acum. nervosa, subtus dilutiora, costa rubra. Fl. paniculati, pedicell. Cor. extus albicans, intus coccinea, margine punctulato.

*Ordine naturali contortis accedit.*

2. *caribæa*. C. pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 179. f. 95. ed. 2. piñ. tab. 63. Obs. 2. tab. 47. Periclymeno &c. Pluk. aln. tab. 103. f. 3.*

*In Caribæis* h.

Arbuse. 10-ped. ramosa. Fol. 2-5-pollic. opposita, petiol. glabra, lanceol-acumin. apicibus reflexis. Pedunc. axill. breves, 1-fl. Fl. sesquipollic. e carneo-albidi, odoratiss. Cor. tubus longiss. limbo reflexo.

3. *corymbifera*. C. fol. oblongo-lanceol. corymb. axillaribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. Ad. Upsal. 3. p. 176.*

*In Insulis maris pacifici.*

Cor. non barbata, ut in C. officin.

*Corticis sapor amarissim. subadstringens, sinill. cortici Peruano.*

276. PSYCHOTRIA. Cal. 5-dentat. coronatus. Cor. tubulosa, Bacca globosa. Sem. 2. hemisphærica, sulcata.

1. *asiatica*. P. stipul. emarginatis: fol. obovat-acut. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 174. f. 22. ed. 2. piñ. tab. 260. f. 19.*

*Psychotrophum. Brown. Jam. tab. 17. f. 2.*

*In Jamaica, & India Orient. h.*

Altitudo humana. Fol. opposita, petiolat. inte-



gerr. nitida. Racemi terminal. Cor. alba, tubo erecto, triplo longiore limbo. Bacca rubra, ficuti & caro. Sem. alba.

2. *serpens*. P. caul. subherbaceo, repente: fol. ovalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In India Orient. 24.*

*Simil. sequenti, sed distincta.* Caul. 2-ped.-orgyal. ramis erectis, alternis, teretibus, articulatis. Fol. opposita, petiolat. utrimq. lævia. Stipul. subrotund. deciduæ. Corymb. terminal. brachiati.

3. *herbacea*. P. caul. herbaceo, repente: fol. cordatis, petiolat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 46. ed. 2. pi. tab. 67.*

*Karinta-Kali. Hort. Mal. 10. tab. 21.*

*Mapouria. Aubl. Guian. tab. 67.*

*In India utriusque umbrosis roridis.*

Radix reptans. Caul. 3-pollic. simpl. 4-fol. Fol. opposita, cordato-subrot. integerr. infer. longe petiolat. Pedunc. terminal. 2-4-fl. Cor. alba, limbo patentiss. Baccæ, & caro rubra. Sem. alba.

4. *emetica*. P. herbacea, procumb. fol. lanceol. glabris: stipulis extrafoliac. subulatis: capitul. axillaribus: peduncul. paucifl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Ipecacuanha. Pis. Bras. 4. p. 101. ? Margr. Bras. p. 17. ?*

*Sub temperie calidiff. Amer. Septent. Provin. Gironensis.*

Radix perpendicul. teretiusc. subramosa. Fol. adproximata, opposita, acumin. patentiss. integerr. subtus costa tereti, prominente, lævia, plana, 2-3-pollic. Fl. parvi, sessil. albi.

- violacea*. P. repens: fol. petiolat. cordatis: fl. cymosis: fruct. violac. *Aubl. Guian. tab. 55.*

*In Guiana, & Caienna.*

Planta humillima, terræ adfixa; ramis expansis, ad singulos nodos radicanibus. Fol. opposita, glabra. Fl. bini-terni-quaterni, longe peduncul. Cor. & bacca violac.

- domingensis*. P. fol. ovat-lanceol. *Jacq. amer. 66.*

*In Domingo h.*

Frutex suberect. 5-ped. ramosus. Fol. 5-pollic. opposita, petiolat. integerr. nitida. Racemi terminal, ramosi, plerumq. bini. Fl. pollic.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 463

sessil. Cor. alba, tubo cylindrico, incurvo, inodora. Baccæ Pisiform. atræ, nitidæ, pulpa aquea, non colorata.

277. COFFEA. Cor. hypocraterif. Stam. supra tubum. Bacca infera. Sem. arillata.

1. *arabica*. C. fl. 5-fid. baccis dispermis. *Syst. veg. ed. 14. Black. 337.*

*Jasminum* &c. *Juss. ad. 1713. tab. 7. Tilli. pis. tab. 32.*

*Evonymo* &c. *Pluk. phyt. 272. f. 1.*

*Bon. Alp. Ægypt. tab. 36.*

*In Arabia felici, Æthiopia h.*

Frutex 12-ped. & ultra. Fol. opposita, breviter petiol. ovat-lanceol. acumin. glabra, supra atro-virent. nitida, subtus dilutiora. Fl. ex singula ala 2-4. sessil. Cor. alba. Fruct. ovatus, utrimq. obtusus, subcompressus, ruber, cortice molli, tenui. Sem. cartilaginea, hinc convexa, inde plana.

2. *occidentalis*. C. fl. 4-fid. baccis 1-sperm. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 47. ed. 2. pict. tab. 68.*

*Pauetta*. *Brown. Jam. tab. 6. f. 1.*

*Jasminum* &c. *Plum. Sp. 17. ic. 156. f. 2.*

*In America calidiore h.*

Arbuse. 6-ped. Fl. opposita, petiol. lanceol-ovata, acumine obtuso, integerr. nitida. Stipul. oppositæ, subulatæ. Racemi axillar. & terminal. trichotomi, interdum paniculati. Cor. alba, suaveolens.

*An sem. usque præbent Coffe?*

*Guianensis*. C. fl. 4-fid: baccis exiguis, violac. dispermis. *Aubl. Guian. tab. 37.*

*In Guiana h.*

Fruticul. 1-2-pedal. ramulis 4-gon. nodosis. Fol. opposita, breviter petiolat. oblon-acuta, integerr. glabra. Stipula utrinq. ad basin petiolat. oblon-acuta. Fl. axill. fascicul. sessil. Cor. alba.

*paniculata*. C. ramis 4-gon: fol. amplis, ovat-oblong. acutis: cor. 4-fid: baccis dispermis. *Aubl. Guian. tab. 38.*

*In Guiana h.*

Frutex 8-ped. ramis, & ramuscul. oppositis, 4-gon. nodosis. Fol. utrinq. intra basin petiol.

Fl. terminal. paniculati, pedicell. oppositis.  
Cor. alba, odora. Bacca subcœrul. Sem.  
ovata.

278. CHIO- Cor. infundibulif. æqualis. Bacca 1-locul. 2-  
COCCA. tper. infera.

1. *paniculata*. C. erecta: fol. ovatis: fl. terminalibus, paniculat.  
dentibus stipularibus binis. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Lin. Suppl.*

*In Surinamo, & Amer. merid. h.*

Arbor alta, ramosa. Fol. opposita, breviter  
petiol. utrimq; acumin. integerr. venosa. Mem-  
brana tenuis combinat fol. Panic. ramosa. Fl.  
lutei. Bacca compressa, lutea.

2. *racemosa*. C. scandens; fol. lato-lanceol: fl. lateralibus, pa-  
niculato-racemosis, dente stipulari, unico.  
*Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Jacq. amer. ed. 2.*  
*piñ. tab. 69.*

*Periclymenum &c. Plum. ic. tab. 217. f. 2. Dill.*  
*elth. tab. 228. f. 295.*

*In Jamaica, Barbados, locis confragosis h.*

Altitudo hūa. Rami longi, declinati. Fol. 2-  
pollic. opposita, subpetiol. integerr. nitida.  
Racemi axill. & terminal. oppositi, 2-pollic.  
penduli. Fl. albi, inodori; vel flavescentes,  
odori. Baccæ parvæ, nivæ.

279. HAMELLIA. Cor. 5-lid. Bacca 5-locul: infera, polys-  
perma.

1. *patens*. H. racemis patentibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.*  
*amer. tab. 50. ed. piñ. tab. 72.*

*In Amer. meridion. h.*

Frutex pedat. Fol. petiol. terna, ovat-acumin.  
integerr. utrimq; subtomentosa. Racemi revo-  
luti, sub-6-fl. Cal. & germ. coccineum. Cor.  
miniata, vel lutea, tubo oblong. 5-angul.  
Bacca ovat-oblong.

*arida.*

H. racemis erectis. *Jacq. amer. tab. 71.*

*In silvis Carthaginensibus h.*

Frutex 5-pedal. erectus, ramosus. Fol. 3-4-  
pollic. longa, petiolis in dorso venis, nervoq.  
medio utrimq; rubentibus terna, ovata, acu-  
min. integ. rr. utrimq; subtomentosa. Racemi  
terminal. quaterni, secundi, subdivisi, rubri:  
racemuli ultimi 3-4-fl. pedunculis breviss. ru-  
bris. Fl. pollic. toti subcoccin. inodori. Bac-  
cæ nigræ, succo atro-purpur.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 463

*ventricosa*. H. racemis terminalibus: fl. subsessil. cor. campanulatis, ventricos: fol. ternatis. *Hompt. Journal. des Sçavans* 1783.

In Jamaica.

*axillaris*. H. racemis axillar. patentibus: fol. subsecun. sessil. *Hompt. Journ. des Sçavans* 1783.

In Jamaica.

*patens*. H. racem. terminalibus, patentibus: fl. pedicellat. *Hompt. Journ. des Sçavans* 1783.

280. LONICERA. Cal. 5-dent. Cor. monopet. irregularis (varia; tubulosa, vel campanulata, limbo 5-fid. irregulari: lab. super. 2-4-fid: infer. 3-fid. vel integro). Bacca polysperma, 2-locul. infera.

\* *Periclymena*, caul. volubil.

1. *Caprifolium*. I. fl. terminalibus verticillat. sessilibus: fol. summis connato-perfoliat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 357. Knorr. del. 1. tab. S. 4. Garid. Air. tab. 21.*

*Periclymeno. Matth.*

In Europa australi 24.

Planta subvolub. 6-ped. Fol. opposita, longe ovata, obtuse acumin. concava, glabra, glauca. Verticil. 6-fl. Fl. lab. super. 4-fid. segment. reflexis, mediis brevioribus; infer. lingulato, divaricato, tubo longiore, Cor. ex purpureo-albescens, aut luteola, odora. Nectar. macula lutea in inferiore tubi parte posita, innumeris parvis glandulis melliferis conflans. Baccæ sessil. aurantiacæ, nitidæ, sed rore testæ, ut nitor haud appareat.

2. *sempervirens*. L. verticill. terminalibus aphyllis: fol. summis connato-perfoliat. *Syst. veg. ed. 14. Hort. angl. tab. 7. Knorr. del. tab. 53.*

*Periclymenum &c. Herm. Lugd. tab. 483.*

In Virginia, Mexico h.

Minor in omnibus suis partibus priore. Fol. rotundiora, lucida, subtus magis incana. Fl. fere regular. coccin. nitidi, inodori.

3. *dioica*. L. verticill. terminalibus, aphyllis: fol. omnibus connato-perfoliat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat* . . . . .

4. *Periclymenum*. L. capitul. terminalibus, ovat. imbricat. fol. omnibus distinctis (oppositis, ovatis). *Syst. veg. ed. 14. Blak. tab. 25. Fuchf. 646.*

In Europa media h.

Frutex 6-ped. Fol. pubescent. quandoq. glabra, subtus cœrulescent. Rami purpur. E supremis fol. prodeunt pedunc. 4-6-fl. verticillati. Fl. patentes, rubri, interne flavi, odori. Fruct. rubri.

6. *japonica*. L. caul. volub. fol. omnibus distinctis: fl. terminalibus, binis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia.*

Caul. parum ramosus, hirsutus. Rami oppositi, patentes, 2-phylli: florentes valde hirsuti, unguicul. Fol. infer. pollic. opposita, petiolat. ovata, acutiusc. integerr. villosa, subtus pallida, petiolis hirsutis. Fl. in apice ramorum. Cor. parva, pollic. rubra.

6. *media*. L. capitul. terminalibus: verticillis aphyllis: cor. brevi, gibbo baseos didymo: fol. summis connato-perfoliat. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1776. tab. 3.*

*Habitat . . .*

Caul. & efflorescentia qualis in *Periclymenis*: cor. autem brevis, tubo gibboso, ut in *Chamecerasis*.

\*\* *Chamecerasa*, pedunc. bifloris.

7. *nigra*. L. pedunc. bifloris: baccis distinctis: fol. ellipticis, integerr. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 314.*

*Periclymenum* &c. *Gesn. fasc. 37. tab. 8. f. 48. Bauh. hist. 2. p. 107. Clus. hist. 1. p. 58.*

*In Helvetia, Italia, Gallia h.*

Frutex 3-5-pedal. Rami valde divaricati, villosi. Fol. opposita, breviter petiol. nervosa, iuniora hirsuta, sub-plicata, unde quasi serrata. Stipul. ovat-lanceol. Bract. squamis 2. aridis, & foliol. tribus transversis, latis. Cal. latiuscul. Cor. extus sordide purpur. intus alba, & pubesc. interdum tota alba. Lab. super. erectum, latissim. obtuse 4-dent; infer. integerr. reflexum. Baccæ nigræ. Sem. 5.

8. *satarica*. L. pedunc. bifloris: baccis distinctis: fol. cordatis, obtusis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Tartaria h.*

Caul. orgyal. & ultra. Fol. breviter petiol. glabra. Involuc. lanceol. involuoc. obovata. Cor.

Cor. pallide incarnata; lab. super. 3-part. lacinia media 2-fida; inferiori simplici.

9. *Xylosteum*. L. pedunc. bifloris: baccis distinctis: fol. (serulatis), pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 808. Duham. arbr. 2. tab. 54.*

*Allobrogum* &c. *Lob. ic. 633.*

*Xylosteum*. *Riv. irreg. tab. 120.*

*In Europæ sepibus frigidioribus, collinis, & montanis h.*

Frutex 6-ped. cortice ramorum sature rubente. Fol. ovata, obrusa, vel acuminata, subtus glauco-virid. Fl. exalbidi. Cor. lab. inferius longius. Fruct. obscure rubri.

10. *pyrenaica*. L. pedunc. bifloris: baccis distinctis: fol. oblong: glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*Xylosteum* &c. *Magnol. hort. tab. 209. Duham. arbr. 2. tab. 110.*

*In Pyrenæis, Sibiria &c. h.*

Differt a priore cor. regularibus; ramis divaricatis: fol. glabris.

11. *alpigena*. L. pedunc. bifloris: baccis coadunatis, didymis: fol. oval-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 274.*

*Chamæcerasus*. *Gesn. fasc. 33. tab. 14. f. 44.*

*Periclymenum* &c. *Clus. 1. p. 59. Lob. ic. 173.*

*Xylosteum* &c. *Riv. irreg. tab. 121.*

*In alpinis Helveticis, Italicis &c. h.*

Frutex diffusus, 1-3-pedal. Fol. opposita, quandoq. terna, breviter petiolat. integerr. sæpe dense ciliata, subtus nitida. Bract. 2. Pedunc. axill. Cor. geminæ, intus obsolete sanguineæ, foris dilutiores, rose albido; galea triloba.

12. *cærulea*. L. pedunc. bifloris: baccis coadunatis, globosis: styl. indivisis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. App. tab. 17.*

*Periclymenum* III. *Clus. hist. 58.*

*In Helvetia &c. h.*

Frutex 3-ped. cortice flavo. Fol. oblong. obtusa, integerr. nervosa, subtus dilutiora, opposita, breviter petiolat. iuniora ciliata, adulta pallentia. Stipul. 2. lineares. Bract. 2. lanceol. Pedunc. axill. breves. Cor. geminæ, ochroleucæ. Fruct. cœrul. Sem. sæpe 10.

\*\*\* *Caul. erecto: pedunc. multifloris.*

13. *symphoricarpos*. L. capitul. lateralibus, pedunculat: fol. pe-  
Tam. I. G g

tiolat. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elsh. tab. 268. f. 370. Du-Hamel. arbr. 2. tab. 82.*

*Vitis &c. Hortul. angl. tab. 20. Pluk. phyt. tab. 420. f. 6.*

*In Virginia, Carolina.*

Fruticul. 2-3-cubital. totus ramosus, ramis oblique vergentibus, subfufcis. Fol. opposita, oblongo-rotunda, subhirsuta, venis obliquis, supra virid. subtus subglauca. Fl. axill. fasciculati, parvi, albido-herbac. Fruct. globosi, purpurei.

14. *bubalina*. L. capitul. terminalibus, pedunculat. fol. oblong. integr. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Rondeletia capitata. Fl. Cap.*

*Ad cap. b. Spet.*

Arbucula. Fol. opposita, breviter petiolat. venosa. Capitulum involuc. breviss. polyphyll. 4-6-fl. Cor. fig. *Symphyti.*

15. *Diervilla*: L. racemis terminalibus: fol. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Dunam. arb. 1. tab. 87.*

*In Acadia, Novboraco h.*

Caul. fruticosus, petal. raro ramosus. Fol. opposita, breviter petiolat. ovato-lanceol. glabra. Fl. fasciculati, lutei.

16. *corymbosa*. L. corymb. terminalibus: fol. ovatis, acutis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Periclymenum &c. Fawill. peruv. 1. tab. 45.*

*In Peru h.*

Frutex 12-ped. ramosus. Fol. opposita, petiolat. pulchre virent. Cor. sanguinea. Fruct. Olivæforma, & col.

*Mangolica*, L. *Pall. It. 3. Gmel. Sib. 3. tab. 25. sed fl. capiflores.*

*In Duuria h.*

Frutex L. *Xylosteo minor*, erectus, ramis opposit. rectis, patentibus. Fol. rariora, opposita, petiol. ovata, serrata, subtus incana. Pedunc. terminal. inter ultimum par foliorum, 2 fid. Singuli sustinentes fl. 2-4-5. sessil. Cor. parva, campanulata, flavescenti-alba.

281. *TRIO-STEUM*. Cor. monopet. subæqual. Cal. longitudine cor. Bacca 3-locul. 1-sperm. infera.

1. *perfoliatum*. T. fl. verticillat. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elsh. tab. 293. f. 378.*

*In Amer. Septentr. h.*

Caul. pl. 2-ped. pilosi, pallide virentes; geniculis distantibus. Fol. perfoliata, palmum, & ultra longa, 3. unc. lata, acumin. in medio latiora: axillar. min. rugosa, subhirsuta, integerr. margine undulato, dilute virid. subtus pallidiora. Fl. ad genicula verticilli: villosi, obscure purpur. punctul. albicantibus. Bacca lutescens.

2. *angustifolium*. T. fl. oppositis, pedunculat. *Syst. veg. ed. 14.*  
Periclymenum &c. *Pluk. alm. tab. 104. f. 2.*

In *Virginia* h.

Caul. ped. & ultra; pubescent. in 6-8. nodos distincti. Fol. 3-4. unc. opposita, mucronata, in medio latiora, pubescent. Fl. axillar. verticillati, ochroleuci. Bacca oval. flava.

282. MORIN-Fl. aggregati, monopet. Stigm. 2-fid. Drupæ DA. aggregatæ.

1. *umbellata*. M. erecta: fol. lanceolato-ovat. pedunc. confertis. *Syst. veg. ed. 14.*

Bancudus &c. *Rumph. Amb. 3. tab. 98.*

In *India*.

Arb. fol. *Cephalanthi*, 4-9. pollic. longis, 3. latis, oppositis, petiolar. integerr. supra obscure viridibus. Singulis pedunc. capitula infident, axillar. forma strobili Pini, magnitudine Prunorum, ex meris verrucis constantia. In cuiusvis apice longum, angustum, & albicans petalum. Petala obliqua ut in *Papaya*. Fructus non edulis.

2. *citrifolia*. M. arborea; peduncul. solitariis. *Syst. veg. ed. 14. Zann. tab. 124.*

Bancudus latifol. *Rumph. Amb. 3. tab. 99.*

Coda-pilaua. *Hort. mal. 1. tab. 52.*

In *India* h.

Fol. grandia, petiol. ovat-acum. crassa, mollia, sature virid. nitentia, plerumq; spithamea, binas palmas lata. Pedunc. longi. Petal. 4-5. oblong. stelliform. cuspidata, intus candida, extus e viridi-albicant. Fruct. oblong. Pini-form. albid. odore foetido, stercoraceo.

3. *Royoc*. M. procumbens. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 16.*

Royoc. &c. *Plum. sp. tab. 26.*

Periclymenum &c. *Pluk. alm. tab. 212. f. 4.*

In *Amer. calidiora* h.



Truncus cortice cinereo. Fol. opposita, petiolat. obverse-ovat. vel lanceol. integerr. nitida. Fl. axill. peduncul. glomerati. Cor. alba. Fructus flavus, succulentus, foetidus.

- muscosa.* M. arborea; capitul. terminalibus, sessilibus. Jacq: *amer. tab. 43. ed. piñ. tab. 66.*  
*In Martinica h.*  
 Arbor 15-pedal. Rami dichotomi, Muscis, & Algis vestientibus semper foedi. Fol. 3-4. pollic. longa, opposita, breviter petiol. lanceol-ovata, acumin. integerr. venosa, glabra. Stipul. inter petiol. pl. setaceæ, ferrugin. Fl. exigui. Paleæ cor. intermixtæ. Cor. alba. Sem. 2. hinc convexa, inde plana.
283. CONO-CARPUS. Cal. campanulat. Cor. 5-petal. aut nulla. Sem. nuda, solitar. infera. (Fl. aggregati, excepta racemosa.)
1. *erecta.* C. erecta: fol. lanceolat. Syst. veg. ed. 14. Jacq: *amer. tab. 52. f. 1. edit. 2. piñ. tab. 78. Casteb. car. 2. tab. 33.*  
 Alni &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 161. f. 2.  
 Alnus &c. Pluk. alm. tab. 240. f. 3.  
 Innominata. Plum. ic. tab. 144. f. 2.  
*In Jamaica, Brasilia &c. maritima h.*  
 Arb. 30-pedal. Fol. multa, alterna, petiolat. super. angustata; infer. cuneiform. integerr. pinguia. Racem. axill. & terminal. simpl. laxi. Fl. exigui, flavescent. Strobili subrotundi, squamis imbricat. reflexis, incanis.
2. *procumbens.* C. procumb. fol. obovatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq: *amer. tab. 52. f. 2. ed. 2. piñ. tab. 260. f. 22. quoad folia.*  
*In montibus maritimis Cubæ h.*  
*An prius varietas?* Fol. sub-pollic. obtusa cum acumine, vel subrotund. nitida. Fl. ut in priore, sed omnia min.
3. *racemosa.* C. fol. lanceol-ovat. obtusiusc: fructibus segregatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq: *amer. tab. 53. ed. 2. piñ. tab. 79.*  
 Mangle &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 187. f. 1.  
*In maritimis arenosis Caribæarum h.*  
*Pet. 5. subrotund: in prioribus nulla. Stam. huic 10.*  
 Arbor procera, a terra in 3-4. truncos divisa. Fol. 3-poll. opposita, petiolis rubentibus su-

bovalia, obtusa, integerr. crassiusc. nitida, ad tactum pinguis, satore virid. Fl. parvi, albi, odori. Fruct. simil. *tetradynamis filiculosis*.

284. KUHNIA. Flos compositus, stictulosis: sem. solitar. pap-po plumoso. Receptac. nudum.

1. *eupatorioides*. K. *Syst. veg. ed. 14. Lin. iun. dec. 21. tab. 11. Eupatorium* &c. *Ard. Sp. 2. tab. 20. Pluk. alm. tab. 87. f. 2?*

*In Pennsylvania 24.*

*Differt ab omnibus fl. compositis anth. separatis; etiam ab Eupatorio fol. alternis. Caul. erecti, sesquiped. læves, rigiduli. Fol. alterna, petiol. lato-lanceol. nuda, subrugosa, subtrus venosa, serraturis mediis ma: subuncial: caulina lineari-lanceol. integerrima. Rami alterni, e medio caule. Corymb. parvi. Cor. subalbica. Stam. albo-flavescent.*

285. ERI-  
THALIS. Cor. 5-raro 6 part. lacin. (linearibus) recurvis. Cal. urceolatus. Bacca 10-locul. infera.

1. *fruticosa*. E. *Syst. veg. ed. 14.*

*E. odorifera. Jacqu. amer. tab. 173. f. 23. ed. 2. piñ. tab. 260. f. 20. Brown. Jam. tab. 17. f. 3.*

*Sambucus* &c. *Plum. ic. tab. 249. f. 2.*

*In Jamaica, Martinica h.*

*Arb. elegans, 15-ped. ramosa. Fol. 2-pollic. opposita, petiolat. subovat. obtusa, cum exiguo acum. integerr. satore virid. nitida. Racemi axillar. oppositi. Fl. caduci. Cor. alba, odora. Baccæ parvæ, rotundæ, purpur.*

*inodora.* E. *fruticosa, procumb. Jacqu. Amer. pag. 72.*

*In Curacao h.*

*An var. E. fruticosa? Frutex 2-pedal. ramis procumbentibus, diffusis. Fl. & baccæ min. Fl. inodori. Baccæ plerumq. albidæ.*

286. MENAIS. Cor. hypocrat. Cal. 3-phyll. Bacca 4-locul. Sem. solitar.

1. *tupiaria*. M. *Syst. veg. ed. 14. Loefl. it. 306.*

*In Amer. meridon. h.*

*Caul. teretes, subvillosi. Fol. alterna, ovata, integerr. aspera. Cor. lacin. rotundat. Bacca globosa.*

287. MUS-  
SÆNDA. Cor. infundibul. Stigm. 2. crassiuscula. Bacca oblonga, infera. Sem. 4-fariam disposita.

472 PENTANDRIA MONOGYNIA.

1. *frondosa*. *M. panicula fol. coloratis. Syst. veg. ed. 14.*  
*Bur. Zeyl. tab. 76.*  
*Folium &c. Rumph. amb. 4. tab. 51.*  
*Belilla. Hort. Mal. 2. tab. 18.*  
*Ophiorrhiza lanceol. Forsk. Æg. monente Vahl,*  
*In India h.*  
*Frutex ramis tortuosis, sinuosis. Fol. opposita,*  
*etiam terna-plura, petiol. ovata, integerr. in*  
*cuspidem angustum terminata, nervosa, pilosa.*  
*Panic. terminal. dichotoma, hirsuta. Cor. in-*  
*tus scarlatina, extus albescens, aut subflavesc.*  
*umbilico flavo. Bacca oblon-rotunda, subpi-*  
*lota, flava, carne viridi.*
2. *spinosa*. *M. spinosa: fl. sessilibus, aggregatis. Syst. veg.*  
*ed. 14. Jacq: amer. tab. 49. ed. 2. piñ. tab.*  
*71.*  
*Palicourea Guianens. Aubl. Guian. tab. 66.*  
*In Martinica, Carthagenæ sylvis h.*  
*Frutex 10-ped. Rami ultimi spinis quaternis cru-*  
*ciatim positis. Fol. petiolat. magnitudine va-*  
*ria, obovata, integerr. venosa, utrimq. sub-*  
*hirsuta. Cor. candida, odora. Bacca prius*  
*flavescens, dein fusca.*
288. **MATHIOLA.** *Cor. (longiss.) tubulosa, indivisa, supera. Cal.*  
*integer. Drupa nucleo globoso.*
1. *scabra*. *M. fol. subrotundo, aspero: fructu nigricante.*  
*Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 173. f. 2.*  
*Rategui &c. Zan. hist. tab. 75?*  
*In America h.*  
*Arbor ramis divisis. Fol. sparsa, petiolat. ovata,*  
*obtusa, integerr. ad apices ramorum conferta,*  
*& min. Pedunc. longi, subdivisi, bract. pin-*  
*natis intercepti. Drupa globosa, calyce co-*  
*ronata.*
289. **MIRABILIS.** *Cor. infundibulif. supera. Cal. inferus. Necta-*  
*rium globosum, germen includens.*
1. *dichotoma*. *M. fl. solitar. axillar. erectis, sessilibus. Syst.*  
*veg. ed. 14.*  
*Jalapa &c. Martin. cent. 1. tab. 1.*  
*In Mexico.*  
*Simil. sequenti, sed differt, præter fl., fol.*  
*auritis.*
2. *Jalapa*. *M. fl. terminalibus, congestis, erectis. Syst. veg.*  
*ed. 14. Rumph. amb. 5. tab. 89. Black. tab. 404.*  
*Knorr. del. 1. tab. 3. Sabb. hort. 2. tab. 11.*  
*In India utraque.*

PENTANDRIA MONOGYNIA. 473

Caul. 4-ped. herbac. ramofi. Fol. opposita, breviter petiolat. cordat-lanceol. satute virid. Cor. col. varia.

3. *longiflora*. M. fl. congestis, longiss. terminalibus, subnutantibus: fol. subvillosi. *Syst. veg. ed. 14. Ad. holm. 1755. tab. 6. f. 1. Hern. mex. f. 2.*

*In Mexicæ frigidis montibus.*

290. *CORIS*. Cal. 10-dent. Cor. subringens, 5-fid. Caps. 5-valv.

1. *monspeliensis*. C. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Europæ arenosis maritimis, & in collibus siccis*  
 ©. 24.

Caul. fruticosus, palmar. ruber. Fol. alterna, sparsa, linearia, patentia, crassiusc. succulentata, ciliata. Fl. capitato-spicati. Cor. ex purpureo-cærul.

291. *BROSSÆA*. Cor. truncata. Cal. carnosus. Caps. 5-locul. polysper.

1. *coccinea*. B. frutesc. fl. coccin. fruct. nigro. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 64. f. 2.*

*In Amer. calidiore h.*

*Planta obscura*. Planta frutescens, ramis alternis, lignosis. Fol. alterna, petiolat. simplicia, ovata, serrata. Fl. terminal. rariores, alterni.

292. *VERBASCUM*. Cor. rotata, subinæqual. limbo 5-fido. Stam. inæqualia. Caps. 2-locul. 2-valv.

*In plerisque speciebus Stam. sunt inclinata, & inæqual. villisque coloratis inferne vestita.*

1. *Thapsus*. V. caul. simpl. fol. decurrentibus, utrimq. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Bluck. tab. 3. & 502. Ludw. ed. tab. 124. Knorr. del. 2. tab. V. Fl. Dan. 631. Morif. Hist. 2. f. 5. tab. 9. f. 1. Sabb. hort. 2. tab. 53.*

*Verbafco 1. Maith.*

*In Europæ glareosis sterilibus h.*

Caul. 6-ped. leviter alatus, tomentosus. Fol. magna, alterna, cruciata, longe ovata, & elliptica, undulata, obiter incisa. Fl. multi, mausc. in longum thyrsus spicati. Cor. pallide lutea, alba, vel flava.

2. *Thapsoides*. V. caul. ramoso: fol. decurrentibus. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 856.*

*In locis saxosis, & collibus h.*

*Hybrida V. Thapsi. Fol. totaliter non decurrunt, & minus alba.*

3. *Boerhaavii*. V. fol. sublyratis: fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 273. Tilli pis. tab. 50.?*  
*In Europa australi.*  
 Fol. spathulata, sinuata, supra nudiusc. subtus subtoment. Spica V. *Thapfi*, fl. non confertiss. sed ad bracteas singulas pl. maioribusque. Cor. lutea, genitalibus purpur.
4. *phlomisoides*. V. fol. ovat. utrimque tomentosis; inferior. petiolat. *Syst. veg. ed. 14. Moench. haff. tab. 4.*  
*In Italia, Germania ♂.*  
*Tomentum per aetatem evanescit.* Caul. erect. spicat. valde tomentosus. Fol. crenata. Racem. spiciform. ex bracteis sparsis, lanceol. Fl. intra singulas bract. 4. Cor. pallida, lineol. rubris. Stam. purpur. Caps. oblong.
5. *Lychnitis*. V. fol. cuneiformi-oblong. (pulverulent. imis petiolat.). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 586. Bauh. hist. 3. pag. 812. 813.*  
*In Europæ ruderalis cultis ♂.*  
 Species omnium maxima. Caul. 3-ped. ramosus. Fl. parvi, lutei, aut albi.
6. *nigrum*. V. fol. cordat-oblong. (inferioribus) petiolat. duplicato-ferrat. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. pag. 870.*  
 Verbasco secundo, e terzo. *Matth.*  
*In Europa ad pagos, vias 24.*  
 Caul. 3-pedal. angulat. ruber, villis ramosis. Fol. supra nigro-viresc. glabra, subtus albida. Spica rara. Fl. multi, flavi, vel albi. *Var. humilior; fl. infundibulif. herbac. passim prolifero. Gmel. Sib. 4. tab. 47.*
7. *phœniceum*. V. caul. subnudo, racemoso: fol. radical. ovatis, crenatis, nudis, rugosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 2. tab. 125.*  
*In Germania, Carniola &c. ♂.*  
 Caul. erectus, simpl. 2-pedal. villosus. Rami ex alis infimis. Fol. caulina cordata, sessil. rugoso-venosa. Racem. pedal. Pedunc. simpl. solitar. Cal. villosus, fol. inferior. fere min. Cor. fature purpur. Filam. purpur. barbata, barba alba.
8. *Blattaria*. V. fol. amplexicaulibus, oblong. glabris: pedunc. solitar. *Syst. veg. ed. 14. Swebb. hort. 2. tab. 56.*  
*In Europa australis locis argillosis ♂.*  
 Caul. erect. 2-ped. Fol. fature virid. nitida, oris

crispis, & dentatis: ima sinuata; super. ovat-lanceol. ferrata. Spica rara. Cor. flava, vel alba, staminibus purpur. Caps. rotunda.

9. *sinuatum*. V. fol. radicalibus pinnatifido-repandis, tomentosis: caul. amplexicaulibus, nudiuscul. rameis primis oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Cum. hist. tab. 403.*

Verbasco laciniato. *Matth.*

b. V. græcum &c. *Tour. it. 1. tab. 335.*

In Etruria, *Monspelii &c. 8.*

Caul. pl. 2-ped. ramosi, subhirsuti. Fol. caulina oblonga, undulata, subdecurrent. Fl. laxè spicati. Cor. lutea. Stam. purpur. tomento albescente.

10. *Osbeckii*. V. caul. folioso: fol. incisfis, nudis: pedunc. 2-fl. calycibus lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Blattaria &c. *Tourn. it. 2. tab. 83. Buxb. cent. 5. tab. 32.*

In Hispania; circa Bosphorum.

Caul. semiped. & ultra, simplex subtoment. Fol. radical. ovalia, *Bugulæ* similia, pollic. petiolat. undulata, purpur. glabra: caulina min. leviter tomentosa. Fl. spicati, magni, virescent. lituris luteis.

11. *spinosum*. V. caul. spinoso, frutesc. folioso. *Syst. veg. ed. 14. Leucioium spinosum. Alp. exot. tab. 36.*

In Creta b.

Caul. pl. 2-ped. lignosi, ramosi, tomentosi. Fol. fasciculi sessil. alterni. Fol. oblonga, ferrata, subtomentosa. Pedunc. laxè spicati. Cor. ex albo-flava. Stam. purpur.

12. *Myconi*. V. fol. radicalibus, lanatis: scapo nudo. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 277. Trew. chret. tab. 57.*

Auricula &c. *Dalech. hist. 837. Bauh. hist. 3. pag. 869.*

In Pyrenæorum nemorosis 24.

Scap. 2-3-dodrant. purpurasc. hirsuti. Fol. Boraginis forma, repanda, crassa, nervosa, pilis ambitu rufescentibus. Cor. cœrul. Stam. lutea.

293. **DATURA**. Cal. tubulos. angulat. deciduus. Cor. infundibulif. 5-angulato-plicata. Caps. 4-valv. polysperma, sæpe echinata. Odor plantæ virosus. Fl. magni, interfoliacei, solitarii.

1. *ferox*. D. pericarp. spinosis, erectis, ovatis; spinis sum-

mis maximis, convergentibus. *Syst. veg. ed. 14.*  
*Mont. in Zan. tab. 162.*

*Stramonium. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 2. f. 4.*  
*Barr. rar. ic. 1112.*

*In China* ☉.

Simil. sequent. sed humilior, latior; fol. minus glabra, sinuata. Fl. mi: albi. Caps. 4. spinis, suprenis maximis.

2. *Stramonium.* D. pericarp. spinosis, erectis, ovatis. fol. ovatis glabris. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. 436. Black. tab. 313. Knorr. del. 1. tab. S. 13. Sabb. hort. 1. tab. 92. Garid. Aix. tab. 86.*

*In Amer. nunc indigena Europæ* ☉.

Caul. latus, diffusus, dichotomus. Fol. magna, longe petiol. angulata, flaccida, venosa. Fl. magni, albicant.

3. *Tatula.* D. pericarp. spinosis, erectis, ovatis: fol. cordat. dentat. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Insulariæ ruderalis* ☉.

Simil. D. *stramonio*. Caul. purpurasc. punctis albis adpersus, ad angulum acutum divisus, lævis. Cor. pallide cœrul.

4. *suffuosa.* D. pericarp. nutantibus, globosis, tuberculatis: fol. ovatis angulatis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 1. tab. 93. Rumph. amb. 5. tab. 243. f. 2. b. Solanum &c. Knorr. del. 1. tab. S. 11.*

*In Ægypto* ☉.

Caul. rufus punctis albis. Cor. extus violac. intus alba, sæpe duplicata.

5. *Metel.* D. pericarp. nutantibus, globosis, spinosis: fol. cordat. subintegris, pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 158. Kniph. cent. tab. 24. Rumph. amb. 5. tab. 87.*

*Hummatu. H. Mal. 2. tab. 28.*

*In Asia, Africa* ☉.

Cal. non angulatus, sed teres, tumidus, peniformis. Cor. simpl. plerumq. alba.

6. *arborea.* D. pericarp. nutantibus, glabris, inermibus: caul. arbor. *Syst. veg. ed. 14.*

*Stramonoides &c. Few. peruw. 2. tab. 46.*

*In Peru* ☿.

Arbor ramis capitulum efformantibus. Fol. veluti racemosa, longe petiolat. ovato-oblonga, nervosa, supra saturata, subtus dilute virid. utrimq. submentosa. Fl. 6-pollic. albi, apice lineis subluteis notato.

7. *lavis*. D. caul. herbac. pericarp. erectis, ovatis, inermibus, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. D. inermis. Jacq. App. tab. 81.*  
Habitum cum D. *Stramonio* convenit, sed altior. Differt potissimum a D. *arborescens* caps. erecta, glabra.
274. **HYOSCYAMUS**. Cor. infundibulif. obtusa, inæqualis, 5-fid. Stam. inclinata. Caps. operculata, 2-locul.
1. *niger*. H. fol. amplexicaul. sinuatis: fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 550. Ludw. ed. tab. 85. Knorr. d.l. 1. tab. P. 3. Riv. irreg. tab. 102.*  
*Hiosciamus. Math.*  
*In Europæ ruderalis pinguis ♂.*  
Tota planta longiusc. pilis barbata, foetida. Caul. cubital. ramulosus. Fol. cinereo-virent glutinosa. Spicæ heteromallæ. Cor. fusca, cum lineis purpureis.
2. *albus*. H. fol. petiolat. obtusis, sinuatis: fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 111. Sabb. hort. 1. tab. 91. Math. Clus. hist. 3. pag. 118.*  
*In Europa ♂.*  
Fol. albiora priore. Cal. striis elevatis. Cor. albescens, fauce atropurpur. aut viridi.
3. *aureus*. H. fol. petiolatis, acutis, dentat. fl. peduncul. fructibus pendulis. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. pag. 84.*  
*b. H. creticus &c. Alp. exot. tab. 98.*  
*In Creta, Oriente; ad muros Unelæ &c. 24.*  
Caul. ped. pilosus. Fol. lobata, denticul. petiolis valde pilosis. Pedunc. lateral. Cor. aurea, fauce atro-purpur. striata. Stam. purpur.
4. *muticus*. H. fol. petiolat. ovatis, acutangulis; calycibus muticis; bract. indivisis. *Syst. veg. ed. 14. Alp. exot. tab. 192. ?*  
*H. Datura. Forsk. Æg. tab. 5. monente Vahl.*  
*In Ægypto, Arabia ♂.*  
Caul. pedal. teretiusc. subpubesc. ramulosus. Fol. alterna, acuta, integerr. lævia pallescent. Floral. subpetiol. ovata, seu ovat-oblong. alternis fl. binis, alternis solitar. Racem. secundus, apice incurvatus. Cor. primum extrus viridis, dein albida, intus atro-purpur. Stam. purpurea.
5. *pusillus*. H. fol. lanceol. dentat. fl. inferioribus binis; ca-



lycibus spinosis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 37. f. 5.*

*In Persia* ☉.

Caul. palmar. pilosus. Fol. alterna, pinnatif. pilosa, petiolis longis, pilosis. Floral. bina, integra. Cal. 10-angulat. Cor. flava, fauce nigra, latere inferiore divisa ultra limbum.

6. *physaloides*. H. fol. ovat. integerr. calyc. inflatis, subglobosis. *Syst. veg. ed. 14. Aman. acad. 7. tab. 6. f. 1.*

*In Sibiria* ☿.

Caul. ped. simpl. teretes, hirti. Fol. alterna, petiolat. lurido-virid. venosa, hirta, super. sensim maiora. Fl. terminal. peduncul. fasciculati. Cal. breviss. Cor. erecta, purpurasc.

7. *Scopolia*. H. fol. ovat. integris; calycibus inflatis, campanulat. lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Scopolia* &c. *Jacq. Obs. 1. tab. 20.*

*Circa Idriam in sylvis* ☿.

Caul. erectus, fere pedat. 2-fid. Fol. petiolat. lanceol-ovata, subrugosa, patentia: caulina alterna, solitar. sub bifurcatura terna, quorum 2. adproximata: ramea gemina, quorum alterum paulo minus. Fl. ramei, axill. solitar. penduli. Cor. *Atropæ* obtusa, extus ferrugin. striis aliquot pallidis, intus flava.

295. *NICOTIANA*. Cor. infundibulif. limbo plicato. Stam. inclinata. Capf. 2-valv. 2-locul.

1. *Tabacum*. N. fol. lanceol-ovat. sessilibus, decurrentibus: fl. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 146. Sabb. hort. 1. tab. 89. Ludw. ed. tab. 167. Knorr. del. 1. tab. 11.*

*Blennochoes. Reneal. Sp. tab. 38.*

*In America* ☉.

Altitudo humana. Fol. alterna, villosa, glutinosa. Fl. racemosi. Cor. rosea.

2. *fruticosa*. N. fol. lanceol. subpetiol. amplexicaulibus: fl. acutis: caul. frutescente. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ad cap. b. Spei, China* ☿.

Simil. priori.

3. *rustica*. N. fol. petiolat. ovat. integerr. fl. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 437. Sabb. hort. 1. tab. 90.*

*In America* ☉.

Caul. pedat. Fl. subcapitati. Cor. viridi-flavescc. Capf. non adeo oblonga.

4. *paniculata*. N. fol. petiolat. cordat. integerrimis: fl. paniculat.

obtusis, clavatis. *Syst. veg. ed. 14. Few. Peruv.*  
1. tab. 10.

In Peru ☉.

Differt a priore caul. altiore, teneriore, paniculato: cor. angustioribus; limbo breviss. obtusiss: calycibus, capsulisq. acutis.

5. *urens*. N. fol. cordat. crenatis: racemis recurvatis: caul. hispido, pruriginoso. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 211.*

In Amer. meridion. h.

Arbor tota hispida. Fol. N. *rusticae*, cordat-ovata, costis spinosis, hirsutis. Racemi alterni, compositi, secundi, revoluti, toti hispidi. Cal. hirtus. Cor. campanul. albida. Caps. bicornis, glabra.

6. *glutinosa*. N. fol. petiolat. cordat. integerr: fl. racemosis, secundis, subringentibus. *Syst. veg. ed. 14. Ad. holm. 1753. tab. 2.*

In Peru ☉.

Fol. glutinosa, magis cordata. Racemi pauci, longi. Cal. una lacinia reliquis duplo ma: Cor. rosea.

7. *puffilla*. N. fol. oblong-ovalibus, radicalibus: fl. racemosis, acutis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 185. f. 2.*

In vera Cruce.

Fol. obtusa, rugosa. Cal. breviss.

296. ATRO-PA. Cor. campanul. Stam. distantia. Bacca globosa, 2-locul.

1. *Mandragora*. A. acaulis: scap. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 364. Sabb. hort. 1. tab. 1. Mill. ic. tab. 173. Lob. ic. 267.*

Mandragora mactchio. *Matth.*

In Italia, Helvetia, Hispania, Sibiria &c. apertis montosis.

Radix bicruris. Fol. semipedal. ovat. lanceol. undulata, foetida. Cor. ex caeruleo-purpureo. Bacca magna, rotunda, lutea.

2. *Belladonna*. A. caul. herbac. fol. ovat. integris. (geminitis). *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 309. Mill. ic. 62. Black. tab. 564. Sabb. hort. 1. tab. 3. Kniph. cent. 9. tab. 16. Ludw. ed. tab. 128.*

Solano maggiore. *Matth.*

In Europa montosis sylvis 24.

Caul. 6-ped. Fol. petiolat. sat ure virid. rigida, venosa. Fl. axil. peduncul. cernui. Cor. tubulosa, albido-fusca, cum lineis nigris. Bacca nigra, lucida, cal. persistente. *Var. fol. min.*

3. *physaloides*. A. caul. herbac. fol. sinuato-angulat: calycibus clausis, acutangulis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 4. tab. 98.*

Alkekengi &c. *Fewel. peruv. tab. 16.*

*In Peru* ☉.

Caul. erectus, 3-4-cubital. patulus, ramis angulatis. Fol. alterna, per petiolum decurrent. oblonga, obruse sinuata (*Datura*), glabra. Pedunc. ad latus petiol. solitar. nudi, 1-fl. Cal. ovarius, basi excisus, profunde 5-part. foliol. sagittato-ovat. Cor. campanulata, parum 5-loba, obtusa; limbo subplicato; cœrul. fundo albo, radiato maculis 5. cœrul. Bacca cernua, exsucca, testa cal. mæ.

4. *solanacea*. A. caul. fruticoso: fol. subovat: pedunc. solitariis: cor. campanul. *Syst. veg. ed. 14.*

S. lignosum &c. *Comm. hort. 2. tab. 96.*

*Ad cap. b. Spei litora maritima* ☿.

Caul. 6-ped. minus ramosus, subangulat. Fol. alterna, sæpius ex gemmis plura, petiolat. integerr. nuda. Pedunc. ex ll. 1-fl. fl. pendulo. Cor. albo-purpureasc. lacin. erectis, lanceolat.

5. *arborescens*. A. caul. frutescent. fol. oblong: pedunculis confertis: cor. revolutis. *Syst. veg. ed. 14.*

A. *Solanacea*. *Allion. aud. ?*

Belladonna &c. *Plum. ic. 46. f. 1.*

*In Amer. merid.*

Fol. alterna, lanceol. integerr. venosa. Pedunc. axill. Cor. alba. Bacca subrot.

6. *frutescens*. A. caul. fruticoso: fol. cordat-ovat. obtusis: peduncul. confertis: *Syst. veg. ed. 14. Barn. ic. 1173.*

*In Hispania* ☿.

Habitus, & omnia *Physalid. somniferæ*, ut limites generum in solo cal. 5-part.

297. **PHYSA-LIS.** Cor. rotata. Stain. conniventia. Bacca intra calycem inflatum, clausum; 2-locularis.

\* *Perennes.*

1. *somnifera*. P. caul. fruticoso: ramis rectis: fl. confertis.  
*Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. p. 85.*  
*In Mexico, Creta, Hispania &c.*  
 Caul. pedal. tomentoso-cinereus. Fol. ovata,  
 integerr. quandoq. geminata, cinerea. Cor.  
 virid. Bacca parva, rubra.
2. *flexuosa*. P. caul. fruticoso; ramis flexuosis: fl. confertis.  
*Syst. veg. ed. 14.*  
*Peuetti. H. Mal. 4. tab. 55.*  
*In India h.*  
 Habitus, & statura prioris: differt fl. minor.  
 ramis bifariam valde flexuosis; hinc fol. quasi  
 distiche disposita, flexuræ angulis exterioribus  
 inserta.
3. *arborescens*. P. caul. fruticoso: fol. ovat. pilosis: fl. solitar.  
 cor. revolutis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. dict.*  
*tab. 206. f. 2.*  
*In Campechia h.*  
 Fol. opposita, ovat-lanceol. integerr.
4. *curassavica*. P. caul. fruticoso: fol. ovat. tomentosis. *Syst.*  
*veg. ed. 14.*  
*Solanum &c. Pluk. alm. tab. III. f. 5.*  
*In Curassao h.*  
 Caul. sesquiped. e viridi-purpur. Fol. alterna,  
 petiol. subdent. crassa, viridi-nigricant. Fl.  
 axill. solitar. Cor. pallida.
5. *viscosa*. P. fol. geminis, obtusis, repandis, subtoment.  
 caul. herbac. superne paniculato. *Syst. veg. ed.*  
*14. Jacq. hort. tab. 136.*  
*Alk-kengi &c. Dill. elth. tab. 10. f. 10.*  
*In Virginia, Bonaria &c.*  
 Planta subtoment. foetida. Caul. pl. sesquiped.  
 basi ramosi, debiles. Fol. alterna, ramea sæpe  
 opposita, petiolat. pallide virent. Fl. pe-  
 duncul. solitar. Cal. campanif. Cor. flava, uni-  
 color. Bacca pisiform. lutea.
6. *pensylvanica*. P. fol. ovat. obtusis, subrepandis, nudiuscul: fl.  
 geminis: caul. herbac. *Syst. veg. ed. 14.*  
*In Virginia &c.*  
 Caul. multi, nunc procumbent. nunc erecti,  
 vix pedal. subflexuosi, tomento obsoleto ad-  
 spersi, apice ramosi. Fol. alterna (*Boerhaa-  
 via*) petiolat. subtus obsolete tomentosa, ad

fl. gemina. Pedunc. axill. solitar. Cal. basi re-  
tus. Cor. lutea, fundo obscuriore. Bacca  
piliform. globosa, rubra.

7. *Alkekengi*. P. fol. geminis, acutis, integris: caul. herbac.  
inferne subramoso. *Syst. veg. ed. 14. Black.*  
*tab. 161. Knorr. del. 1. tab. 1. 4. Ludw. ed.*  
*tab. 151. Sabb. hort. 2. tab. 63.*

*Solanum vesicarium. Garid. tab. 6.*

*Solanum Alicacabo. Matth.*

*In Italia, Germania, Japonia scrobibus 24.*

Caul. cubital. subrubens. Fol. petiolat. cordat-  
acumin. Pedunc. axill. 1-fl. Cor. subalbida,  
villosa. Fructus, & cal. magni, maturi coc-  
cin.

8. *peruviana*. P. pubesc. fol. cordat. integerrim. *Syst. veg. ed.*  
*14.*

*Lima 24. H.*

Planta simil. *Datura Metel.* Caul. altus, divari-  
catus. Fl. solitar. penduli, lutei, umbilico  
maculis 5. fuscis, fauce hirsuta.

\*\* *Annua.*

9. *angulata*. P. ramosiss. ramis angulat. glabris: fol. ovat.  
dentat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Halicacabum. Cam. hort. tab. 17.*

*Alkekengi &c. Dill. elth. tab. 12. f. 12. b. tab.*  
*11. f. 11.*

*In India utraque ☉.*

Fl. parvi, albid. Cal. angulat. Bacca lutea.

10. *pubescens*. P. ramosiss. fol. villosa-viscidis: fl. pendulis.  
*Syst. veg. ed. 14.*

*Alkekengi &c. Fawil. peruv. 3. tab. 1.*

*Solanum &c. Moris. hist. 3. f. 13. tab. 3. f. 24.*

*In India utraq: præcipue in Virginia ☉.*

Cor. maculae fusca, nec pallida. Bacca globo-  
sa, lutea, villosa-viscida.

11. *minima*. P. ramosiss. pedunc. fructiferis fol. villosa lon-  
gioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

*Solanum &c. Sabb. hort. 2. tab. 64. Herm. Lugd.*  
*tab. 571. Hort. mul. 10. tab. 140. f. 71.*

*In India ☉.*

Planta parva, pilis oblong: ad ramorum alas.  
Caulic. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

scant. fauce fuscis maculis notata. Cal. & bacca herbac.

12. *pruinosa*. P. ramosiss: fol. subvillosis: pedunc. strictis. Syst. veg. ed. 14.

In America ☉.

Fol. antecedentium 9. 10. 11. sed anth. flavæ, nec cœrul. Rami teretes, supra plani, villosi. Fol. villoso-viscosa: Fl. cernui. Bacca subturbin. lutea.

13. *barbadensis*. P. ramosiss: fol. cordat. villosis: calycibus frutesc. pendulis, ovatis, acutis, 3-gon. fructu maioribus. Syst. veg. ed. 14. Jacq: misc. 2.

Alkekengi &c. Dill. elsh. tab. 9. f. 9.

Habitat in Barbados ☉.

Caul. erectus, teres, crassus, villosus, ramis divaricatis: Fol. longe petiol. acuta, dentat. mollia, utrimq. subvillosa, sed non viscida. Pedunc. breves. Fl. cernui. Cor. ochroleuca, cum maculis ad basin 3 fuliginosis. Fruct. penduli, decidui. Cal. inflatus, cinereus, venosus. Bacca subrotunda, pallide virens, nitida, glaberrima, acidula.

Ob anth. purpur; fol. non viscosa; defectum pruinæ; peduncul. floriferos nutantes, non admodum longos, a P. pruinosa distincta videtur.

- ramosa*. P. fol. simplicibus, geminisq. late ovatis, acutis, sinuato-dentat. subvillosis. Forsk. Suppl. Æg.

In Ægypto.

Habitus P. Alkekengi. Fl. flavi. Cal. valde inflatus, 3-gonus. Bacca sicca, rubra.

- prostrata*. P. ramosissima; caul. procumb. tereti, hirsuto: fol. subcarnosis. Herit. sirp. fasc. 3. tab. 22.

In arenosis Lima ☉.

Planta humifusa. Cotyledon. oblongæ. Caul. herbac. pedat. ab ipsa basi ramosus, fragilis, aquosus. Rami, & ramuli multi, flexuosi, alterni. Fol. ima opposita; caulina alterna; ramea gemina, altero min. petiolat. cordata, patentia, summa basi inæqualia, obtusiuscula, repando-subangulata, subtus villosa, crassiuscula, plana, fragilia, aquosa, lacte virid. 24-30 lin. long. 18-21. lin. lata. Fl. axillar. solitar-gemini, pedunculat. fragrantés, sat fugaces, 1 poll. lati. Cor. violac. intus umbone

Tom. I.

H h

exalbido, radiato lineis violaceo-intensioribus. Pedunc. villosi, floriferi breves, erecti; fructiferi elongati, reflexi. Cal. ventricoso-tubulosus, inflatus, brevis, decangulus, 5-fid: fructiferus clausus, subrotund. pellucidus, exalbidus. Bacca subrotund. viresc. 3-4. lin. lata.

298. SOLA- Cor. rotata. Anth. subcoalitæ, apice poro g-  
NUM. mino dehiscences, Bacca 2-locul. (calyc. patulo, nec turgido testæ).

\* *Inermia*.

1. *laurifolium*, S. caul. inermi, arboreo: fol. petiolat. ovato-oblong. subtus tomentosus: panícula terminal. dichotoma, divaricata, *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Amer. australi* h.

Fol. spitham. integerr. fusca. Panícula racemis secundis. Bacca nigra.

2. *verbasco-* S. caul. inermi, fruticos. fol. ovat. integerr.  
*lium*. tomentosus: umbellis composit. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 13. Pluk. alm. tab. 216. f. 1.*

*In America* h.

Altitudo humana. Planta tota tomentosa. Pedunc. terminal. semper 2-fid. ramis denuo 2-fid. Cor. alba. Bacca lutea.

3. *pseudo-cap-* S. caul. inerm. fruticoso: fol. lanceol. repandis: umbell. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 718.*

*In Madera* h.

Altitudo humana. Planta ramosa, diffusa. Fol. integerr. quandoq: geminata. Cor. alba. Bacca Cerasiformis, rubra.

4. *diphyllum*. S. caul. inerm. fruticoso: fol. geminis, altero min: fl. cymosis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 111. f. 4. mala.*

*In America?* h.

Caul. erectus: rami pauci, erecti. Fol. longitudine digiti, petiolat. ovato-lanceol. glabra. Pedunc. axill. & terminal. Cor. parva, dilute carnea. Bacca rubra.

5. *Dulcam-* S. caul. inerm. frutesc. flexuoso: fol. superior.  
*ra*. hastatis: racemis cymosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 607. Black. tab. 34. Duham. arbr. 2. tab. 72. Ludw. ed. tab. 58. Knorr. del. 1. tab. T. H. 3.*

Vite salvatica. *Muth.*

In *Europa sepibus humentibus* h.

Fol. petiolat. infer. simplic. cordato-lanceol. fordide virent. flaccida, venosa, glabra. Racemi 2 fidi, dichotomi, nudi. Fl. 1-lateral. penduli. Cor. segment. reflexis, purpuro-cœrul. ad basin nectaria 2. subrotunda, ovata, ex flavo-virescentia: apicibus croceis. Bacca ovar. coccinea. 1. *Var. fol. variegat.* 2. *fol. crassis, hirsutis.* = *Dill. elsh. tab. 273. f. 352. 3. fl. albis: 4. fl. pleno.*

6. *quercifolium.* S. caul. inermi, subherbac. angulato-flexuoso, scabro: fol. pinnatifid. racemis cymosis. *Syst. veg. ed. 14. Few. peruw. tab. 15.*

In *Peru* h.

Soror S. *Dulcamara.* Caul. scabri. Fol. in petiol. decurrent. venosa, glabra, subtus scabra. Pedunc. ramosi. Cor. violac. obrusior quam in priore, maculis 2. viridibus ad basin singulæ lacinia. Anth. flavæ. Bacca ovata.

7. *radicans.* S. caul. inerm. herbac. teretiusc. lævi, prostrato, radicante: fol. pinnatifid. racemis cymosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. dec. 1. tab. 10.*

In *Peru* 24.

Cor. parva, dilute cœrul. Bacca parva, lutea.

8. *havanense.* S. caul. inermi, frutesc. fol. lanceol. integerr. nitidis: pedunc. sub-2-fl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 35. ed. 2. piæ. tab. 48.*

In *Martinica sylvis maritimis* h.

Frutex 5-ped. Fol. alterna, petiolat. obtusiusc. Cor. ampla, tubo breviss. lacin. latis, submarginat. cœrulea. Bacca ovar. cœrul.

9. *triste.* S. caul. inerm. frutescen. fol. lanceol-oblon. subrepandis, glabris: racemis subcymosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 40. f. 2. ed. 2. piæ. tab. 49.*

In *Martinica* h.

Frutex erect. 8-ped. Fol. 7-8-pollic. longa, alterna, petiol. acuta, atro-virent. Racemi lateral. sesquipollic. crassi, simpl. vel 2 fid. Fl. parvi, albi. Bacca globosa, sordide flavescens.

10. *racemosum.* S. caul. inermi, frutescen. fol. lanceol. repandis, undulat. racemis longis, erectis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 36. ed. 2. piæ. tab. 50.*

In *Martinica, Surinam* h.



Frutex 4-ped. Fol. alterna, petiolat. nitida. Pedunc. apice crassiores, nutantes. Cor. profunde dissecta, alba. Bacca pisiform. rubra.

11. *bonariensis*. S. caul. subinerm. fruticoso: fol. ovar-oblong. sinuato-repandis, scabris. *Syst. veg. ed. 14. Pl. elth. tab. 272. f. 331.*

*In agro Bonuriensi h.*

Caul. orgyal. & ultra, flexuosus, fuscus. Fol. deltoidea, subrepanda, nuda. Pedunc. lateral. subumbell. sub 5. fid. Fl. magni, nutantes, albi, extus tomentosi. Anth. flavæ. Bacca magnitudine *Sorbi Aucuparia*.

12. *macrocarpon*. S. caul. inermi, suffrutic. fol. cuneatis, repando-angulatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zan. tab. 158. Few. peruv. tab. 46. Plur. ic. 224. f. 2.*

*In Peru h.*

Caul. ped. rigens, lævis. Fol. magna, oleracea. Fl. magni, erecti, campanulati, breviter peduncul. cærul. Bacca magnitud. pomi, globosa, subfistul. flava.

13. *tuberosum*. S. caul. inerm. herbac. fol. impari-pinnatis, integerr. peduncul. subtrivis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 523. & tab. 587. Knorr. del. 2. tab. S. 9. 10. Banh. prodr. tab. 89.*

*In Peru ☉. 24.*

Radix tuberosa. Caul. 2-3-cubital. punctul. rubris adpersus. Petiol. decurrent. Foliol. 5-7. subrotun. hirsuta, impari ma: Fl. fasciculati. Cor. subalbida.

14. *pimpinellifolium*. S. caul. inerm. herbac. fol. impari-pinnat. integerr. racemis simplicibus. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Peru h.*

Habitus sequentis. Foliol. glabra.

15. *Lycopersicum*. S. caul. inerm. herbac. fol. impari-pinnat. incis: racemis simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Pomum amoris. Black. tab. 133. Rumph. amb. 5. tab. 154. f. 1.*

*In Amer. calidiore ☉.*

Fol. interrupte-pinn. foliol. subæqual. hirsuta, pallide virent. Cor. dilute lutea. Poma orbicul. subcompressa, e luteo-rubent.

16. *pseudo-Lycopersicum*. S. caul. inerm. herbac. fol. pinnat. incis: racemis simplicibus: fructibus subvillofis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Hort. 1. tab. 11.*

*Habitas . . . .*

Simil. priori. Discrimen in racemis; & fructu min. flavescente.

17. *peruvianum*. S. caul. inerm. herbac. fol. impari-pinnat. incis. tomentof. racemis 2-part. foliolis: baccis pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Lycopersicon* &c. *Few. peruw. 3. tab. 25.*

*In Peru 24.*

Fol. incana. Cor. lacte flava, maior quam in *Lycopersico*. Bacca parva, rotunda.

18. *montanum*. S. caul. inerm. herbac. fol. suicordat. repandis. *Syst. veg. ed. 14. Few. peruw. 3. tab. 46.*

*In Peru 24.*

Radix oval. carnosa. Caul. 3-pollic. Fol. pollicar. (axillaria min.) 3-4. alterna, petiolat. Fl. terminal. bini. Cor. rosea. Stam. purpur.

19. *rubrum*. S. caul. inerm. subperennante: fol. geminis, ovat. integerr. pedunculis subumbellat. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat . . . .*

20. *nigrum*. S. caul. inerm. herbac. fol. ovatis, dentato-angularis: racemis distichis, nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 460. Black. tab. 107. Ludw. ed. tab. 172. Knorr. del. 2. tab. S. 3. Sabb. hort. 2. tab. 60.*

Solatro degli Orti. *Math.*

*In O-bis totius cultis ☉.*

Caul. pedat. anceps, ramosus. Fol. alterna, longe petiolat. subpendula, mollia, villosa, tenera, nervosa, atro-virent. Fl. corymbosi. Cor. parva, alba, apicibus luteis. Bacca parva, nigra. *Var. 1. fol. laciniat: 2. fol. minus undosis, baccis rubris: 3. fol. hirsutioribus; baccis luteis.*

21. *scandens*. S. caul. inerm. volubil. fol. cordat. ovatis, dependentibus, subtus mollissimis: panicul. terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In Surinamo.*

Caul. herbac. Fol. alterna, petiolat. remota. Cor. laciniis lanceol. recurvis. Bucca globosa, Cerasi magnitudine.

22. *quadrangulare*. S. caul. inerm. herbac. 4-gono, scabro: fol. rhombæis, dentat. integrisque. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*Ad cap. b. Spei.*

Differt præcipue caul. 4-gono, hirsuto. Fol. sæpe decurrunt, & caulis angulos crispus format. *Var. fol. lanceol. integris.*

23. *æthiopica*. S. caul. inerm. herbac. fol. ovatis, repando-angulatis; peduncul. fertilibus 1-fl. cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 12. Pluk. phyt. 226. f. 4. Lob. ic. 265.*

*In Æthiopia, China* ☉.

Caul. rigidulus. Fol. *S. Bonariensis*, palmar. obtusa, costa aculeata. Cal. aculeat. Cor. alba, Fructus magnus, globosus, depressus, profunde torulosus, & quasi in lobos sectus, durus, ex phœniceo-ruber.

24. *Melongena*. S. caul. inerm. herbac. fol. ovatis, tomentosis; pedunc. pendulis, incrassatis; calycibus inermibus. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. 226. f. 2.*

*In Indiis* ☉.

Caul. subruber. Fol. longe petiolat. sinuata, aut plicata, dentata, nigricant. Cor. alba, aut purpur. Fruct. magnus, pendulus, albus, aut purpur.

25. *lyratum*. S. caul. inerm. herbac. erecto: fol. lyrato-hastatis, tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

*In Japonia*.

Planta tota tomentosa, & inermis. Caul. flexuosus, ramosus, teres. Fol. sparsa, petiol. ovata; inferior. lyrato-pinnatifida; super. hastata, pollicar. pinnæ lateral. suboppositæ, 4-raro pl. integræ; terminalis maj. acumin. integra. Fl. versus apicem axill. & terminal. paniculati. Panicul. subdichot.

\*\* *Aculeata*.

26. *insanum*. S. caul. herbac. aculeat. fol. ovat. tomentosis; pedunc. pendulis, incrassatis; calycibus aculeat. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 549. Konrr. fl. 1. tab. T. 10. Pluk. alm. tab. 226. f. 3. Moris. hist. 3. f. 13. tab. 2. f. 2.*

*Trongum hortense. Rumph. amb. 5. tab. 85.*

*In Indiis* ☉.

Valde adfines *S. Melongenæ*. Caul. vix ramosus, tomento stellato. Fol. subsinuata. Pedunc. solitar. penduli, incrassati, 1-fl. Poma magna, oblong. quandoq. striata, lutea, magnitudine varia.

27. *ferox*. S. caul. herbac. aculeato: fol. cordat. angulatis, subtus tomentosis; baccis hirtis, calyce obtectis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Malabar*.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 489

*Statura S. Melongenæ*. Fol. ampla, petiolat. aculeis erectis adpersa, supra villosa. Cal. campanulat. tomentosus, valde aculeat.

28. *campes-  
triensis*. S. caul. aculeat. hirtus: fol. cordat-oblong. 5-lobis; sinibus obtusis, elevatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 368. f. 347.*

*In America* ☉.

Caul. frutesc. pedat. aculeis patentibus, rectis, purpurasc. Fol. petioli latere super. purpur. Pedunc. lateral. gemini, altero 1-fl. altero sub-4-fl. Cor. alba, vel cœrulea.

29. *mammom-  
sum*. S. caul. herbac. aculeat. fol. cordatis, angulato-lobatis, utrimq. villosis, aculeatis. *Syst. veg. ed. 14. Merian. Surinam. tab. 27. Pluk. alm. tab. 225. f. 1.*

*In Virginia, Barbados* ☉.

Fol. longitud. & latitud. æqual. obtusiusc. nervis, & aculeis flavescentibus. Baccæ pyri parvi inversi forma, & magnitud. lutea.

30. *panicula-  
tum*. S. caul. petiolisque aculeatis: fol. sinuato-angul. supra glabris: fl. paniculat. *Syst. veg. ed. 14. In Brasilia.*

Caul. & petiol. albo-tomentosi, aculeis rectis, rarioribus. Caul. 3-6-ped. Fol. lata, cordata, acutiusc. Panicul. composita, tomentosa. Cor. cœrul. alba.

31. *virgini-  
num*. S. caul. aculeat. angulat. fol. pinnatifid. undiq. aculeat. Lacin. sinuat. obtusis; calycibus aculeat. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 267. f. 346. Pluk. alm. tab. 62. f. 3.*

*In America* ☉.

Spinæ multæ, validæ, nivææ.

*Differt a S. Sodomæo ramis angulatis, sed an-  
num. Baccæ parvæ, variegatæ e viridi, &  
albo.*

32. *indicum*. S. caul. fruticoso, aculeato; fol. cuneiformibus, angulatis, subtus tomentosis, aculeis utrimq. rectis. *Syst. veg. ed. 14. Sibb. hort. 2. tab. 58. Burm. Zeyl. tab. 102. Robert. ic. 28. Dill. elth. tab. 270. f. 349.*

*In India utraque* ☿.

Caul. hirsutus, spinis confertis, rectis, flavis, apice fuscis. Fol. petiol. utrimq. hirta, aculeis ut in caul. Fl. peduncul. Cal. inerm. sed hispida.

Differt potissimum a *S. Sodomeo* fol. subtus tomentosis: fl. min. vulgaris magnitudine: pedunc. ramosis: fructibus croceis; & fol. laciniis acutis.

33. *fuscatum*. *S.* caul. fruticoso, aculeat. fol. ovat. obtuse lobat. aculeis utrimq. rectis; superioribus coloratis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Habitat* . . .

34. *carolinense*. *S.* caul. aculeat. annuo: fol. hastato-angulatis; acul. utrimq. rectis; racemis laxis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 269. f. 348.*

*In Carolina* ☉.

Caul. 1-2-ped. brachiati, hirsuti, e viridi albicant. Fol. 1-fesquipalmar. 2-3. unc. lata, raro, & irregulariter sinuata, sinubus oblique sibi respondentibus, basi integra, scabra, vix tomentosa, spinis in costa, non lateribus, utrimq. virentibus. Racemi simpl. Cor. ampla, Borraginea, e violac. dilute purpur. Bacca pisiform. lutea.

35. *sodomeum*. *S.* caul. fruticoso, aculeat. tereti: fol. pinnatifido-sinuat. sparfe aculeat. nudis: calycibus aculeat. *Syst. veg. ed. 14. Herm. Lugd. tab. 575. Morif. hist. 3. f. 13. tab. 1. f. 15. Pluk. alm. tab. 316. f. 4.*

*In Africa* h.

Caul. subvillos. aculeis sparsis, remotis, compressis, recurvis, luteis. Fol. oblong. sinubus rotundat. utrimq. viridia. Pedunc. lateral. longi, ramosi, aculeati. Cor. Borraginea, ex cœrul. pallescens. Bacca magna, rotunda, lutea.

36. *sanctum*. *S.* caul. fruticos. aculeat. aculeis toment: foliisq. oblique ovat. repandis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 316. f. 52.*

*In Palaestina* h.

Caul. cinereus, acul. crassis, rectis, brevibus, flavescentibus, apice tomentos. Fol. crassa, toment. obtusa: tenella pinnatim sinuata, margine albido. Petiol. subrus aculeati. Pedunc. lateral. pedicello primario cum calyce spinoso. Cor. Borraginea, cœrul. purpurasc. Bacca lutea.

37. *hybridum*. *S.* caul. fruticos. aculeat: fol. ovat. acut. subinermibus, repandis; tenellis, dorso, & ad oras violac-pulverulentis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 113.*

*Habitat* . . .

Aculei validi. Caul. 2-ped. ramis tomento pulverul. obfritis. Fol. petiolat. undulata, pallide virent. Pedunc. racemosi, tomentosi, umbellati, fusco-violac. pauci, 1-fl. Cal. tomentosus. Cor. pallide cœrul. Bacca subrotunda, depressa, subfulcata, pendula, col. aurantiaco, nitida.

38. *coccineum*. S. caul. fruticos. aculeat. fol. ovatis, subrepandis, uno, alterove aculeo armatis, subtomentos. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ic. rar. tab. 24.*

*Habitat* . . .

Frutex 2-ped. breviter, & rariter aculeatus. Rami patuli, teretes, aculeis rectis, subulatis, fuscescent. armantur. Fol. late ovata, obtusa, alterna, petiolat. fordide virent. nervo medio utrimq. & petiolo rariter aculeato. Racemi oppositifol. breves, simplic. subinerm. tomentosi. Cal. parvus, subinermis, tomentosus. Cor. rotata, profunde 5-fid. calyc. multoties longior, albida, vel subpurpurea. lacin. ovatlanceol. acutis. Bacca pisiform. rubra, dein fordide aurantiaca.

39. *tomentosum*. S. caul. fruticos. aculeat. acul. acerosis: fol. cordatis, inermibus, subrepandis: tenellis purpureo-pulverulent. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zan. tab. 157. Triumf. præl. tab. 6. Bocc. sic. tab. 5.*

*In Æthiopia* h.

Planta tota tomentosa, aculeis angustiss. Fol. utrimq. virid. obtusa, fere sola costa spinosa. Baccæ fulvæ, magnitudine *Grossulariæ*.

40. *bahamense*. S. caul. fruticoso, aculeat: fol. lanceol. obtusis, repandis, margine reflexis: racemis simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elch. tab. 271. f. 350. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 11. f. 3.*

*In Amer. Insula Providentia* h.

Caul. 1-2-pedal. Fol. *Castanæ* simil. parum sinuata, spinosa, supra atro-virent. & subhirsuta; subtus dilutiora. Fl. parvi. Cor. e cœrul-dilute purpurea. Bacca pisiform. e croceorubra.

41. *igneum*. S. caul. fruticoso, aculeat. fol. lanceolat. acumin. basi utrimq. revolut: racemis simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hor. 1. tab. 14. Pluk. alm. tab. 225, f. 5.*

*In Amer. h.*

*Simil. priori, sed fl. albi &c. Spinæ copiosiores, validiores, rubro-ignæ.*

Altitudo hñā. Fol. iuniora villosa; adulta glabra. Cor. alba, vel subpurpurea. Bacca pisi-form. flava.

42. *trilobatum*. S. caul. fruticos. aculeato: fol. cuneiformibus, obtusis, subtrilob. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 22. f. 2. Pluk. alm. tab. 316. f. 5.*

*In Jamaica, ad cap. b. Spei h.*

Caul. altus, angustus. Fol. parva. Aculei reflexi in caul. petiol. fol. pedunc. Pedunc. 1-fl. Cal. minim. Bacca parva, *Sambuci*.

*An 2. sp. cum una fl. parvis, albis; altera magnis, violac.?*

43. *Stramoni-folium*. S. caul. fruticos. aculeat. fol. cordat. acutis, lobatis, aculeat. subvillosis: calyc. inermibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. ic. rar.*

*Habitat*

Caulis, fol. utrimque, petioli, rami dense aculeati: in caule plurimi recurvi; reliqui recti. Truncus cinereus, exasperatus. Fol. ampla, maiora cum petiolo pedalia, alterna, utrinq. villosa, & mollia, lobis sublanceolat. acutis. Petioli teretes, villosi-asperi. Pedunc. breves in caule, & ramis inter proxima fol. enascuntur, folio superiori oppositi, horizontaliter patentes. Pedicilli plurimi, circulariter dispositi, subvillosi, sicuti calyx. Cal. minimus, lacin. subrotund. Petal. pallide purpurascens. aut albida, lacin. longis, lanceolat. patentissim.

44. *margina-tum*. S. caul. fruticoso, aculeat. fol. cordat. repandis, margine albis. *Syst. veg. ed. 14. Murr. Comm. Gottin. 1783. tab. 4.*

*S. niveum. Allion. Aud. Misc. Taur.*

*S. Abyssinicum. Jacq. hort.*

*Schunda, aut Chunda. H. Mal. 2.*

*In Abyssinia h.*

Caul. albo-tomentos. Fol. supra virid. subtus alba, tomentosa, acul. utrinq. rectis. Fl. racemosi, campanul. plicati. tomentosi, albi, simil. *S. tuberoso*. Cal. inerm: fructiferi aculeati.

45. *capense*. S. caul. fruticos. aculeat. tereti: fol. sinuat-

pinnatifid. aculeat. nudis; lacin. alternis, obtulis, integris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Ad. cap. b. Spei.*

Planta copia aculeorum horrida.

\*\*\* *Spinosa.*

46. *lycinoides*. S. caul. spinoso, fruticoso: fol. ellipticis. *Syst. veg. ed. 14.*

*In Peru? h.*

Frutex facie Lycii. Caul. inermis, ramis omnibus in spinam desinentibus. Fol. parva, petiolat. laevia. Fl. lateral. solitar. Cor. rotata, sub-5-fid.

*bombense*. S. caul. frutesc. inermi; fol. ovalibus, integerr. racemis corymbosis. *Jacq: amer.*

*In fruticetis circa Carthagenam h.*

Arbuse. 12-ped. comosa. Fol. in planta iunioræ sæpe pedal. Fl. parvi, albi.

*subinermis*. S. caul. frutesc. subinermi: fol. lanceol-ovat. integerr. *Jacq: amer. tab. 40. f. 3. ed. 2. pic. tab. 259. f. 15.*

*In Carthagenæ fruticetis h.*

Frutex 6-ped. Fol. 3-4. poll. longa, alterna, petiol. acuta, supra glabra, subtus subroment. Racem. lateral. 2-3-pollic. peduncul. secundis. Cor. cœrul. Bacca globosa.

*trifoliatum*. S. caul. fruticos. aculeat: fol. ternatis, ovat. integerrim. *Burm. Ind. tab. 22. f. 3.*

*Habitat Coromandeli h.*

Caul. spinis incurvatis, rarioribus. Fol. altern. petiol. glaberr. nuda.

*terminale*. S. caul. frutesc. inerm. fol. ovalibus, acut: umbell. terminalibus. *Forsk. Æg.*

*In Arabia h.*

Caul. decumben. verrucosi, summi pubescent. raro apice volubili. Fol. alterna, patent. pubescent. Petioli leviter alati: lamina 2-pollic. integra, villosa, subciliata. Cor. patens, alba. Anth. flavæ.

*ægyptiacum*. S. fructu rubro: fol. subangulat. glabris. *Forsk. Æg.*

*In Arabia.*

*Var. fol. integris, villosiss: fruct. nigro.*

*In Cephalalgia frontis illinitur succus fol. expressus.*



- incanum*. S. Forsk. Æg.  
In Arabia.  
Caul. pedunc. petiol. & costa fol. supra, & intra valde aculeati. Cal. subinerm. Fl. racemosi, albid. Bacca pisiform. rubra.  
Fol. recentia vulneribus imponuntur.
- armatum*. S. Forsk. Æg.  
In Arabia.  
Planta horridis spinis armata. Caul. procumb. Aculei semipollic. albi. Fol. & cor. S. Bahamensis.
- coagulans*. S. Forsk. Æg.  
In Arabia 24.  
Caul. sæpe aculeati. Fol. ovat-obl. obtusa, sinuata, sæpe inerm. sæpe costa, & petiol. spinosis. Cal. hispidus. Bacca globosa, nucis magnitudinis, coriacea, flava.  
Acini lacti recenti immittuntur, ut statim coagulet.
- cordatum*. S. caul. fruticos. subacul: fol. cordato-subrot: integris, inermibus. Forsk. Æg.  
In Arabia.  
Fol. semipollic. petiolat. Pedunc. lateral. solitarii, 1-fl. Cor. deflexa, violac. Anth. flavæ. Bacca pisiform. pulposa, rubra.
- villosum*. S. fol. villosis, ovalibus, basi obliquis, margine repandis. Forsk. Æg.  
In Arabia.
- zeylanicum*. S. fruticosum: caule; fol. sinuatis; pedunculis; calycibusque aculeatis. Scop. Delic. Insul. fasc. 1. tab. 1.  
Habitat . . . h.  
Caul. fuscus, villosus, ramis ramulosis; aculeis violaceis, rectis, striatis. Fol. ovata, obtusa, villosa, aculeis supra crebrioribus. Petiol. aculeati, fol. breviores, teretes, villosi. Pedunc. solitar. petiolis oppositi, sæpius 2-fl. aculeati, villosi. Membrana violac. pellucida, dentibus calyc. interposita. Cor. rubro-violac. tubo flavo. Bacca flava, ovata, aut sphaerica, pendula, glabra. Planta odore, & sapore nullo.
- mauritianum*. Differt a S. indico, statura multo minore; fol. obtusis; sinibus rotundatis; & fructu luteo.  
S. frutescens; ramis superioribus lanatis: fol. oblongis, integris, tomentosis: racemis ter-

minalibus, glandulosis. Scop. Delic. Insub. fasc. 3. tab. 8.

In Insulis Mauritanis h.

Differt a *S. Verbascifolio*, cui caulis rimosus; ramificatio irregularis; fol. ovata, opposita, duplo breviora, ex quorum alis nullum exit foliol. Racem. unicus, multo longior, ex angulo divisionis ramulorum supremorum prodiens; cor. alba; glandulae nullae.

Nostro coryledones lanceol. tomentosae, breviter petiolatae. Fol. in ultimis dumtaxat ramulis; ex quorum alis foliola solitaria, recurva. Racemus dichotomus, lanatus. Fl. congesti. Cor. parva, violac.

299. CAPSICUM. Cor. rotata. Bacca exsucca.

1. annuum. C. caul. herbac. pedunc. solitar. Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. hort. 2. tab. C. 6. Black. tab. 129.

Vallia capo-molago: Hort. mal. 2. tab. 35.

b. C. tetragonum. Mill. Diā.

In Amer. merid. ☉.

Caul. 2-ped. angulat. Fol. alterna, geminata, longe petiol. ovat-acumin. integerr. atro-virent. glabra, nitida. Fl. oppositifol. Cor. alba. Fruct. ovat-acumin. corallinus, splendens.

2. baccatum. C. caul. fruticos. laevi; pedunc. geminis. Syst. veg. ed. 14. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 146. f. 1.

Piper &c. Rumph. amb. 5. tab. 88. f. 2.

In Indiis h.

Differt a *C. fruticoso*, caul. teneriore, magis frutesc. nec scabriusc. baccis ovat. minimis, magnitudine Ribeos, nec Cerasi; ramis divaricatis; calyc. dentibus subulatis, patulis, nec obsoletis.

3. sinense. C. caul. fruticos. fl. fructibusque pendulis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Hort. app. tab. 62.

In Martinica h.

Caul. lignosus, perennans. Fol. alterna, longe petiol. ovat-acumin. integerr. Pedunc. breves, 1-fl. solitar. vel gemelli, nutantes. Cor. albo-flavesce. Fructus ovati, obtusi, obsolete angular. nitidi, flavi.

4. grossum. C. caul. suffrutescent. fructibus incrassatis, variis. Syst. veg. ed. 14.

Piper &c. *Bess. cyth. aus. tab. 2. f. 1.*

*In India* h.

Simil. *C. annuo*, sed caul. perennans, spitham. subramosus. Fruct. relate ad plantam maximus, Mali fere magnitudine, erectus, solitar.

3. *frutescens*. *C. caul. fruticos. scabriuscul. pedunc. solitar. Syst. veg. ed. 14. Clus. exot. 340. f. 2. Rumph. amb. 5. tab. 88. f. 1. 3. 4.*

*In India* h.

Frutex non bene sese sustentans. Fruct. oblong. compressus, ruber.

300. STRYCHNOS. Cor. 5-fid. Bacca 1-locul. cortice lignoso.

1. *Nux vomica*. *S. caul. inerm. fol. ovatis. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 395.*

*Caniram. Hort. Mal. 1. tab. 37.*

*In India* h.

Arbor procera, ramis densis, late sparsis. Fol. opposita, se mutuo oblique decussantia, supra tubnitentia, nervosa, saporis amari. Fl. subumbell. parvi. Pet. e viridi-lutea. Fruct. rotundus, glaber, absque rugis, per maturitatem candidus, cortice crassiusc. & fragili, amarus. Sem. intra carnem, rotunda, compressa.

2. *colubrina*. *S. fol. ovat-acutis; cirrhis simplicibus. Syst. veg. ed. 14.*

Arbor ligni &c. *Rumph. amb. 2. tab. 37.*

Lignum colubrinum. *Black. tab. 403.*

Modica-caniram. *H. Mal. 7. tab. 5.*

*In India* h.

Arbor *Malo Punicae* simil. spinis brevibus, & firmis horrida. Rad. lignosa, brachii crassitie, acris, amarissima, cortice ferrugin. maculis ciner. notato. Caudex cort. candido. Fol. lutea, aspectu pulcherrima, binata, trinervia. Fruct. orbicul. ma: fuscus. Sem. orbicul-compressum.

Contendunt *Indiæ Botanici*, hanc a *Nuce vom.* non esse diversam. *Lin. Suppl.*

3. *potatorum*. *S. inerm. fol. opposit. petiolat. ovat. acutis: panicui. verticillat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In montosis ad Madrag. h.*

Arb. ramis opposit. Fol. breviss. integerr. glabra, 3-nervia, venosa. Panicul. ad articulos superior. ramorum, 4-6. parvæ, simpl. peduncul. paucifl. Fl. parvi, nutantes. Bacca Cerasifor-

mis, obscure rubra, gustui primum dulcis, dein amara, & adstringens.

301. GENIPA. Cor. rotata. Stigm. clavatum. Bacca 2-locul. Sem. nidulant. cordata.

1. *americana*. G. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 136.*

*In Amer. merid. h.*

Arb. 80-ped. ramosa. Fol. densa, petiolat. oblong-rotund. glabra, nitida, venosa, supra atro-virid. subrus dilutiora. Racemi multiss. Fl. breviter peduncul. Cal. e viridi-flavesce. Cor. alba, aut albo-flavesce. odora. Fruct. fig: ovi Gallinacei, gratus, subacidus, sed atro col. ora inficit, col. primum subvirid. dein rubro, tandem ciner. Caro albicans. Sem. rubicunda.

302. IGNA- Cal. 5-dent. Cor. infundibulif. longiss. Drupa  
TIA. 1-locul. polysper.

1. *amara*. I. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

*In India h.*

Arbor. ramosiss. ramis longis, sarment. scandentibus. Fol. spitham. opposita, petiolat. ovata, acuta, plana, integerr. venosa, glaberr. Panicul. axill. parvæ, ex pedunc. 3-5-fl. Fl. longiss. nutantes, albi, odore Jasmini. Fructus ovarus, collo attenuato, cortice sicco glaberrimo, magnitudine *Pyræ bon-chretien* dicti.

*Vulgo Faba S. Ignatii offic.*



11.3.79

Ph 19376

005669108



